Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” (Nueva Serie)
Año 2016 | Vol. 20 | N° 1 | Pág. 1-627 | ISSN 0325-3856

AVES ARGENTINAS: DESCRIPCIÓN, COMPORTAMIENTO, REPRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Charadriidae a Trochilidae

Última actualización: Julio de 2016







Martín R. de la Peña

Colaborador: Sergio Salvador

Dibujos de nidos: Elda Krüger

Museo Provincial
de Ciencias Naturales
«Florentino Ameghino»

ORDEN:CHARADRIIFORMES

TEROS Y CHORLOS

FAMILIA:CHARADRIIDAE

Aves de las patas largas.

El nido es poco elaborado. Ligera excavación, bordeada de palitos, pastos, tallos de yuyos, materias fecales de bovinos o de equinos.

Ponen huevos en el suelo, 3 ó 4, piriformes. Con manchas (miméticos).

Los pichones son nidífugos.

Se alimentan de vermes, caracoles, crustáceos, moluscos, larvas, insectos, lombrices.

Frecuentan playas marinas, turbales, orillas de lagunas, pantanos, esteros, bañados, charcos, áreas rurales, ruderales.

CHORLO PAMPA *Pluvialis dominica* (Statius Müller, 1776)

Otros nombres: Chorlito. Chorlaco. Chorlito dorado. Chorlo. Chorlo de chacra. Chorlo del campo. Chorlo dorado. Chululú. Mbatutuí pecho de mármol. Mbatutuí pecho listado. Playero de oro.

DESCRIPCIÓN
Largo: 24-28 cm.
Peso: Salvador (1990a): N= 1 (?) 132,0 g; Salvador (2014a): N= 4 (M) X= 148,0 g (Rango 133 a 162); N= 3 (H) X= 144 g (Rango 136 a 149)
Coloración. Pico negro. Patas grises oscuras. Iris pardo.
Plumaje de reposo sexual.
Cara, cuello y pecho blanquecinos jaspeados de pardo claro. Frente, ceja y resto de lo ventral blanquecinos.
Dorsal parda oscura con plumas orilladas de blanquecino.
Alas pardas oscuras. Cubiertas como el dorso. Axilares grises parduscas.
Cola parda y grisácea.
Plumaje nupcial.
Corona y posterior del cuello negros jaspeados de amarillento. Partes dorsales pardas oscuras con puntos amarillos dorados. Frente, ceja, lados del cuello y del pecho blanco. Garganta, lados de la cara, pecho y abdomen, negros.

COMPORTAMIENTO
Forma grupos dispersos. Se lo ve en campos o cerca del agua.

Alimentación
Zotta (1934). **Insectos:** Ortópteros (*Schistocerca paranesis*)
Bucher y Herrera (1981). **Insectos:** Coleópteros.
Klimaitis (1993). Coleópteros. Piedritas.
Isacch y Martínez (1998). **Insectos:** Coleópteros. Dípteros (larvas). Hormigas. Lepidópteros (larvas). **Crustáceos:** Isópodos. **Moluscos:** Gasterópodos. **Otros:** arácnidos, lombrices, semillas, vegetales.

Iribarne y Martínez (1999). **Crustáceos:** Cangrejos (*Uca uruguayensis*)
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Carabidae, Curculionidae, Scarabaeidae, Tenebrionidae: larvas). Hymenoptera (Formicidae). Lepidoptera (orugas, crisálidas). Orthoptera (Acridiidae, Tettigonidae). **Crustáceos:** Gammaridae (*Gammarus* sp.)

HÁBITAT
Estepas, praderas, costas marinas y de lagunas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño mediano. Ceja blanquecina. Dorso pardo, ventral blanquecinoa

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Pluvialis dominica (Statius Müller, 1776) migratorio del Ártico de Norteamérica. Llega hasta Tierra del Fuego y las Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Migratorio del Ártico de Norte América. Durante la primavera y verano austral llega hasta Centro América e Islas del Caribe y Sud América, hasta Bolivia y centro de Argentina. Por la costa Atlántica llega hacia el sur hasta Tierra del Fuego.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Coconier (2005b); Codesido et al. (2013); Dabbene (1920d); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Fiameni (1994); Gibson (1920); Hartert y Venturi (1909); Isacch y Martínez (2003); Klimaitis (1975b, 1993); Morici (2012b); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1927d, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Weller (1967a); White (1882)

Observaciones: De la Peña (San Clemente del Tuyú, pdo. Gral Lavalle, 14-01-1983)

Catamarca
Citas: Carma (2009); Salvador (1990a)

Chaco
Citas: Contreras et al. (1990b)



Chubut
Citas: Bradley et al. (1985); Gatto et al. (2005); Harris (2008); Kovacs et al. (2005); Pagnoni (1995)

Córdoba
Citas: Bucher y Herrera (1981); Miatello et al. (2003); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores y Yzurieta (1980b); Osinaga Acosta et al. (2006); Salvador (1983a); Yzurieta (1995)

Corrientes
Citas: Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); De la Peña (1996b, 2012b); Muzzachiodi (2001a, 2002); Muzzachiodi et al. (2003); Serié y Smyth (1923)

Formosa
Citas: Contreras (1987c, 1993b); Contreras et al. (2014); Gorleri et al. (2011)

Observaciones: Bodrati, A. (*in litt*. 2012)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Dabbene (1920d); Laredo (1996)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Siegenthaler (1984); Tejerina et al. (2006)

Mendoza
Citas: Martínez et al. (1997a); Sosa (1995d); Wetmore (1926b)

Misiones
Citas: Chebez (1996a)

Neuquén
Citas: Del Valle et al. (1989); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Casas (1988); Gelain (2001); Gelain y Tolosa (2011); González (1990); Llanos et al. (2011)

Salta
Citas: Echevarría et al. (2014); Moschione et al. (2013)

San Luis
Citas: Nellar Romanella (1993)

Santa Cruz
Citas: Chebez et al. (1988); Darrieu et al. (2008); Gandini y Frere (1998b); Ramilo y Pastore (2015)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2011f); Fandiño y Pautasso (2011); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Maugeri et al. (2009); Wilson (1926)

Santiago del Estero
Citas: Moschione y Bishels (2004); Nores et al. (1991)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Humphrey et al. (1970)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Dabbene (1920d); Echevarría y Chani (1999, 2000, 2006); Echevarría (2001); Echevarría et al. (1998, 2008c); Laredo y Vides-Almonacid (1999); Lucero (1983)

Islas Malvinas
Citas: Woods (2006)

CHORLO ÁRTICO *Pluvialis squatarola* (Linnaeus, 1758)

Otros nombres: Chorlito gris. Chorlo blanco. Chorlo gris. Chorlo de pecho negro. Pollo cabezón. Pollo de mar grande.

DESCRIPCIÓN
Largo: 27-31 cm.
Peso: Harrington et al. (1986): N= 5 (?) X: 292,5 g.
Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo oscuro.
Plumaje de reposo sexual.
Frente, cejas, cara, cuello por delante, pecho y flancos blanquecinos. Dorso pardo grisáceo con las plumas marginadas de blanquecino. Supracaudales blancas. Cola blanca barrada de pardo. Punta de la cola parda. Remeras pardas oscuras con base blanca. Cubiertas alares pardas oscuras con las plumas orilladas de blanquecino. Axilares negras.
Plumaje nupcial.
Cara, cuello anterior, pecho, vientre, flancos y axilares negros. Abdomen y subcaudales blancos. Resto de la cabeza blanco, con la corona manchada de pardo. Dorsal parda, negruzca y blanquecina. Rabadilla y banda alar blancas.

COMPORTAMIENTO
Alimentación
Iribarne y Martínez (1999). **Crustáceos:** Cangrejos (*Uca uruguayensis*)

HÁBITAT
Playas marinas y de lagunas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño mediano. Cejas, ventral, rabadilla y banda alar blancas. Cola barrada. Axilares negras, visibles en vuelo.
Se parece al Chorlo pampa, pero se diferencia por tener axilares negras, rabadilla y banda alar blancas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758) migratorio del Ártico. Llega a lagunas del interior, Jujuy, Córdoba, Santa Fe y costas de Buenos Aires a Tierra del Fuego.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en todo el Ártico extremo, más al norte que la mayoría de las aves (Nuevo y Viejo Mundo). Desde allí migra a playas y ambientes acuáticos de todo el mundo.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Coconier (2005b); Darrieu y Camperi (2001a); Delhey et al. (2001c); Gavensky (2013); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b)

Córdoba
Citas: Miatello et al. (2003); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores y Yzurieta (1980b); Osinaga Acosta et al. (2006); Yzurieta (1995)

Chubut
Citas: Bradley et al. (1985)

Jujuy
Observaciones: Camperi et al. (2012); Moschione (2010b)

Río Negro
Citas: Canevari (1979); Gelain y Tolosa (2011); González (1990); Paz Barreto (1997b); Llanos et al. (2011)

Santa Fe
Citas: Baldo et al. (1995); Giraudo et al. (2008)

Tierra del Fuego
Citas: Jehl y Rumboll (1976)

CHORLO CABEZÓN *Oreopholus ruficollis* (Wagler, 1829)

Otros nombres: Chorlaco. Chorlito. Chorlo. Chorlo campestre. Chorlo canela. Chorlo colorado. Chorlo de campo. Chorlo de garganta oxidada. Chorlo de loma. Chorlo de vientre negro. Chorlo garganta tostada. Chorlo pampa. Chorlo rastrojero. Pachurrón. Pampero. Pollo de campo. Talulo. Tinta. Tinta-yesgüí. Tiula. Yesgüí.

DESCRIPCIÓN
Largo: 25-29 cm.
Peso: Contreras (1975): N= 1 (H) 132,5 g; Camperi (1992c): N= 3 (M) X: 183,3 gr (Rango 150 a 200); N= 2 (H) 150 y 200 g; Christie et al. (2004): N= 1 (?) 169 g; Salvador (2014a): N= 1 (M) 142,5 g; N= 1 (H) 133 g
Coloración. Pico negro. Patas naranjas o rosadas con tibias parduscas. Iris pardo oscuro.
Corona, cuello y partes dorsales pardas grisáceas estriadas de negro y canela. Frente y ceja superciliar ocráceas. Línea oscura a través de los ojos. Rabadilla gris pardusca. Garganta y cuello canelas. Pecho pardo grisáceo. Mancha negra en el vientre. Resto de lo ventral ocráceo.
Primarias pardas con los raquis y zonas adyacentes blanquecinas. Secundarias pardas con puntas blanquecinas. Cobijas alares como las partes dorsales. Cola gris con franja subterminal negra.

COMPORTAMIENTO
Se para con el cuerpo erguido. Arisco.

Alimentación
Fiora (1939). Insectos y larvas.
Zotta (1934). **Insectos:** Coleópteros (Escarabacidae, Curculionidae). Dípteros. Himenópteros. Lepidópteros.
Zotta (1940c). **Insectos:** Coleópteros. **Otros**: Lombriz (*Pheretima*). Minerales. Semillas.
Olrog (1956a).**Insectos:** Coleópteros. Langostas.
Humphrey et al. (1970). **Insectos:** Coleópteros.
Klimaitis (1993).**Insectos:** Coleópteros. **Crustáceos:** Isopoda (Bicho bolita). **Otros:** semillas.
Isacch y Martínez (1998). **Insectos:** Coleópteros. Dípteros. Hormigas. Lepidópteros (larvas). Ortópteros. **Arácnidos. Otros:** lombrices, semillas, vegetales.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Curculionidae, Scarabaeidae, no identificado). Hemiptera. Lepidoptera (crisálidas). Orthoptera (Acridiidae). **Crustáceos:** (Isópodos terrestres)

Anélidos: Oligoquetos: (lombrices de tierra).


Voces
Straneck (*in litt*.). En vuelo emite un suave y melancólico Juirrhh...juir..juirrhh..

HÁBITAT
Estepas, turbales. En otoño e invierno praderas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos y/o pichones en Jujuy, Salta, Mendoza, Córdoba, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N



Expuesto. Rudimentario. Depresión en el suelo, con o sin pastos en la base.

Miatello et al. (1999). Nidifica en Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba.
Jehl y Rumboll (1976). Río Grande. Cabo Peñas, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego. Nido con 3 huevos.
Contreras (1977b). Valle del río Collón Curá, Neuquén, nidifica entre setiembre y octubre.
Albrieu et al. (2004). Nidifica entre setiembre y diciembre. Construye en pequeñas depresiones en el suelo, en sectores pedregosos y más bien abiertos, con pastos cortos.
Sosa (2005). Llancanelo, dpto. Malargüe, Mendoza. Nidifica en el lugar.

Huevos
Pone 3 ó 4 huevos. Pardos con pintas negras.

Medidas
Goodall et al. (1951):42,3 a 44,2 x 32,2 a 33,1

PICHONES
Observaciones
Salvador (*in litt*.). Península Valdés, dpto. Biedma, Chubut, 09-11-1979, una pareja con 2 pichones de 2-3 días, a orillas de un camino de ripio.
Belcher (1936). Pilcaniyeu, dpto. Pilcaniyeu, Río Negro, 05-12-1935, un pichón.
Humphrey et al. (1970). Viamonte, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego, 09-12-1931, pichones, observados por Reynolds.
Laredo (1996). Laguna Pozuelos, Jujuy, nidos en setiembre y juveniles en diciembre.
Christie et al. (2004). Pichones en diciembre en el noroeste patagónico.
Petracci et al. (2004a). El Nihuil, Mendoza, 100 km al sur, el 01-12-2001, en la ruta provincial 180, 3 adultos con pichones.
Colina (2011). Recta Tin-Tin, dpto.Cachi, Salta, adulto con un pichón el 28-10-2008.
De la Peña (2013c). Puerto Deseado, dpto. Deseado, Santa Cruz, 07-11-1979. Pareja con un pichón.

Depredadores
De adultos: *Falco peregrinus* (Peres y Peres 1985,Ellis et al. 2002)

Otros
Dabbene (1926g). Dolores, pdo. Dolores, Buenos Aires, un ejemplar con Semialbinismo.
Urcola (2011). Un ejemplar con Leucismo parcial.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño mediano. Notable mancha negra en el vientre. Dorso estriado de negro. Cuello canela.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Oreopholus ruficollis ruficollis (Wagler, 1829) por la cordillera y precordillera desde Jujuy y Sierras Grandes (Córdoba) y por el llano desde Chubut hasta Tierra del Fuego. Accidental en las Islas Malvinas.
En otoño migra hasta Tucumán y Santa Fe.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Desde Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Oreopholus ruficollis ruficollis (Wagler, 1829)

Buenos Aires
Citas: Camperi (1992c); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Hartert y Venturi (1909); Isacch y Martínez (1998, 2003); Klimaitis (1975b, 1993); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Marelli (1933); Morici (2012b); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Roesler (2001a); Straneck (1990a); Zapata (1998)


Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009)

Chubut
Citas: Camperi (1998); Daciuk (1977c); Darrieu y Camperi 2000 (2001); Hartert y Venturi (1909); Pagnoni (1995); Sainz-Trápaga (2014)

Observaciones: De la Peña (Punta Clara, dpto. F. Ameghino, 05-11-1979)

Córdoba
Citas: Heredia (2006); Miatello et al. (1993, 1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Ordano (1996); Osinaga Acosta et al. (2006); Salvador (1983a); Volkmann y Cargnelutti (2001); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Los Gigantes, dpto. Punilla, 28-11-1989)



La Pampa
Citas: Chebez et al. (1998); De la Peña y Tittarelli (2011); Pereyra (1937b); Siegenthaler (2004); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006)

Jujuy
Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Caziani y Derlindati (2000); Chebez et al. (1998); Fiora (1939); Laredo (1996)

La Rioja
Citas: Giacomelli (1923)

Mendoza
Citas: Blendinger y Alvarez (2002); Calí et al. (2008); Contreras (1979g); Martínez et al. (1997a); Ordano y Bosisio (2001); Petracci et al. (2004a); Reed (1914, 1916, 1921); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (1993b, 2005)

Neuquén
Citas: Chehebar et al. (1992); Christie et al. (1988); Contreras (1975, 1977b); Daciuk (1968, 1983a); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Pereyra (1945); Steullet y Deautier (1939); Veiga et al. (2005); Wetmore (1926b.)

Río Negro
Citas: Bettinelli y Chebez (1986); Camperi (1998); Casas (1992a); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Gelain (2010, 2012b); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Paz Barreto (1990c, 1997b); Peters (1923b)

Observaciones: De la Peña (Ñorquinco, dpto. Ñorquinco, 04-02-1976)

Salta
Citas: Colina (2011); Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Camperi y Darrieu (2004); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i); Moschione y Banchs (1992)

San Luis
Citas: Masramón (1983); Nellar Romanella (1993)

Santa Cruz
Citas: Albrieu et al. (2004); Coconier (2005b); Darrieu et al. (2008); De Lucca y Saggese (1992); Erize (1983); Gandini y Frere (1998b); Hellmayr (1932); Hellmayr y Conover (1948b); Imberti (2005e); Lange (1981); Peri (2013); Petracci et al. (2004a); Sclater et al. (1870); Scott y Sharpe (1910); Wetmore (1926a); Zapata (1967, 1969)

Observaciones: De la Peña (Jaramillo, dpto. Deseado, 02-02-1974: Puerto Deseado, dpto. Deseado, 07-11-1979)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2011f); Wilson (1926)

Tierra del Fuego
Citas: Castellanos (1935); Clark (1986); Earnshaw (1973); Humphrey et al. (1970); Olrog (1948); Ripley (1950)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch et al. (2011b); Laredo y Vides-Almonacid (1999); Lucero (1983)

Islas Malvinas
Citas: Wace (1921); Woods (2006)

CHORLO DE ESPOLÓN *Vanellus cayanus* (Latham, 1790)

Otros nombres: Armado. Avefría de espolón. Chorlo armado. Chorlo de Cayena.Tero armado. Tero de espolón. Tero overo. Teru teru de collar.

DESCRIPCIÓN
Largo: 23-26 cm.
Peso: Graves y Zusi (1990): N= 2 (M) 72 y 73 g; N= 1 (H) 79 g.
Coloración. Pico negro. Patas rojas. Espolón alar rosado. Párpados rojoa anaranjados. Iris pardo.
Cara y lados de la cabeza negros. Corona blanca, con centro pardo grisáceo, formando una línea a los lados de la cabeza. Dorso pardo. Escapulares negras y blancas. Garganta y abdomen blancos. Lados del cuello y del pecho negros.
Cobijas alares pardas grisáceas. Secundarias blancas, las más externas con puntas oscuras. Primarias pardas oscuras. Cola blanca con ancha banda negra en la extremidad.

HÁBITAT
Riberas de ríos y de lagunas.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Más información:
Piersma (1996b)



IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Dorso pardo. Pecho negro. Alas con bandas blancas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Vanellus cayanus (Latham, 1790) en Salta y Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Se distrubuye por todos los paises de América del Sur, excepto Chile y Uruguay.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2012b); Chebez (1994, 1996a); Mogensen (1930)

Salta
Citas: Jensen y Areta (2007); Moschione et al. (2013)

TERO COMÚN *Vanellus chilensis* (Molina, 1782)

Otros nombres: Avefría. Avefría americana. Frailecillo del plata.Güerequeque. Queltregüa. Queltreque. Queroquero. Quetreque. Quiltegue. Tegle. Telo. Terencho. Terito. Tero austral. Tero chileno. Tero cordillerano. Tero de la cordillera. Tero del oeste. Teru-teru. Tetén. Teteu. Teu-teu. Tilo. Tilo-tilo. Tregül.

DESCRIPCIÓN
Largo: 32-38 cm.
Peso: Contreras (1975): Navas y Bó (1986a): N= 5 (M) X: 351,3 g (Rango 291 a 416); N= 7 (H) X: 352,7 g (Rango 276,8 a 430); Camperi (1992c): N= 1 (M) 350 g; N= 3 (H) 300 g cada una.; Salvador (2014a): N= 6 (M) 304,0 g (Rango 281,0 a 328,0); N= 4 (H) X= 299,0 (Rango 288,0 a 312,0)
Coloración. Pico, patas y espolón alar rojizos. Iris rojo.
Frente, garganta y cuello anterior negros, separados del resto del cuerpo por un margen blanco. Pecho negro. Resto de la cabeza, cuello posterior y dorso grises. Copete negro. Resto de las partes ventrales blancas.
Alas negras. Cubiertas verdes bronceadas. Las mayores blancas.
Cola blanca con ancha banda subterminal negra.

COMPORTAMIENTO
Anda en pareja o formando grupos. Es muy cuidadoso del nido y de los pichones. Cuando algún intruso se aproxima a ellos realiza ceremonias de distracción que consisten en agacharse en distintos lugares lejos del nido o de los pichones o bien simulan estar heridos. A veces realiza vuelos rasantes sobre los extraños. En poblaciones se posa en los techos de construcciones.

Alimentación
Marelli (1919). Coleópteros. Lombrices.
Aravena (1927). **Insectos:** Curculiónidos (*Listroderes cotirrostris*). Crisomélido (*Haltica*). Escabajos. Carábidos. Grillo topo (*Scapteriscus dydactilus*). Hormigas. Lepidópteros.Tucura. **Vegetales:** Semillas de *Xanthium macrocarpum.* **Otros:** Piedritas.
Zotta (1934). **Insectos:** Coleópteros (Curculionidae, Scarabaeidae, Chrysomelidae). Dípteros Acuáticos (Dolichopodidae)
Fiora (1939). Insectos, tierra, limo, restos vegetales.
Humphrey et al. (1970).**Insectos:** Coleópteros.
Willianson (1975). **Vegetales:** Semillas de *Panicum mileaceum, Phalaris canariensis.* **Otros:** Pan.
Bucher y Herrera (1981). **Insectos:** Coleópteros. Ortópteros.
Klimaitis (1993).**Insectos:** Coleópteros. **Otros:**Piedritas.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Blattaria. Coleoptera (Carabidae, Chrysomelidae, Curculionidae, Elateridae, Scarabaeidae, Tenebrionidae: larvas). Hymenoptera (Formicidae). Lepidoptera (orugas, crisálidas). Orthoptera (Acridiidae, Gryllidae).**Anélidos:** oligoquetos. (lombrices de tierra). **Arácnidos**: arañas. **Crustáceos:** Isópodos terrestres. **Vegetales:** semillas no determinadas. Frutos Solanáceas. **Otros:** Arena.
De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). Hormigas. Lombrices. Insectos.
Salvador (2013e). **Insectos:** Hormigas Isaú (*Atta vollenweideri*)
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Voces
Straneck (*in litt*.). Cuando se alarma repite un sonoro y estridente Tere..ter..kere..tere...

HÁBITAT
Bañados, charcas, praderas, áreas rurales, parques.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos y/o pichones en Jujuy, Tucumán, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N				N	N	N	N	N	N	N

En el suelo. En praderas, áreas rurales, parques, orillas de humedales.
Expuesto. Poco elaborado. Ligera excavación bordeada de palitos, pastos, tallos de yuyos, materias fecales de bovinos o de equinos.
A veces sin materiales, o pueden estar sobre o entre materias fecales de bovinos o de equinos.

Salvador y Salvador (en prep.). Dpto. San Martín, Córdoba, 81 nidos entre junio y febrero, en campos con pasturas naturales, rastrojos o alfalfares, posturas de 3 ó 4 huevos.
Salvador, Narosky y Fraga (*in litt*.). Villa Ángela, dpto. Mayor Luis J. Fontana, Chaco, 16-12-1982, un nido en un pastizal próximo a un bosque inundado, con 4 huevos.
Salvador (*in litt*.). Villa La Angostura, dpto. Los Lagos, Neuquén, 01-12-1986, un nido en la playa a orillas del lago, con 3 huevos frescos.
Shipton (Instituto Miguel Lillo). Chicligasta, dpto. Chicligasta, Tucumán, 25-11-1909, 3 huevos.
Lillo (Instituto Miguel Lillo). Simoca, dpto. Simoca, Tucumán, 30-12-1912, 3 huevos.
Contino (Instituto Miguel Lillo). Palma Sola, dpto. Santa Bárbara, Jujuy, 08-11-1969, nido con 2 huevos.
Gibson (1880b). Cabo San Antonio, pdo. Partido de la Costa, Buenos Aires. Nidos.
Smyth (1927). Cacharí, pdo. Azul, Buenos Aires, 02-10-1919 y 17-10-1920, dos nidos con 3 huevos cada uno; Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, 21-01-1923, nido con 3 huevos.
Pereyra, C. B. de (1928). Provincia de Buenos Aires, nidos desde junio a febrero.
Pozzi (1934). Estancia La Balbina, pdo. Balcarce, Buenos Aires, nidos a mediados de agosto.
Pereyra (1938b). Provincia de Buenos Aires. Comienzan la postura en junio. Pone 4 huevos y alguna vez 5.
Zapata y Cabrera (1969). Atalaya, pdo. Magdalena, Buenos Aires. Un nido con 4 huevos el 28-10-1967 y otro con 3 huevos el 06-11-1967.
Zuberbühler (1971). Provincia de Buenos Aires. Nido con 4 huevos.
Jehl y Rumboll (1976). Río Grande, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego. Nido con huevos, el 23 de octubre.
Contreras (1977b). Valle del río Collón Curá, Neuquén, nidifica entre octubre y noviembre.
Contino (1980). Nidifica en diciembre en el noroeste.
Gallegos Luque (1984). Estancia La Armonía, pdo. General Las Heras, Buenos Aires, nidos desde fines de agosto hasta mediados de enero.
Jenny (1997). Wildermuth, dpto. San Martín, Santa Fe, el 20-12-1996, un nido con 4 huevos propios, tenía uno de Pirincho (*Guira guira*)
Miatello et al. (1999). Nidifica en Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba.
Babarskas et al. (2003). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, nido con huevos en setiembre.
Zapata y Zazarino de Bustingorry (1990). 25 de Mayo, pdo. 25 de Mayo, Buenos Aires, 1980. Nidos en setiembre con 4 huevos.
Christie et al. (2004). Nidos con huevos desde agosto a diciembre, en el noroeste patagónico.
Albrieu et al. (2004). Estuario del Río Gallegos, dpto. Güer Aike, Santa Cruz, construye el nido en el suelo, con pastos y piedritas.
Imberti (2005e). Nidifica en pastizales cercanos al agua, en el oeste de Santa Cruz.



Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa. Se observaron 30 nidos. Anida desde fines de julio a mediados de enero.
Maugeri (2007). Laguna Epecuén, pdo. Adolfo Alsina, Buenos Aires, 23-10-1999, nido con 3 huevos y 2 de Chorlito doble collar (*Charadrius falklandicus*).
De la Peña (2013c). En total 91 nidos, en Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 66 nidos: 07-10-1970, 3 huevos, 15-06-1989, 4 huevos, 20-09-1989, 2 huevos y un pichón; 25-08-1998, 4 huevos, 25-08-1998, 3 huevos, 02-09-1998, 2 huevos, 22-09-1998, 2 huevos, 4 huevos, 4 huevos, 3 huevos; 17-10-1998, 3 huevos, 3 huevos; 05-02-1999, 3 huevos; 15-07-1999, 2 huevos; 17-10-2000, un huevo; 13-07-2003, 4 huevos; 30-07-2003, 2 huevos; 01-08-2003, 3 huevos; 09-08-2003, 4 huevos; 09-08-2003, 4 huevos; 10-08-2003, un huevo y un pichón, 4 huevos, 4 huevos; 13-08-2003, 4 huevos, 3 huevos, 3 huevos; 15-08-2003, 4 huevos, 4 huevos, 4 huevos, 3 huevos; 17-08-2003, 4 huevos, 3 huevos; 18-08-2003, 4 huevos; 19-08-2003, un huevo; 06-09-2003, 3 huevos, 3 huevos; 15-09-2003, 2 huevos; 16-09-2003, 3 huevos, 3 huevos, 3 huevos, 3 huevos, 4 huevos, 4 huevos, 4 huevos, 4 huevos; 20-10-2003, 4 huevos; 20-08-2004, 4 huevos; 24-08-2004, 3 huevos, 3 huevos; 06-09-2004, 3 huevos; 11-09-2004, 4 huevos; 27-09-2004, 3 huevos; 30-10-2004, 2 huevos, 3 huevos; 31-10-2004, 3 huevos, 4 huevos, 3 huevos; 15-08-2005, 2 huevos; 3 huevos; 20-01-2007, 2 huevos; 03-09-2007, 3 huevos; 3 huevos; 20-09-2007, 4 huevos, 4 huevos; 09-01-2009, 3 huevos; 03-09-2112, 5 huevos. Cayastacito, dpto. San Justo, Santa Fe, 5 nidos: 13-10-1972, 3 huevos; 03-08-1973, 3 huevos, 3 huevos; 03-01-1979, 4 huevos; 27-10-1983, 3 huevos; Candioti, dpto. La Capital, Santa Fe, 05-01-1979, 4 huevos; Llambi Campbell, dpto. La Capital, Santa Fe, 2 nidos: 18-10-1986, 3 huevos, 4 huevos; Río Ñirihuau, dpto. Pilcaniyeu, Río Negro, 07-10-1989, 2 huevos; Los Amores, dpto. General Obligado, Santa Fe, 08-11-1989, 2 huevos; Laguna del Palmar, dpto. Vera, Santa Fe, 2 nidos: 18-11-1989, 4 huevos, 3 huevos; Malabrigo, dpto. General Obligado, Santa Fe, 02-1019-91, 4 huevos; Colón, dpto. Colón, Entre Ríos, 10-10-1991, 4 huevos; Franck, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 12-11-1991, 1 huevo; Rincón de Ávila, dpto. La Capital, Santa Fe, 2 nidos: 09-12-1994, 3 huevos, 2 huevos; Ruta 13 y 36, dpto. Vera, Santa Fe, 14-11-1996, 2 huevos; Empalme San Carlos, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 3 nidos: 15-08-1998, 3 huevos, 17-08-1998, en construcción y 4 huevos, San Carlos Centro, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 12-07-2003, 2 huevos; La Camila, dpto. San Justo, Santa Fe, 20-01-1999, un huevo; Miramar, dpto. San Justo, Córdoba, 09-12-2007, 3 huevos; Cayastá, dpto. Garay, Santa Fe, 06-11-2012, 2 huevos.
Un nido construido con tallitos de yuyos y algunos trocitos de materias fecales de vaca. Algunos no tienen materiales. Miden un diámetro total, de 12 a 14 cm.
Salvador y De la Peña. 2014. Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 03-09-2012 nido con 5 huevos; Gral. Las Heras, pdo. Gral. Las Heras, Buenos Aires, 09-07-2014, nido con 6 huevos.
Segura et al (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 13 nidos.

Huevos
Pone 3 ó 4 huevos. Raramente 5 ó más. Cónicos o piriformes. De color verdoso, pardo, pardo verdoso o verde oliva, con manchas, pintas y rayitas negras y grises.



Medidas
Contino (Instituto Miguel Lillo): 44,3 x 34,5 y 44,5 x 33,6
Crawshay(1907): 51,2 x 35,0
Hartert y Venturi (1909): 45 a 48 x 32 a 34
Gibson (1920): 45 a 47 x 32 a 34
Pereyra (1938b): 45 x 33
Zapata y Cabrera (1969): 44,0 a 49,3 x 31,8 a 35,0 X= 46,9 x 33,8 (N= 7)
Contino (1980): 46 x 33
Zapata y Zazarino de Bustingorry (1990): X= 46,25 x 33,5
Di Giacomo (2005h): 42,7 a 47,7 x 31,5 a 33,8 X= 45,1 a 32,6 (N= 46)
Maugeri (2007): X= 42,6 x 28,7 (N= 3)

De la Peña (2013c):

Para *V. ch. lampronotus*
De 41,2 a 51,5 x 31,3 a 35,5 X= 46,2 x 33,2 (N= 42)

Para *V. ch. chilensis*
De 49,2 a 53,8 x 34,4 a 35,4 X= 51,5 x 34,8 (N= 2)

Salvador y Salvador (en prep.): 44,1 a 50,9 x 32,1 a 36,7 X= 47,46 x 33,94 (N= 63)
Salvador, Narosky y Graga (*in litt*.): 46,2 a 49,7 x 32,2 a 32,9 X= 48,0 x 32,7 (N= 4)
Salvador (*in litt*.): 46,3 a 47,0 x 34,7 a 35,6 X= 46,6 x 35,0 (N= 3)

Pesos
Salvador y Salvador (en prep.): 25,5 a 33 X=29,3 (N= 48)
Salvador (*in litt*.): 28 a 29 X= 28,6 (N= 3)
Zapata y Cabrera (1969): 21,5 a 30,0 X= 25,7 (N= 7)
Di Giacomo (2005h): 21,0 a 27,2 X= 23,5 (N= 46)

De la Peña (2013c):
Para *V.ch. lampronotus*
Peso: 20 a 28,0 X= 24,4 (N= 32)
Peso de las cáscaras: 1,625 a 1,980 X= 1,730 (N= 15)

Para *V. ch. chilensis*
Peso: 29,7 X= 29,7 (N= 2)
Peso de las cáscaras: 2,3 X= 2,3 (N= 2)

Anónimo (1933): huevos colectados en Tierra del Fuego por T. L. y G. P. Bridges y P. W. Reynolds, en el Museo Nacional de Historia Natural.

PICHONES
Descripción
De la Peña (2013c). Los pichones nacen en 24-36 horas. A los 3días de edad, tienen los ojos marrones. Pico negro. Interior de la cavidad bucal, gris-rosado. Patas grises.
Plumón gris moteado de negro en la parte dorsal y alas (excepto la punta, que es blanca). Plumón de las primarias blanco. Franja oscura donde comienzan las secundarias.
Ventralmente blanco. Franja negra debajo de la nuca. Cuello blanco. Collar pectoral negro más ancho y más notable en los costados. A los 5 días se nota el espolón naciente.

Peso al nacer
De la Peña (2013c): 18,4 a 21,5 (N= 4)

MEDIDAS

Días de vida	Medidas							
	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Tarso	Tibia	Pico
	Vaina o cañón	Lámina	Vaina o cañón	Lámina				
1						2,4-3,1	3,6-4,1	1,0-1,3
3						3,4	4,3	1,2
5					1,5	3,4	4,3	1,4
11					1,5	3,9	4,7	1,5
28	1,2	0,9	1,4	2,3	4	5,9	7,2	2,2

Observaciones
Fiora (1939). Zapla, Jujuy, diciembre de 1930 dos pichones recién emplumados.
Olrog (1965b). Bañado de Figueroa, dpto. Figueroa, Santiago del Estero, primera semana de junio de 1963, pichones de corta edad.
Humphrey et al. (1970). Desde Río Grande a Ushuaia, Peterson y Humphrey, el 28 de noviembre observaron pichones.
Christie et al. (2004). Pichones desde setiembre a diciembre, en el noroeste patagónico.

Generalidades
Paradas nupciales
De la Peña (2013c). Realizan "paradas" desde tres a varios ejemplares juntos. Estas consisten en marchar con el cuerpo erguido, con pasos rápidos, corren y emiten voces fuertes. Se paran y agachan la cabeza, el pico casi rozando el suelo. Abren y elevan la cola y las alas están entreabiertas.
Corren juntos, a veces algunos levantan vuelo y a los pocos minutos regresan para reiniciar la ceremonia.
El 17-08-1998 en Empalme San Carlos se observó una cópula y la construcción del nido y a los 6 días puso el primer huevo. La pareja traía unos tallos de yuyos.

Período de puesta, incubación, cuidados
Pereyra (1938b). Período de incubación, 21 días.
Di Giacomo (2005h). Período de incubación, 28 días. Postura en días alternos.
De la Peña (2013c). Período de incubación, 25-26 días. Demora en la construcción del nido de 4 a 6 días. Pone en días corridos o alternos. Los pichones nacen en 24 a 36 horas. Algunos nidos son cuidados por tres adultos.

Costumbres
Cuando está en el nido y nota un extraño, puede levantarse rápidamente o se levanta y caminando despacio se agacha en distintas lugares para simular que se echa en otros nidos.
Los pichones duermen protegidos bajo el cuerpo de un adulto.
En algunos casos, sobretodo cuando están roturando la tierra, si los huevos son corridos de lugar por alguna persona, no los afecta, continúan con la incubación.
Algunos ejemplares cuando incuban permiten que el observador se aproxime a pocos centímetros del nido.
Ataca a perros y otros animales cuando está con huevos o con pichones.
Se los ha visto hacer frente a las vacas y ovejas que se aproximan al nido cuendo comen. En estos casos se paran sobre el nido, entreabren las alas y llegan a picotear el morro del animal.
En Esperanza, en un lote de 10 hectáreas se contaron en forma simultánea 8 nidos. Dos nidos estaban separados por 30 m.
Los pichones son depredados por los Caranchos y los Chimangos. Los huevos suelen ser destruidos por las personas y los pichones llevados como mascotas.

Más información:
Gallegos Luque (1984)

Depredadores
De adultos: *Geranoaetus melanoleucus* (Hiraldo et al. 1995, Trejo et al. 2006a, Salvador y Salvador en De la Peña y salvador 2010); *Bubo virginianus* (Di Giacomo 2005h); *Bubo magellanicus* (Donázar et al. 1997, Miatello et al. 1999, Teta et al. 2001, Trejo et al. 2005a); *Caracara plancus* (Vargas et al. 2007);*Falco femoralis* (Bó 1999, Salvador 2012); *Falco peregrinus* (Peres y Peres 1985, Ellis et al. 2002, Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador 2010); de pichones: *Circus buffoni* Salvador y Salvador en (De la Peña y Salvador 2010); *Geranoaetus polyosoma* (De Lucca 2011b); *Caracara plancus* (De la Peña en De la Peña y Salvador 2010, Salvador 2013).



Esperanza. Santa Fe. 03-09-2012. Nido con 5 huevos



Esperanza. Santa Fe. 22-10-2013. Incubando



Esperanza. Santa Fe. 01-11-2111



Esperanza. Santa Fe. 03-10-2005





Esperanza. Santa Fe. 06-01-2008. Parada nupcial



Esperanza. Santa Fe. 10-10-2006 Nido con huevo de Gorrión *Passer domesticus*

Esperanza. Santa Fe. 09-09-1999



Esperanza. Santa Fe. 10-10-2008. Incubando



Esperanza. Santa Fe. 14-01-2007



Esperanza. Santa Fe. 10-02-2008

Otros

Pereyra (1937c)**.**Un ejemplar con Albinismo parcial.
De la Peña (1988a). Un ejemplar Albino total.
Urcola (2011). Un ejemplar con Leucismo parcial y dos con Dilución pastel.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Pecho negro, en contraste con el blanco abdominal. Dorso gris. El copete y el grito.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Vanellus chilensis lampronotus (Wagler, 1827) en Salta, Jujuy, este de Tucumán, de Catamarca, de La Rioja, de San Juan, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Buenos Aires, este de Río Negro y noreste de Chubut ; *Vanellus chilensis chilensis* (Molina, 1782) en Jujuy, Salta, oeste de Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Neuquén y oeste

de Río Negro y de Chubut y *Vanellus chilensis fretensis* (Bordkorb, 1934) en Santa Cruz, Tierra del Fuego e islas Malvinas. En otoño migra al norte.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cuatro subespecies. Se extiende por Sud américa desde Panamá hacia el sur hasta Tierra del Fuego.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Vanellus chilensis lampronotus (Wagler, 1827)

Buenos Aires
Citas: Aravena (1927); Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Camperi (1992c); Codesido et al. (2011); Dabbene (1918a); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Filipello y López de Casenave (1993); Fiora (1939); Gibson (1880b, 1920); Hartert y Venturi (1909); Isacch et al. (2006); Isacch y Martínez (2001); Klimaitis (1975b, 1993); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Leveau y Leveau (2004b, 2005, 2011b); Lucero et al. (2011); Marelli (1933); Maugeri (2007); Mérida y Bodrati (2006); Montaldo y Claver (1986); Morici (2012b); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Navas y Bó (1986a); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pereyra, C. B. de (1927); Pugnali y Chamorro (2008); Renard (1920); Soave et al. (1999); Straneck (1990b) ; Weller (1967a); White (1882); Zapata (1998); Zapata y Cabrera (1969); Zuberbhüler (1971)

Observaciones: De la Peña (Claromecó, pdo. Tres Arroyos, 07-02-1976)

Chaco
Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004)

Observaciones: De la Peña (Resistencia, dpto. San Fernando, 27-08-1987)

Chubut
Citas: Bó (1958); Boswall (1973); Hartert y Venturi (1909); Navas y Bó (1986a); Parera (1992); Sainz-Trápaga (2014)

Córdoba
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Brandolín et al. (2007); Bucher y Herrera (1981); Castellanos (1931); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores y Yzurieta (1980b); Ordano (1996); Osinaga Acosta et al. (2006); Partridge (1953c); Salvador (1983a, 2013e); Sferco y Nores (2003); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Miramar, dpto. San Justo, 28-02-1976)

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Marelli (1918); Ordano et al. (2008)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Baliño y Biole (1984); Beltzer et al. (2006); Beltzer (1981c); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b, 2013c); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2002); Muzzachiodi et al. (2003); Navas (1982); Peltzer (1998); Raffo et al. (2008); Zapata (1975, 1977)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c);Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Gorleri et al. (2011); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988); Serié y Smyth (1923)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Fiora (1939)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Bruno et al. (2007); Bruno y Erro (2010); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Grilli et al. (2009); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Navas y Bó (1986a); Pereyra (1937b); Siegenthaler (1984, 2004); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006); Wetmore (1926b); Williamson (1975)

Observaciones: De la Peña (Anzoategui, dpto. Caleucaleu,05-02-1976)

La Rioja
Citas: Hayward (1967)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b); Capmourteres et al. (2015); Chatellenaz (2007); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2008-2009); Martínez Gamba (2014)

Río Negro
Citas: Bettinelli y Chebez (1986); Casas (1992a); De la Peña (2013c); Gelain (2010); Gelain y Tolosa (2011); Navas y Bó (1986a); Pérez y Petracci (1998); Llanos et al. (2011)

Observaciones: De la Peña (Catriel, dpto. Gral. Roca, 20-11-1998, San Carlos de Bariloche, dpto. Bariloche, 22-11-1998)

Salta
Citas: Navas y Bó (1986a)

San Juan
Citas: Hartert y Venturi (1909); Lucero (2013i); Navas y Bó (1986a); Ortiz y Murúa (1994)

San Luis
Citas: Casares (1944b); Masramón (1983); Navas y Bó (1986a); Partridge (1953c)

Observaciones: De la Peña (San Luis, dpto. La Capital, 13-10-2004)

Santa Fe
Citas: Beltzer (1986c); Beltzer et al. (2003-2004); Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009); Quiroga y Hadad (2004); Rossetti y Giraudo (2003); Wilson (1926)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Observaciones: De la Peña (Selva, dpto. Rivadavia, 29-01-1977)

Tucumán
Citas: Lucero (1983); Navas y Bó (1986a); Ortiz y Ruiz (2011)

Vanellus chilensis chilensis (Molina, 1782)

Catamarca
Citas: Carma (2009)

Observaciones: De la Peña (Santa María, dpto. Santa María, 08-02-1977)

Chubut

Observaciones: De la Peña (Esquel, dpto. Futaleufú, 03-02-1976)

Jujuy
Citas: Budin (1931)

Observaciones: De la Peña (Jujuy, dpto. Capital, 06-02-1983)

Mendoza
Citas: Aramburú (1983); Blendinger y Alvarez (2002); Calí et al. (2008); Contreras (1979g); Contreras y Fernández (1980); Darrieu (2014); De la Peña (2013c); Giacomelli (1923); Gómez (2006); Hellmayr (1932); Leybold (1873a); Lucero (2013f); Navas y Bó (1986a); Olivera et al. (2009); Pereyra (1927e); Reed (1914); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (1993a, 2005); Wetmore (1926)

Observaciones: De la Peña (Malargüe, dpto. Malargüe, 14-10-2004)

Neuquén
Citas: Chehebar et al. (1992); Christie et al. (2004); Contreras (1975, 1977b); Daciuk (1968, 1978, 1983a); Fiori y Zalba (1999); Gollán (1951); Gorgoglione (2005); Hellmayr y Conover (1948b); Heredia y Funes (1987); Matarasso (2007); Navas y Bó (1986a); Pereyra (1945); Veiga et al. (2005); Wetmore (1926b); Yepes (1939)

Observaciones: De la Peña (La Rinconada, dpto. Huiliches, 27-01-1976)

Río Negro
Citas: Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Contreras et al. (1980b); Daciuk (1977c); Gelain y Tolosa (2011); Gelain (1984b, 2001, 2012b); Navas y Bó (1986a); Peters (1923b)

Observaciones: De la Peña (San Carlos de Bariloche, dpto. Bariloche, 31-01-1976; 22-11-1998)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Coconier et al. (2007); Echevarría et al. (2014); Moschione et al. (2013)

Observaciones: De la Peña (Salta, dpto. Capital, 30-01-1977)

San Juan
Citas: Acosta y Murúa (2001); Gelain (2008b); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f); Navas y Bó (1986a)

San Luis
Citas: Nellar Romanella (1993)

Observaciones: De la Peña (Merlo, dpto. Junín, 19-11-1997)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996, 2000); Antelo y Brandán (2006, 2013); Antelo et al. (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch y Aráoz (2007); Capllonch et al. (2011b); Cocimano et al. (2005b); Echevarría et al. (2008a, 2008c, 2014); Echevarría (2001); Echevarría y Chani (1999, 2000, 2006); Handford (1983); Lucero (1983); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Aráoz (2014)

Vanellus chilensis fretensis Bordkorb, 1934

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001a)

Chubut
Citas: Darrieu y Camperi 2000 (2001); Navas y Bó (1986a)

Neuquén
Citas: Navas y Bó (1986a)

Río Negro
Citas: Camperi (1998); Casas (1992a); Gelain (2010); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Navas y Bó (1986a, 1990)

Santa Cruz
Citas: Brodkorb (1934); Darrieu et al. (2008); De Lucca y Saggese (1992); Erize (1983); Imberti (2005e); Imberti y Albrieu (2001); Lange (1981); Navas y Bó (1986a);Oustalet (1891); Peri (2013); Scott y Sharpe (1910); Travaini et al. (2004); Zapata (1967, 1969)

Observaciones: De la Peña (Río Turbio, dpto. Güer Aike, 09-11-1979)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Earnshaw (1973); Humphrey et al. (1970); Jehl y Rumboll (1976); Navas y Bó (1986a); Olrog (1948, 1950)

Observaciones: De la Peña (Río Grande, dpto. Río Grande, 01-02-1972)

Tucumán
Citas: Lucero (1983)

Islas Malvinas
Citas: Wace (1921); Woods (2006)

TERO SERRANO *Vanellus resplendens* (Tschudi, 1843)

Otros nombres: Avefría serrana. Leque-leque. Leuquencho. Lico lico. Tero de la puna. Teru teru de la puna. Teru teru serrano.

DESCRIPCIÓN
Largo: 32-33 cm.
Peso: Fiora (1933): N= 2 X= 240 g; Navas y Camperi (2006): N= 1 (M) 230 g; N= 2 (H) 370 y 390 g.
Coloración. Pico amarillo en la base, negro hacia la punta. Patas y espolones alares rosados. Iris rosado.
Cabeza, cuello y pecho grises. Garganta blanquecina. Dorso pardo con reflejos verdosos.
Semicollar blanco en dorsal del cuello que lo separa del dorso. Resto de la ventral blanco.
Alas pardas oscuras con blanco en la base de las primarias y de las secundarias. Secundarias más internas, blancas y negras. Cubiertas menores pardas violáceas, mayores blancas.
Cola con banda subterminal parda oscura.

COMPORTAMIENTO
Anda en pareja o formando grupos.

Alimentación
Fiora (1939). Insectos, caparazón de gasterópodo, minerales, vegetales, larvas.

Voces
Straneck (*in litt*.). Su voz de alarma es un agudo Kier..kierrr.kier..kier...

HÁBITAT
Estepas y praderas húmedas y orillas de pantanos, charcos, arroyos, entre los 2000 y los 3800 m de altura.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos y/o pichones en Tucumán, Jujuy, Salta, Catamarca.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N									N	N

Expuesto. Rudimentario. Depresión en el suelo, revestida de pajitas, raicillas y líquenes.



Uranga (*in litt*.). Laguna El Huancar, dpto. Cochinoca, Jujuy, 27-01-2016, nido a 70 m de una laguna, depresión poco tapizada con pastos.Tenía 4 huevos.
Hartert y Venturi (1909). Altas cumbres, Tucumán, a 4400 m de altura, Dinelli localizó un nido, en febrero de 1903 con 4 huevos.
Budin (1931). Río Humahuaca, dpto. Humahuaca, Jujuy, en febrero de 1931, nido con 4 huevos.
Dabbene (1972). Dinelli encontró huevos en la puna en el mes de febrero a 4.400 m de altura.
Contino (1980). En el Noroeste argentino se encuentran pichones recién nacidos desde diciembre hasta marzo.
Handford (1983). Tafí del Valle, dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 12-01-1973, nido con 3 huevos.
Salvador (1992). Tafí del Valle, dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 04-12-1987,

nido con 4 huevos.
El nido estaba en una suave ladera herbácea (que recuerda césped cortado) y junto a una piedra plana de 15 x 17 cm. Es una depresión de 10 cm de diámetro y 3,5 cm de profundidad; poco revestida con líquenes, pajitas y raicillas, esta cama con un espesor de 1 cm.
Laredo (1996). Laguna Pozuelos, Jujuy, nidifica de noviembre a enero.
Capllonch y Quiroga (2013). La Quebradita, dpto. Tafí del Valle, Tucumán, entre 2005 y 2011 se encontraron 5 nidos. Nidifica de noviembre a enero.



Laguna El Huancar. Jujuy. 27-01-2016. Foro Máximo Uranga

Huevos
Pone 4 huevos. Piriformes. De base verde olivácea con pintas marrones oscuras y grisáceas distribuidas por toda la superficie, pero más concentradas en el polo Mayor.

Medidas
Salvador (1992): de 45,1 a 47,5 x 33,1 a 34,5 X= 46,5 x 35,2 (N= 4)
Capllonch y Quiroga (2013): de 45 a 47 x 32 a 33

Peso
Salvador (1992): de 25,2 a 27,8 X= 26,5 (N= 4)

PICHONES
Descripción.
De la Peña (2013c). Pico negro. Paladar rosado. Patas grisáceas. Uñas negras. Piel oscura.
Cara con puntillado pardo. Cejas crema. Corona marrón claro jaspeada de gris y ocre. Garganta blanquecina. Pecho gris. Abdomen blanco.
Espalda blanca con plumón pardo en la nuca. Dorsalmente plumas marrones con los bordes ocres. Cubiertas alares oscuras (tornasoladas) orilladas de ocre, formando un barrado.
Primarias negras de 7 cm. Secundarias blancas, de 5 cm. Rabadilla con plumón pardo y ocre.
Ventral de la cola blanca, le sigue una barra negra y termina en ocráceo. Las tres plumas externas blancas.

Observaciones
Contino (1980). En el noroeste, pichones de diciembre a marzo.
Capllonch et al. (2011b). El Infiernillo, dpto. Tafí del Valle, Tucumán. Pichones y juveniles.

De la Peña (2013c). Abra Pampa, dpto. Cachinoca, Jujuy,04-02-1977, una pareja andaba con un pichón. Las Estancias, dpto. Andalgalá, Catamarca, 28-12-2002, pareja con un juvenil.
Capllonch y Quiroga (2013). Ruta Provincial Nº 5, entre Yavi y La Quiaca, dpto. Yavi, Jujuy, enero de 2010, pichones.
Salvador (2015). Cortaderas, dpto. Tinogasta, Catamarca, 11-03-2008, una pareja con dos pichones.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pecho gris. Mancha alar blanca. El hábitat.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Vanellus resplendens (Tschudi, 1843) entre los 2000 y los 3800 m de altura en Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan, Tucumán y Catamarca. Observado además en el norte de Córdoba.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Se encuentra entre 2.000 y 3.800 metros de altura en la cordillera de Los Andes en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca
Citas: Alabarce et al. (1990); Camperi y Darrieu 2000 (2001); Carma (2009);
Navas y Camperi (2005, 2006); Pereyra (1942a); Salvador (2015)

Observaciones: De la Peña (Las Estancias, dpto. Andalgalá, Catamarca, 28-12-2002)

Córdoba
Citas: Michelutti y Torres (2006)

Jujuy
Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009);Fiora (1933, 1939); Laredo (1996); Lönnberg (1903); Narosky (1988); Navas y Camperi (2005, 2006); Straneck (1990f)

Observaciones: De la Peña (Cieneguillas, dpto. Santa Catalina, 10-02-1983)

La Rioja
Citas: Navas y Camperi (2005); Lucero e Izasa (2015)



Salta
Citas: Navas y Camperi (2005); Moschione et al. (2013); Salvadori (1897)

San Juan
Citas: Agnolín et al. (2009); Gelain y Pereyra Lobos (2011b)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Baer (1904);Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch et al. (2011b); Capllonch y Quiroga (2013); Echevarría et al. (1998, 2007, 2000a, 2008c, 2008b, 2011); Handford (1983); Hartert y Venturi (1909); Laredo y Vides-Almonacid (1999); Lillo (1902, 1905); Lucero (1983); Navas y Camperi (2005, 2006); Navarro et al. (2000) ; Olrog (1949a); Salvador (1992)

CHORLITO PALMADO *Charadrius semipalmatus* Bonaparte, 1825

Otros nombres: Butuirá. Chorlitejo semipalmado. Chorlito de dedos semipalmados. Chorlito semipalmado. Chorlo semipalmado. Pollito de mar.

DESCRIPCIÓN
Largo: 17-19 cm.
Peso: Schulz Neto et al. (2008): N= 4 (M) X: 52,3 g (Rango 49 a 59); N= 1 (H) 42 g; N= 145 (?) X: 39,4 g (Rango 20 a 70).
Coloración.
Plumaje de reposo sexual.
Pico negro con la base rojiza. Patas amarillas.Iris pardo oscuro.
Cabeza y dorso pardos. Frente, cejas, mancha detrás de los ojos, garganta y collar nucal blancos. Ventral blanca con banda parda en el pecho.
Alas pardas oscuras con banda blanca. Cubiertas pardas.
Cola parda con la punta blanca
Plumaje nupcial.
Pico negro con la base naranja. Patas naranjas. Iris pardo oscuro.
Cara, anterior de la corona y banda pectoral negros. La banda se continúa por detrás del cuello formando un collar. El resto del plumaje como en reposo sexual pero con la corona más oscura.

COMPORTAMIENTO
Corre rápido. Forma bandadas.

HABITAT
Costas marinas, de lagunas y bañados.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. Collar nucal blanco. Banda pectoral parda.
Se parece al Chorlito de collar, pero tiene collar nucal blanco y carece de canela en las partes dorsales. Diferente color de pico.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Charadrius semipalmatus Bonaparte, 1825 migratorio del Ártico de Norteamérica. Llega hasta Mendoza, Neuquén, norte de Río Negro, Entre Ríos y por la costa de Buenos Aires a Tierra del Fuego.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en el ártico migrando hacia el sur en el invierno boreal, distribuyéndose principalmente por la costa del Océano Pacífico hasta Chile y por las del Atántico hasta Tierra del Fuego.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Canevari et al. (1991b); Fiameni (1994); Darrieu y Camperi (2001a); Delhey et al. (2001c); Dabbene (1929a); Isacch et al. (2006); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b)

Catamarca
Citas: Carma (2009)



Córdoba
Citas: Miatello et al. (1991-1994); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1979, 1980b); Osinaga Acosta et al. (2006); Yzurieta (1995)

Chubut
Citas: Bradley et al. (1985); Sainz-Trápaga (2014)

Formosa
Citas: Contreras (1987c);Contreras et al. (2014)

Jujuy
Citas: Lonnberg en Dabbene (1920d)

La Pampa
Citas: De la Peña y Tittarelli (2011); Tittarelli (2002)

Mendoza
Citas: Sosa (1993b, 1995d, 2003, 2005)

Neuquén
Citas: Matarasso (2007)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

Santa Cruz
Citas: Dabbene (1920a); Seebohm (1887); Sharpe (1896)

Santa Fe
Citas: De la Peña (1988c, 2011f)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Dabbene (1920d); Humphrey et al. (1970); Humphrey Bridge (1970); Olrog (1979b)



CHORLITO MONGOL *Charadrius mongolus* Pallas, 1776

DESCRIPCIÓN
Largo: 18-21 cm.
Coloración. Pico negro. Patas pardo grisáceas. Iris pardo.
Dorsal gris. Ventral blanco. Pecho y corona castaños. Oscuro alrededor de los ojos.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Observado en las costas de Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cinco subespecies. China, Mongolia, Rusia, Siberia. Migra a India, Asia, África, Australia.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Le Nevé y Manzione (2011)

CHORLITOPICUDO *Charadrius wilsonia* Ord, 1814

DESCRIPCIÓN
Largo: 16,5-20 cm.
Coloración. Pico negro, grueso. Patas rosa grisáceas. Iris pardo.
Dorsal pardo. Frente blanca con banda negra en la parte superior. Ventral blanco con collar pardo.
En el período no reproductivo sin la banda negra y la banda pectoral poco notable.
Plumas externas de la cola blancas.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Observado en Jujuy.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Estados Unidos, América Central, Caribe. Migra a Perú, norte de Argentina, Brasil.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Charadrius wilsonia beldingi (Ridgway, 1919) (*) Posible subespecie

Jujuy
Citas: Rodríguez et al. (2010)

CHORLITO DE COLLAR *Charadrius collaris* Vieillot, 1818

Otros nombres: Angelito. Arenero. Chorlaco. Chorlitejo de collar. Chorlito. Chorlito costero. Chorlito de collar negro.Chorlo. Mbatuituí collar negro. Pollito de mar. Terito de arena. Terito de arenales.

DESCRIPCIÓN
Largo: 14-16 cm.
Peso: Salvador (1990a): N= 2 (?) 31,2 y 34,5 g; Camperi (1992a): N= 1 (M) 31,4 g, N= 1 (H) 34,5 g; Salvador (2014a): N= 1 (M) 29,5 g; N= 2 (H) 30,3 y 31,3 g

Coloración. Pico negro. Patas amarillo-naranjas. Iris pardo oscuro.
Adulto.
Frente, garganta, manchita posoculares y partes ventrales blancas. Anterior de la corona, línea loral y banda en superior del pecho negras. Cara, nuca y cuello posterior canelas rojizos. Dorso pardo con las plumas orilladas de canela. Rabadilla blanca con central pardo.
Remeras pardas oscuras con la base blanca. Secundarias y cubiertas pardas con punta blanca.

Cola parda con las plumas externas blanquecinas.

Juvenil.
Similar al adulto pero con la corona y collar pectoral pardos.

COMPORTAMIENTO
Anda solitario o en pareja, a veces en grupo. Corre rápido.

Alimentación
Fiora (1939). Insectos, semillas.
Bucher y Herrera (1981). **Insectos:** Coleopteros.Dípteros (larvas acuáticas).
Beltzer (1986d). **Insectos:** Coleóptera (Dytiscidae, Hydrophilidae, Curculionidae, Carabidae).Diptera (Chironomidae,*Glyptotendipes* sp.). **Moluscos:** (Hydrobiidae, *Littoridina parchappei*) (Planorbidae).
Beltzer y Lajmanovich (1990). **Insectos:** Coleópteros. Coleoptera (Carabidae). Ephemeroptera (*Campsurus* sp.). Hemiptera (Belostomidae). Lepidoptera (Larvas). Ortoptera (Grillotalpidae). **Molluscos:** (Planorbidae). **Vegetales:** semillas (Polygonaceae, *Polygonum acuminatum*).
Beltzer (1991a). **Insectos:** Coleóptera (Dytiscidae, Hydrophilidae, Curculionidae, Carabidae).Diptera (Chironomidae,Glyptotendipes sp.). **Moluscos:** (Hydrobiidae, *Littoridina parchappei*) (Planorbidae).
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Dytiscidae, Hydrophilidae, larvas).Hemiptera (Corixidae). **Moluscos:** (Hydrobiidae: *Littoridina parchappei*, Planorbidae: *Biomphalaria* sp.)

Voces
Straneck (*in litt*.). Hace un corto y esporádico Pip....piph...

HÁBITAT
Orillas de ríos, de esteros, de lagunas, bancos de arena.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos y/o pichones en Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N								N	N	N	N

En el suelo. En bancos de arena, playas o islas arenosas, orillas de ríos y de lagunas. Expuesto. Rudimentario. Excavación en el suelo arenoso o salitroso. Sin aporte de materiales.



Salvador y Salvador (en prep.). Dpto. San Martín, Córdoba, 4 nidos entre octubre y diciembre, en playas de lagunas salinas y en costas de arroyos, postura de 3 huevos.
Salvador, Salvador y Fraga (*in litt*.). Banco Caraballo, río Uruguay, dpto. Colón, Entre Ríos, 10-01-1985, nido en una depresión en la arena, con un pichón recién nacido y un huevo.
Salvador (*in litt*.). Miramar, dpto. San Justo, Córdoba, 28-10-1991, nido en una depresión, a 7 m de la laguna, con 3 huevos a punto de eclosionar.

Fiora (1939). Río Ledesma, agosto de 1933 una hembra con un huevo a término.

Smyth (1927). Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, 3 nidos: 16-10-1922, con un huevo, 21-10-1925, un huevo y 03-10-1926 con 3 huecos.
Klimaitis y Moschione (1984). Banco Caraballo, dpto. Colón, Entre Ríos, 2 nidos con 2 y 3 huevos cada uno, en una colonia de Sternuna superciliaris y Rynchops niger.
Maugeri (2005). Río Paraná inferior, pdo. Ramallo, Buenos Aires, 27-01-2001, nido con huevos, junto al Gaviotín chico común (*Sternula superciliaris*)
De la Peña (2013c). Reconquista, dpto. General Obligado, Santa Fe, 2 nidos: 01-11-1975, 3 huevos y 2 huevos; Río Paraná (Boca del Yacaré). dpto. Garay, Santa Fe, 31-11-1977, 2 huevos; Río Paraná (Paraná). dpto. Paraná, Entre Ríos, 7 nidos: 22-11-1977, 2 huevos y 3 huevos; 04-11-78, 3 huevos, 3 huevos, 3 huevos, 2 huevos, 2 huevos; Laguna Setubal, dpto. La Capital, Santa Fe, 14-12-1989, 2 huevos; Monte Vera, dpto. La Capital, Santa Fe, 3 nidos: 09-09-1995, 3 huevos; 11-11-2000, 2 huevos y 2 huevos; Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 2 nidos: 18-10-1998, 3 huevos; 24-10-1998, un huevo.
Medidas: diámetro total: de 5 a 8 cm, profundidad: de 1 a 3 cm.
Klimaitis y Borba (2016). Berisso, pdo. Berisso, Buenos Aires, 27-10-2007, nido con 3 huevos.

Huevos
Pone 3 huevos. Ovoidales o cónicos. De color pardo, ocre u ocre oscuro, con pintas y manchitas pardas oscuras y grises distribuidas por toda la superficie.

Medidas
Salvador y Salvador (en prep.): 26,9 a 29,8 x 21,1 a 22,7 X= 28,5 x 22,1 (N= 9)
Salvador, Salvador y Fraga (*in litt*.): 28,6 x 21,9
Hartert y Venturi (1909): 28 a 30 x 21 a 22
Klimaitis y Moschione (1984): 27, 5 a 30, 1 x 20,5 a 21,2 X= 28,8 x 20,8 (N= 5)
De la Peña (2013c): 26,5 a 30,4 x 20,8 a 22,4 X= 28,1 x 21,4 (N= 16)



Pesos
Salvador y Salvador (en prep.): 6,9 a 8,3 X= 7,7 (N= 9)
De la Peña (2013c): 7 a 7,1 X= 7,05 (N= 2)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,343 a 0,431 X= 0,384 (N= 16)

PICHONES
Descripción
De la Peña (2013c). Plumón crema amarillento con puntos oscuros. Ventralmente blanquecino.

Observaciones
Christie et al. (2004). Pichones en enero, en el noroeste patagónico, observados por E. A. Casas.
De la Peña (2013c). Río Paraná (Paraná). 22-11-1977. Pareja con 2 pichones en banco de arena; Villa Roda, dpto. La Capital, Santa Fe, 01-11-94.
Pareja con un pichón chico, cruzando un camino de tierra. Ruta 13 y Río Saladillo, dpto. San Cristóbal, Santa Fe, 14-11-96. Pareja con 2 pichones chicos.

Depredadores
De adultos: *Falco peregrinus* (Galmes et al. 2008b)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. Ventral blanca con corona y collar pectoral negro.



Esperanza. Santa Fe. 18-10-1998



Mar Chiquita. Córdoba. 09-12-2007



Monte Vera. Santa Fe. 09-09-1995



Monte Vera. Santa Fe. 09-09-1995



Villa Roda. Santa Fe. 01-11-1994. Pichón



Campo Andino. Santa Fe. 01-12-2007

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Charadrius collaris Vieillot, 1818 en todo el norte del país hasta Neuquén, Río Negro y norte de Chubut.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Se destribuye desde Méjico hasta Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Darrieu y Camperi (2001a); Durnford (1878); Filipello y López de Casenave (1993); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis (1975b); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Klimaitis y Borba (2016); Maugeri (2005);Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Mougeri (2005); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Olrog (1963b); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Wetmore (1926); White (1882); Zapata (1998)

Catamarca
Citas: Carma (2009); Heinonen Fortabat et al. (1992); Salvador (1990a)

Observaciones: De la Peña (Santa María, dpto. Santa María, 08-02-1977)

Chaco
Citas: Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b)

Chubut
Citas: Babarskas y Flombaum (1998)

Córdoba
Citas: Bucher y Herrera (1981); Heredia (2006); Miatello et al. (1991-1994); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores y Yzurieta (1980b); Osinaga Acosta et al. (2006); Salvador (1983a); Straneck (1990d); Yzurieta (1995)

Corrientes
Citas: Contreras (1981b, 1983c); Chatellenaz et al. (2010); Giraudo et al. (2006)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); Camperi (1992a); De la Peña (2012b, 2013c); Klimaitis y Moschione (1984); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2001a, 2001b); Muzzachiodi et al. (2003); Navas (1982); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998);Contreras (1987c);Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Gorleri et al. (2011); López Lanús (1997); Pujalte et al. (1995)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Fiora (1939)

La Pampa
Citas: Coconier (2005b); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Di Giacomo et al. (2005cc); Siegenthaler (2004); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006)

La Rioja
Citas: Giacomelli (1923); Heinonen Fortabat et al. (1992)

Mendoza
Citas: Aramburú (1983); Blendinger y Alvarez (2002); Contreras (1979); Contreras y Fernández (1980); Darrieu (2014); Darrieu et al. (1989); Lucero (2013f); Martínez et al. (1997a); Pereyra (1927e); Reed (1914); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (1993b, 2005)

Misiones
Citas: Chebez (1996a)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Contreras (1977b); Chehebar et al. (1992); Christie et al. (1988); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Nores e Yzurieta (1982b); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Casas (1992a); Christie et al. (2004); Gelain (1984b, 2001, 2012b); Gelain et al. (2003); Gelain y Casas (1986b); Gelain y Tolosa (2011); Kovacs et al. (2005); Llanos et al. (2011); Navas (1970b); Nores e Yzurieta (1992); Paz Barreto (1997b); Pérez y Petracci (1998)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Coconier et al. (2007); Echevarría et al. (2014); Moschione et al. (2013)

Observaciones: De la Peña (Cafayate, pdto. Cafayate, 08-12-1977)

San Juan
Citas: Camperi y Darrieu (2004); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i)

San Luis
Citas: Masramón (1983); Nellar Romanella (1993)

Santa Fe
Citas: Beltzer (1986d, 1991a); Beltzer et al. (2003-2004); Beltzer y Lajmanovich (1990); Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950);López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Luna y Manassero (2013); Pautasso (2002b)

Santiago del Estero
Citas: Moschione y Bishels (2004); Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009);Capllonch (2007a); Echevarría y Chani (1999, 2000, 2006); Echevarría (2001); Echevarría et al. (1998, 2008c); Hartert y Venturi (1909); Laredo y Vides-Almonacid (1999); Lucero (1983)

CHORLITO PUNEÑO *Charadrius alticola* (Berlepsch & Stolzmann, 1902)

Otros nombres: Chorlitejo serrano. Chorlito serrano. Chorlo andino. Chorlo de la puna. Chorlo de las sierras. Chorlo serrano.

DESCRIPCIÓN
Largo: 17-18 cm.
Peso: Salvador (1988): N= 1 (H) 42 g.
Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo oscuro.
Frente, cara, garganta y partes ventrales blancas. Anterior de la corona, región auricular y línea a los lados del cuello negras. Nuca y cuello posterior rojizos. Resto de lo dorsal y cubiertas alares pardos.
Remeras pardas con blanco hacia la base, formando una banda. Secundarias pardas con puntas blancas.
Cola parda en el centro y blanca en los costados.
En invierno carece de rojizo y el negro de la cabeza y del cuello es pardo.

COMPORTAMIENTO
Anda en pareja o formando grupos.

HÁBITAT
Orillas de ríos y lagunas, entre los 3000 y los 4000 m de altura.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos y/o pichones en Jujuy, Catamarca.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N									

Ligera depresión del suelo.
Höy (1967). Altiplano de Jujuy, enero de 1965, nido con 2 huevos.



Huevos
Pone 2. Piriformes. Pardo claro con puntos violetas y rayitas negras.

Medidas
Höy (1967): 34,8 x 24,7 y 34,9 x 24,2

Pichones
Laredo (1996). Laguna de Pozuelos, Jujuy, pichones y juveniles en enero.
Salvador (2015). Cortaderas, dpto. Tinogasta, Catamarca, 11-03-2008, pareja con 2 pichones pequeños.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. Ventral blanca, sin collar. Negro por detrás de la frente y a los lados del cuello.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Charadrius alticola (Berlepsch & Stolzmann, 1902) entre los 3000 y los 4000 m de altura en Jujuy, Salta, Catamarca, Mendoza y San Juan.

SUBESPECIES.Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Por la cordillera de Los Andes de Perú, Bolivia, Chile y Argentina.



CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009); Dabbene (1919a); Salvador (2015)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Caziani y Derlindati (2000); Caziani et al. (2001); Chebez et al. (1998); Höy (1967); Laredo (1996); Olivera (2009); Salvador (1988); Straneck (1990f)

Observaciones: De la Peña (Abra Pampa, dpto. Cochinoca, 04-02-1977)

La Rioja
Citas: de La Fuente (2002)

Mendoza
Citas: Bodrati (2005c); Lucero (2012h); Martínez et al. (2009); Olivera et al. (2009)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013); Vides Almonacid (1990)

San Juan
Citas: Bodrati (2005c); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Haene y Montañez (1996); Lucero (2012c, 2013f, 2013i)

Tucumán
Citas: Brandán y Navarro (2009); Capllonch et al. (2011b); Laredo y Vides-Almonacid (1999); Ortiz et al. (2005)

CHORLITO DE DOBLE COLLAR *Charadrius falklandicus* Latham, 1790

Otros nombres: Angelito. Chorlaco. Chorlitejo de doble collar. Chorlito. Chorlito doble collar. Chorlito dos collares. Chorlo de doble collar. Chorlo de las Malvinas. Playero de la patagonia. Pollito de mar. Tero de mar.

DESCRIPCIÓN
Largo: 18-19 cm.
Peso: Zapata (1967): N= 1 (M) 75 g; Contreras (1975): N= 1 (M) 66 g; Salvador (2014a): N= 1 (H) 63,7 g;
Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo.
Frente blanca. Anterior de la corona negra. Posterior de la corona y del cuello canela rojizo. Resto de las partes dorsales pardo grisáceo. Rabadilla parda. Ventral blanca, con dos collares negros. Uno fino en el cuello y el otro ancho sobre el pecho.
Primarias pardas con blanco hacia la base formando una banda. Secundarias pardas con punta blanca.
Cola con las plumas centrales pardas oscuras, las laterales blanquecinas.
En el plumaje de reposo sexual, el negro de la cabeza y de las bandas es reemplazado por un grisáceo.

COMPORTAMIENTO
Corre rápido. Forma grupos de pocos ejemplares.

Alimentación
Marelli (1919). **Insectos:** Coleópteros. Vegetales.
Zotta (1932). Coleópteros (*Clavicornia*). Hemípteros. Himenópteros.
Humphrey et al. (1970). Coleópteros.
Klimaitis (1993). Caracoles pequeños. Piedritas. Semillas.
D´Amico et al. (2004).**Moluscos:** Almeja (*Darina solenoides*). **Crustáceos:** Cangrejos (*Cyrtograpsus affinis*).**Insectos**. **Anélidos:** Poliquetos (*Travisia olens*), (*Glycera americana*), (*Laeonereis acuta*).
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera. Diptera. Hymenoptera (Formicidae). **Moluscos:** Hydrobiidae: (*Littoridina parchappei*)
Musmeci et al. (2013). **Poliquetos:** *Travisia olens***. Moluscos bivalvos:** *Darina solenoides, Tellina petitiana,* Mytilidae indeterminado. **Insectos:** hormigas y coleópteros. **Crustáceos:** isópodos y anfípodos. **Semillas.**


HÁBITAT
Costas marinas y de lagunas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos y/o pichones en Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Islas Malvinas.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N								N	N	N	N

En playas con piedritas, en orillas de ríos, de lagunas o costa marina.
Expuesto. Rudimentario. Excavación en el suelo.

Salvador y Narosky (*in litt*.). Punta Honda, dpto. Sierra Grande, Río Negro, 21-11-1983, nido en una depresión en un suelo con conchillas, con 3 huevos frescos.
Salvador (*in litt*.). Puerto Pirámides, dpto. Biedma, Chubut, 02-12-1995, nido en una depresión en la playa de canto rodado con 3 huevos.
Uranga (*in litt.*). Camarones, dpto. Florentini Ameghino, Chubut, 01-12-2013, dos nidos con 3 huevos cada uno.
Durnford (1878). Valle del Río Chubut, 29-09-1977, nido con huevos.
Sainz-Trápaga (*in litt.*). Playa Paraná, Madryn, dpto. Biedma, Chubut, 25-10-2014, nido con 3 huevos.
Gibson (1880b). Cabo San Antonio, pdo. Partido de la Costa, Buenos Aires, 4 nidos, entre agosto y setiembre.
Gibson (1920). Cabo San Antonio, pdo. Partido de la Costa, Buenos Aires, 28-10-1885, nidos con huevos.
Smyth (1927). Islas Malvinas, 01-10-1923, 2 huevos.
Boswall y Prytherch (1972). Punta Tombo, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 13 al 19 de noviembre de 1971, nido con 3 huevos.
Nores e Yzurieta (1975). Laguna Mar Chiquita, Río Ancho, dpto. Tulumba, Córdoba, 29-09-1973 a 03-10-1973, nido con 3 huevos.
Jehl y Rumboll (1976). Río Grande, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego. Nido con 3 huevos, el 24 de octubre.
Woods y Woods (1997). Islas Malvinas, de setiembre a enero, nidos.



Yorio et al. (1998a). Punta Tombo,dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 1990-1995, nidificando.
Sosa (2005). Llancanelo, dpto. Malargüe, Mendoza. Nidifica en las costas salitrosas del este de la laguna.
Blendinger (en Sosa, 2005). Nidos en salitrales de la zona de Cari Lauquen, dpto. Chos Malal, Neuquén, en verano de 2011.
Albrieu et al. (2004). Nidifica entre setiembre y noviembre. Nido en el suelo con guijarros y alguna ramita. Nidifica a lo largo de la costa y también a orillas de lagunas en la estepa. En el estuario del río Gallegos, dpto. Güer Aike, Santa Cruz, se encontraron nidos cerca de Punta Loyola, en distintos puntos sobre la margen sur de ambos ríos e incluso en el basural de la ciudad de Río Gallegos.
Maugeri (2007). Laguna Epecuén, pdo. Adolfo Alsina, Buenos Aires, 23-10-1999, nido con 2 huevos y 3 de Tero (*Vanellus chilensis*). Originalmente el nido tenía 3 huevos.
García Peña et al. (2008). Playa Fracasso (Península Valdés) y playas cercanas a Puerto Madryn, dpto. Biedma, Chubut, entre el 26 de octubre de 2006 y el 11 de enero de 2007, 45 nidos.
Villabriga et al. (2009). Puerto Madryn, dpto. Biedma, Chubut, nidifica de octubre a diciembre. Posturas de 3 huevos.

Huevos
Pone 3 ó 4 huevos. Piriformes. Pardo amarillento, manchados de marrón oscuro, negro y púrpura pálido, mayormente en el polo mayor.

Medidas
Salvador y Narosky (*in litt*.): 35,7 a 36,3 x 24,3 a 25,3 X= 36,0 x 24,8 (N= 3)
Salvador (*in litt*.): 34,9 a 35,7 x 24,4 a 25,7 X= 35,3 x 24,9 (N= 3)
Durnford (1878): 35 x 25
Gibson (1920): 36 a 39 x 25 a 27
Nores e Yzurieta (1975): 36 a 38 x 20 a 25 X= 37,0 x 21,6 (N= 3)
Maugeri (2007): X= 35,2 x 25,5 (N= 2)

Peso
Salvador y Narosky (*in litt*.): 10,1 a 10,9 X= 10,5 (N= 3)
Anónimo (1933): huevo colectado en Viamonte, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego, por T. L. y G. P. Bridges y P. W. Reynolds, en el Museo Nacional de Historia Natural.



Playa Paraná, Madryn. Chubut. 25-10-2014.
Foto: Santiago Sainz-Trápaga

PICHONES

Descripción

Zapata (1967). Plumón blanco acanelado en el vientre, gris oliváceo con manchas y rayas negras en la parte dorsal. Patas gris verdosas y el pico oscuro con ápice negro.

Observaciones

Durnford (1878). Valle del Río Chubut, 29-09-1977, adultos con pichones.
Zapata (1967). Puerto Deseado, dpto. Deseado, Santa Cruz, 20-10-1961, pareja con un pichón y el 25 otra con 2 pichones.
Humphrey et al. (1970). Reynolds 18-12-1929, pichones en Cabo Peñas, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego..
Jehl y Rumboll (1976). Río Grande,dpto. Río Grande, Tierra del Fuego. Rumboll, el 17-01-1974 observó pichones.
Sosa (2005). Llancanelo, dpto. Malargüe, Mendoza. El 20-11-2004, adulto con pichones en costas salitrosas de la laguna Bravina (Agua Escondida)

Más información:
García Peña et al. (2008)

Depredadores

De adultos: *Falco peregrinus* (Peres y Peres 1985)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño chico. Ventral con dos bandas negras o pardas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Charadrius falklandicus Latham, 1790 desde Mendoza, Córdoba y Buenos Aires hasta Tierra del Fuego y las islas Malvinas. En otoño migra al norte.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Nidifica en el sur de Sud América migrando hacia el norte en el invierno austral hasta Uruguay y sureste de Brasil.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS



Buenos Aires

Citas: Coconier (2005b); Darrieu y Camperi (2001a); Fiameni (1994); García y Gómez Laich (2007); Gibson (1880b, 1920); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis (1975b, 1993); Lucero (1982); Marelli (1933); Maugeri (2007); Morici (2012b); Moschione (1989); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1927f, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Wetmore (1926); Zapata (1998); Zotta (1932)

Observaciones: De la Peña (Claromecó, pdo. Tres Arroyos, 07-02-1976; San Clemente del Tuyú, pdo. Gral. Lavalle, 14-01-1983)

Catamarca

Citas: Carma (2009)

Chubut
Citas: Boswall (1973); Camperi (1998); Contreras (1975); D´Amico et al. (2004); Darrieu y Camperi 2000 (2001); Gatto et al. (2005); Musmeci et al. (2013); Pagnoni (1995); Sainz-Trápaga (2014); Yorio et al. (1998a)

Observaciones: De la Peña (Península Valdés, dpto. Biedma, 04-02-1972)

Córdoba
Citas: Bucher y Herrera (1981); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1975, 1980b); Yzurieta (1995)

La Pampa
Citas: Bonkewitzz (1990); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Maceda et al. (2008); Siegenthaler (2004); Tejerina et al. (2006)

Mendoza
Citas: Aramburú (1983); Blendinger y Alvarez (2002); Calí et al. (2008); Chebez et al. (1993); Darrieu et al. (1989); Darrieu (2014); Di Giácomo et al (2007); Martínez et al. (1997a); Roig (1965); Sosa (1993b, 2003, 2005)

Observaciones: De la Peña (Llancanelo, dpto. Malargüe, 15-10-2004)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Chehebar et al. (1992); Daciuk (1968, 1983a); Gorgoglione (2005); Heredia y Funes (1987); Matarasso (2007); Pereyra (1945); Steullet y Deautier (1939); Veiga et al. (2005); Wetmore (1926b)

Río Negro
Citas: Casas (1992a); Contreras et al. (1980b); Gelain (2001, 2010, 2012b); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Paz Barreto (1997b); Peters (1923b)

Santa Cruz
Citas: Albrieu et al. (2004); Chebez et al. (1988); Coconier (2005b); Daciuk (1977b); Darrieu et al. (2008); De Lucca y Saggese (1992); Erize (1983); Ferrari y Albrieu (2005); Gandini y Frere (1998a, 1998b); Iglesias y Pérez (1998); Imberti (2005e); Imberti y Albrieu (2001); Lange (1981); Oustalet (1891); Scott y Sharpe (1910); Sharpe (1896); Straneck (1990a); Zapata (1967, 1969)

Observaciones: De la Peña (Río Turbio, dpto. Güer Aike, 09-11-1979)

Santa Fe
Citas: Giraudo et al. (2008); López-Lanús et al. (2013a); Luna y Manassero (2010, 2013); Romano et al. (2005)

Sanativo del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1984, 1986); Earnshaw (1973); Humphrey et al. (1970); Jehl y Rumboll (1976); Olrog (1948)

Observaciones: De la Peña (Río Grande, dpto. Río Grande, 02-02-1972)

Islas Malvinas
Citas: Wace (1921); Woods y Woods (1997); Woods (2006)

CHORLITO DE PECHO CANELA *Charadrius modestus* Lichtenstein, 1823

Otros nombres: Chorlitejo pecho rojo. Chorlito cabezón. Chorlito de invierno. Chorlito de pecho castaño. Chorlito de pecho rojizo. Chorlito de pecho rojo y negro. Chorlito de pecho colorado. Chorlito pechicolorado. Chorlito pecho canela. Chorlo canela. Chorlo de campo. Chorlo de invierno. Chorlo negro. Chorlo pechicolorado. Pollito. Pollo colorado. Pollo de mar. Pollo negro.

DESCRIPCIÓN
Largo: 19-22 cm.
Peso: Humphrey et al. (1970): N= 1 (M) 77 g; Salvador (2014a): N= 1 (M) 77 g
Coloración. Pico negro. Patas grises verdosas. Iris pardo.
Cara grisácea. Frente y superciliares blancas. Corona, nuca, dorso y rabadilla pardos. Anterior del cuello y pecho canelas rojizos separada por una banda negra del blanco del vientre.
Alas pardas. Cola parda con las plumas externas blancas.
En el plumaje de reposo sexual el cuello y el pecho son pardos cenicientos y la banda negra es poco notable.

COMPORTAMIENTO
Bastante manso, confiado. En invierno forma bandadas.



Alimentación
Crawshay (1907). Insectos. Larvas.
Zotta (1934). Lepidópteros. Piedritas.
Zotta (1940). **Insectos:** Coleópteros (Curculionidae,Chrysomelidae).
Moluscos: (*Planorbis* sp.) (*Kermatoides* sp.). Minerales.
Humphrey et al. (1970). Crustáceos. Ostras. Algas.
Isacch y Martínez (1998). **Insectos:** Coleópteros. Dípteros. Hormigas. Lepidópteros (larvas). Ortópteros. **Arácnidos. Otros: s**emillas, vegetales, lombrices.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera. Hymenoptera (Formicidae). **Moluscos:** Planorbidae: (*Biomphalaria* sp.)

HÁBITAT
Turbales, costas marinas, de lagunas y de ríos.


NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos y/o pichones en Santa Cruz, Tierra del Fuego.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N								N	N	N	N

Expuesto. Rudimentario. Base de pasto o musgos.

Humphrey et al. (1970). Tierra del Fuego, huevos en octubre.
Jehl y Rumboll (1976). Río Grande. Cabo Peñas, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego. Tres nidos con 3 huevos cada uno, el 30 de octubre.
Albrieu et al. (2004). Nidifica entre setiembre y noviembre, en el suelo, generalmente en murtillares. Ambos sexos incuban.

Huevos
Pone 3 huevos. De color leonado con manchas pardas y grisáceas más concentradas en el polo mayor.



Anónimo (1933): huevos colectados en Viamonte, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego, por T. L. y G. P. Bridges y P. W. Reynolds, en el Museo Nacional de Historia Natural.

PICHONES

Observaciones

Hartert y Venturi (1909). Ushuaia, dpto. Ushuaia, Tierra del Fuego, juveniles el 20-02-1898.
Humphrey et al. (1970). Perterson y Humphreyy, 18-12-1960, pichones en Cabo San Pablo.
Humphrey et al. (1970). Reynold pichones en Cabo Peñas, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego, el 02-02-1929.

Depredadores

De adultos: *Falco peregrinus* (Peres y Peres 1985).

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño chico. Pecho canela con banda negra que separa el blanco ventral. Cejas superciliares. En reposo sexual cejas superciliares blancas y pecho pardo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Charadrius modestus Lichtenstein, 1823 en Tierra del Fuego y las islas Malvinas.
En otoño migra hasta Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos y Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Nidifica en extremo sur de Argentina incluyendo las islas Malvinas y sur Chile. En su migración invernal alcanza hasta Uruguay y extremo sureste de Brasil.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Carrizo et al. (2001); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Delhey et al. (2001c); Fiameni (1994); Gibson (1920); Hartert y Venturi (1909); Isacch y Martínez (1998, 2003); Klimaitis (1975b); Marelli (1933); Morici (2012b); Moschione (1989); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Straneck (1990a)

Chubut

Citas: Harris (2008); Pagnoni (1995); Sainz-Trápaga (2014)

Córdoba

Citas: Bucher y Herrera (1981); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores y Yzurieta (1980b); Osinaga Acosta et al. (2006); Yzurieta (1995)

Corrientes

Citas: Contreras (1987a); Contreras y Contreras (1984)

Entre Ríos

Citas: De la Peña (2012b)

La Pampa
Citas: De la Peña y Tittarelli (2011); Siegenthaler (1984)

Mendoza
Citas: Blendinger y Alvarez (2002); Di Giácomo et al (2007); Martínez et al. (1997a); Reed (1916); Roig (1965); Sosa (1993b, 1995d, 2005)

Misiones
Citas: Chebez (1996a)

Neuquén
Citas: Chebez et al. (1998); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Pereyra (1945)

Río Negro
Citas: Gelain (2010); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); González (1990); Llanos et al. (2011); Paz Barreto (1997b)

Santa Cruz
Citas: Albrieu et al. (2004); Coconier (2005b); De Lucca y Saggese (1992); Di Giacomo et al. (2005cc); Ferrari y Albrieu (2005); Iglesias y Pérez (1998); Imberti (2003, 2005e); Imberti y Albrieu (2001); Lange (1981); Scott y Sharpe (1910); Wetmore (1926a)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2011f); Giraudo et al. (2008); López-Lanús et al. (2013a); Wilson (1926)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Earnshaw (1973); Hartert y Venturi (1909); Humphrey et al. (1970); Jehl y Rumboll (1976); Olrog (1948, 1950); Reynolds (1934)

Islas Malvinas
Citas: Wace (1921); Woods (2006)

CHORLITO DE VINCHA *Phegornis mitchellii* (Fraser, 1845)

Otros nombres: Becasina. Becasina de las ciénagas. Chorlitejo de corona. Chorlito cordillerano. Chorlito coronado. Chorlito de las ciénagas. Chorlito de las vegas. Chorlo. Chorlo de Mitchell. Chorlo diademado. Chorlo vincha blanca. Pollito cordillerano.

DESCRIPCIÓN
Largo: 18-19 cm.
Coloración. Pico negro. Patas amarillentas. Iris pardo.
Cabeza parda. Cejas superciliares blancas hasta la nuca. Nuca y posterior del cuello castañas. Anterior del cuello blanca. Partes dorsales pardas. Ventral gris blanquecina barrada de pardo. Alas pardas grisáceas. Secundarias con puntas blanquecinas. Cola parda con las plumas externas barradas de blanco.

COMPORTAMIENTO
Anda solitario o en pareja. Relativamente manso.

HÁBITAT
Orillas de ríos y ciénagas de altura.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos y/o pichones en Jujuy, Mendoza, Catamarca, La Rioja.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N									N



Expuesto. Rudimentario. Plataforma circular con pocos pastos en la base.

Fernándes D'Olivera y Rodríguez Moulin (1997). Laguna Los Horcones, dpto. Las Heras, Mendoza, 06-12-1993, nido sobre la arena a 25 cm de un pequeño curso de agua. Nido circular de pastos secos, de 8 cm de diámetro y 2 cm de profundidad, tapizado con piedritas.
Ferrer et al. (2013a). Parque Provincial Aconcagua, dpto. Las Heras, Mendoza, 20-01-2008, nido circular de 10 cm de diámetro, con 2 huevos. Casa de Piedra, 3 nidos: 05-03-2009, nido con 2 huevos, el 04-12-2010, nido con 2 huevos y el 27-12-2010 otro con 2 huevos.

Huevos
Pone 2 huevos. Piriformes, de color oliva grisáceo con pintas negruzcas, gruesas y finas.

Medidas
Fernándes D'Olivera y Rodríguez Moulin (1997): 36,0 x 25,3 y 34,8 x 24,1

PICHONES
Observaciones
Laredo (1996). Laguna de Pozuelos, Jujuy, juveniles en febrero.
Vitale y Cockle (2012). Laguna brava, dpto. Vinchina, La Rioja, 08-02-2009, pareja con 2 pichones.
Ferrer et al. (2013a). Parque Provincial Aconcagua, 19-02-2008, adulto con 2 pichones (observados por D. Cucchiara) , Casa de Piedra, 06-01-2008, dos adultos y 2 pichones.
Salvador (2015). Paso San Francisco, dpto. Tinogasta, Catamarca, 05-03-2007, pareja con 2 pichones pequeños.

Más información:
Ferrer et al. (2013a)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. Notables cejas blancas. Castaño en la parte posterior del cuello. Ventral barrada.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Phegornis mitchellii (Fraser, 1845) en la cordillera y precordillera del oeste, desde Jujuy y Tucumán hasta Neuquén.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Cordillera de los Andes en Perú, Chile, Bolivia y noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009); Salvador (2015)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Laredo (1996)

La Rioja
Citas: Di Giácomo et al. (2007); Vitale y Cockle (2012)

Mendoza
Citas: Barros (1930); Fernandes D'Olivera y Rodríguez Moulin (1997); Ferrer et al. (2013a); Lynch Arribalzaga (1902); Olivera et al. (2009); Roig (1965); Wolffhuegel (1929)

Neuquén
Citas: Gorgoglione (2005); Matarasso (2007)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Laredo y Vides-Almonacid (1999); Lucero (1983)



OSTREROS

FAMILIA: HAEMATOPODIDAE

Aves de pico largo, fuerte y aplanado, lo que les permite sacar a los moluscos de sus valvas.

Frecuentan costas marinas, riberas de arroyos, ríos, lagunas, zonas húmedas en estepas.

Se alimentan de crustáceos, moluscos y larvas.

OSTRERO COMÚN *Haematopus palliatus* Temminck, 1820

Otros nombres: Fil fil. Ostrero americano. Ostrero blanco. Ostrero de abdomen blanco. Ostrero de Dunford. Ostrero de la patagonia. Ostrero pardo. Pilpilén. Pitanay. Tero costero. Tero de mar.

DESCRIPCIÓN
Largo: 40-44 cm.
Peso: Camperi (1992c): N= 2 (H) 600 g.
Coloración. Pico rojo. Patas blanquecinas rosadas. Iris anaranjado.
Cabeza, cuello y superior del pecho negros. Rayita blanca debajo de los ojos. Partes dorsales, cubiertas alares, primarias y parte de las secundarias pardas. Inferior del pecho, punta de las secundarias y de las cubiertas mayores, supracaudales, y resto de las partes ventrales blancos.
Cola parda oscura con base blanca.

COMPORTAMIENTO
Vuela a baja altura. Anda en pareja o en grupos.


Alimentación
Crawshay (1907). Larvas.
Humphrey et al. (1970). Larvas. Ostras. Vegetales.
Martínez y Bachmann (1997). **Moluscos:** Psammobiidae (*Tagelus plebeius*). **Crustáceos:**Cangrejo (*Cyrtograpsus angulatus*).
Bachmann y Martínez (1999). **Crustáceos:**Cangrejo (*Cyrtograpsus angulatus*). (*Chasmagnathus granulata*).
Albrieu et al. (2004). Moluscos Poliquetos.
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Moluscos:** Mactridae (*Darina solenoides*). Mesodesmatidae (*Mesodesma mactroides*). Mytilidae (*Aulocomya ater, Brachidontes rodriguezi*). Naticidae (*Natica isabellana*). Ostreidae (*Crassostrea gigas*). Psammobiidae (*Tagelus plebeius*). Tellinidae (*Tellina petitiana*)

Voces
Straneck (*in litt*.). Su voz es un agudo silbo Juiiit..Juiiít.: que suele finalizar con un Pirrrippirrrhh...

HÁBITAT
Costas marinas, playas, orillas de lagunas, lagos y de ríos.

NIDIFICACIÓN

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N



Se localizaron nidos y/o pichones en Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz.

En el suelo arenoso o entre piedras.
Expuesto. Poco elaborado. Depresión con caparazones de ostras, huesos o piedritas, en la base o en el reborde.

Salvador y Narosky (*in litt*.). Necochea, pdo. Necochea, Buenos Aires, 24-11-1983, un nido a 3 m de la línea de marea, en una simple depresión en la arena de unos 12 cm de diámetro con 2 huevos.
Salvador (*in litt*.). Puerto Pirámides, dpto. Biedma, Chubut, 02-12-1995, un nido en la costa, en zona de restingas, a 13 m del mar, en una depresión natural de 15 cm de diámetro y 4 cm de profundidad, contenía 2 huevos incubados.
Gibson (1920). Cabo San Antonio, pdo. Partido de la Costa, Buenos Aires, 08-12-1913, nido.
Bertellotti et al. (1995). Islote Notable (Isla de los Pájaros). dpto. Biedma, Chubut, 16 nidos.
Bachmann y Martínez (1998). Reserva Mar Chiquita, pdo. Mar Chiquita, Buenos Aires, desde el 9-09 al 02-11-1997, 33 nidos, con huevos.
González et al. (1998). Islotes frente a Punta Verde, dpto. San Antonio, Río Negro, en 1994 se contaron 12 nidos en el islote mayor y 5 nidos en el islote menor; en Isla Novaro, dpto. San Antonio, Río Negro, 24 nidos.
González et al. (1998). Islote Redondo, dpto. San Antonio, Río Negro, en 1995, 3 nidos.
Yorio et al. (1998a). Islote Notable, en 1994, 16 nidos; Isla Primera, en 1993, 6 nidos, en 1993, 2 nidos en Punta Pirámide, dpto. Biedma, Chubut.
Yorio et al. (1998a). Punta Tombo, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 1990-1995, nidificando. Isla Cumbre, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, en 1994, 3 nidos.
Albrieu et al. (2004). Nidifica en octubre y noviembre. Construye el nido sobre la arena o entre cantos rodados, en la zona costera. Suele colocar restos de valvas y piedritas.
Simonetti y Fiori (2009). Estuario de Bahía Blanca, dpto. Villarino, Buenos Aires, primavera de 2008, nidos entre setiembre y noviembre, nidos con 1 o 2 huevos, pocos con 3.
Bachmann y Darrieu (2010). Mar Chiquita, Mar de Cobos y La Caleta, pdo. Mar Chiquita, Buenos Aires, entre 1997 y 2001, 142 nidos. Puesta desde principio de setiembre a principio de octubre.
Simonetti et al. (2013). Estuario de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, nidos en septiembre a diciembre en los años 2008 (28 nidos) y 2009 (34 nidos).
De la Peña (2013c). Punta Logaritmo, dpto. Biedma, Chubut, 4 nidos: 26-11-1973, 2 huevos, 26-11-1973, 2 huevos, 04-11-1979, 2 huevos, 04-11-1979, 2 huevos.
Nidos en playas arenosas o entre y sobre piedritas. Medidas: diámetro total: de 15 a 18 cm.
Segura et al (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 5 nidos.

Huevos

Pone 2, a veces 3 huevos. Ovoidales. De color ocre o pardo verdoso, con pintas y manchas pardas, grises y negras distribuidas por toda la superficie.



Medidas

Salvador y Narosky (*in litt*.): 54,0 a 55,4 x 37,6 a 37,7 X= 54,7 x 37,6 (N= 2)
Salvador (*in litt*.): 53,2 a 54,1 x 39,3 a 39,6 X= 53,6 x 39,4 (N= 2)
Gibson (1920): 55 x 37
Bachmann y Martínez (1998): 52,5 a 62,4 x 33,0 a 41,9 X= 56,6 x 38,5 (N= 78)
De la Peña (2013c): 52 a 58,6 x 37,7 a 40,9 X= 54,3 x 38,9 (N= 12)

Peso
Bachmann y Martínez (1998): 37,5 a 53,8 X= 43,6 (N= 78)
De la Peña (2013c): cáscaras 3,143 a 3,490 X= 3,358 (N= 6)

Generalidades
Bachmann y Martínez (1998). Período de incubación 27 a 30 días. Los pichones volaron a los 35-40 días.
Bachmann y Darrieu (2010). Período de incubación, aproximádamente 27-28 días.

Más información:
Bachmann y Darrieu (2010). Simonetti et al. (2013)

Depredadores
De pichones: *Nycticorax nycticorax* (Daciuk 1973b)

Otros
Zelaya et al. (1997). Mayor Buratovich, pdo. de Villarino, Buenos Aires, observaron un ejemplar Albino.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pico largo, rojo. Contraste entre el negro de la cabeza, cuello y pecho, y el resto de lo ventral. Notable banda alar blanca visible en vuelo.


Punta Logaritmo. Chubut. 04-11-1979


Punta Logaritmo. Chubut. 26-11-1973


Punta Norte. Chubut. 04-02-1972

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA



Haematopus palliatus palliatus Temminck, 1820 por la costa desde Buenos Aires a Tierra del Fuego.
Observado en Lago Puelo (Chubut).

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Se distribuye por costas marinas tanto del Océano Atlántico como del Océano Pacífico, en toda América, aunque en forma discontínua.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Haematopus palliatus palliatus Temminck, 1820

Buenos Aires
Citas: Bachmann y Martínez (1999); Camperi (1992c); Darrieu y Camperi (2001a); Fiameni (1994); García y Gómez Laich (2007); Gibson (1920); Hartert y Venturi (1909); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pereyra (1938b); Simonetti et al. (2013)

Observaciones: De la Peña (Claromecó, pdo. Tres Arroyos, 07-02-1976)

Chubut
Citas: Daciuk (1977c); De la Peña (2013c); Gatto et al. (2005); Harris (2008); Jehl y Rumboll (1976); Parera (1992); Sainz-Trápaga (2014); Straneck (1990a); Yorio et al. (1998a)

Observaciones: De la Peña (Punta Loma, dpto. Biedma, 27-11-1999)

Mendoza
Citas: Roig (1965); Zotta (1936c)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011); González et al. (1998); Llanos et al. (2011); Paz et al. (2004); Peters (1923b)

Santa Cruz
Citas: Albrieu et al. (2004); Darrieu et al. (2008); Gandini y Frere (1998b); Hellmayr y Conover (1948b); Jehl (1978); Jehl y Rumboll (1976); Steullet y Deautier (1939); Zapata (1969)

Observaciones: De la Peña (Río Turbio, dpto. Güer Aike, 09-11-1979)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986)

OSTRERO NEGRO *Haematopus ater* Vieillot, 1825

Otros nombres: Fil fil negro. Pilpilén negro.

DESCRIPCIÓN
Largo: 43-46 cm.
Coloración. Pico rojo. Patas blanco-rosadas. Iris anaranjado.
Peso: Zapata (1967): N= 3 (M) X= 708 g (Rango 660 a 780); N= 2 (H) 765 y 795 g; N= 1 (?) 775 g.

Cabeza, cuello, lomo y partes ventrales negros. Partes dorsales pardas. Primarias pardas oscuras.
Cola parda oscura, casi negra.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Crawshay (1907). Ostras .Peces.

Voces
Straneck (*in litt*.). Suele cantar a dúo y su voz es muy parecida a la del Ostrero común.

HÁBITAT
Costas marinas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos y/o pichones en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas Malvinas.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	N

En el suelo arenoso o entre piedras. En costas marinas o en islas.
Expuesto. Poco elaborado. Sin elementos o con alguna piedrita en el borde.

Salvador y Narosky (*in litt*.). Punta Tombo, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 18-11-1983, 3 nidos, uno en una depresión en la arena y algunas piedritas, de unos 15 cm de diámetri y 3 cm de profundidad, 2 huevos, otro en una depresión en una restinga, con un huevo y el último entre unas rocas, en una represión de piedritas y conchillas con 2 huevos.
Salvador (*in litt*.). Playa Larralde, Península Valdés, dpto. Biedma, Chubut, 03-12-1995, un nido entre las rocas a pocos metros de la línea de marea en una depresión de conchillas, 2 huevos incubados.
Smyth (1927). Islas Malvinas, 05-11-1923, 2 huevos..
Olrog (1950). Tierra del Fuego, nido con 2 huevos en noviembre.
Zapata (1967). Puerto Deseado, dpto. Deseado, Santa Cruz, 24-10-1961, nido con 2 huevos en la isla Quiroga. El 03-11-1961 y el 07-11-1961, dos nidos con un huevo cada uno.
Boswall y Prytherch (1972). Punta Tombo, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 13 al 19 de noviembre de 1971, 5 nidos, uno con un huevo, 3 con 2 y uno con 3 huevos.
Bertellotti et al. (1995). Islote Notable (Isla de los Pájaros). Dpto. Biedma, Chubut, 9 nidos.
Punta et al. (1995). Islas Isabel, dpto. Escalante, Chubut, 26 nidos, comenzó la postura en la segunda semana de octubre de 1991.
Gandini y Frere (1995b). Punta Medanosa, 5 nidos en 1995, Punta Sur, varios nidos en 1994, dpto. Deseado, Santa Cruz.
Gandini y Frere (1996). Isla Chaffers, en el año 1993, se localizaron 5 nidos, Isla Quiroga, 5 nidos en 1992, dpto. Deseado, Santa Cruz.
Woods y Woods (1997). Islas Malvinas, de octubre a enero, nidos.
González et al. (1998). Islote de los Pájaros, dpto. San Antonio, Río Negro, 1990-1995, nidificando.
Yorio et al. (1998a). Islote Notable, en 1994, 9 nidos; Isla Primera, en 1993, 4 nidos; en 1993 en Punta Pirámide, 6 nidos; dpto.Biedma, Chubut.
Yorio et al. (1998a). Punta León, dpto. Rawson, Chubut, de 1989 a 1995, nidos. Punta Tombo, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 1990-1995,



nidificando. Isla Cumbre, en 1994, 4 nidos; en Isla Blanca Menor Oeste, en 1995, 7 nidos, dpto. Florentino Ameghino, Chubut.
Yorio et al. (1998b). Isla Aguilón del Norte, Isla Leones, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 1990-1995, nidificando. Isla Lobos, en noviembre de 1993, 3 nidos; Isla Galiano Norte, en 1993, 6 nidos; Isla Galiano Central en 1993, un nido, dpto. Florentino Ameghino, Chubut. Isla Vernaci Este, en 1993, un nido; Isla Vernaci Sudoeste, en 1993, un nido; Isla Vernaci Oeste, en 1993, un nido; Isla Vernaci Noroeste, en 1993, un nido; Isla Viana Menor, en 1993, 3 nidos, Isla Felipe, un nido, en 1993, dpto. Escalante, Chubut.
Gandini y Frere (1998a). Cabo Blanco, nidificando, Islas Larga, 8 nidos en 1994, dpto. Deseado, Santa Cruz.
Frere y Gandini (1998). Banco Justicia II, dpto. Magallanes, Santa Cruz, 7 nidos en 1994.
De la Peña (2013c). Punta Tombo, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 3 nidos: 27-11-1973, un huevo y un huevo; 05-11-1979, 2 huevos; Puerto Deseado, dpto. Deseado, Santa Cruz, 2 nidos: 07-11-1979, 2 huevos y un huevo.
Nidos en suelo arenoso o entre piedras en una isla. Medidas: diámetro total: de 14 a 16 cm.

Huevos
Pone 2 huevos a veces 3.
Ovoidales. De color ocre, ocre grisáceo o pardo verdoso, con pintas y manchitas grises y pardas oscuras distribuidas por toda la superficie. Algunos tienen líneas pardas claras.



Medidas
Salvador y Narosky (*in litt*.): 58,1 a 67,6 x 39,7 a 41, 8 X= 62,4 x 40,9 (N= 5)
Salvador (*in litt*.): 62 a 63,4 x 39,8 a 41,1 X= 63,1 x 40,4 (N= 2)
Zapata (1967): 64 x 40
De la Peña (2013c): 54,5 a 60,5 x 40 a 41,3 X= 57,9 x 40,6 (N= 7)

Pesos
Salvador y Narosky (*in litt*.): 48,5 a 58,5 X= 54,8 (N= 5)
De la Peña (2013c): cáscaras 3,212 a 4,116 X= 3,828 (N= 7)

PICHONES
Observaciones
Zapata (1967). Puerto Deseado, dpto. Deseado, Santa Cruz, 03-11-1961, pichones en la isla Larga; 04-12-1961, varios pichones en la isla Quiroga.
De la Peña (2013c). Punta Logaritmo, dpto. Biedma, Chubut, 26-11-1973. Pareja con un pichón.

Generalidades
Punta et al. (1995). Período de incubación 28 días.

Más información:
Punta et al. (1995)

Depredadores
De adultos: *Phalcoboenus australis* (Catry et al. 2008)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pico largo. Negro con el dorso pardo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
*Haematopus ater*Vieillot, 1825 en las costas de Chubut, Santa cruz, Tierra del Fuego y las Malvinas.
En invierno llega a la costa de Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Costas marinas del sur de Sud América en Perú, Chile y Argentina, incluyendo las Islas Malvinas.



Punta Tombo. Chubut. 05-11-1979



Punta Tombo. Chubut. 26-11-1973



Punta Tombo. Chubut. 26-11-1973



Punta Tombo. Chubut. 05-11-1979

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS



Buenos Aires

Citas: Fiameni (1994); Narosky y Di Giacomo (1993); Rodríguez Moulín (1984b); Savigny (2002d)

Chubut

Citas: Bó (1958); Daciuk (1977a, 1977b, 1977c); De la Peña (2013c); Gatto et al. (2005); Harris (2008); Parera (1992); Punta et al. (1995); Sainz-Trápaga (2014); Straneck (1990a); Yorio et al. (1998a)

Observaciones: De la Peña (Punta Logaritmo, dpto. Biedma, 26-11-1973)

Río Negro

Citas:Gelain y Tolosa (2011); González (1992); González et al. (1998); Llanos et al. (2011); Paz Barreto (1997b)

Santa Cruz
Citas: Daciuk (1977b); Darrieu et al. (2008); De la Peña (2013c); Frere y Gandini (1998); Gandini y Frere (1998a., 1998b); Jehl (1978); Steullet y Deautier (1939); Zapata (1967)

Observaciones: De la Peña (Puerto Deseado, dpto. Deseado, 25-01-1972)

Tierra del Fuego
Citas: Castellanos (1935); Chebez y Bertonatti (1994); Clark (1986); Earnshaw (1973); Humphrey et al. (1970); Olrog (1948, 1950); Ripley (1950)

Canal de Beagle
Citas: Stiles (1979a)

Islas Malvinas
Citas: Wace (1921); Woods y Woods (1997); Woods (2006)

OSTRERO AUSTRAL *Haematopus leucopodus* Garnot, 1826

Otros nombres: Ostrero del sur. Ostrero de patas blanquecinas. Ostrero overo. Pipilén austral. Pilpilén overo. Pipilero overo. Tero de mar. Tero real.

DESCRIPCIÓN
Largo: 42-46 cm.
Coloración. Pico rojo. Patas blanco-rosadas. Iris amarillo.
Peso: Jehl (1978): N= 2 (H) 585 y 610 g.
Cabeza, cuello, dorso, pecho, primarias y tercio terminal de la cola negros.
Secundarias, borde de las cubiertas mayores, supracaudales, base de la cola y partes ventrales blancas.

COMPORTAMIENTO
Solitario o en pareja. A menudo nidifica en estepas alejado del agua

Alimentación

Voces
Straneck (*in litt*.). Su voz en un agudo silbo siiiiiíihhh...siiiiihiih.

HÁBITAT
Costas marinas, riberas de arroyos, ríos, lagunas, zonas húmedas en estepas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos y/o pichones en Santa Cruz, Tierra del Fuego, Islas Malvinas.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N								N	N	N	N

En el suelo arenoso o entre piedras. En playas marinas o en lagunas del interior.
Expuesto. Poco elaborado. Depresión, con o sin algunas piedrita u otro elemento.

Smyth (1927). Islas Malvinas, 16-10-1923, 2 huevos.
Olrog (1950). Tierra del Fuego, nido con huevos en noviembre.

Jehl y Rumboll (1976). Río Grande, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego. Nidos en octubre con huevos.
Chebez et al. (1998). Parque Nacional Los Glaciares, dpto. Los Lagos, Santa Cruz, nidifica.
Woods y Woods (1997). Islas Malvinas, de setiembre a enero, nidos.
Schiavini et al. (1998). Islote Bertha Mayor, dpto. Ushuaia, Tierra del Fuego, 1990-1995, nidificando.
Albrieu et al. (2004). Estuario del Río Gallegos, dpto. Güer Aike, Santa Cruz, nidifica entre setiembre y noviembre. Construye el nido en orillas de lagunas o zonas anegadas y mallines, en la estepa y hasta la zona cordillerana.
De la Peña (2013c). Cancha Carrera, dpto. Güer Aike, Santa Cruz, 08-11-1979, 2 huevos; La Esperanza, dpto. Guer Aike, Santa Cruz, 08-11-1979, 2 huevos.
Nidos en laguna seca, a 50 m y otro a 20 m de una ruta. Medidas: diámetro total, de 14 a 15 cm.



Huevos
Pone 2 huevos. Ovoidales. De color ocre oscuro o verde oliváceo con pintas y manchas pardo oscuro y grises distribuidas por toda la superficie.



Medidas
Smyth (1927): 58 x 39,5 a 41,5
De la Peña (2013c): 51,4 a 57,1 x 39,8 a 40,5 X= 54,7 x 40,1 (N= 4)

Pesos
De la Peña (2013c): cáscaras 3,028 a 3,528 X= 3,259 (N= 4)

Anónimo (1933): huevos colectados en Viamonte, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego, por T. L. y G. P. Bridges y P. W. Reynolds, en el Museo Nacional de Historia Natural.

PICHONES
Observaciones
Zapata (1967). Puerto Deseado, dpto. Deseado, Santa Cruz, 05-12-1961, pareja con 2 pichones, al borde de la isla Quinta.
Humphrey et al. (1970). Reynolds observó pichones el 02-02-1929, en Cabo Peñas, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pico largo. Contraste entre el negro de la parte dorsal y el blanco de la ventral.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Haematopus leucopodus Garnot, 1826 en el interior y costas de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y las Malvinas.
En invierno llega hasta la costa de Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Se distribuye en el extremo sur de Chile y Argentina.



La Esperanza. Santa Cruz. 08-11-1979



La Esperanza. Santa Cruz. 08-11-1979

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires

Citas: Bachmann e Isacch (1999); Darrieu y Camperi (2001a); Delhey et al. (2001c); Fiameni (1994); Nores (1986b); Salvador y Narosky (1987)

Chubut

Citas: Camperi (1998); Daciuk (1977b); Gatto et al. (2005); Harris (2008); Humphrey y Bridge (1970); Kovacs et al. (2005); Jehl y Rumboll (1976); Parera (1992); Sainz-Trápaga (2014); Salvador y Narosky (1987)

Neuquén

Citas: Del Valle y Funes (1994); Matarasso (2007)

Río Negro

Citas: Gelain y Tolosa (2011);Llanos et al. (2011); Nores (1986a.); Paz Barreto (1997b)

Santa Cruz

Citas: Albrieu et al. (2004); Chebez et al. (1988); Coconier (2005b); Daciuk (1977b); Darrieu et al. (2008); De la Peña (2013c); Erize (1983); Ferrari y Albrieu (2005); Fjeldsa (1985); Gandini y Frere (1998b); Harris (2008); Humphrey y Bridge (1970); Imberti (2003); Imberti y Albrieu (2001); Jehl y Rumboll (1976); Lange (1981); Millar y Baker (1980); Murphy (1925); Oustalet (1891); Scott y Sharpe (1910); Zapata (1967, 1969)



Tierra del Fuego

Citas: Chebez y Bertonatti (1994); Clark (1986); Earnshaw (1973); Humphrey et al. (1970); Jehl y Rumboll (1976);

Keith (1970); Olrog (1948, 1950); Pereyra (1950a); Reynolds (1934); Ripley (1950);Schiavini et al. (1998)

Observaciones: De la Peña (Río Grande, dpto. Río Grande, 02-02-1972)

Islas Malvinas

Citas: Straneck (1990a); Woods y Woods (1997); Woods (2006)

TEROS REALES

FAMILIA:RECURVIROSTRIDAE

Aves acuáticas de pico, cuello y patas largos.

Se alimentan de insectos acuáticos, vermes, semillas.

Frecuentan bañados y lagunas.

Nidifica en forma aislada o en colonias. Construye el nido en pastos naturales al borde de lagunas, en islotes con gramíneas dentro de lagunas y en pastos salados al bord e de arroyos. En suelos arenosos de las costas sin vegetación. También en isletas o en albardones.

Expuesto. Poco elaborado. Plataforma de tallos de yuyos o pastos, en la base o en el reborde.

Pone 3 ó 4 huevos, cónicos, de color pardo u ocre oscuro, con pintas y manchas pardas oscuras o violeta oscuro, distribuídas por toda la superficie, pero más concentradas en el polo mayor.

Cuando tienen pichones y notan un extraño, se apartan simulando tener un ala quebrada y se agachan aleteando. Emiten voces chillonas y fuertes, en el interín los pichones se esconden en huecos, pisadas de animales o entre los pastos, quedando inmóviles.

TERO REAL *Himantopus mexicanus* (Statius Müller, 1776)

Otros nombres: Avoceta. Canilludo. Chorlito palmeado. Cigüeñuela. Haito. Mbatituí zancudo. Perrito. Perrito del agua. Perro. Perro de agua. Terito de laguna. Terito overo. Terito real. Tero de agua. Teru real. Tero real de cola negra. Zancudo. Zancudo de Azara.

DESCRIPCIÓN
Largo: 37-42 cm.
Peso: Salvador (2014a): N= 3 (M) X= 211 g (Rango 203 a 216); N= 4 (H) X= 195 g (Rango 189 a 202)
Coloración. Pico negro. Patas rosadas. Iris carmín.
Nuca, posterior del cuello, región escapular y alas negros. Frente, corona, dorsal de la base del cuello, rabadilla, cola y partes ventrales blancas.

COMPORTAMIENTO
Anda solitario, en grupos de pocos ejemplares o en bandadas de muchos.

Alimentación
Aravena (1927). **Insectos:** Coleóptero (*Sphenophorus crassus*). Carábidos (*Platima*) y (*Scarites anthracinus*).
Arácnidos.
Zotta (1932). **Insectos:** Coleópteros.**Crustáceos**.
Fiora (1939). Insectos.
Bucher y Herrera (1981). **Insectos:** Coleópteros. Corixidae. Hormigas.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Dytiscidae, Hydrophilidae, larvas, no identificado). Diptera (Culicidae: larvas). Hemiptera (Belostomatidae, Corixidae). **Crustáceos:** (Gammaridae: *Gammarus* sp., Paleamonidae: *Palaemonetes* sp.). Ephemeroptera (náyades y

adultos).**Moluscos:** Ampullaridae: (*Ampullariacanaliculata*, Hydrobiidae: *Littoridinaparchappei*, Planorbidae: *Biomphalaria* sp.). **Arácnidos:** arañas. **Otros:** Arena.
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Voces
Straneck (*in litt*.). Cuando está alarmado repite una voz nasal: guep..guep..guep..

HÁBITAT
Lagunas, bañados, charcas, basurales.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Tucumán, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N	N	N			N	N	N	N	N

En el suelo. En albardones o en orillas de lagunas, cerca del agua.
Expuesto. Poco elaborado. Plataforma de tallos de yuyos o pastos, en la base o en el reborde.

Shipton (Instituto Miguel Lillo). Toro Muerto, dpto. Leales, Tucumán, 11-12-1909, nido con 4 huevos.
Nores e Yzurieta (*in litt*.) a S. Salvador, 4 nidos, 3 en Laborde, dpto. Unión, Córdoba, uno con 3 huevos, el 03-09-1973, otro con 3 huevos el 30-10-1973 y el tercero con 4 huevos el 15-11-1973; el cuarto nido lo hallaron en la laguna Ludueña, dpto. Juárez Celman, Córdoba, con 4 huevos, el 25-08-1977.
Salvador, Nores e Yzurieta (*in litt*.). Miramar, dpto. San Justo, Córdoba, 11-12-1980, 3 nidos en un manchón de pasto salado, con 4 huevos cada uno.
Salvador y Salvador (en prep.). Dpto. San Martín, Córdoba, 69 nidos entre agosto y mayo, en pastos naturales al borde de lagunas, en islotes con gramíneas dentro de lagunas y en pasto salado al borde de arroyos, posturas de 3 a 4 huevos.
Gibson (1880b). Cabo San Antonio, pdo. Partido de la Costa, Buenos Aires, 2 nidos, entre agosto y octubre.
Hartert y Venturi (1909). Bahía Blanca, pdo. Bahía Blanca, Buenos Aires, 23-10-1899, nido con 4 huevos.
Pereyra (1938b). Río Luján, pdo. Luján, Buenos Aires, colonia con 9 nidos, todos con 4 huevos.
Zapata y Cabrera (1969, Laguna Chasicó. pdo. Villarino, Buenos Aires, un nido con 4 huevos, 04-12-1967.
Zapata y Cabrera (1969). Atalaya, pdo. Magdalena, Buenos Aires. Dos nidos con 4 y 3 huevos.
Zapata y Zazarino de Bustingorry (1990). 25 de Mayo, pdo. 25 de Mayo, Buenos Aires, 1980. Nidos en setiembre con 4 huevos. Diámetro externo de 17 a 19 cm.
Sosa (2005). Llancanelo, dpto. Malargüe, Mendoza. Nidifica en forma aislada en suelos arenosos de las costas sin vegetación. También en isletas.
De la Peña (2013c). Cayastacito, dpto. San Justo, Santa Fe, 11 nidos: 16-11-1972, 4 huevos, 2 huevos, 2 huevos, 3 huevos, 3 huevos, 4 huevos, 4 huevos, 4 huevos, 4 huevos, 4 huevos, 4 huevos; Isla Verde, dpto. Marco Juárez, Córdoba, 4 nidos: 05-02-1992, 2 huevos y 3 huevos; 21-10-1998, un huevo y 3 huevos,
Los nidos de Cayastacito, estaban en un albardón en el medio de una laguna los de Isla Verde, en la orilla de una laguna. Medidas: diámetro total: de 10 a 14 cm, alto: 3 a 4 cm.
Segura et al (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos "Ronald Runnacles", 6 nidos. Uno parasitado por *Heteronetta atricapilla*.



Huevos



Pone 4 huevos. Cónicos. De color pardo u ocre oscuro, con pintas y manchas pardas oscuras distribuidas por toda la superficie.

Medidas

Salvador, Nores e Yzurieta (*in litt*.): 44,8 a 46,2 x 31,9 a 32,2 X= 45,5 x 32,1 (N= 8)
Salvador y Salvador (en prep.):43,6 a 47,1 x 30,2 a 33,2 X= 45,7 x 31,9 (N= 68)
Hartert y Venturi (1909): 42,5 a 43 x 31,5
Gibson (1920): 45 a 47 x 33
Pereyra (1938b): 45 x 33
Zapata y Cabrera (1969): 46,1 a 46,9 x 31,6 a 34,9 X= 46,5 x 33,7 (N= 2)
Zapata y Zazarino de Bustingorry (1990): X= 47,73 x 34,30 (N=4)
De la Peña (2013c): 44,6 a 48,9 x 31 a 34 X= 45,3 x 32,5 (N= 11)

Pesos

Salvador y Salvador (en prep.): 22 a 28,5 X= 26,1 (N= 49)
Zapata y Cabrera (1969): 18 a 28 X= 23 (N= 2)
De la Peña (2013c): 22,8 a 23,9 X= 22,9 (N= 3)
De la Peña (2013c): cáscaras 1,4 a 1,7 X= 1,6 (N= 11)

PICHONES

Descripción

De la Peña (2013c): Pichón de 5-6 días.
Pico oscuro. Corona y dorso pardo oliváceo con puntos y líneas negras. Ventral blanquecino.

Observaciones

De la Peña (2013c). Isla Verde, dpto. Marco Juárez, Córdoba, 21-10-1998. Pareja con 2 pichones.

Generalidades

De la Peña (2013c). El 17-09-2003 en Esperanza, se observó una cópula.
Cuando tienen pichones y notan un extraño, se apartan simulando tener un ala quebrada y se agachan aleteando. Emiten voces chillonas y fuertes. En el interín los pichones se esconden en huecos, pisadas de animales o entre los pastos, quedando inmóviles.
Los pichones pían antes de salir del huevo.

DEPREDACIÓN

De adultos: *Falco peregrinus* (Galmes et al. 2008b)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Pico, cuello y patas largos. Blanco y negro. El grito.



Esperanza. Santa Fe. 12-12-2007



Esperanza. Santa Fe. 30-06-2008



Isla Verde. Córdoba. 21-10-1998



Isla Verde. Córdoba. 21-10-1998



Isla Verde. Córdoba. 21-10-1998



Esperanza. Santa Fe. 12-12-2007

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Himantopus mexicanus melanurus Vieillot, 1817 desde el norte del país hasta Santa Cruz.Accidental en las Islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cinco subespecies. **S**e extiende desde Norte América, Islas del Caribe, Centro América y Sud América hasta Chile, Perú, Brasil y Argentina.



CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Himantopus mexicanus melanurus Vieillot, 1817

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Durnford (1878); Fiameni (1994); Filipello y López de Casenave (1993); Fiora (1939); Gibson (1880b, 1920); Hartert y Venturi (1909); Isacch et al. (2006); Klimaitis (1975b); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); López de Casenave y Filipello (1995); Mérida y Bodrati (2006); Morici (2012b); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Renard (1920); Straneck (1990b); Weller (1967a); Zapata (1998); Zotta (1932)

Observaciones: De la Peña (Claromecó, pdo. Tres Arroyos, 07-02-1976)

Catamarca
Citas: Carma (2009); Silverio y Fra (2009)

Observaciones: De la Peña (Salinas Grandes, dpto. La Paz, 08-03-1981)

Chaco
Citas: Chatellenaz (2005a); Moschione y Bishels (2004)

Observaciones: De la Peña (Quitilipi, dpto. Quitilipi, 03-05-1988)

Chubut
Citas: Camperi (1998); Daciuk (1977); Escudero et al. (2004); Harris (2008); Kovacs et al. (2005); Sainz-Trápaga (2014)

Observaciones: De la Peña (Leleque, dpto. Cushamen**,** 01-02-1976; Trelew, dpto. Rawson, 30-11-2000)

Córdoba
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Brandolín et al. (2007); Bucher y Herrera (1981); Castellanos (1931); De la Peña (2013c); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores y Yzurieta (1980b); Salvador (1983a); Sferco y Nores (2003); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Balnearia, dpto. San Justo, 15-01-2009)

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Beltzer (1981c); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2002); Muzzachiodi et al. (2003); Peltzer (1998); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Zapata (1975, 1977)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c);Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); López Lanús (1997); Pujalte et al. (1995)

Jujuy
Citas:Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Chebez et al. (1998); Gorleri et al. (2011); Laredo (1996); Moschione y Segovia (2005)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Bruno et al. (2007); Bruno y Erro (2010); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Galmes et al. (2008); Grilli et al. (2009); Maceda et al. (2001); Pereyra (1937b); Siegenthaler (1984, 2004); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006)

Observaciones: De la Peña (Realicó, dpto. Realicó, 19-11-1998; Gral. Acha, dpto. Utracán**,** 19-11-1998)

La Rioja
Citas: Bodrati y Ferrari (2014)

Mendoza
Citas: Aramburú (1983); Blendinger y Alvarez (2002); Calí et al. (2008); Contreras y Fernández (1980); Darrieu (2014); Lucero (2009, 2013f); Martínez et al. (1997a); Pereyra Lobos y Martínez (2011); Reed (1914); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (1993b, 2005)

Observaciones: De la Peña (Llancanelo, dpto. Malargüe, 15-10-2004)

Misiones
Citas:Chebez (1996a); Martínez Gamba (2014)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Babarskas et al. (1996); Canevari et al. (1991b); Chehebar et al. (1992); Fiori y Zalba (1999); Gorgoglione (2005); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Casas (1992a); Gelain (1984a, 1984b, 2001, 2012b); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Paz Barreto (1997b); Paz, D. et al. (2004); Pérez y Petracci (1998); Piacentini et al. (2003)

Observaciones: De la Peña (Río Colorado, dpto. Pichi Mahuida, 26-11-2000)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Camperi (1988); Coconier et al. (2007); Echevarría et al. (2014); Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Gelain (2014a); Lucero (2013f, 2013i); Ortiz y Murúa (1994)

San Luis
Citas: Bianchini y Arenas (2014b); Masramón (1983); Nellar Romanella (1993)

Santa Cruz
Citas: Darrieu et al. (2008); Imberti (2003, 2005e); Imberti y Albrieu (2001)

Santa Fe
Citas: Beltzer (1986c); Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Quiroga y Hadad (2004)

Santiago del Estero
Citas: Nores e Yzurieta (1982a)

Observaciones: De la Peña (Selva, dpto. Rivadavia, 29-01-1977; Bandera, dpto. Belgrano, 30-07-1987)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch et al. (2011b);Cocimano et al. (2005); Echevarría (2001, 2014); Echevarría y Chani (1999, 2001, 2006); Echevarría et al. (1998, 2008c); Hartert y Venturi (1909); Laredo y Vides-Almonacid (1999); Lucero (1983); Ortiz y Ruiz (2011)

Islas Malvinas
Citas:Woods (2006)

AVOCETA ANDINA *Recurvirostra andina* Philippi & Landbeck, 1861

Otros nombres: Caití. Caito. Kaito. Tero real andino. Tero real andino de pico corvo.

DESCRIPCIÓN
Largo: 43-48 cm.
Peso: Navas y Camperi (2006): N= 1 (M) 370 g.
Coloración. Pico negro. Patas grises azuladas. Iris anaranjado.
Blanco con las alas, la cola y la parte media del cuerpo negros.

COMPORTAMIENTO
Anda en pareja o formando pequeños grupos.

Alimentación
Fiora (1939). Vegetales, insectos, larvas, limo, arena.

Voces
Straneck (*in litt*.). La voz es un ascendente y nasal Düit..düit.. Düit.

HÁBITAT
Orillas de lagunas, arroyos, charcos, entre los 3.000 y los 4.000 metros de altura.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Jujuy.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	N	N									

Expuesto. Elaborado. Depresión en el suelo tapizada o no con palitos.

Contino y Narosky (com. pers.) a S. Salvador, hallaron 3 nidos en laguna de Pozuelos, Jujuy, el 25-02-1976. Dos sin postura y el otro con un huevo roto. Un nido mide 20 cm de diámetro externo, 12 cm en el interno y 2 cm de profundidad.
Uranga (*in litt.*). Laguna Runtuyoc, Abra Pampa, dpto. Cochinoca, Jujuy, nido en un albardón de tierra rodeado por agua, con 2 huevos y otro con 4.
Contino (1980). Abra Pampa, dpto. Cochinoca, Jujuy,pequeñas colonias en las playas, con huevos en febrero.
Salvador (1992). Contino (Fundación Miguel Lillo). Abra Pampa, dpto. Cachinoca, Jujuy,19-02-1964, 3 huevos.
Laredo (1996). Laguna Pozuelos, Jujuy, nido con huevos en febrero.







Laguna Runtuyoc, Abra Pampa. Jujuy Fotos: Máximo Uranga

Huevos
Pone 3 huevos. Fondo pardo oliváceo con manchas, líneas y puntos neguzcos y violeta oscuro más concentradas en el polo mayor.

Medidas
Salvador (1992). Contino (Fundación Miguel Lillo): 51,3 x 35,9 y 51,2 x 38,2



Peso
Contino (1980): 38,5

PICHONES
Observaciones
Contino (1980). Pichones en marzo.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Blanco con las alas y la cola negras. Pico largo curvado hacia arriba. Patas largas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Recurvirostra andina Philippi & Landbeck, 1861 lagunas entre los 3000 y los 4000 m de altura en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Región altoandina de Perú, Chile, Argentina y Bolivia.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2007); Navas y Camperi (2005, 2006); Peters (1934)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Fiora (1939); Contino en Salvador (1992); Laredo (1996); Navas y Camperi (2005); Straneck (1990f)



Observaciones: De la Peña (Abra Pampa, 10-02-1983)

La Rioja
Citas : Eguía (2014)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013); Vides Almonacid (1990)

Tucumán
Citas:Brandán y Navarro (2009); Laredo y Vides-Almonacid (1999)

PALOMA ANTÁRTICA

FAMILIA: CHIONIDAE

Aves que se caracterizan por tener el pico corto y grueso.

Alimentación omnívora.

Frecuentan costas marinas, principalmente en colonias de pingüinos, cormoranes, gaviotas, focas, lobos y elefantes marinos.

Ponen 1 o más huevos.

Pichones cubiertos de plumón pardo.

PALOMA ANTÁRTICA *Chionis albus* (J. F. Gmelin, 1789)

Otros nombres: Chorlo gigante. Chorlote blanco antártico. Pico de estuche. Pico envainado blanco.

DESCRIPCIÓN
Largo: 34-41 cm.
Peso: Favero (2001): N= 40 (M) X: 719,1 g (Rango 640 a 810); N= 37 (H) X: 635,3 g (Rango 560 a 720).
Coloración. Pico amarillo rosado con punta negra. Patas grisáceas. Iris pardo.
El pico es corto, cónico, fuerte. La mitad basal del maxilar superior está cubierta por una vaina ocrácea. La base del pico y los lados de la cara, por debajo de los ojos, implumes. Carúncula rosada.
Coloración general del plumaje blanca.

COMPORTAMIENTO
Relativamente mansa. Corre como si diera saltitos. Solitaria o a veces en grupos dispersos.
Alimentación
Burger (1981). **Carroña:** (Pingüinos, otras aves, Pinnípedos, Cetáceos). Crustáceos. Desperdicios. Huevos (Pingüinos y otras aves). Moluscos. Leche (Pinnípedos). Placentas (Pinnípedos).
Favero (1996). **Carroña:** (Elefantes marinos). Leche (de Elefantes marinos). Materias fecales. Placentas.
Albrieu et al. (2004). Crustáceos. Desperdicios. Moluscos. Materias fecales.
De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). Carroña. Huevos. Materias fecales.
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Carroña:** (Pingüinos, Pinnipedos, Peces). Huevos.

HÁBITAT
Costas marinas, islotes.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Antártida, Islas Shetland del Sur, Islas Orcadas del Sur.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N									N	N

Plataforma de diversos materiales.

Ubica el nido en el suelo, entre las rocas o en construcciones abandonadas, cerca de las costas marinas. Es redondeado, bordeado con piedritas, plumas, cáscaras de huevos y trozos pequeños de madera. También puede emplear materiales vegetales. Straneck (*in litt*.).

Montaltti (comp. pers.). Isla 25 de Mayo, Shetland del Sur, 06-01-1997, nidos.
Olrog (1958a). Nidificando en la Isla Media Luna, Islas Shetland del Sur.
Coria y Montalti (1993b). Bahía Esperanza, Península Antártica, nidos desde noviembre de 1989 a febrero de 1990.
Orgeira (1997c). Punta Cierva, costa de Danco, Península Antártica, nidifica.
García Esponda et al. (2000). Isla Halfmoon, Islas Shetland del Sur, 1995/96, nidificando.
Coria et al. (2011). Isla Laurie, Orcadas del Sur, diciembre de 1994, nidificando.

Huevos
Pone 2 ó 3 huevos. Ovoidal alargado. Ocre grisáceo, blanquecinos o grises, con manchas y pecas pardas oscuras más concentradas en el polo mayor.



Medidas
Montaltti (comp. pers.): 61,7 x 39,0
Straneck (*in litt*.): 54 a 60 x 37 a 40

PICHONES
Observaciones
Olrog (1958a). Bahía Esperanza, 24-01-1953, pichones.

Más información:
Favero (2001)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Blanca. La forma del pico.



Isla de los Pájaros. Chubut. 04-02-1972



Punta Tombo. Chubut. 26-11-1973 Comiendo huevos de Gaviota cocinera.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA



Chionis albus (J. F. Gmelin, 1789) nidifica en Georgias, Sandwich, Orcadas y Shetland del Sur y en el Archipiélago Antártico. Habita además las islas Malvinas, costas de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut.
En invierno llega hasta la costa de Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Nidifica en Georgias, Sandwichs, Orcadas y Shetlands del Sur y en el Archipiélago Antártico. Habita además las Malvinas, costas de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut. En invierno sube por la costa hasta Río Negro, Buenos Aires.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires

Citas: Darrieu y Camperi (2001a); Fiameni (1994); García y Gómez Laich (2007); Narosky (1983b); Narosky y Di Giacomo (1993)

Chubut

Citas: Bó (1958); Boswall (1973); Harris (2008); Parera (1992); Sainz-Trápaga (2014)

Observaciones: De la Peña (Isla de los Pájaros, dpto. Biedma, 04-02-1972; Punta Tombo, dpto. F. Ameghino, 27-11-1973)

Río Negro

Citas: Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Paz et al. (2004); Paz, D. (1991b)

Santa Cruz

Citas: Albrieu et al. (2004); Dabbene (1910); Darrieu et al. (2008); Gandini y Frere (1998b); Olrog (1948); Salvadori (1900); Steullet y Deautier (1939); Zapata (1967)

Observaciones: De la Peña (Puerto Deseado, dpto. Deseado, 07-11-1979)

Tierra del Fuego

Citas: Castellanos (1935); Clark (1984, 1986); Humphrey et al. (1970); Jehl y Rumboll (1976); Olrog (1948)

Observaciones: De la Peña (Río Grande, dpto. Río Grande, 02-02-1972)

Islas Malvinas

Citas: Wace (1921); Woods (2006)

Mares, islas y Antártica

Citas: Castellanos (1927); Coria y Montalti (1993b); Favero (2001); Novatti (1978); Olrog (1958a); Orgeira (1997a, 1997c)

Georgias del Sur

Citas: Prince y Croxall (1996)

Orcadas del Sur

Citas: Castellanos (1935); Coria et al. (2011); Paz, D. (1990a)

Shetland del Sur
Citas: Arechabala y Novatti (1983); Bennett (1920); Favero y Silva (1993); García Esponda et al. (2000); Shuford y Spear (1988)

CHORLITO CENICIENTO

FAMILIA: PLUVIANELLIDAE

Nidifican solitariamente.

Construyen el nido en orillas de lagos y lagunas, generalmente entre piedras.

Pone 2 huevos. La pareja incuba.

CHORLITO CENICIENTO *Pluvianellus socialis* G. R. Gray, 1846

Otros nombres: Chorlito. Chorlito de lomo gris. Chorlo de Magallanes.

DESCRIPCIÓN
Largo: 20-21cm.
Peso: Jehl (1975): N= 5 (M) X: 89,1 g (Rango 79 a 102); N= 8 (H) X: 79,5 g (Rango 69,5 a 87,3).
Coloración. Pico negro. Patas rosadas. Iris rojo.
Frente y garganta blanquecinas. Lorum oscuro. Resto de la cabeza, cuello, pecho y partes dorsales grises oscuras. Resto de ventral blanco.
Alas pardas con las secundarias blancas.
Cola con las plumas centrales pardas oscuras y las laterales blancas.

COMPORTAMIENTO
Corre rápido. Forma pequeños grupos.

Alimentación
Crawshay (1907). Crustáceos

HÁBITAT
Orillas de lagunas y charcas, playas marinas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Santa Cruz, Tierra del Fuego.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N							N	N	N	N	N

Rudimentario, expuesto. Huevos puestos sobre el suelo. Algunos con pequeñas piedritas.

Reynold (1953). Nido con 4 huevos en Cabo Viamonte, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego,.
Jehl, (1975). Comienza a nidificar en setiembre en Tierra del Fuego. Nidos en Santa Cruz y en Tierra del Fuego.
Jehl y Rumboll (1976). Laguna Los Escarchados, dpto. Lago Argentino, Santa Cruz. Enero de 1976, R. W. Storer, observó 5-6 parejas nidificando.
Albrieu et al. (2004). Santa Cruz, nidifica entre setiembre y enero.
Ferrari et al. (2008). Comienza a nidificar en Agosto. Ubica el nido en lagunas con playas de canto rodado mezclado con arcilla.

Entre el 12-10-2006 y el 23-01-2007, 20 nidos con 1 ó 2 huevos, en Santa Cruz. De 71 nidos monitoreados, el 71% resultó exitoso. Una misma pareja ha sido observada nidificando 3 veces (las dos primeras con éxito) en una misma temporada.



Huevos
Pone 2 huevos, piriformes, grisáceos o gris verdosos, con pintas oscuras.

Medidas
Ferrari et al. (2008): X= 34, 8 x 25, 2 (N=21)

Peso
Jehl (1975): 9, 6 a 10, 9

PICHÓN
Descripción
Jehl (1975). Cara, cabeza y dorsalmente, gris verdoso. Alas teñidas de dorado. Garganta blanca, sombreado de dorado en la parte superior del pecho. Resto de la parte ventral, blanco.

Observaciones
Humphrey et al. (1970). Reynold observó juveniles en Cabo Peñas, el 31-01-1927.

Generalidades
Ferrari et al. (2008). Período de incubación, 24 días.
Jehl (1975). Período de incubación, 24-26 días.

Más información:
Lishman y Nol (2012). Ferrari et al. (2003, 2008). Jehl (1975)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. Coloración general gris con el vientre blanco.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Pluvianellus socialis G. R. Gray, 1846 en Santa Cruz y Tierra del Fuego. Accidental en las Islas Malvinas.
Observado además en La Rioja, Río Negro y en Chubut.
En otoño migra hasta Buenos Aires.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en el sur de la patagonia, tanto en Chile como Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Chiurla (1996); Darrieu y Camperi (2001a); Delhey et al. (2001c); Lowen et al. (2009); Narosky y Di Giacomo (1993)

Chubut
Citas: Harris (2008); Pagnoni (1995); Pierce (1990)

La Rioja
Citas: Chebez (2005b); Sosa (2010)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011); González (1990, 1991, 1996); Llanos et al. (2011)

Santa Cruz
Citas: Albrieu et al. (2004); Chebez et al (1998); Coconier (2005b); De Lucca y Saggese (1992); Di Giacomo et al. (2005cc); Erize (1983); Ferrari y Albrieu (2005); Ferrari et al. (2003, 2008); Fjeldsa (1985); Iglesias y Pérez (1998); Imberti (2003, 2005e); Imberti y Albrieu (2001); Jehl (1975); Jehl y Rumboll (1976); Lange (1981); Lishman y Nol (2012); Rumboll (1974); Scott y Sharpe (1910); Straneck (1990a);

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1984, 1986); Crawshay (1907); Humphrey et al. (1970); Jehl (1975); Jehl y Rumbold (1976); Mogensen (1930); Olrog (1948); Pierce (1990); Reynolds (1953)

Malvinas
Citas: Woods (1988, 2006)

CHORLOS Y BECASINAS

FAMILIA: SCOLOPACIDAE

Aves de pico y patas largos.

Las alas son largas y puntiagudas.

Construyen el nido en el suelo. Cerca de ambientes acuáticos (campos inundados, bañados, arroceras)

Semioculto. Poco elaborado. Depresión forrada con pastos, a veces con reborde con el mismo material.

Pone 3 huevos. Ovoidales ó cónicos. De color pardo amarillento o crema con pintas y manchitas pardo claro, pardo oscuro y grises, distribuidas por toda la superficie, pero más concentradas en el polo mayor. Algunos con manchas y líneas negras.

Los pichones son nidífugos.

Se alimentan de vermes, caracoles, larvas.

Frecuentan lagunas, esteros, bañados, playas marinas.

Subfamilia: Numeniinae

BATITÚ *Bartramia longicauda* (Bechstein, 1812)

Otros nombres: Batuitui. Batutú. Chorlaco. Chorlito ribetes blancos acanelados. Chorlo solo. Chorlo solitario. Chululú. Gordillo. Mbatitiú. Mbatui. Sacha pollito del pasto.



Esperanza. Santa Fe. 10-12-2003



Progreso. Santa Fe. 08-12-2008

DESCRIPCIÓN
Largo: 26-32 cm.
Peso: Salvador (1990a): N= 4 (?) 135,0, 136,0, 141,0 y 143,0 g; Salvador (2014a): N= 4 (?) X= 139,5 g (Rango 135 a 143)

Coloración. Pico negro. Patas amarillentas. Iris pardo.
Cabeza, cuello y pecho ocráceos canelas estriados de negro. Cejas y garganta blanquecinas. Dorsal parda y negra con las plumas orilladas de ocráceo. Rabadilla parda oscura. Resto de lo ventral blanco. Flancos barrados de blanco y negro.
Alas pardas grisáceas y blanquecinas. Puntas de las secundarias blancas.
Cola parda grisácea con las plumas externas acaneladas y todas barradas de negro.

COMPORTAMIENTO
Anda en grupos. Relativamente arisco. Se suele posar sobre los postes de los alambrados.

Alimentación
Marelli (1919). **Insectos:** Dípteros. Coleópteros. **Otros:** Vegetales.
Zotta (1934). **Insectos:** Coleópteros. Hemípteros (Pentatomidae). **Otros:** Moluscos. Semillas. Vegetales.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:**Coleoptera (Curculionidae). Lepidoptera (Pieridae: orugas). Orthoptera (Acridiidae). **Otros:** Semillas. Vegetales.

HÁBITAT
Terrenos húmedos, praderas.

Depredadores
De adultos: *Falco peregrinus* (Notarnicola y Seipke 2004), (Galmes et al. 2008b)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño mediano. Pico corto. Cabeza pequeña. Cola larga, barrada.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Bartramia longicauda (Bechstein, 1812) migratorio de Norteamérica. Llega por el interior hasta Neuquén y Río Negro. Accidental en las islas malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en praderas de Norte América. Migra durante el invierno boreal a regiones con habitat semejante (pastizales) del sur de Brasil, Paraguay, este de Bolivia, Uruguay **y** Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Chebez et al. (1998); Dabbene (1918a, 1920d); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Delhey et al. (2001c); Hartert y Venturi (1909); Mérida y Bodtati (2006); Morici (2012b); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Petracci et al. (2004); Savigny (2002a)



Catamarca
Citas: Barrionuevo et al. (2009a); Carma (2009)

Córdoba
Citas: Dabbene (1920d); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Osinaga Acosta et al. (2006); Salvador (1983a, 1990a); Yzurieta (1995)

Chaco
Citas: Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b)

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Chatellenaz et al. (2010); Chebez et al. (1998); Contreras (1981b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Observaciones: De la Peña (Bonpland, dpto. Paso de los Libres, 11-12-2002)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); Canavelli et al. (2004); Dabbene (1920d, 1972); De la Peña (1996, 2012b); Raffo et al. (2008)

Formosa
Citas: Contreras (1987c, 1993b); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Gorleri et al. (2011); Laubmann (1930)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009) Camperi et al. (2012); Moschione y Segovia (2005)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Dabbene (1920d); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Galmes et al. (2008b)

La Rioja
Citas: Bodrati y Ferrari (2014); Giacomelli (1923)

Mendoza
Citas: Burmeister (1861); Reed (1914); Roig (1965)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Krauczuk (2005); Navas y Bó (1991a); Steullet y Deautier (1939)

Neuquén
Citas: Matarasso (2007)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Capllonch (2011); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Dabbene (1920d); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Haene et al. (2001); Lucero (2013i); Martínez et al. (2009)

San Luis
Citas: Nellar Romanella (1993)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2011f); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Manassero y Luna (2009a); Rodríguez Graves et al. (2009); Straneck (1990e); Wilson (1926)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a, 2011); Capllonch et al. (2011b); Dabbene (1972); Dinelli en Dabbene (1920d); Lucero (1983); Ortiz y Aráoz (2014)

Islas Malvinas
Citas: Hayman et al. (1986); Woods (2006)

Islas Shetland del Sur
Citas: Dabbene (1923a)

PLAYERO ESQUIMAL *Numenius borealis* (J. R. Forster, 1722)

Otros nombres: Chorlito campesino. Chorlo de pico corvo. Chorlo esquimal. Chorlo polar.

DESCRIPCIÓN
Largo: 29-34 cm.
Coloración. Pico negruzco con pardo en la base de la mandíbula. Patas grises. Iris pardo.
Corona parda estriada de ocráceo. Cejas blanquecinas. Dorso pardo jaspeado de ocráceo. Garganta blanquecina. Resto de la cabeza, cuello y pecho ocráceos jaspeados de pardo. Abdomen blanquecino. Flancos barrados de ocráceo y pardo.
Alas pardas grisáceas, con las plumas de cubierta orilladas de ocráceo. Cola parda ocrácea.

HABITAT
Estepas húmedas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Pico largo, curvado hacia abajo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Numenius borealis (J. R. Forster, 1722) migratorio del Ártico de. Llega hasta Corrientes, Córdoba y Chubut. Accidental en las Islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Migratorio del Ártico, Estados Unidos, Canadá y posiblemente Alaska desde donde se dirigía hacia las islas del Caribe y desde allí a Paraguay, sur de Brasil, Chile, Uruguay y Argentina.



CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Dabbene (1926e); Daguerre (1924c); Gibson (1920); Pereyra (1938b); Runnacles en Wetmore (1939)

Córdoba
Citas: Michelutti (1991)

Corrientes
Citas: Contreras (1981b)

Entre Ríos
Citas: Barrows (1884)

Tierra del Fuego
Citas: Humphrey et al. (1970)

Islas Malvinas
Citas: Wace (1921); Woods (2006)

PLAYERO TRINADOR *Numenius phaeopus* (Linnaeus, 1758)

Otros nombres: Chorlo grande de pico curvo. Chorlo pico curvo.

DESCRIPCIÓN
Largo: 40-46 cm.
Peso: Schulz Neto et al. (2008): N= 5 (?) X: 322 g (Rango 275 a 375).
Coloración. Pico pardo. Patas grisáceas. Iris pardo oscuro.
Cejas blanquecinas. Bandas oculares oscuras. Dorsal parda jaspeada de blanquecino. Rabadilla y cola pardas oscuras barradas de pardo claro. Garganta blanca. Cuello y pecho blanquecinos jaspeados de pardo. Resto de lo ventral blanco. Alas pardas moteadas de blanquecino.

COMPORTAMIENTO
Anda solitario. Arisco.

Alimentación
Iribarne y Martínez (1999). Cangrejos (*Uca uruguayensis*)

HÁBITAT
Costas marinas, cangrejales, marismas, humedales.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Pico largo y curvado hacia abajo. Patas largas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Numenius phaeopus hudsonicus Latham, 1790 migratorio del Ártico de Norteamérica. Llega por la costa de Buenos Aires a Tierra del Fuego, Islas Malvinas y en humedales del interior (Formosa, oeste de Río Negro).



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cuatro subespecies. Nidifica en región Paleártica (Europa) y Neártica: Alaska a norte de Canadá. Migra en el invierno boreal a Sud América.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Numenius phaeopus hudsonicus Latham, 1790

Buenos Aires
Citas: Coconier (2005b); Darrieu y Camperi (2001a); Fiameni (1994); Mérida y Bodtati (2006); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pereyra (1923b); Petracci et al. (2004); Pugnali y Chamorro (2008)

Chubut
Citas: Gatto et al. (2005); Sainz-Trápaga (2014)

Formosa
Citas: Contreras (1987c);Contreras et al. (2014)

La Pampa
Citas: Orrego Aravena (1970)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011); Kovacs et al. (2005); Llanos et al. (2011)

Santa Cruz
Citas: Albrieu et al. (2004); Chebez et al. (1988); Coconier (2005b); Harris (2008); Imberti (2003, 2005e)


Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Dabbene (1920, 1920d); Devilliers y Terschuren (1978); Earnshaw (1973); Humphrey et al. (1970); Jehl y Rumboll (1976); Kovacs et al. (2005); Morrison y Ross (1989)

Malvinas
Citas: Greroty (1994); Strange (1992); Woods (1988, 2006)

Subfamilia: Limosinae

BECASA DE MAR *Limosa haemastica* (Linnaeus, 1758)

Otros nombres: Aguja. Aguja de mar. Batitú. Becada. Becasa. Becasina. Becasina de mar. Caicayén. Chorlaco. Chorlo grande. Percasina. Pircacina. Poroto. Zapatito.


San Clemente del Tuyú. Buenos Aires. 14-01-1983

DESCRIPCIÓN
Largo: 36-42 cm.
Peso: Camperi (1992c): N= 1 (M) 263 g; N= 1 (H) 275,6 g; Salvador (2014a): N= 1 (H) 247 g

Coloración. Pico rojizo en la mitad basal, negro hacia la punta. Ligeramente curvado hacia arriba en la punta. Patas grises azuladas. Iris pardo oscuro.

Plumaje de reposo sexual.

Dorso gris pardusco. Cejas, supracaudales y garganta blancas. Cuello, pecho y flancos grises. Resto de la ventral blanquecino.

Primarias pardas oscuras con raquis y base blanca. Cubiertas como el dorso, pero las inferiores con puntas blancas. Cola negra con base blanca. Plumas externas y punta blanquecinas.

Plumaje nupcial.

Cabeza parda grisácea con tinte rojizo. Cejas blancas. Dorsal negra con las plumas orilladas de rojizo. Espalda y lomo negruzcos y ocráceos. Rabadilla blanca. Garganta blanquecina. Resto de lo ventral castaño rojizo, jaspeado en el cuello y barrado de negro y blanco en el resto. Cola negra.

COMPORTAMIENTO

Anda solitario o en bandadas. Se mete en el agua.

Alimentación

Bala et al. (1998b). **Moluscos:** Almeja (*Darina solenoides*)

Hernández et al. (2008). **Moluscos:** Almeja (*Darina solenoides*), (*Tellina petititana*). **Crustáceos:** (*Cyrtegrepsus altimanus*). **Insectos. Poliquetos:** (*Glycera americana*)

Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** (larvas acuáticas). **Moluscos:** Hydrobiidae: (*Littoridina parchappei*, Planorbidae: *Biomphalaria* sp.)

HÁBITAT

Bañados, costas de lagunas, de ríos y de mares.

Depredadores

De adultos: *Falco peregrinus* (Peres y Peres 1985).

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño grande. Patas largas. Pico largo y ligeramente curvado hacia arriba. Bandas alares, cejas y supracaudales blancas.

Se parece al Pitotoy grande pero tienen diferente color de patas y también son distintos en el pico y en las bandas alares.

Diferenciarlo del Playero ala blanca.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Limosa haemastica (Linnaeus, 1758) migratorio del Ártico de Norteamérica. Llega hasta Tierra del Fuego, tanto por el interior como por la costa. Observada además en Islas Malvinas y Shetland del Sur.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Migrador Artico de Estados Unidos y Canadá. Llega hasta Tierra del Fuego. Tiene el segundo registro del vuelo sostenido más prolongado entre las aves migratorias con 6.000 millas en 6 días sin parar de Tierra del Fuego a Texas.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires

Citas: Camperi (1992c); Coconier (2005b); Dabbene (1920d); Darrieu y Camperi (2001a); Gibson (1920); Morici (2012b); Myers y Myers (1979);

Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1927d, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Weller (1967a); White (1883b); Zapata (1998)

Observaciones: De la Peña (Laguna Las Flores, pdo. Las Flores, 10-12-1972; San Clemente del Tuyú, pdo. Gral Lavalle, 14-01-1983)

Catamarca
Citas: Carma (2009)

Chaco
Observaciones: Bodrati, A. (*in litt*. 2012)

Chubut
Citas: Bradley et al. (1985); Dabbene (1920d); Daciuk (1977); Gatto et al. (2005); Kovacs et al. (2005); Pagnoni (1995); Sainz-Trápaga (2014)

Córdoba
Citas: Bucher y Herrera (1981); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores y Yzurieta (1979, 1980b); Osinaga Acosta et al. (2006); Salvador (1983a); Yzurieta (1995)

Corrientes
Citas: Contreras (1981b)

Formosa
Citas:Contreras (1987c);Contreras et al. (2014)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Chebez et al. (1998); Laredo (1996)

La Pampa
Citas: De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Tejerina et al. (2006)

Observaciones: De la Peña (Puelches, dpto. Curá Co, 28-11-1998)

Mendoza
Citas: Chebez et al. (1993); Darrieu et al. (1989); Martínez et al. (1997a); Sosa (2005)

Neuquén
Citas: De Valle et al. (1989); De Valle y Funes (1994); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas:Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Paz Barreto (1997b); Pérez y Petracci (1998)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Lucero (2013i)

San Luis
Citas: Nellar Romanella (1993)

Santa Cruz
Citas: Albrieu et al. (2004); Bala et al. (1998b); Chebez et al. (1988); Coconier (2005b); Dabbene (1920d); Darrieu et al. (2008); Erize (1983); Ferrari y Albrieu (2005); Imberti (2003, 2005e); Imberti y Albrieu (2001); Lange (1981); Sharpe (1896)

Santa Fe
Citas: Chiale et al. (2015); De la Peña (2011f); Fandiño y Pautasso (2011); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Martinez Achenbach (1957); Maugeri et al. (2009); Ordano y Bosisio (1997)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Tierra del Fuego
Citas: Chebez et al (1998); Clark (1986); Dabbene (1920d); Humphrey et al. (1970); Jehl y Rumboll (1976)

Tucumán
Citas: Keith (1970); Lucero (1983)

Islas Malvinas
Citas: Dabbene (1920d); Wace (1921); Woods (2006)

Shetland del Sur
Citas: Juares et al. (2009)

BECASA CANELA *Limosa fedoa* (Linnaeus, 1758)

DESCRIPCIÓN
Largo: 42-48 cm.
Coloración. Pico largo, negruzco con base rosácea.
Coloración general canela grisáceo barrado, manchado y estriado de negruzco.

HÁBITAT
Praderas húmedas, orillas de pantanos y lagunas, costas marinas..



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Limosa fedoa fedoa (Linnaeus, 1758) migratoria de Norteamérica.
Observado en Jujuy.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Norteamérica. Migra hasta el norte de Chile y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Jujuy
Citas: Rodríguez et al. (2010)

Observaciones: Moschione en Camperi et al. (2012)

Subfamilia: Arenariinae

VUELVEPIEDRAS *Arenaria interpres* (Linnaeus, 1758)

Otros nombres: Chorlito vuelvepiedras. Playero turco. Vira piedras.

DESCRIPCIÓN
Largo: 21-26 cm.
Peso: Schulz Neto et al. (2008): N= 55 ? X: 92,1 g (Rango 57 a 127).
Coloración. Pico negro. Patas rojas. Iris pardo oscuro.
Plumaje de reposo sexual.
Corona y cuello posterior pardos grisáceos jaspeados de negruzco. Espalda parda con las plumas orilladas de blanquecino. Lomo blanco. Mitad anterior de las supracaudales parda oscura, mitad posterior blanca. Cara grisácea blanquecina. Garganta blanca. Cuello y pecho pardos con las plumas orilladas de blanquecino. Resto de la ventral blanco.
Alas pardas oscuras con las cubiertas medianas, borde de las escapulares, base de las remeras y últimas secundarias blancas.
Cola parda oscura con la punta blanca.
Plumaje nupcial.
Parte de la cara, lados del cuello, dorso y pecho negros. Corona blanca, salpicada de rayitas negras. Zona escapular castaño y negro. Lorum, garganta, lados de la cabeza y del cuello y resto de lo ventral blancos. Cubiertas alares canelas jaspeadas de pardo y blanco. Resto del plumaje como el de reposo sexual.

COMPORTAMIENTO
Forma pequeños grupos. Arisco.

Alimentación
Iribarne y Martínez (1999). **Crustáceos:** Cangrejos (*Uca uruguayensis*).

HÁBITAT
Costas marinas y de lagunas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño de chico a mediano. Banda alar blanca. Cuando vuela muestra dos bandas alares y el lomo blanco.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Arenaria interpres morinella (Linnaeus, 1766) migratorio del Ártico de Norteamérica. Llega por la costa desde Buenos Aires a Tierra del Fuego y por el interior a Jujuy, Formosa, Córdoba y Santa Fe. Accidental en las Islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Amplia distribución en el mundo.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Arenaria interpres morinella (Linnaeus, 1766)

Buenos Aires
Citas: Coconier (2005b); Darrieu y Camperi (2001a); Fiameni (1994); Gibson (1920); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b); Roesler (2001b); Zapata (1998)

Chubut
Citas: Harris (2008); Kovacs et al. (2005); Pagnoni (1995); Sainz-Trápaga (2014); Salvador y Narosky (1987)



Córdoba
Citas: Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1979); Yzurieta (1995)

Formosa
Citas: Contreras et al. (2014); Gorleri y Di Giacomo (2002)

Jujuy
Observaciones: Moschione, F. (17-12-2011, Laguna Pozuelo, Informe 3/12)

La Pampa
Citas: De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2008)

Neuquén
Citas: Bianchini y Arenas (2013a)

Río Negro
Citas: Bianchini y Arenas (2013a); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Paz Barreto (1997b)

Santa Cruz
Citas: Darrieu et al. (2008); Jehl y Rumboll (1976)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

Santa Fe
Citas: Luna y Manassero (2010)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Jehl y Rumboll (1976)

Islas Malvinas
Citas: Wace (1921); Woods (2006)

PLAYERO DE ROMPIENTE *Aphriza virgata* (J. F. Gmelin, 1789)

Otros nombres: Chorlito de las rompientes. Chorlo de las playas.

DESCRIPCIÓN
Largo: 23-26 cm.
Coloración. Pico negro. Patas amarillas verdosas. Iris pardo oscuro.
Plumaje de reposo sexual.
Dorsal parda grisácea. Rabadilla blanca. Cejas y garganta blanquecinas. Pecho gris. Resto de ventral blanco con algunas manchas grises.
Alas pardas con banda blanca. Cola blanca con punta negra.

Plumaje nupcial.
Moteado y estriado de oscuro.



COMPORTAMIENTO

Alimentación

HÁBITAT
Costas marinas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño mediano. Cejas, banda alar y rabadilla blancos. Cola blanca con ancha banda terminal negra.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Aphriza virgata (J. F. Gmelin, 1789) migratorio del hemisferio norte. Llega a la costa de Tierra del Fuego y las islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en Alaska y Canadá desde donde migra por el Océano Pacífico, hasta Chile y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Rio Negro
Citas: Llanos et al. (2011)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Imberti (2003, 2005e); Narosky (1983b)

Malvinas
Citas: Curtis (1994); Woods (2006)

PLAYERO ROJIZO *Calidris canutus* (Linnaeus, 1758)

Otros nombres: Chorlito rojizo. Chorlo rojizo. Correlimos gordo.

DESCRIPCIÓN
Largo: 25-26 cm.
Peso: Schulz Neto et al. (2008): N= 45 (?) X: 150,3 g (Rango 114 a 190).
Coloración. Pico negro. Patas verdosas. Iris pardo.
Plumaje de reposo sexual.
Cejas blancas. Partes dorsales pardas grisáceas clara estriadas de negruzco. Rabadilla y supracaudales blancas grisáceas rayadas de pardo. Ventral blanca con estrías negruzcas en la garganta, cuello, pecho y flancos.
Alas pardas con plumas ribeteadas de blanco y las cubiertas inferiores con la punta blanca formando una banda. Cola gris pardusca.
Plumaje nupcial.
Cabeza, garganta, cuello anterior, pecho y superior del abdomen canelas. Inferior del abdomen, flancos y subcaudales blancos. Partes dorsales pardas grisáceas, canelas y negras. Rabadilla grisácea con barras pardas. Supracaudales blancas con barras pardas. Cola gris pardusca.
Alas como en reposo sexual.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Marelli (1919). Insectos. Larvas.
González et al. (1996). **Moluscos:** Mejillín (*Brachidontes rodriguezi*).
Bala et al. (1998a). **Moluscos:** Almejas (*Darina solenoides*), (*Tellina petitiana*). Poliquetos (*Travisia* sp.).
Brayton y Scheider (2000). **Moluscos:** Almeja(*Darina solenoides*). Mejillón (*Mytilus edulis*).
Sitters et al. (2001). **Moluscos:** Almej*a* (*Darina solenoides*).
Bala et al. (2001).**Moluscos:** Almeja (*Darina solenoides*). Mejillón (*Mytilus edulis*).
Pagnoni (2002). **Moluscos:** Almejas (*Darina solenoides*), (*Tellina petitiana*).
Albrieu et al. (2004). **Moluscos:**Almeja (*Darina solenoides*)
Hernández et al. (2004). **Moluscos:** Almeja(*Darina solenoides*).**Crustáceos.**
Hernández et al. (2008). **Moluscos:**Almejas(*Darina solenoides*), (Tellina petitiana). **Crustáceos:** (Anfipodos). (*Cicloleberis pousenii*). Insectos.

HÁBITAT
Costas marinas.

Depredadores
De adultos: *Falco peregrinus* (Notarnicola y Seipke 2004).

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño mediano. Pico, cuello y patas cortos. En vuelo, rabadilla barrada, banda alar blanca y dorso "escamado".

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Calidris canutus rufa (A. Wilson, 1813) migratorio del Ártico de Norteamérica. Llega por la costa de Buenos Aires a Tierra del Fuego. También a Jujuy, Córdoba. Accidental en las Islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cinco subespecies. Nidifica en el Ártico de Canadá desde donde migra en el invierno boreal a Sud América.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Calidris canutus rufa (A. Wilson, 1813)

Buenos Aires
Citas: Blanco et al. (1992); Coconier (2005b); Darrieu y Camperi (2001a); Delhey et al. (2001c); Fiameni (1994); Gavensky (2013); Gibson (1920); Hartert y Venturi (1909); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b); Pugnali y Chamorro (2008)

Chubut
Citas: González et al. (2008); Harris (2008); Hernández et al. (2005b); Pagnoni (1995); Sainz-Trápaga (2014)

Observaciones: De la Peña (Punta Loma, dpto. Biedma, 27-11-2000)

Córdoba
Citas: Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1979, 1980b); Yzurieta (1995)

Jujuy
Citas: Moschione (2010b)



Río Negro
Citas: D´Amico (2011); Gelain y Tolosa (2011); Kovacs et al. (2005); Llanos et al. (2011); Morrison y Ross (1989); Paz Barreto (1997b); Tolosa y Gelain (2007)

Santa Cruz
Citas: Albrieu et al. (2004); Chebez et al. (1988); Coconier (2005b); Darrieu et al. (2008); Ferrari et al. (2005a); Ferrari y Albrieu (2005); Gandini y Frere (1998a); González et al. (2008); Hernández et al. (2004, 2005b);

Santiago del Estero
Citas: Torres y Michelutti (2001a)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1984, 1986); D´Amico et al. (2005); D´Amico (2011); González et al. (2004, 2008); Hernández et al. (2005b); Humphrey et al. (1970); Jehl y Rumboll (1976)

Islas Malvinas
Citas: Woods (2006)

PLAYERITO BLANCO *Calidris alba* (Pallas, 1764)

Otros nombres: Arenero. Chorlito blanco. Chorlito blanco arenero. Chorlito pies roxas. Chorlo blanco. Correlimos blanco. Playero blanco.

DESCRIPCIÓN
Largo: 18-20 cm.
Peso: Schulz Neto et al. (2008): N= 19 (?) X: 56,5 g (Rango 39 a 80).
Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo.
Plumaje de reposo sexual.
Partes dorsales grisáceas claras. Frente, cejas y partes ventrales blancas.
Alas pardas oscuras con banda blanca. Cubiertas superiores negras. Inferiores grises. Cola blanca con las plumas centrales pardas oscuras.
Plumaje nupcial.
Lados de la cabeza y cuello canelas rojizos mezclados con blanco y negro. Partes dorsales pardas grisáceas, estriadas de negro y canela rojizo. Rabadilla gris pardusca. Pecho punteado de rojizo. Resto de ventral blanco. Alas pardas con banda blanca. Cola con plumas centrales pardas, externas blancas.

COMPORTAMIENTO
Forma pequeños grupos. Se suele parar en una pata.

Alimentación
Humphrey et al. (1970). Algas. Crustáceos.
Humphrey et al. (1970). Insectos. Larvas.
Petracci (1998).**Insectos:** Coleópteros (Staphylinidae, Hydrophilidae, Curculionidae). **Crustáceos:** (*Corophium* sp.). **Moluscos:** Pelecypoda (Mytilidae, *Brachydontes rodriguezi*). Pelecypoda (Corbulidae, *Corbula* sp.). **Poliquetos**: (*Glycera* sp.). **Otros:** Algas.

Hernández et al. (2005c). **Moluscos:** Almeja (*Darina solenoides*). **Crustáceos:**Cangrejo (*Cyrtograpsus* sp.). **Isópodo:** (*Exosphaeroma* sp.). **Poliquetos:** (*Travisia olens*)

HÁBITAT
Costas marinas y de lagunas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. Coloración general blanca. En vuelo banda alar notable y cola "partida".

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Calidris alba (Pallas, 1764) migratorio del Ártico. Llega por la costa e interior, desde Jujuy, Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires hasta Tierra del Fuego.Accidental en las Islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Migratorio del Ártico. En invierno es cosmopolita hallándoselo en las costas de todos los continentes, pudiéndoselo encontrar en las playas de arena de prácticamente todo el mundo.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Dabbene (1920d); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Fiameni (1994); Hartert y Venturi (1909); Marelli (1924); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Petracci (1998); Pereyra (1938b); Pugnali y Chamorro (2008)

Observaciones: De la Peña (Laguna Las Flores, pdo. Las Flores, 10-12-1972; San Clemente del Tuyú, pdo. Gral. Lavalle, 14-01-1983)

Chubut
Citas: Dabbene (1920d); Gatto et al. (2005); Harris (2008); Hernández et al. (2005c); Pagnoni (1995); Sainz-Trápaga (2014)

Córdoba
Citas: Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1979, 1980b); Osinaga Acosta et al. (2006); Yzurieta (1995)

Entre Ríos
Citas: Marateo et al. (2009)



Formosa
Citas: Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h)

Jujuy
Citas: Moschione (2010b)

La Pampa
Citas: Coconier (2005b); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Di Giacomo et al. (2005cc); Maceda et al. (2008)

Mendoza
Citas: Blendinger y Alvarez (2002); Martínez y Pereyra Lobos (2005); Pereyra (1927e); Sosa (1993b, 1995d, 2003, 2005)

Misiones
Citas: Dabbene (1920d)

Neuquén
Citas: Bianchini y Arenas (2014a); Del valle et al. (1989); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011); González (1991, 1996); Llanos et al. (2011); Paz Barreto (1997b); Paz et al. (2004)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b)

Santa Cruz
Citas: Albrieu et al. (2004); Darrieu et al. (2008); Gandini y Frere (1998a)

Santa Fe
Citas: Beltzer (1986c); De la Peña (1988, 2011f); Fandiño y Pautasso (2011); López-Lanús et al. (2013a); Luna y Manassero (2013); Wilson (1926)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1984, 1986); Humphrey et al. (1970); Jehl y Rumboll (1976); Keith (1970)

Tucumán
Citas: Brandán y Navarro (2009); Echevarría et al. (1998, 2008c); Echevarría (2001); Echevarría y Chani (1999, 2000, 2006)

Islas Malvinas
Citas: Woods (2006)

PLAYERITO ENANO *Calidris pusilla* (Linnaeus, 1766)

Otros nombres: Chorlito enano. Chorlito semipalmado enano.

DESCRIPCIÓN
Largo: 13-15 cm.
Peso: Schulz Neto et al. (2008): N= 214 (M) X: 23,7 g (Rango 16 a 38); N= 440 (H) X: 27,7 g (Rango 16 a 41).
Coloración. Pico negro. Patas negruzcas con palmadura. Iris pardo.
Plumaje de reposo sexual.
Corona parda estriada de blanquecino. Cejas superciliares blancas. Dorsal parda oscura con las plumas orilladas de pardo. Ventral blanca. Lados del pecho pardos grisáceos.
Alas pardas oscuras con la parte terminal de la tapadas blanquecina formando una banda.
Cola parda con las plumas laterales grisáceas.
Plumaje nupcial.
Similar al de reposo sexual pero con las partes dorsales salpicadas de canela y negro. Pecho grisáceo estriado de negruzco.

COMPORTAMIENTO
Anda en grupos de pocos ejemplares. Relativamente manso.

HÁBITAT
Lagunas, costas marinas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. Ceja y ventral blancos Dorsal parda. Patas semipalmadas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Calidris pusilla (Linnaeus, 1766) migratorio del Ártico. Llega por la costa desde Buenos Aires a Chubut. También Jujuy, La Pampa,Córdoba. Accidental en las Islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Migratorio del Ártico. Nidifica en Siberia (Rusia). Alaska (Estado Unidos) y Canadá. Migra por costa del Océano Pacífico desde Méjico y costas de islas del Caribe y Océano Atlántico hasta Argentina**.**

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Jaramillo (2000); Nores et al. (1983); Pereyra (1938b)

Chubut
Citas: Durnford en Dabbene (1920b); Harris (2008); Nores e Yzurieta (1979); Seebohn (1888)

Córdoba
Citas: Narosky et al. (1977); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1979, 1980b); Yzurieta (1995)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Moschione (2010b); Rodríguez et al. (2010)

La Pampa
Citas: Darrieu et al. (2011b)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011)

Islas Malvinas
Citas:Woods (2006)



PLAYERITO MENOR *Calidris minutilla* (Vieillot, 1819)

DESCRIPCIÓN
Largo: 13-15 cm.
Peso: Schulz Neto et al. (2008): N= 35 (?) X: 20,7 g (Rango 18 a 32).
Coloración.
Plumaje de reposo sexual.

En reposo, pardo grisáceo. Pico, patas Iris pardo oscuro.
Plumaje nupcial.
Dorsal parda con gris castaño. Cabeza parda. Pecho pardo estriado más oscuro.



HÁBITAT
Costas marinas, orillas de lagunas, bañados.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Calidris minutilla (Vieillot, 1819) migratorio de América del Norte.
Observado en Orcadas del Sur y en los bañados del río Atuel, La Pampa, Salta y Jujuy.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en Norte América, Alaska y Canadá desde donde migra en el invierno boreal llegando hacia el sur hasta Chile y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Jujuy
Citas: Moschione (2010b); Rodríguez et al. (2010)

La Pampa
Citas: Darrieu et al. (2011b); Maceda et al. (2008)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

Orcadas del Sur
Citas: Hemmings (1985)

PLAYERITO DE RABADILLA BLANCA *Calidris fuscicollis* (Vieillot, 1819)

Otros nombres: Carachilla. Chorlaco. Chorlito. Chorlito gris. Chorlito de rabadilla blanca. Chorlito pestorejo. Chululú-i de rabadilla blanca. Correlimos lomiblanco. Mbatuituí. Playerito gris. Playerito rabadilla blanca.



Mar Chiquita. Córdoba. 09-12-2007

DESCRIPCIÓN
Largo: 15-18 cm.
Peso: Zapata (1967): N= 1 (H) 41 g; Salvador (2014a): N= 2 (M) 43,4 y 46,3 g; N= 1 (H) 40,6 g;
Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo oscuro.
Plumaje de reposo sexual.
Partes dorsales grises parduscas, poco jaspeadas de pardo. Supracaudales blancas. Frente, cejas, garganta y vientre blancos. Pecho gris finamente jaspeado de pardo. Flancos con estrías pardas.
Alas pardas oscuras con las plumas de cubiertas marginadas de gris claro. Cola parda.
Plumaje nupcial.
Similar al de reposo sexual pero con las partes dorsales teñidas de canela y el pecho y abdomen estriados de pardo.

COMPORTAMIENTO
Anda en grupos o en bandadas grandes. Relativamente manso.

Alimentación
Aravena (1927). **Insectos:** Coleópteros (*Metriona tenella*). Hormigas.**Vegetales:** semillas no determinadas.
Humphrey et al. (1970). Larvas.
Beltzer (1988a).**Vegetales:** Semilla *Cuscuta* sp*.* **Insectos:** Díptera(Chironomidae, *Chironomus domizii, Polypedilum* sp., *Glyptotendipes* sp., *Glyptotendipes* sp., Ceratopogonidae, *Bezzia* sp.).**Moluscos:**Hydrobiidae, (*Littoridina parchappei*).
Beltzer (1991a). **Vegetales:** semillas no determinadas. **Insectos:** Díptera(Chironomidae, *Chironomus domizii, Polypedilum* sp.). **Moluscos:**Hydrobiidae, (*Littoridina parchappei*).
Montalti et al. (2003). **Vegetales:** Semillas de *Chenopodium* sp*.,* Cyperaceae, Fabaceae *Lotus glaber, Malva* sp*. Melilotus* sp., *Piptochaetium* sp*., Polygonum* sp*., Scirpus* sp*., Stellaria media,* Ulmaceae.
D´Amico et al. (2004). **Moluscos:** Almeja (*Darina solenoides*). **Poliquetos:** (*Travisia olens*).
Hernández et al. (2005a). **Moluscos:** Almeja (*Darina solenoides*). **Crustáceos. Insectos.Poliquetos:** (*Travisia olens)*
Hernández y Bala (2007). **Moluscos:** Almeja (*Darina solenoides*). **Insectos.Poliquetos:**(*Laeonereis acuta, Travisia olens*)
Hernández et al. (2008). **Moluscos:** Almeja (*Darina solenoides*), (*Tellina patitiana*). **Insectos.Crustáceos:** (Anfipodos). (*Cicloleberis pousenii*). **Poliquetos:** (*Glicera americana*)
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Chrysomelidae,Diptera (larvas y adultos), Diptera (Culicidae: larvas), Dytiscidae, no identificado) **Moluscos:** Hydrobiidae: (*Littoridina parchappei*, Planorbidae: *Biomphalaria* sp.).

Voces
Straneck (*in litt*.). En vuelo emite una voz de contacto zik.zik.zik..

HÁBITAT
Costas marinas y de lagunas, bañados.

Depredadores
De adultos: *Falco peregrinus* (Pereyra 1938b).

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. En vuelo, las supracaudales blancas. Esto lo diferencia del Playerito unicolor.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Calidris fuscicollis (Vieillot, 1819) migratorio del Ártico de Norteamérica. Llega por el interior y por la costa hasta Tierra del Fuego.Observado en las Islas Malvinas y Georgias del Sur.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en el Ártico de Norte América, migra hasta Sud América, llegando hasta Tierra del Fuego.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Coconier (2005b); Dabbene (1920d); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Durnford (1878); Fiameni (1994); García y Gómez Laich (2007); Gibson (1920); Klimaitis (1975b); Mérida y Bodtati (2006); Morici (2012b); Moschione (1989); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1927d, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); White (1883b); Zapata (1998)

Observaciones: De la Peña (San Clemente del Tuyú, 14-01-1983)

Catamarca
Citas: Carma (2009)

Chaco
Citas: Lynch Arribalzaga (1920); Moschione y Bishels (2004)

Chubut
Citas: Bó (1958); D´Amico et al. (2004); Darrieu y Camperi 2000 (2001); Dabbene (1920d); Gatto et al. (2005); Harris (2008); Hartert y Venturi (1909); Hernández et al. (2005); Pagnoni (1995); Sainz-Trápaga (2014); Straneck (1990a)

Observaciones: De la Peña (Punta Tombo, dpto. F. Ameghino, 05-11-1979)

Córdoba
Citas: Bucher y Herrera (1981); Dabbene (1920d); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores y Yzurieta (1980b); Osinaga Acosta et al. (2006); Salvador (1983a); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Miramar, dpto. San Justo, 09-12-2007)

Corrientes
Citas: Contreras (1981b); Dabbene (1920d); Giraudo et al. (2006)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); Dabbene (1920d)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Gorleri et al. (2011);

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Coconier (2005b); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Di Giacomo et al. (2005c); Maceda et al. (2001, 2008); Tejerina et al. (2006)

Observaciones: De la Peña (Parque Luro, dpto. Capital, 28-11-1998)

La Rioja
Citas: Bodrati y Ferrari (2014)

Mendoza
Citas: Aramburú (1983); Blendinger y Alvarez (2002); Canevari et al (1998);Darrieu et al. (1989); Di Giácomo et al (2007); Lucero (2013f); Martínez et al. (1997a); Martínez y Pereyra Lobos (2005); Olivera et al. (2009); Sosa (1993b, 2005)

Misiones
Citas: Chebez (1996a); Navas y Bó (1991a)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Contreras (1977b); De Valle et al. (1989); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Castello et al. (1982); Gelain (1984b, 2001, 2010); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Gonzales (1990, 1991); Llanos et al. (2011); Paz Barreto (1997b)

Salta
Citas: Coconier et al. (2007) ; Echevarría et al. (2014); Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas : Lucero (2013f, 2013i)

Santa Cruz
Citas: Albrieu et al. (2004); Coconier (2005b); Chebez et al. (1988); Dabbene (1920d) , Darrieu et al. (2008); Erize (1983); Ferrari y Albrieu (2005); Gandini y Frere (1998a, 1998b); Iglesias y Pérez (1998); Imberti (2005e); Imberti y Albrieu (2001); Lange (1981); Dabbene (1920d); Scott y Carbonell (1986); Scott y Sharpe (1910); Sharpe (1896); Steullet y Deautier (1939); Zapata (1967, 1969)

Santa Fe
Citas: Beltzer (1986c, 1988a, 1991a); De la Peña (2011f); Fandiño y Pautasso (2011); Giai (1950);López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Luna y Manassero (2013)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1984, 1986); Dabbene (1920d); Humphrey et al. (1970); Jehl y Rumboll (1976); Keith (1970); Olrog (1948, 1950)

Tucumán
Citas: Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch et al. (2011b); Echevarría y Chani (1999, 2000, 2006); Echevarría (2001); Echevarría et al. (1998); Esteban (1953); Lucero (1983); Ortiz et al. (2005)

Islas Malvinas
Citas: Dabbene (1920d); Wace (1921); Woods (2006)

Georgias del Sur
Citas: Prince y Croxall (1983, 1996); Prince y Payne (1979)

Orcadas del Sur
Citas: Coria et al. (2011)

PLAYERITO UNICOLOR *Calidris bairdii* (Coues, 1861)

Otros nombres: Chorlito anteado. Chorlito de alas largas. Correlimos unicolor. Playerito de rabadilla parda. Pollito de mar. Pollito piador. Sacha-pollito.

DESCRIPCIÓN
Largo: 17-18 cm.
Peso: Salvador (2014a): N= 3 (M) X= 41,5 g (Rango 38,8 a 43,6); N= 1 (H) 40,5 g
Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo.
Plumaje de reposo sexual.
Corona y partes dorsales pardas oscuras con las plumas orilladas de pardo claro. Cara y pecho pardos canelas con jaspeado pardo. Cejas, garganta y resto de lo ventral blancos.
Alas pardas con puntas de las cobijas blanquecinas formando una tenue banda.
Cola parda con las plumas laterales pardas claras.
Plumaje nupcial.
Similar al de reposo sexual pero con las partes dorsales jaspeadas de negro y plumas orilladas de ocráceo.


Mar Chiquita. Córdoba. 09-12-2007

COMPORTAMIENTO
Anda en grupos.

Alimentación
Bucher y Herrera (1981). **Insectos:** Dípteros (larvas acuáticas).
Beltzer y Lajmanovich (1990). **Insectos:** Coleoptera (Cerambycidae, Hydrophilidae, Carabidae) (Curculonidae, Noteridae, Suphisellus sp.). Diptera (Larvas). Lepidoptera (Larvas). **Moluscos:** (Planorbidae). **Vegetales:** Semillas (Gramíneas), (Polygonaceae, *Polygonum acuminatum*)

Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Dytiscidae).Diptera (larvas). Hemiptera (Corixidae).Trichoptera (larvas). Insectos (larvas acuáticas).**Moluscos:** (Hydrobiidae: *Littoridina parchappei*, Planorbidae: *Biomphalaria* sp.). **Vegetales:** Semillas (Gramíneas), (*Scirpus* sp.).**Arácnidos:** arañas.



Voces
Straneck (*in litt*.). En vuelo su voz de contacto es un agudo trinado bidd..biird..bied..

HÁBITAT
Bañados, playas de lagunas y marinas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. Pecho jaspeado y supracaudales pardas.
Se parece al Playerito de rabadilla blanca pero se diferencia por el color de las plumas supracaudales.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Calidris bairdii (Coues, 1861) migratorio del Ártico. Llega por el interior y por la costa hasta Tierra del Fuego.Observado en las Islas Malvinas y Georgias del Sur.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en el Ártico desde donde migra en el invierno boreal hasta Tierra del Fuego.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Dabbene (1920d); Darrieu y Camperi (2001a); Fiameni (1994); Gibson (1920); Maugeri (2002a); Mérida y Bodtati (2006); Morici (2012b); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Roesler (2001a); Wetmore (1926); Zapata (1998)

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009); Dabbene (1920d); Vides-Almonacid (1986)

Chaco
Observaciones: Bodrati, A. (*in litt*.2012)

Chubut
Citas: Camperi (1998); Daciuk (1977); Darrieu y Camperi 2000 (2001); Pagnoni (1995); Parera (1992); Sainz-Trápaga (2014); Straneck (1990a)

Observaciones: De la Peña (Punta Norte, dpto. Biedma, 04-02-1972; Leleque, dpto. Cushamen, 01-02-1976)

Córdoba
Citas: Bucher y Herrera (1981); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores y Yzurieta (1980b); Salvador (1983a); Dabbene (1920d); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Miramar, dpto. San Justo, 09-12-2007)

Corrientes
Citas:Contreras (1981b); Giraudo et al. (2006)

Entre Ríos
Citas: Mancini (2011)

Formosa
Citas: Contreras (1987c, 1993b); Contreras et al. (2014)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Caziani y Derlindati (2000); Caziani et al. (2001); Chebez et al. (1998); Laredo (1996); Olivera (2009)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Bruno et al. (2007); Coconier (2005b); Dabbene (1920d); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Di Giacomo et al. (2005c); Maceda et al. (2001, 2008); Siegenthaler (1984, 2004); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006)

La Rioja
Citas: Bodrati y Ferrari (2014); Camperi et al. (2008); Chebez (2005b); de La Fuente (2002); Giacomelli (1923); Hayward (1967)

Mendoza
Citas: Aramburú (1983); Blendinger y Alvarez (2002); Dabbene (1920d); Canevari et al (1998);Darrieu et al. (1989); Darrieu (2014); Di Giácomo et al (2007); Martínez et al. (1997a); Olivera et al. (2009); Roig (1965); Sosa (1993b, 2003, 2005)

Observaciones: De la Peña (Llancanelo, dpto. Malargüe, 15-10-2004)

Misiones
Citas :Chebez (1996a)

Neuquén
Citas: Christie et al. (1988); De Valle et al. (1989); Gorgoglione (2005); Heredia y Funes (1987); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Casas (1992a); Christie et al (1998, 2004); Gelain (1984b, 2001, 2012b); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Paz Barreto (1997b); Pérez y Petracci (1998); Peters (1923b)

Salta
Citas: Coconier et al. (2007); Echevarría et al. (2014); Moschione et al. (2013); Vides Almonacid (1990)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013i)

San Luis
Citas: Masramón (1983); Nellar Romanella (1993)

Santa Cruz
Citas: Coconier (2005b); Dabbene (1920d); Darrieu et al. (2008); Erize (1983); Iglesias y Pérez (1998); Imberti (2005e); Imberti y Albrieu (2001); Lange (1981); Scott y Sharpe (1910)

Santa Fe
Citas: Beltzer y Lajmanovich (1990) De la Peña (2011f); Fandiño y Pautasso (2011); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002a); Romano et al. (2005)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1984, 1986); Humphrey et al. (1970); Keith (1970); Jehl y Rumboll (1976); Olrog (1948)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch et al. (2011b); Dabbene (1920d); Echevarría et al. (1998, 2008c); Echevarría y Chani (1999, 2000, 2006); Echevarría (2014); Laredo y Vides-Almonacid (1999); Lucero (1983); Ortiz et al. (2005)

Islas Malvinas
Citas: Wace (1921); Woods (2006)

Georgias del Sur
Citas: Prince y Croxall (1996)

PLAYERITO PECTORAL *Calidris melanotos* (Vieillot, 1819)

Otros nombres: Chorlito. Chorlito de lomo negro. Chorlito escudado. Chorlito manchado. Chorlito pectoral. Playerito escudado.

DESCRIPCIÓN
Largo: 19-23 cm.
Peso: Contreras (1986a) N= 2 (M) 61,5 y 59,5 g; N= 1 (H) 56,0 g; Salvador (1988): N= 2 (M) 68,0 y 65 g; Salvador (2014a): N= 4 (M) X= 76,6 g (Rango 73,5 a 78,8); N= 2 (H) 59,8 y 68,3 g; N= 2 (?) 72 y 76 g;

Coloración. Pico negro con base amarilla. Patas amarillentas. Iris pardo oscuro.
Plumaje de reposo sexual.
Partes dorsales pardas oscuras con las plumas orilladas de pardo claro. Supracaudales pardas. Cejas y garganta blanquecinas. Cuello y pecho jaspeados y manchados de pardo. Resto de la ventral blanco. Alas pardas oscuras con las cubiertas orilladas de blanquecino. Cola parda.
Plumaje nupcial.
Similar al de reposo sexual pero más estriado y manchado de negro.

COMPORTAMIENTO
Anda en grupos dispersos o en bandadas.

Alimentación
Aravena (1927). **Insectos:** Coleópteros. Crisomélidos. Ditíscidos. **Vegetales:** Semilla(*Medicago sativa*).
Zotta (1934). **Insectos:** Coleópteros *Gryllus* sp. Ortópteros (*Schistocerca paranensis*). Moluscos. Piedritas.
Zotta (1940). **Insectos:** Coleópteros (Tenebrionidae). **Vegetales:** *Oxalis sp.* (hojas). Minerales. Vegetales.

Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Curculionidae, Dytiscidae), (larvas acuáticas). Diptera (larvas). Ephemeroptera (náyades). Lepidoptera (orugas). Trichoptera (larvas). **Moluscos:** Hydrobiidae: (*Littoridinaparchappei*, Planorbidae: *Biomphalaria* sp.). Orthoptera (Acridiidae). **Vegetales:** Semillas (Gramíneas), (*Scirpus* sp.).

HÁBITAT
Orillas de esteros, bañados.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. Notable contraste entre el pecho jaspeado y oscuro y el blanco abdominal. En vuelo se ve la rabadilla "partida" por las plumas supracaudales oscuras.


Esperanza. Santa Fe. 08-01-2008


Llambi Campbell. Santa Fe. 14-10-1980

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Calidris melanotos (Vieillot, 1819) migratorio del Ártico. Llega hasta Santa Cruz, islas Malvinas y Georgias del Sur.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en Alaska y el Ártico Canadiense en Norte América, asi como en Rusia (Siberia). En el invierno boreal migra llegando hasta Argentina y Georgias del Sur.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Aravena (1927); Bodrati et al. (2006b); Dabbene (1920d); Darrieu y Camperi (2001a); Delhey et al. (2001c); Gibson (1920); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis (1975b); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); López-Lanús et al. (2013c); Mérida y Bodtati (2006); Morici (2012b); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b); Pugnali y Chamorro (2008)

Catamarca
Citas: Barrionuevo et al. (2009a); Carma (2009)

Chaco
Citas:Moschione y Bishels (2004)
Observaciones: Bodrati, A. (*in litt*. 2012)



Chubut
Citas: Dabbene (1920d); Harris (2008); Sainz-Trápaga (2014)

Córdoba
Citas: Brandolín et al. (2007); Bucher y Herrera (1981); Castellanos (1931); Dabbene (1920d); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores y Yzurieta (1980b); Osinaga Acosta et al. (2006); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Miramar, dpto. San Justo, 28-02-1976)

Corrientes
Citas: Cano et al. (2010); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b, 1986a); Giraudo et al. (2006)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); Dabbene (1920d); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Zapata (1975, 1977)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c, 1993b); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Gorleri et al. (2011);
López Lanús (1997); Pujalte et al. (1995)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Chebez et al. (1998); Fiora (1939); Laredo (1996); Salvador (1988); Veiga et al. (2014)

Observaciones: De la Peña (Abra Pampa, dpto. Cochinoca, 22-02-1979)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Coconier (2005b); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Di Giacomo et al. (2005c); Maceda et al. (2001, 2008); Tejerina et al. (2006)

La Rioja
Citas: Bodrati y Ferrari (2014)

Mendoza
Citas: Aramburú (1983); Contreras y Fernández (1980); Darrieu et al (1989); Darrieu (2014); Lucero (2013f); Martínez et al. (1997a); Olivera et al. (2009); Sosa (2005); Wetmore (1926)

Misiones
Citas: Chebez (1996a); Hellmayr y Conover (1948); Navas y Bó (1991a); Pereyra (1950b)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); De Valle et al. (1989); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Gelain (2001); Gelain y Tolosa (2011); Pérez y Petracci (1998)

Salta
Citas: Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i); Moschione y Banchs (1992)

San Luis
Citas: Nellar Romanella (1993)

Santa Cruz
Citas: Dabbene (1920d); Darrieu et al. (2008); Sharpe (1896)

Santa Fe
Citas: Bagnarol et al. (2010); Beltzer (1986c); Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f); Fandiño y Pautasso (2011); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Jehl y Rumboll (1976)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Dabbene (1920d); Echevarría y Chani (1999, 2000, 2006); Echevarría et al. (1998); Echevarría (2014); Laredo y Vides-Almonacid (1999); Lucero (1983)

Islas Malvinas
Citas: Woods (2006)

Georgias del Sur
Citas: Prince y Croxall (1983, 1996); Prince y Payne (1979)

PLAYERITO DE VIENTRE NEGRO *Calidris alpina* (Linnaeus, 1758)

Otro nombre: Playerito de panza negra.

DESCRIPCIÓN
Largo: 16-22 cm.
Coloración. Dorsal rojiza. Abdomen negro. Pecho blanquecino jaspeado de pardo.

HÁBITAT
Costas marinas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Calidris alpina (Linnaeus, 1758) migratorio. Se reproduce en América del Norte, Groenlandia, norte de Asia. Observado en Mar del Plata (Buenos Aires), Salta y en Santa Cruz.
Se desconoce la subespecie.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Nueve subespecies. Nidifica en todo el Ártico en Norte América, Europa y Asia. Durante el invierno boreal migra hacia el sur, raramente alcanzando en el continente americano más allá del sur de Méjico.



CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Kieser (1982)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

Santa Cruz
Citas: Darrieu et al. (2008)

PLAYERO ZANCUDO *Calidris himantopus* (Bonaparte, 1826)

Otros nombres: Batuirá. Chorlito de patas largas. Chorlito semipalmado de pico largo. Chorlito zancudo.



Campo Andino. Santa Fe. 14-11-2008

DESCRIPCIÓN
Largo: 18-23 cm.
Coloración. Pico negro. Patas verdosas. Iris pardo oscuro.
Plumaje de reposo sexual.
Dorsal gris pardusca, levemente rayada de blanquecino en el cuello. Rabadilla gris pardusca con las plumas orilladas de blanquecino. Supracaudales blancas. Cejas blanquecinas. Ventral blanca jaspeada de gris en el pecho y en los flancos.
Alas pardas oscuras con las plumas de cubierta orilladas de blanquecino. Cola parda y blanquecina.
Plumaje nupcial.
Cejas blancas. Lados de la cara canelas claros. Partes dorsales con las plumas orilladas de blanquecino. Garganta y cuello anterior blanquecinos estriados de pardo. Pecho, flancos y abdomen blanquecinos con barras pardas oscuras. Resto igual al plumaje de reposo sexual.

HÁBITAT
Bañados, orillas de lagunas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño mediano. Pico largo y algo curvado. Cejas y supracaudales blancas. Patas verdosas.
Se parece al Pitotoy chico.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Calidris himantopus(Bonaparte, 1826) migratorio de Estados Unidos.
Llega hasta Jujuy, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones, Catamarca, Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe, Buenos Aires y Río Negro.Accidental en las Islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Migratorio del Ártico, Canadá y Estados Unidos. En el invierno boreal migra a Centro América y toda Sudamérica (excepto Chile) hasta Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Dabbene (1920d); Darrieu y Camperi (2001a); Delhey et al. (2001c); Gibson (1920); Mérida y Bodtati (2006); Morici (2012b); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1927d, 1938b); Petracci et al. (2004); Pugnali y Chamorro (2008)

Observaciones: De la Peña (Laguna Las Flores, pdo. Las Flores, 10-12-1972)

Catamarca
Citas: Heinonen Fortabat et al. (1992)

Córdoba
Citas: Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1979, 1980b); Osinaga Acosta et al. (2006); Yzurieta (1995)

Corrientes
Citas: Contreras (1981b); Dabbene (1920d)

Formosa
Citas: Contreras (1987c);Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Gorleri et al. (2011)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Laredo (1996); Moschione et al. (2011)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bruno y Erro (2010); Siegenthaler (2004)

Misiones
Citas:Chebez (1996a)

Río Negro
Citas: Contreras et al. (1980b); Gelain y Tolosa (2011); Grigera y Rubulis (1985); Paz Barreto (1997b)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Lucero (2013i)

Santa Fe
Citas: De la Peña (1988, 2011f); Di Giacomo et al. (2001); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Martinez Achenbach (1957)

Santiago del Estero
Citas: Ménéguax (1925); Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Laredo y Vides-Almonacid (1999); Lucero (1983)


Islas Malvinas
Citas:Woods (2006)

PLAYERITO CANELA *Tryngites subruficollis* (Vieillot, 1819)

Otros nombres: Chorlito canela. Chorlito de garganta blanca acanelada. Chorlito ocráceo. Chorlo de garganta acanelada.

DESCRIPCIÓN
Largo: 18-20 cm.
Coloración. Pico negro. Patas amarillentas. Iris pardo oscuro.
Plumaje de reposo sexual.
Partes dorsales con estrías oscuras en la corona y el resto jaspeado de canela y negruzco. Ventral ocrácea canela. Subcaudales blanquecinas.
Alas pardas. Cubiertas como el dorso. Ventral de las alas blanca con las puntas oscuras.
Cola parda oscura.
Plumaje nupcial.
Partes dorsales más oscuras y más moteado y rayado de negro. Ventral canela.

COMPORTAMIENTO
Alimentación
Isacch y Martínez (1998). **Insectos:**Coleópteros. Dípteros (larvas). Gasterópodos. Hormigas. Lepidópteros (larvas). Ortópteros. **Otros:** Vegetales. Arácnidos.



HÁBITAT
Bañados, praderas, cerca o lejos del agua.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. Ventral ocre canela, dorso jaspeado. En vuelo, las alas ventralmente son blancas con puntas negras. Patas amarillentas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Tryngites subruficollis (Vieillot, 1819) migratorio de Norteamérica. Llega hasta Jujuy, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en el extremo Ártico de Alaska y Canadá. Migra en el invierno boreal hasta Uruguayy Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Coconier (2005b); Codesido et al. (2013); Dabbene (1920d); Darrieu y Camperi (2001a); Delhey et al. (2001c); Hartert y Venturi (1909); Isacch y Martínez (2003); Lanctot et al. (2004); Mérida y Bodtati (2006); Morici (2012b); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1927f, 1938b)

Córdoba
Citas: Dabbene (1920d); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores et al (1983); Yzurieta (1995)

Corrientes
Citas: Contreras (1981b); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2003b, 2006); López-Lanús et al. (2013b)

Entre Ríos
Citas: Abadie (1993)

Formosa
Citas: Contreras (1987c);Contreras et al. (2014); Gorleri et al. (2011)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Laredo (1996); Narosky (1988); Olivera (2009)

La Pampa
Citas: Darrieu et al. (2011b)

Misiones
Citas: Dabbene (1920d)

Santa Fe
Citas: De la Peña (1988c, 2011f); De la Peña et al. (2003); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Luna y Manassero (2010, 2013); Manassero y Luna (2009a)


Subfamilia: Scolopacinae

BECASINA GRIS *Limnodromus griseus* (J. F. Gmelin, 1789)

Otros nombres: Becasa gris. Becasina migratoria.

DESCRIPCIÓN
Largo: 24-28 cm.
Peso: Schulz Neto et al. (2008): N= 68 (?) X: 90 g (Rango 70 a 155).
Coloración. Pico negro. Patas verdes. Iris pardo oscuro.

Plumaje de reposo sexual.
Corona grisácea. Cejas blanquecinas. Garganta blanca. Resto de la cabeza y cuello grisáceos levemente jaspeados. Dorso grisáceo. Rabadilla blanca. Ventral blanquecina.
Alas pardas. Puntas de las secundarias blancas. Cubiertas grisáceas. Cola blanca barrada de negro.
Plumaje nupcial.
Dorsal parda rojiza manchada de negro. Ventral rojiza con barras transversales negras.



HÁBITAT
Costas marinas o de lagunas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño mediano. Pico largo. Cejas blanquecinas. Rabadilla blanca. Cola barrada.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Limnodromus griseus griseus (J. F. Gmelin, 1789) migratorio del Ártico de Norteamérica. Llega a la costa de Buenos Aires. Observado además en Córdoba, Jujuy y en el oeste de Río Negro.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Migrador del Ártico de Norteamérica. Llega a Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Limnodromus griseus griseus (J. F. Gmelin, 1789)

Buenos Aires
Citas: Barbetti et al. (1985); Bertonatti y Sutton (1986); Darrieu y Camperi (2001a); Gandoy et al. (2014); Jaramillo (2000); Narosky (1983b); Pereyra (1938b); Zapata (1998); Zotta (1942c)

Córdoba
Citas: Yzurieta (1995)

Jujuy
Citas: Moschione (2010b); Rodríguez et al. (2010)

Río Negro
Citas: Contreras et al. (1980b)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

BECASINA DE LOS PÁRAMOS *Gallinago jamesoni* (Jardine & Bonaparte, 1855)

DESCRIPCIÓN
Largo: 29-30 cm.
Coloración. Parecida a la Becasina grande (*Gallinago stricklandii*)

HÁBITAT
Áreas húmedas y pantanosas.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Gallinago jamesoni (Jardine & Bonaparte, 1855) observada en Jujuy.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Se halla en la cordillera de los Andes entre 2.000 y 4.000 m, en áreas húmedas y pantanosas de los páramos en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Moschione et al. (2008a)

BECASINA GRANDE *Gallinago stricklandii* (G. R. Gray, 1845)

Otros nombres: Agachadiza grande. Becasina fueguina.

DESCRIPCIÓN
Largo: 30-38 cm.
Coloración. Pico gris amarillento con punta negra. Patas amarillas parduscas. Iris pardo oscuro.
Plumas de las partes dorsales con bandas negras, castañas y ocres, alternadas. Cara blanquecina con puntillado pardo oscuro. Garganta blanquecina. Pecho ocráceo con ondulaciones pardas oscuras y algo de canela en el cuello. Abdomen ocráceo. Flancos ocráceos barrados de pardo oscuro y canela.
Alas pardas con finos rebordes en las primarias. Cubiertas alares y cola como el dorso.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Reynolds (1935). Insectos.

HÁBITAT
Pantanos y turbales en bosques húmedos.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Goodall et al. (1951)

Depredadores
De adultos: *Falco peregrinus* (Ellis et al. 2002)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Pico largo. “aperdizada”.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Gallinago stricklandii (G. R. Gray, 1845) en Islas de los Estados e islotes del canal de Beagle, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Islas Malvinas. Observada en el noroeste de Neuquén y en el oeste de Río Negro.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en ser de Chile y Argentina. Migra al norte en invierno.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Chebez et al. (1998); Matarasso (2007)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011); Kovacs et al. (2005)

Santa Cruz
Citas: Coconier (2005b); Imberti (2003, 2005e)

Tierra del Fuego
Citas: Blendinger (1998); Clark (1986); Humphrey et al. (1970); Olrog (1948)

Islas Malvinas
Citas: Benneat (1926); Woods (1988, 2006)

BECASINA GIGANTE *Gallinago undulata* (Boddaert, 1783)

DESCRIPCIÓN
Largo: 48 cm
Coloración. Pico largo y ancho en la base. Patas verde grisáceo.
Cabeza, cuello y dorsal, rayado de negro y castaño. Ventral blanquecino jaspeado de pardo. Flancos barrados de castaño.Remeras pardo oscuras finamente barradas de blanco.

HÁBITAT
Pantanos, pastizales inundados, orillas de esteros.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Gallinago undulata gigantea (Temminck, 1826) en Corrientes.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Colombia, Venezuela, norte y sureste de Brasil, este de Guyanas, este de Bolivia, Paraguay y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Gallinago undulata gigantea (Temminck, 1826)

Corrientes
Citas: López Lanús y Moller Jensen (2012); López-Lanús et al. (2013b)

Más información:
López Lanús y Moller Jensen (2012)

BECASINA COMÚN *Gallinago paraguaiae* (Vieillot, 1816)

Otros nombres: Becasa. Becasina. Agachadera. Agachadiza. Agachadiza común. Agachona. Aguatero. Becada. Becasina. Becasina chillona. Becasina de las sierras. Becasina prima. Becasina primera. Becasina segunda. Busca lluvias. Canasta. Canastica. Canastita. Carrero. Chorlaco. Chorlito. Chorlo agachón. Chula. Percasina. Picasina. Pide lluvia. Porotera. Rayador. Rompeviento. Yacaberé.

DESCRIPCIÓN

Largo: 25-30 cm

Peso: Contreras (1975): N= 6 (?) X: 136,4 g (Rango 111 a 152,2); Contreras (1979f): N= 1 (H) 111,0 g; Salvador (1988): N= 1 (H) 113,0 g; Navas y Bó (2001): N= 1 (M) 124,5 g; N= 2 (H) 151 y 182,9 g; Salvador (2014a): N= 2 (M) 109 y 118 g; N= 1 (H) 125 g

Coloración. Pico negro con base amarilla. Patas grises verdosas. Iris pardo oscuro.

Cabeza parda oscura con una franja central ocrácea. Partes dorsales pardas oscuras. Escapulares negras con las láminas externas de las plumas marginadas de ocráceo. Cejas y garganta blanquecinas. Cuello y pecho ocráceos jaspeados de pardo. Vientre blanco. Flancos blanquecinos con barras pardas y canelas.

Alas pardas oscuras.

Cola con las plumas centrales negras con puntas blancas y una banda subterminal canela. Laterales barradas de blanquecino y gris con puntas blancas.

COMPORTAMIENTO

Relativamente mansa. Plumaje mimético con la vegetación.

Alimentación

Marelli (1919). Vegetales.

Aravena (1927). **Insectos:** Curculiónidos. Dípteros. Lepidópteros. **Moluscos:***Ampullaria*.

Zotta (1932). **Insectos:** Coleópteros. Dípteros. **Otros:** Piedritas. Semillas. Vegetales.

Zotta (1934). **Insectos:** Coleópteros. Hemípteros. Himenópteros. **Moluscos**: (*Planorbis kermatoides*). **Otros:** Semillas. Vegetales. Piedritas.

Olrog (1956a). Oligoquetos.

Humphrey et al. (1970). Larvas.

Klimaitis (1993). Coleópteros. Vegetales.

Lajmanovich y Beltzer (1995). **Insectos:** Coleópteros(Elmidae, Curculionidae, Dytiscidae, Carabidae), (Escabaeidae, Hydrophilidae, *Berosus* sp.). Díptera (Tipulidae, Chironomidae, *Chironomus domizii*). Lepidoptera (Larvas). Hemíptera (Pelocoridae). Orthoptera (Grillidae). **Vegetales:** Semillas (*Polygonum* sp.). (Frutos) (Esporangios, *Salvinia* sp.)

Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera. Ephemeroptera (náyades). Hemiptera (Corixidae). Insectos (larvas). **Moluscos:** (Planorbidae: *Biomphalaria* sp.). **Vegetales:** Semillas (Gramíneas). **Anélidos:** (oligoquetos: lombrices de tierra)

Voces

Straneck (*in litt*.). Levanta vuelo sorpresivamente. En veloz vuelo en picada, y como marcación territorial, el macho hace un sonido mecánico con las plumas de la cola al pasar el aire a través de las mismas se produce un fuerte y soplado Fefe.fefe.fefe.fefefefhh.fe..fehh..

HÁBITAT

Bañados, pantanos, pajonales húmedos.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos y/o pichones en Formosa, Tucumán, Córdoba, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Río Negro.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
					N	N	N	N	N		



En el suelo. Cerca de ambientes acuáticos (campos inundados, bañados, arroceras)
Semioculto. Poco elaborado. Depresión forrada con pastos, a veces con reborde.

Salvador y Salvador (en prep.). Dpto. San Martín, Córdoba, 3 nidos en agosto y octubre, en proximidades de bañados, en matas de *Cynodon* sp. y matas de *Distichlis* sp., postura 2 huevos.
Salvador (*in litt*.). Cintra, dpto. Unión, Córdoba, 03-09-2001, nido en las proximidades de una laguna, oculto bajo una mata gramínea, con 2 huevos incubados.
Withington (1888). Lomas de Zamora, pdo. Lomas de Zamora, Buenos Aires, un nido junto a una zanja con agua corriente, con 3 huevos.
Hartert y Venturi (1909). Nidos en Barracas al Sud, Capital Federal, Buenos Aires y en Chaco.
Peters (1923b). Huanu-Luan, 25 de Mayo, Río Negro, 07-10-1920, nido con huevos.
Smyth (1927). Manchalá, dpto. Leales, Tucumán, 08-10-1922, 2 huevos. Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, 11-11-1926, 3 huevos.
Pereyra (1938b). Provincia de Buenos Aires, nidifica desde junio a setiembre. Construye el nido cerca o en la orilla del bañado sobre los mismos pastos o en algún albardón.
Drabble (1953). Gualeguaychú, dpto. Gualeguaychú, Entre Ríos, 24-09-1951, nido con 2 huevos.
Zapata y Zazarino de Bustingorry (1990). 25 de Mayo, pdo. 25 de Mayo, Buenos Aires, 1980. Nidos en julio a octubre con 2 huevos. Diámetro externo de 15 a 17 cm.
Miatello et al. (1999). Nidifica en Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba.
Babarskas et al. (2003). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, nido con huevos en setiembre y dos nidos en noviembre.
Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa. Dos nidos, uno en julio y el otro en noviembre, con 2 y 1 huevo respectivamente.
De la Peña (2013c). Villa San José, dpto. Colón, Entre Ríos, 15-07-1972, 3 huevos; Cayastacito, dpto. San Justo, Santa Fe, 03-08-1973, 3 huevos; Emilia, dpto. La Capital, Santa Fe, 2 nidos: 28-07-1978, 3 huevos y 2 huevos; Alejandra, dpto. San Javier, Santa Fe, 06-08-1991, 2 huevos; Merlo, dpto. Junín, San Luis, 20-01-2001, 2 huevos; Matilde, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 15-06-2002, 2 huevos.
El nido de Alejandra, estaba en una elevación del suelo, en el interior de una arrocera.
Medidas: diámetro total: de 10 a 12 cm, profundidad: 1 a 2,5 cm.
Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos “Pablo Girard”, dos nidos con 2 huevos cada uno.
Segura et al (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 5 nidos.

Huevos
Pone 3 huevos. Ovoidales ó cónicos. De color pardo amarillento o crema con pintas y manchitas pardas claras, pardas oscuras y grises distribuidas por toda la superficie pero más concetradas en el polo mayor. Algunos con manchas y líneas negras.

Medidas



Salvador (*in litt*.): 37,9 x 28,9 y 37,8 x 29,1
Salvador y Salvador (en prep.): 36,2 a 37,9 x 27,4 a 29,6 X= 37,2 x 28,2 (N= 4)
Hartert y Venturi (1909): 37,5 a 42 x 27 a 30
Gibson (1920): 41 x 30
Smyth (1927): de 40,5 a 42 x 28 a 28,5
Pereyra (1938b): 41 a 45 x 27 a 31
Zapata y Zazarino de Bustingorry (1990): X= 35,25 x 24,75 (N=8)
Di Giacomo (2005h): 40,7 a 41,8 x 28,3 a 28,9 X= (N= 2)
De la Peña (2013c): De 38,7 a 42,5 x 27,7 a 32,5 X= 40,1 x 29,5 (N= 10)

Pesos

Salvador y Salvador (en prep.): 15 a 17,5 X= 16,2 (N= 4)
Di Giacomo (2005h): 15,0 y 15,5
De la Peña (2013c): 15,7 a 16 X= 15,85 (N= 2)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,841 a 0,907 X= 0,888 (N= 7)

Anónimo (1933): huevos colectados en Tierra del Fuego por T. L. y G. P. Bridges y P. W. Reynolds, en el Museo Nacional de Historia Natural.

PICHONES

Descripción

De la Peña (2013c): Pico y patas negros. Cuerpo cubierto de plumón negro.

Observaciones

Christie et al. (2004). Pichones en octubre y noviembre.
De la Peña (2013c): 28-07-73. Cayastacito, dpto. San Justo, Santa Fe. Adulto con un pichón.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño mediano. Pico largo. Cejas y franjas en la cabeza blanquecinas.



Cayastacito. Santa Fe. 03-08-1973



Cayastacito. Santa Fe. 03-08-1973



Cayastacito. Santa Fe. 08-03-1973



Cayastacito. Santa Fe. 28-07-1973



Emilia. Santa Fe. 28-07-1978



La Brava. Santa Fe. 18-11-1983

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Gallinago paraguaiae paraguaiae (Vieillot, 1816) desde el norte del país hasta San Juan, San Luis y Buenos Aires; *Gallinago paraguaiae magellanica* (King, 1828) desde Mendoza, Neuquén y Río Negro, hasta Tierra del Fuego y las islas Malvinas. Migra en el otoño al norte.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies. Se distribuye por toda Sud América hasta Tierra del Fuego e Islas Malvinas. Algunos autores en base a vocalizaciones y comportamiento consideran en realidad 2 especies diferentes.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Gallinago paraguaiae paraguaiae (Vieillot, 1816)

Buenos Aires

Citas: Aravena (1927); Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Camperi (1992c); Codesido et al. (2013); Dabbene (1918a); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Filipello y López de Casenave (1993); Gibson (1920); Hartert y Venturi (1909); Isacch et al. (2006); Klimaitis (1975b, 1993); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Lucero et al. (2011); Mérida y Bodtati (2006); Morici (2012b);

Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1927d, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); White (1882); Zapata (1998); Zotta (1932)



Catamarca
Citas: Carma (2009)

Chaco
Citas: Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b)

Córdoba
Citas: Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores y Yzurieta (1980b); Ordano (1996); Osinaga Acosta et al. (2006); Salvador (1983a); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Miramar, dpto. San Justo, 28-02-1976)

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Straneck (1990c)

Observaciones: De la Peña (Mburucuyá, dpto. Mburucuyá, 19-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Baliño y Biole (1984); Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); López-Lanús et al. (2013c); De la Peña (2012b, 2013c); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2001a, 2001b); Muzzachiodi et al. (2003); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Zapata (1975, 1977)

Formosa
Citas: Contreras (1987c);Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Gorleri et al. (2011); López Lanús (1997); Narosky y Martelli (1995); Pujalte et al. (1995)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Fiora (1939)

La Pampa
Citas: De la Peña y Tittarelli (2011)

Misiones
Citas: Chebez (1996a); Dabbene (1910); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Navas y Bó (1993)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i); Navas y Bó (2001)

San Juis
Citas: De la Peña (2013c); Nellar Romanella (1993); Nores y Yzurieta (1981)

Santa Fe
Citas: Beltzer (1986c); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Giai (1950); Lajmanovich y Beltzer (1995); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Wilson (1926)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Echevarría et al. (1998, 2008c); Echevarría (2001); Echevarría y Chani (1999, 2000, 2006); Lucero (1983)

Gallinago paraguaiae magellanica (King, 1828)

Buenos Aires
Citas: Camperi (1992); Narosky y Di Giacomo (1993)

Chubut
Citas: Camperi (1998); Daciuk (1977); Sainz-Trápaga (2014); Vidoz (1995)

Mendoza
Citas: Blendinger y Alvarez (2002); Calí et al. (2008); Contreras y Fernández (1980); Contreras (1980c); Darrieu (2014); Lucero (2013f); Martínez et al. (1997a); Olivera et al. (2009); Pereyra (1942a); Reed (1916); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (1995d, 2005);Wetmore (1926)

Neuquén
Citas: Contreras (1975, 1977b); Christie et al. (1988, 2004); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Olrog (1979b); Pereyra (1945); Steullet y Deautier (1939); Veiga et al. (2005); Wetmore (1926b); Yepes (1939)

Observaciones: De la Peña (La Rinconada, dpto. Huiliches, 27-01-1976; Junín de los Andes, dpto. Huiliches, 26-11-1998)

Río Negro
Citas: Camperi (1998); Contreras (1975); Contreras et al. (1980b); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Daciuck (1977); Gelain (1984a, 1984b, 2001, 2010, 2012b); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Grigera y Rubulis (1985); Llanos et al. (2011); Paz Barreto (1997b); Peters (1923b)

Santa Cruz
Citas: Coconier (2005b); De Lucca y Saggese (1992); Earnshaw y Earnshaw (2000); Erize (1983); Imberti (2005e); Imberti y Albrieu (2001); Lange (1981); Oustalet (1891); Peri (2013); Sclater et al. (1870)

Observaciones: De la Peña (Río Turbio, dpto. Güer Aike, 09-11-1979)

Tierra del Fuego
Citas: Castellanos (1935); Clark (1986); Earnshaw (1973); Humphrey et al. (1970); Olrog (1948, 1950); Reynolds (1934)

Islas Malvinas
Citas: Wace (1921); Woods (2006)

BECASINA ANDINA *Gallinago andina* Taczanowski, 1875

Otros nombres: Becasina de la puna.

DESCRIPCIÓN
Largo: 25 cm.
Coloración. Parecida a *Gallinago paraguaiae*. Más chica, pico más corto. Patas amarillas. Voz diferente.

HÁBITAT
Bañados, pantanos.

NIDIFICACIÓN
Se localizó nido en jujuy.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N			

Laredo (1996). Laguna Pozuelos, Jujuy, nido a mediados de setiembre.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Gallinago andina Taczanowski, 1875 entre los 2.000 y los 4.000 metros de altura en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, San Juan y Mendoza. En invierno baja a las llanuras.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Se extiende desde el norte de Perú hacia Bolivia, Chile y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca
Citas: Carma (2009); Olrog (1953); Zotta (1936b)



Jujuy
Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009); Laredo (1996); Salvador (1988)

Mendoza
Citas: Sosa (2003)

Salta
Citas: Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013); Olrog (1959c)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Echevarría et al. (2008a); Esteban (1953); Laredo y Vides-Almonacid (1999); Lucero (1983); Olrog (1953, 1959c)

Subfamilia: Tringinae

FALAROPO COMÚN *Phalaropus tricolor* (Vieillot, 1819)

Otros nombres: Chorlito. Chorlito de tres colores. Chorlito nadador. Chorlito palmado grande. Chorlito pies palmados. Chorlito tarso comprimido. Chorlo blanco. Chorlo blanco nadador. Chorlo de agua. Chorlo de tarso comprimido. Chorlo de tres colores. Chorlo nadador. Chorlo palmado blanco. Chorlo palmado tricolor. Chorlo tricolor. Falaropo blanco. Falaropo de Wilson. Falaropo tricolor. Gordillo.

DESCRIPCIÓN
Largo: 22-25 cm.
Peso: Fiora (1933): N= 3 X= 65 g (Rango 60 a 70); Salvador (1988): N= 2 (M) 45,0 y 47 g; Christie et al. (2004): N= 1 (H) 45 g; Salvador (2014a): N= 1 (M) 53,7 g; N= 3 (H) X= 55,2 g (Rango 52,8 a 58,6)

Coloración. Pico negro. Patas amarillas. Iris pardo.
Plumaje de reposo sexual.
Partes dorsales grises claras. Ceja, rabadilla, supracaudales y partes ventrales blancas. Línea ocular oscura. Alas grises oscuras. Cobijas orilladas de blanquecino. Cola grisácea.
Plumaje nupcial.
Hembra. Frente y corona grises. Nuca blanca. Por detrás de los ojos se extiende una línea hasta la base del cuello. Dorso gris azulado con mancha castaña. Rabadilla, cejas, barba y garganta blancas. Anterior del cuello y pecho ocres canelas. Resto de las partes ventrales blanco.
Alas y cola como en reposo sexual.
Macho. Más pequeño y de colores más apagados.

COMPORTAMIENTO
Forma bandadas. Muy nadador. Gira sobre sí mismo picoteando el agua.

Alimentación
Zotta (1940c). **Insectos:** Coleópteros (Carabidae, Curculionidae, Tenebrionidae). **Moluscos:** Caracol (huevos) (*Ampullaria* sp.) **Otros:** Minerales. Vegetales.
Bucher y Herrera (1981). **Insectos:** Coleópteros. Corixidae. **Vegetales:** Semillas.
Klimaitis (1993). **Insectos:** Coleópteros. **Otros:** Piedritas.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Dytiscidae). Diptera (larvas). Hemiptera (Corixidae). **Moluscos:** (Hydrobiidae: *Littoridina parchappei*, Planorbidae: *Biomphalaria* sp.)**Vegetales:** Semillas (*Scirpus* sp.)

HÁBITAT
Lagunas, mares.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño mediano. Cejas, rabadilla y ventral blancas.
Dorso gris claro. Muy nadador.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Phalaropus tricolor (Vieillot, 1819) migratorio de Norteamérica. Llega hasta Tierra del Fuego y ocasionalmente a las islas Malvinas y Georgias del Sur.



Esperanza. Santa Fe. 07-01-2008



Esperanza. Santa Fe. 07-01-2008



Llambi Campbell. Santa Fe. 01-03-1974



Esperanza. Santa Fe. 07-01-2008

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Nidifica en Estados Unidos. Migra hasta Tierra del Fuego, islas Malvinas y Georgias del Sur. Se lo encuentra especialmente en la costa del Pacífico y toda Argentina en lagos alcalinos tanto en los Andes como en otros del interior del continente.


CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Dabbene (1920d, 1929a); Darrieu y Camperi (2001a); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis (1975b, 1993); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Mérida y Bodtati (2006); Morici (2012b); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Zapata (1998)

Catamarca

Citas: Carma (2009)



Córdoba
Citas: Bucher y Herrera (1981); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores y Yzurieta (1980b); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Miramar, dpto. San Justo, 27-11-1977)

Corrientes
Citas: Contreras (1981b)

Chubut
Citas: Camperi (1998); Dabbene (1920d); Darrieu y Camperi 2000 (2001); Harris (2008); Kovacs et al. (2005); Pagnoni (1995); Sainz-Trápaga (2014)

Entre Ríos
Citas: De la Peña (2012b)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c);Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Esteban (1953); Gorleri et al. (2011); López Lanús (1997); Pujalte et al. (1995)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Caziani y Derlindati (2000); Caziani et al. (2001); Chebez et al. (1998); Fiora (1933, 1939); Laredo (1996); Moschione y Segovia (2005); Moschione et al. (2011); Olivera (2009); Salvador (1988)

Observaciones: De la Peña (Abra Pampa, dpto. Cochinoca, 22-02-1979)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Bruno et al. (2007); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Siegenthaler (1984, 2004); Tejerina et al. (2006)

Observaciones: De la Peña (Parque Luro, dpto. Capital, 28-11-1998)

La Rioja
Citas: Bodrati y Ferrari (2014)

Mendoza
Citas: Blendinger y Alvarez (2002); Contreras y Fernández (1980); Dabbene (1920d); Sosa (1995d, 2005); Pereyra Lobos y Martínez (2011); Roig (1965)

Misiones
Citas: Chebez (1996a); Dabbene (1910, 1920d.); Navas y Bó (1993)

Neuquén
Citas: Del Valle et al. (1989); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Christie et al. (2004); Gelain (2010); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Paz Barreto (1997b)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Echevarría et al. (2014); Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013i)

Santa Cruz
Citas: Darrieu et al. (2008); Erize (1983); Iglesias y Pérez (1998); Imberti (2005e); Imberti y Albrieu (2001); Lancelotti et al. (2009); Lange (1981)

Santa Fe
Citas: Bollero y Ramírez (2012); Burger y Howe (1975); Chiale et al. (2015);De la Peña (1988c, 2011f); Fandiño y Pautasso (2011); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Maugeri et al. (2009)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Observaciones: De la Peña (Selva, dpto. Rivadavia, 06-02-1983)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Humphrey et al. (1970); Jehl y Rumboll (1976); Keith (1970)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch et al. (2011b); Dabbene (1920d, 1929a); Echevarría y Chani (1999, 2000, 2006); Echevarría (2001); Echevarría et al. (1998, 2008c); Laredo y Vides-Almonacid (1999); Lucero (1983); Ortiz et al. (2005)


Islas Malvinas
Citas: Wace (1921); Woods (2006)

Georgias del Sur
Citas: Prince y Croxall (1996)

FALAROPO DE PICO FINO *Phalaropus lobatus* (Linnaeus, 1758)

Otros nombres: Chorlito apizarrado de mar. Chorlito palmado chico. Chorlo de mar de pies palmados. Falaropo pico fino.

DESCRIPCIÓN
Largo: 17-20 cm.
Coloración. Pico negro. Patas grisáceas. Iris pardo.
Plumaje de reposo sexual.
Partes dorsales grisáceas con el dorso jaspeado. Corona y franja ocular oscuras. Frente, cejas superciliares, lados de la cabeza y del cuello y partes inferiores blancos. Lados del pecho grisáceos.
Alas pardas. Cubiertas grisáceas con las extremidades blancas. Cola grisácea.
Plumaje nupcial.
Hembra. Partes dorsales grises oscuras, estriado de ocráceo. Barba y garganta blancas. Anterior, lados del cuello y pecho canelas.
Alas grises oscuras con las cubiertas orilladas de ocre. Resto del plumaje como en reposo sexual.
Macho. Semejante a la hembra pero más oscuro y con el pecho blanquecino jaspeado de gris y lavado de canela.



COMPORTAMIENTO

Alimentación

HÁBITAT
Lagunas, mares.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. Pico negro. Corona y franja ocular oscuras. Dorso jaspeado.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758) migratorio de Norteamérica. Observado en Chaco, Corrientes, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Mendoza.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en el Ártico y área vecina. Migra durante el invierno boreal migra hasta Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Narosky y Di Giacomo (1993); Pereyra (1938b); Zotta (1944a)

Chaco
Citas: Dabbene (1920d)

Corrientes
Citas: Contreras (1981b)

Mendoza
Citas: Olivera et al. (2009); Sosa et al. (2006); Sosa (1995b)

Observaciones: De la Peña (Las Leñas, dpto. Malargüe, 13-10-2004)

Neuquén
Citas: Del Valle et al. (1989)

Río Negro
Citas: Casas y Gelain (1986); Gelain (2007b); Sosa et al. (2006)

San Juan
Citas: Gelain (2013i, 2014a)

FALAROPO DE PICO GRUESO *Phalaropus fulicarius* (Linnaeus, 1758)

Otros nombres: Chorlito de mar. Chorlito de pecho rojizo. Chorlito palmado castaño. Chorlito palmado rojizo. Chorlo de mar. Falaropo pico grueso.

DESCRIPCIÓN
Largo: 20-23 cm.
Peso: Christie et al. (2004): N= 1 (H) 45 g.
Coloración. Plumaje de reposo sexual.
Pico verde amarillento con punta negra. Patas grises. Iris pardo.
Corona y línea posocular oscuras. Partes dorsales grises. Frente, cejas superciliares, cuello anterior y partes ventrales blancos.
Alas grises parduscas con las cobijas mayores con punta blanca. Cola gris pardusca.
Plumaje nupcial.
Pico amarillo con punta negra. Patas amarillentas.
Frente, corona y lorum pardos oscuros. Lados de la cabeza blancos. Posterior del cuello pardo y canela.
Dorsal ocrácea estriada de negro. Cuello y resto de ventral canelas.
Alas grises parduscas oscuras. Cobijas mayores con punta blanca. Cola parda oscura.

HÁBITAT
Mares, lagunas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño mediano. Nuca y línea posocular oscuras. Dorsal gris. Ventral blanca.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Phalaropus fulicarius (Linnaeus, 1758) migratorio del Ártico. Observado en Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y las islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en el extremo Ártico. Migra hasta Tierra del Fuego y las islas Malvinas.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Dabbene (1920d); Olrog (1974); Pereyra (1938b)

Chubut
Citas: Camperi (1998); Chebez et al. (1998); Kovacs et al. (2005); Rubio (2006)

Córdoba
Citas: Cobos et al. (1999)



Formosa
Citas. Contreras et al. (2014)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bruno et al. (2006)

Mendoza
Citas: Elías (2008); Güller et al. (2006); Olivera et al. (2009); Olrog (1974); Pereyra Lobos y Elías (2011)

Neuquén
Citas: Argerich (2012); Contreras (1977b);Kovacs et al. (2005); Matarasso (2007); Olrog (1974); Pérez et al. (2006); Ramilo en Cheheber et al. (1992)

Río Negro
Citas: Christie et al. (2004); Gelain (2010, 2012b)

San Juan
Citas: Lucero (2013b); Gelain (2013i, 2014a)

Santa Cruz
Citas: Coconier (2005b); Darrieu et al. (2008); Imberti (2003, 2005e)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Humphrey et al. (1970); Keith (1970)

Malvinas
Citas: Murphy (1936); Woods (2006)

Antártida
Citas: Hayman et al. (1986); Watson (1975)

PLAYERITO DE PICO CURVO *Xenus cinereus* (Guldenstadt, 1774)

Otro nombre: Playerito pico curvo.

DESCRIPCIÓN
Largo: 22-25 cm.
Coloración. Pico negro en la punta, amarillento en la base. Curvado. Patas amarillas. Iris pardo.
Plumaje de reposo sexual.
Dorsal gris pardusca. Ventral blanquecina. Lados del pecho finamente estriados.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

HÁBITAT
Costas de ríos y marinas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño mediano. Cuello y pecho estriados, que contrastan con el blanco de las partes ventrales. Dorso gris.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Xenus cinereus(Guldenstadt, 1774) observado en Buenos Aires.
Nidifica en Finlandia, Rusia, Ucrania, Siberia.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Es un chorlito del Viejo Mundo (región paleártica), nidificando desde Finlandia a Siberia e inverna en África y Australasia. En el continente americano hay pocos registros, evidentemente como errante.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Jaramillo (2000); Narosky y Di Giacomo (1993); Pugnali et al. (1988)

PLAYERITO MANCHADO *Actitis macularius* (Linnaeus, 1766)

Otros nombres: Chorlito. Chorlito manchado.

DESCRIPCIÓN
Largo: 18-20 cm.
Peso: Schulz Neto et al. (2008): 266 (?) X: 36,6 g (Rango 22 a 62).
Coloración. Pico amarillo en la base, negro en la punta. Patas verdosas. Iris pardo.
Plumaje de reposo sexual.
Cabeza y partes dorsales pardas oliváceas. Cejas blanquecinas. Ventral blanca.
Alas pardas. Banda alar blanca. Cubiertas como el dorso.
Cola grisácea con las plumas laterales barradas de blanco. Puntas blancas, excepto el par central.
Plumaje nupcial.
Cobijas alares y rabadilla más oscuros. Partes ventrales blancas con puntos negros. Resto igual al plumaje de reposo sexual.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Marelli (1919). Coleópteros (larvas).
Zotta (1934). Coleópteros. Ortópteros. Moluscos. Piedritas.

HÁBITAT
Riberas de ríos.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. Ventral blanca. Banda alar blanca, visible en vuelo. Cola “partida”.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Actitis macularius (Linnaeus, 1766) migratorio de Norteamérica. Llega hasta Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, Chaco, Misiones, Formosa, Corrientes, Buenos Aires y Chubut.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en Norte América. Migra en el invierno boreal a estados sureños de Estado Unidos, Islas del Caribe, Centro América hasta Argentina, incluyendo todos los países de Sud América.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (1997b, 2006b); Darrieu y Camperi (2001a); Delhey et al. (2001c); Doiny Cabré (2006); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Mérida y Bodtati (2006); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1927d, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008)

Chaco
Citas: Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b)

Chubut
Citas: Narosky (1983b)

Córdoba
Citas: Miatello et al. (1991-1994); Yzurieta (1995); Nores (1996)

Corrientes
Citas: Chatellenaz et al. (2010)

Formosa
Citas: Contreras (1987c, 1993b); Contreras et al. (2014)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998)

Misiones
Citas: Chebez (1996a); Dabbene (1919a.); Partridge (1954)

Neuquén
Citas: Contreras (1977b)

Río Negro
Citas: Gelain (2012b); Gelain y Tolosa (2011); Peters (1923b)

Salta
Citas: Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán (2005); Brandán y Navarro (2009); Dabbene (1920d); Echevarría et al. (2008a); Lucero (1983)

PITOTOY SOLITARIO *Tringa solitaria* Wilson, 1813

Otros nombres: Chorlaco de costa. Chorlito. Chorlito de costa. Chorlito pardo menor. Chorlito solitario. Chorlo grande. Chululú-í. Dui-dui. Lavandero solitario. Mbatuitui. Playero solitario. Sacha pollito chico.

DESCRIPCIÓN
Largo: 18-22 cm.
Peso: Contreras (1979f): N= 1 (H) 67,5 g; Salvador (1988): N= 1 (H) 50 g; N= 1 (?) 50 g; Salvador (2914a): N= 1 (M) 56,5 g; N= 2 (H) 51,6 y 54,8 g
Coloración. Pico negro. Patas oliváceas. Iris pardo oscuro.
Plumaje de reposo sexual.
Partes dorsales grisáceas parduscas con suave rayado y manchado de gris y pardo oscuro. Círculo ocular blanco. Lados de la cabeza, cuello y pecho blanquecinos estriados de pardo. Flancos blanquecinos barrados de pardo.
Alas pardas oscuras. Las plumas externas de la cola son blancas con barras pardas y las centrales pardas.
Plumaje nupcial.

Similar al plumaje de reposo sexual pero con las partes dorsales más oscuras y manchadas de blanco.



Esperanza. Santa Fe. 07-12-2007

COMPORTAMIENTO
Se lo ve solitario, en los charcos. A veces dentro de los montes.

Alimentación
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Curculionidae, Hydrophilidae). Diptera (larvas). Hymenoptera (Formicidae). Trichoptera (larvas). **Crustáceos:** Gammaridae: (*Gammarus* sp.). **Moluscos:** Hydrobiidae: (*Littoridina parchappei*).

HÁBITAT
Bañados, playas de ríos y de lagunas, charcos en montes.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. Círculo ocular blanquecino. Solitario.
Cola blanca barrada lateralmente y con el centro oscuro.
Se parece al Pitotoy chico pero difieren en el color de las patas y de la cola.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Tringa solitaria cinnamomea (Brewster, 1890) migratorio de Norteamérica. Llega hasta Neuquén y Río Negro; *Tringa solitaria solitaria*Wilson, 1813 migratorio de Norteamérica. Llega hasta Tucumán, Chaco, Misiones, Buenos Aires.Observado en Georgias del Sur.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Nidifica en Alaska y Canadá. Migra en el invierno boreal hasta Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Tringa solitaria cinnamomea (Brewster, 1890)

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Dabbene (1920d); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Durnford (1878); Hartert y Venturi (1909) , Klimaitis (1975b); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Leveau y Leveau (2001); Mérida y Bodtati (2006); Morici (2012b); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008)

Observaciones: De la Peña (Claromecó, pdo. Tres Arroyos, 07-02-1976)

Catamarca
Citas: Carma (2009)

Chaco
Citas: Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004)

Córdoba
Citas: Brandolín et al. (2007); Dabbene (1920d); Castellanos (1931); Heredia (2006); Miatello et al. (2003); Miatello et al. (1993, 1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores y Yzurieta (1980b); Osinaga Acosta et al. (2006); Salvador (1983a); Sferco y Nores (2003); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Laguna de Pocho, dpto. Pocho, 06-12-1981)

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b); Esteban (1953); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Observaciones: De la Peña (Empedrado, dpto. Empedrado, 23-11-1993)

Entre Ríos
Citas: Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c, 1993b); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Gorleri et al. (2011); Laubmann (1930); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995); Wetmore (1926)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Fiora (1939); Moschione y Segovia (2005); Salvador (1988)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Coconier (2005b); Chebez (2005); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Di Giacomo et al. (2005c); Tejerina et al. (2006)

La Rioja
Citas: Bodrati y Ferrari (2014); Dabbene (1920d); Giacomelli (1923)

Mendoza
Citas: Aramburú (1983); Contreras y Fernández (1980); Martínez et al. (1997a); Sosa (1993b, 2005)

Misiones
Citas: Benstead et al. (1998); Chebez (1996a); Krauczuk (2005); Martínez Gamba (2014); Navas y Bó (1993); Partridge (1954)

Neuquén
Citas: Matarasso (2007)

Río Negro
Citas: Paz Barreto (1997b)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Coconier et al. (2007); Dabbene (1920d); Moschione et al. (2013)

San Luis
Citas: Nellar Romanella (1993)

Santa Fe
Citas: Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f); Fandiño y Pautasso (2011); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Wilson (1926)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991); Torres y Michelutti (2001a)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996, 2000); Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Dabbene (1920d); Echevarría et al. (2008a);Lucero (1983); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz y Aráoz (2014)

Georgias del Sur
Citas: Prince y Croxall (1983, 1996); Prince y Payne (1979)

Tringa solitaria solitaria Wilson, 1813

Formosa
Citas: López Lanús (1997)

Misiones
Citas: Navas y Bó (1993)

Tucumán
Citas: Lucero (1983)

PITOTOY GRANDE *Tringa melanoleuca* (J. F. Gmelin, 1789)

Otros nombres: Batitú. Chorlaco de costa. Chorlito. Chorlito de costa. Chorlito de rabadilla blanca. Chorlito zancudo. Chorlo grande. Chorlo grande de patas amarillas. Chorlo mayor de patas amarillas. Chorlo patas amarillas grande. Chorlo real.

DESCRIPCIÓN
Largo: 30-35 cm.

Peso: Schulz Neto et al. (2008): N= 3 (?) X: 141,7 g (Rango 115 a 172); Salvador (2014a): N= 3 (M) X= 160 g (Rango 149 a 168); N= 4 (H) X= 170,2 g (Rango 136 a 187)

Coloración. Pico negro con base amarilla. Patas amarillas. Iris pardo oscuro.

Plumaje de reposo sexual.

Dorsal parda salpicada de blanco y pardo oscuro. Supracaudales blancas. Garganta y ceja blanquecinas. Lados de la cabeza, cuello anterior y lateral, pecho y flancos jaspeados suavemente de pardo. Resto de la ventral blanco.

Alas pardas oscuras con las secundarias y las cubiertas salpicadas de blanco. Cola blanca barrada de pardo.

Plumaje nupcial.

Similar al plumaje de reposo sexual pero con el pecho y las partes ventrales más jaspeadas de pardo oscuro. Partes dorsales más oscuras.



Esperanza. Santa Fe. 08-07-2007



Esperanza. Santa Fe. 08-07-2007



Esperanza. Santa Fe. 08-07-2007

COMPORTAMIENTO

Anda en grupos, a veces con otros chorlos. La voz es similar a la del Pitotoy chico pero algo más grave.

Alimentación

Olrog (1956a). Miriápodos.
Beltzer y Lajmanovich (1991). *Salminus maxillosus.*
Klimaitis (1993). Limo. Semillas.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (larvas acuáticas). Hemiptera (Corixidae) Insectos (larvas acuáticas). **Crustáceos:** Gammaridae: (*Gammarus* sp.). **Moluscos:** Hydrobiidae: (*Littoridinaparchappei*)



HÁBITAT
Bañados, lagunas, playas marinas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Patas amarillas.
Se parece al Pitotoy chico pero es de mayor tamaño. También a la Becasa de mar, pero ésta tiene el pico curvado hacia arriba, patas grisáceas y bandas alares blancas.
Diferenciarlo del Playero de alas blancas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Tringa melanoleuca (J. F. Gmelin, 1789) migratorio del Ártico de Norteamérica. Llega por el interior y por la costa hasta Tierra del Fuego. Accidental en las Islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en Canadá y Alaska desde donde migra durante el invierno boreal a toda América llegando en el sur hasta Tierra del Fuego.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Dabbene (1918a, 1920d); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Filipello y López de Casenave (1993); García y Paterlini (2009); Gibson (1920); Hartert y Venturi (1909); Isacch et al. (2006); Klimaitis (1975b, 1993); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Mérida y Bodtati (2006); Morici (2012b); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Weller (1967a); White (1882); Zapata (1998)

Observaciones: De la Peña (Claromecó, pdo. Tres Arroyos, 07-02-1976)

Catamarca
Citas: Barrionuevo et al. (2009a); Carma (2009); Steullet y Deautier (1935-1946)

Chaco
Citas: Contreras et al. (1990b)

Chubut
Citas: Camperi (1998); Daciuk (1977); Darrieu y Camperi 2000 (2001); Dabbene (1920d); Sainz-Trápaga (2014)

Observaciones: De la Peña (Trelew, 30-11-2000)

Córdoba
Citas: Brandolín et al. (2007); Bucher y Herrera (1981); Dabbene (1920d); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores y Yzurieta (1980b); Osinaga Acosta et al. (2006); Salvador (1983a); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Miramar, dpto. San Justo, 09-12-2007)

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b); Giraudo et al. (2006)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); Dabbene (1920d); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2001a, 2001b); Muzzachiodi et al. (2003); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c, 1993b); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Gorleri et al. (2011); López Lanús (1997); Pujalte et al. (1995)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009) Camperi et al. (2012); Caziani y Derlindati (2000); Chebez et al. (1998); Laredo (1996)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Bruno et al. (2007); Coconier (2005b); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Di Giacomo et al. (2005c); Maceda et al. (2001); Siegenthaler (1984, 2004); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006)

Observaciones: De la Peña (Puelches, dpto. Curá Co, 28-11-1998)

La Rioja
Citas: Lobo Allende y Bortnyk (2013); Lobo Allende et al. (2014)

Mendoza
Citas: Aramburú (1983);Blendinger y Alvarez (2002); Contreras y Fernández (1980); Dabbene (1920d); Darrieu et al. (1989); Ferrer et al. (2013b); Leybold (1873a); Reed (1914, 1916); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (1993b, 2005); Wetmore (1926); Wolffhuegel (1929)
Observaciones: De la Peña (Llancanelo, dpto. Malargüe, 15-10-2004)

Misiones
Citas: Chebez (1996a); Navas y Bó (1991a)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Chehebar et al. (1992); Christie et al. (1988); De Valle et al. (1989); Fiori y Zalba (1999); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Camperi (1998); Christie et al. (2004); Gelain (2001, 2012b); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Paz Barreto (1997b); Paz et al. (2004); Pérez y Petracci (1998); Peters (1923b)

Salta
Citas: Coconier et al. (2007) ; Echevarría et al. (2014); Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Acosta y Murúa (2001); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i); Ortiz y Murúa (1994)

San Luis
Citas: Masramón (1983); Nellar Romanella (1993)

Santa Cruz
Citas: Albrieu et al. (2004); Imberti (2005e); Imberti y Albrieu (2001); Zapata (1969)

Santa Fe
Citas: Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f); Fandiño y Pautasso (2011);Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Wilson (1926)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Humphrey et al. (1970); Jehl y Rumboll (1976); Keith (1970); Olrog (1948)

Tucumán
Citas: Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Dabbene (1920d); Echevarría et al. (1998, 2008a); Echevarría y Chani (1999, 2000, 2006); Hartert y Venturi (1909); Laredo y Vides-Almonacid (1999); Lucero (1983)

Islas Malvinas
Citas: Woods (2006)

PLAYERO DE ALAS BLANCAS *Tringa semipalmata* (J. F. Gmelin, 1789)

Otros nombres: Playero ala blanca. Playero aliblanco.

DESCRIPCIÓN
Largo: 35-40 cm.
Peso: Schulz Neto et al. (2008): N= 2 (M) 70 y 72 g.
Coloración. Pico negruzco. Patas grises azuladas. Iris pardo odcuro.
Plumaje de reposo sexual.
Dorsal grisácea. Supracaudales blancas. Ventral blanquecina con gris en la parte anterior del cuello. Loral blanco.
Primarias blancas en la mitad basal, resto negro. Secundarias blancas. Cola blanca con banda terminal gris.
Plumaje nupcial.
Estriado oscuro en la cabeza y en el cuello. Barrado en dorsal. Ventral barrada y jaspeada.

COMPORTAMIENTO
Anda solitario o en pareja.

HÁBITAT
Costas marinas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Pico largo. Banda alar blanca.

Se diferencia del Pitotoy grande por tener diferente color de pico y manchas blancas en las alas, y de la Becasa de mar por la forma y color del pico.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Tringa semipalmata semipalmata (J. F. Gmelin, 1789) migratorio de Norteamérica. Observado en Jujuy, Córdoba, Buenos Aires, este de Chubut y Tierra del Fuego.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Nidifica en Norte América. En invierno boreal migra por la costa a Islas del Caribe, Centro América y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Tringa semipalmata semipalmata (Gmelin, 1789)

Buenos Aires
Citas: Argerich et al. (2011); Roesler et al. (2004); Jaramillo (2000); Straneck en Canevari et al. (1991b)

Chubut
Citas: Escudero et al. (2004)

Córdoba
Citas: Yzurieta (1995); Torres y Michelutti (2001a)

Jujuy
Observaciones: Moschione, F. (19-04-2011, Laguna del Cementerio, Informe 3/12)

Santa Fe
Citas: López-Lanús et al. (2013a)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Olrog (1979b)

PITOTOY CHICO *Tringa flavipes* (J. F. Gmelin, 1789)

Otros nombres: Batitú. Batitú chico. Becasina. Chorlaco de costa. Chorlito. Chorlito de costa. Chorlito patiamarillo. Chorlito pardo mayor. Chorlito zancudo. Chorlo chico. Chorlo de patas amarillas. Chorlo menor de patas amarillas. Chorlo patas amarillas chico. Chululú-í. Frailecillo. Patas amarillas menor. Pitotoy. Playero pata amarilla chico. Sacha pollito.

DESCRIPCIÓN
Largo: 25-28 cm.
Peso: Salvador (2014a): N= 3 (M) X= 88,2 g (Rango 86,0 a 91,3); N= 3 (H) X= 85,5 g (Rango 78,5 a 89,5); N= 2 (?) 83 y 87 g
Coloración. Pico negro. Patas amarillas. Iris pardo.
Plumaje de reposo sexual.
Frente, corona, cuello posterior y partes dorsales pardos grisáceos estriados de blanquecino. Supracaudales y garganta blancos. Pecho jaspeado de pardo. Resto de la ventral blanco.
Alas pardo grisáceas con las plumas marginadas de blanco. Cola blanca barrada de pardo.
Plumaje nupcial.

Similar al de reposo sexual pero con las partes dorsales más manchadas de blanco y negro y el pecho y flancos más jaspeados de pardo.



Esperanza. Santa Fe. 02-12-2007

COMPORTAMIENTO
Mueve la cabeza acompasadamente. Anda en bandadas, a veces solitario.

Alimentación
Aravena (1927). **Insectos:** Carábidos. Coccinélidos. Curculiónidos. Coleópteros (*Hidrochares medius*). Dípteros. Hemípteros.
Zotta (1940c). Coleópteros. Minerales.
Humphrey et al. (1970). Crustáceos,Peces, Larvas.
Martínez et al. (1975). **Insectos:**Insectos (larvas).**Moluscos:** (Gatropoda).
Bucher y Herrera (1981). **Insectos:** Dípteros (larvas acuáticas). Hemípteros (Corixidae). **Moluscos:** Caracoles acuáticos. **Vegetales:**Semillas.
Beltzer (1986b).**Insectos:** Coleoptera (Dytiscidae, Hydrophilidae, *Tropisternus* sp.). Hemípteros (Belostomidae, *Belostoma* sp.). **Moluscos:**Hydrobiidae, (*Littoridina parchappei*). **Peces.**
Beltzer (1991a).**Insectos:** Coleoptera (Dytiscidae, Hydrophilidae, *Tropisternus* sp.). Hemípteros (Belostomidae, *Belostoma* sp.).**Moluscos:**Hydrobiidae, (*Littoridina parchappei*). **Peces.**
Klimaitis (1993). Minerales.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Chrysomelidae, Dytiscidae, Hydrophilidae). Diptera (Culicidae: larvas). Hemiptera (Corixidae). Hymenoptera (Formicidae). Insectos (larvas acuáticas).Trichoptera (larvas). **Crustáceos:** Gammaridae: (*Gammarus* sp.). **Moluscos:** Hydrobiidae: (*Littoridina parchappei*). **Arácnidos:** arañas. **Vegetales**: Semillas.

HÁBITAT
Orillas del mar, de lagunas, bañados.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño mediano. Patas amarillas.
Se parece al Pitotoy grande pero difieren en el tamaño.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Tringa flavipes (Gmelin, 1789) migratorio del Ártico de Norteamérica. Llega por el interior y por la costa hasta Tierra del Fuego.Accidental en las Islas Malvinas.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en el Ártico de Norteamérica, desde donde migra durante el invierno boreal a toda América llegando en el sur hasta Tierra del Fuego.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Aravena (1927); Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Coconier (2005b); Dabbene (1918a, 1920d); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Filipello y López de Casenave (1993); Gibson (1920); Hartert y Venturi (1909); Isacch et al. (2006); Klimaitis (1975b); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Mérida y Bodtati (2006); Morici (2012b); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Straneck (1990b); Weller (1967a); Zapata (1998)

Catamarca
Citas: Barrionuevo et al. (2009a); Carma (2009)

Observaciones: De la Peña (Salinas Grandes, dpto. La Paz, 08-03-1981)

Chaco
Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b)

Observaciones: De la Peña (Presidente Roque Saens Peña, dpto. Cte. Fernández, 03-05-1988)

Chubut
Citas: Bradley et al. (1985); Camperi (1998); Dabbene (1920d); Darrieu y Camperi 2000 (2001); Harris (2008); Kovacs et al. (2005); Parera (1992); Sainz-Trápaga (2014)

Córdoba
Citas: Brandolín et al. (2007); Bucher y Herrera (1981); Dabbene (1920d); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores y Yzurieta (1980b); Osinaga Acosta et al. (2006); Salvador (1983a); Sferco y Nores (2003); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Miramar, dpto. San Justo, 09-12-2007)

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Cano et al. (2010); Chatellenaz et al. (2010); Dabbene (1920d); Contreras (1981b); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); Dabbene (1920d); Marateo et al. (2009); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Zapata (1975, 1977)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c, 1993b); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Gorleri et al. (2011); López Lanús (1997); Pujalte et al. (1995)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Caziani y Derlindati (2000); Chebez et al. (1993); Fiora (1939); Laredo (1996)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Bruno et al. (2007); Coconier (2005b); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Di Giacomo et al. (2005c); Maceda et al. (2001); Siegenthaler (1984, 2004); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006)

La Rioja
Citas: Bodrati y Ferrari (2014); Giacomelli (1923); Lobo Allende y Bortnyk (2013); Lobo Allende et al. (2014)

Jujuy
Citas: Budin (1931); Dabbene (1920d)

Mendoza
Citas: Aramburú (1983); Blendinger y Alvarez (2002); Contreras y Fernández (1980); Darrieu et al. (1989); Darrieu (2014); Leybold (1873a); Lucero (2013f); Martínez et al. (1997a); Olivera et al. (2009); Reed (1914, 1916); Roig (1965); Sosa (1993b, 2005); Steullet y Deautier (1939); Wetmore (1926)

Misiones
Citas: Chebez (1996a); Hellmayr y Conover (1948); Navas y Bó (1991a)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Contreras (1977b); Chehebar et al. (1992); Christie et al. (1988); De Valle et al. (1989); Eastman et al. (2005); Fiori y Zalba (1999); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005)

Observaciones: De la Peña (La Rinconada, dpto. Huiliches, 27-01-1976)

Río Negro
Citas: Contreras et al. (1980b); Christie et al. (2004); Daciuck (1977); Gelain (1984b, 2001, 2010, 2012b); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Paz Barreto (1997b); Pérez y Petracci (1998); Peters (1923b)

Salta
Citas: Coconier et al. (2007); Echevarría et al. (2014); Moschione et al. (2013)
San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i)

San Luis
Citas: Casares (1944b); Masramón (1983); Nellar Romanella (1993); Partridge (1953c)

Santa Cruz
Citas: Imberti (2005e); Imberti y Albrieu (2001); Zapata (1969)

Santa Fe
Citas: Beltzer (1986b, 1991a); Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f); Fandiño y Pautasso (2011); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Wilson (1926)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Observaciones: De la Peña (Argentina, dpto. Aguirre, 29-01-1977)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Humphrey et al. (1970); Olrog (1948)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch et al. (2011b); Dabbene (1920d); Lucero (1983); Echevarría et al. (1998, 2008c); Echevarría y Chani (1999, 2000, 2006); Echevarría (2014); Laredo y Vides-Almonacid (1999)

Islas Malvinas
Citas: Daguerre (1924b); Woods (2006)

AGACHONAS

FAMILIA: THINOCORIDAE

Aves de patas y cola cortas.

El nido es una simple depresión del suelo, en ocasiones cerca de algún coironal, pero también en zonas sin protección o en arenales vegetados lejos del agua.

Ponen 3 ó 4 huevos, piriformes, oliváceos o blanco crema con manchas pardas y canela oscuro, más concentradas en el polo mayor.

Sólo la hembra incuba, cuando dejan el nido cubren los huevos con pastos.

Se alimentan de granos e insectos.

Frecuentan praderas y estepas.

AGACHONA GRANDE *Attagis gayi* I. Geoffroy Saint-Hilaire & Lesson, 1831

Otros nombres: Agachona aperdigada. Agachona de la puna. Agachona de vientre rojizo. Chorlo aperdizado mayor. Chorlo perdiz. Colano. Colano de Simón. Corralera. Perdicita cordillerana. Perdigón. Perdiz cordillerana. Perdiz de la cordillera. Perdiz de la sierra. Perdiz real. Torrolón. Tortolón.

DESCRIPCIÓN
Largo: 27-30 cm.
Peso: Navas y Bó (2001): N= 1 (M) X= 297,5 g; N= 2 (H) X= 347,3 g y 402,9 g
Coloración. Pico y patas amarillentos. Iris pardo.
Cabeza y cuello dorsal grises cenicientos moteados y estriados de negro. Dorsal oscura con ondulaciones grises, canelas y ocres (aperdizada). Garganta gris blanquecina. Cuello anterior y pecho canelas pálidos con ondulaciones negras. Abdomen y subcaudales ocráceos canelas.
Alas pardas. Cubiertas alares negras jaspeadas de rojizo. Cola parda rojiza con barras negras.

COMPORTAMIENTO
Relativamente mansa. Coloración mimética. Vuelo rápido.

HÁBITAT
Estepas pedregosas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos y/o pichones en Mendoza y noroeste patagónico.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N											

Sosa (2005). Llancanelo, dpto. Malargüe, Mendoza. En enero se encontraron nidos en arenales vegetados lejos del agua.
Barros (1930). Río de las Vacas, Mendoza, dos pollos que empezaban a emplumar.

PICHONES
Christie et al. (2004). Pichones en enero en el noroeste patagónico, observados por S. Vellido.

Más información:
Goodall et al. (1951). Housse (1945)



IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Dorso "aperdizado". Ventral canela, sin blanco.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Attagis gayi simonsi Chubb, 1918 en el altiplano de Jujuy y *Attagis gayi gayi* I. Geoffroy Saint-Hilaire & Lesson, 1831entre los 3500 y los 4500 m de altura, en la Cordillera de los Andes desde Salta hasta Mendoza, y entre los 1000 y los 2000 m desde Neuquén a Santa Cruz.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Por la cordillera Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Attagis gayi simonsi Chubb, 1918

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009);Caziani y Derlindati (1999); Navas y Camperi (2005); Olrog (1963b, 1979b)

Attagis gayi gayi I. Geoffroy Saint-Hilaire y Lesson, 1831

Catamarca
Citas: Carma (2009); Esteban (1953); Navas y Bó (1996c); Navas y Camperi (2006); Nores (1995)

Chubut
Citas: Camperi (1998); Navas y Camperi (2005)

Jujuy
Citas: Budin (1931); Chebez et al. (1998); Laredo (1996); Navas y Bó (1996c); Navas y Camperi (2005)



La Rioja
Citas: Bodrati y Ferrari (2014); Chebez (2005b); Di Giácomo et al. (2007); Nores (1995); Lucero e Izasa (2015)

Mendoza
Citas: Barros (1930);Canevari et al (1998);Chubb (1918b);Darrieu (2014); Ferrer et al. (2011); Leybold (1873a); Navas y Camperi (2005); Olivera et al. (2009); Pereyra (1950a); Sanzín (1918); Sosa (1995d, 2005); Steullet y Deautier (19395); Reed (1916); Roig (1965); Wolffhuegel (1929)

Neuquén
Citas: Chebez et al. (1998); Christie et al. (1988); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Olrog (1979b); Pereyra (1945); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Camperi (1998); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Navas y Camperi (2005)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013); Navas y Bó (1996c); Navas y Camperi (2005); Nores (1995)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Moschione y Banchs (1992); Navas y Bó (2001); Navas y Camperi (2005)

Santa Cruz
Citas: Dabbene (1913); Di Giacomo et al. (2005c); Hellmayr (1932); Imberti (2005e); Scott y Sharpe (1910); Wetmore (1926a)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch et al. (2011b); Laredo y Vides-Almonacid (1999); Lucero (1983); Navas y Bó (1996c); Navas y Camperi (2005); Nores (1995)

AGACHONA PATAGÓNICA *Attagis malouinus* (Boddaert, 1783)

Otros nombres: Chorlo. Chorlo aperdizado del sur. Chorlo perdiz de la patagonia. Colano de la patagonia. Perdicita cordillerana austral. Perdiz. Perdiz cordillerana de vientre blanco. Perdiz patagónica. Toshti.

DESCRIPCIÓN
Largo: 27-29 cm.
Peso: Humphrey et al. (1970): N= 2 (M) 308 y 392 g; N= 4 (H) X: 327,2 g (Rango 308 a 350).
Coloración. Pico pardo. Patas grisáceas. Iris pardo claro.
Cabeza y cuello ocráceos con estrías y puntos negros. Cejas y lados de la cabeza grises blanquecinos. Dorsal parda oscura con ondulaciones ocres, castañas y blanquecinas. Garganta blanquecina. Anterior del cuello y pecho castaños con ondulaciones pardas oscuras y blanquecinas. Abdomen y subcaudales blancos.
Alas pardas. Cubiertas alares pardas oscuras, ribeteadas de blanco y con manchas rojizas.
Cola negruzca con barras pardas rojizas y fina punta blanquecina.

COMPORTAMIENTO
Es de vuelo rápido y sorpresivo.

Alimentación
Crawshay (1907). Semillas .Vegetales.
Humphrey et al. (1970). Semillas. Vegetales.

HÁBITAT
Estepas.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.



Más información:
Goodall et al. (1964)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Aspecto "aperdizado" pero con el abdomen blanco. Esto la diferencia de la Agachona grande.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Attagis malouinus (Boddaert, 1783) desde Neuquén, Río Negro hasta Tierra del Fuego y las Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Endémica de Argentina y Chile.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Neuquén
Citas: Contreras (1977b);Heredia y Funes (1987); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011); Hecker y Vidoz (1998); Wetmore (1926)

Santa Cruz
Citas: Darrieu et al. (2008); Di Giacomo et al. (2005c); Erize (1983); Imberti (2003, 2005e); Lange (1981); Navas y Bó (1996c); Salvadori (1900); Scott y Sharpe (1910); Steullet y Deautier (1939)

Observaciones: De la Peña (Río Gallegos, dpto. Güer Aike, 30-01-1974)

Tierra del Fuego
Citas: Castellanos (1935); Clark (1986); Earnshaw (1973); Humphrey et al. (1970); Olrog (1948); Reynolds (1934); Ripley (1950)

Islas Malvinas
Citas: Wace (1921); Woods (2006)

AGACHONA DE COLLAR *Thinocorus orbignyanus* I. Geoffroy Saint-Hilaire & Lesson, 1831

Otros nombres: Agachona mediana. Agachona de pecho gris. Chorlo agachón de las alturas. Chorlo aperdizado mediano. Chorlo Juancho. Cojón. Corral. Don Juancho. Guancho. Juancho. Pocoí. Perdicita. Perdicita cojón. Perdicita cojón del norte. Porotera. Puco-puco. Pucu pucu.

DESCRIPCIÓN
Largo: 19-24 cm.
Peso: Fiora (1933): N= 2 X= 112,5 g (Rango 110 a 115); Salvador (1988): N= 1 (H) 110,0 g; Navas y Bó (1997b): N= 6 (M) X: 121,9 g (Rango 106,8 a 131,3); N= 2 (H) 126,4 y 126,7 g.
Coloración. Pico amarillento con punta oscura. Patas amarillas. Iris pardo.
Macho. Frente gris. Cejas y auriculares grises con estrías negras. Nuca y posterior del cuello grisáceos. Resto de la parte dorsal pardo moteado de negro y ocre. Garganta bordeada por una franja negra que se une en el cuello. Lados de la cabeza, del cuello y el pecho, grises. El pecho está separado del abdomen por una línea negra. Abdomen y subcaudales blancos. Flancos con manchas pardas.

Alas pardas con las cubiertas ribeteadas de blanquecino y jaspeadas de negro. Cola parda oscura con las plumas ribeteadas de ocre.

Hembra.

Dorsal similar al macho. Lados de la cabeza, cuello y pecho ocres jaspeados de pardo. Este último separado del abdomen por una línea oscura.

Cola parda oscura con punta blanca y rayas ocres en las plumas centrales.

COMPORTAMIENTO

Es de vuelo rápido y sorpresivo.

Alimentación

Fiora (1939). Vegetales, arena, tierra.

Baldo y Ordano (1993).Semillas de *Mulhenbergia peruviana.*

Voces

Straneck (*in litt*.). En época de reproducción el macho hace un vuelo territorial, desde la madrugada, repitiendo continuamente una voz: Pucú.pucú.pucú.pucú.. o coop. coop.coop.coop.

HÁBITAT

Estepas, turbales.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos y/o pichones en Jujuy, Tucumán, Mendoza, Santa Cruz, Tierra del Fuego.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	N	N							N	N	

Depresión en el suelo recubierta con pastos y tallos.



Hartert y Venturi (1909). Budín en Cumbres Calchaquíes, dpto. Tafí Viejo, Tucumán, 3 huevos.

Maclean (1969b). Nidos en Santa Cruz y en Tierra del Fuego.

Contino (1980). Nidifica en la puna jujeña.

Laredo (1996). Laguna de Pozuelos, Jujuy, nido con 4 huevos.

Pereyra Lobos (2002). Nidifica en el Parque Nacional Aconcagua, Mendoza.

Huevos

Pone 4 huevos. Piriformes u ovoides, oliváceos con manchas pardas y canela oscuro.

Anónimo (1933): huevos colectados en Viamonte, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego, por T. L. y G. P. Bridges y P. W. Reynolds, en el Museo Nacional de Historia Natural.

PICHONES

Descripción

Salvador (2015). Iris café oscuro, patas amarillas y pico amarillo con caballete negruzco.

Peso: 72,5

Observaciones
Barros (1930). Cajón de las Vacas, Aconcagua, Mendoza, Marzo de 1922, pichón de 2-3 días de edad.
Fiora (1939). Laguna Colorada, Jujuy, 4.200 m, marzo de 1930, hembra con varios pichones
Humphrey et al. (1970). Reynold observó el 14-11-1928, pichones en Viamonte, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego.
Contino (1980). Jujuy, pichones recién nacidos a fines de febrero.
Salvador (2015). Aparzo, dpto. Humahuaca, Jujuy, 02-03-1983, una hembra con un pichón emplumado.

Más información:
Maclean (1969b). Goodall et al. (1951)

Depredadores
De adultos: *Falco peregrinus* (Peres y Peres 1985, Ellis et al. 2002)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
El macho por una línea negra en la garganta en forma de U y otra en el pecho. La hembra por el pecho jaspeado y una línea oscura en la base.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Thinocorus orbignyanus ingae Tschudi, 1843entre los 2700 y los 4000 m de altura en Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán hasta el noroeste de Mendoza y *Thinocorus orbignyanus orbignyanus*I. Geoffroy Saint-Hilaire & Lesson, 1831por el oeste desde Mendoza y Córdoba y en la llanura desde Río Negro hasta Tierra del Fuego e Isla de los Estados.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Se encuentra en los Andes de Perú, Bolivia, Chile y Argentina hasta Tierra del Fuego, entre 2.700 y 4.000 metros de altura en sus poblaciones del norte, llegando a la estepa patagónica en el sur.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Thinocorus orbignyanus ingae Tschudi, 1843

Catamarca
Citas: Brodkorb (1928); Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009); Nores (1995); Steullet y Deautier (1935-1946); Vides-Almonacid (1986)

Jujuy
Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Chebez et al. (1998); Fiora (1933, 1939); Salvador (1988, 2015); Straneck (1990f)



Mendoza
Citas: Barros (1930); Ferrer et al. (2011); Navas y Bó (1997b); Olivera et al. (2009); Pereyra Lobos (2002)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013); Nores (1995); Vides Almonacid (1990)

San Juan
Citas: Camperi y Darrieu (2004); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013i); Moschione y Banchs (1992); Navas y Bó (1997b); Nores (1995)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch et al. (2011b); Hartert y Venturi (1909); Laredo y Vides-Almonacid (1999); Lucero (1983); Nores (1995)

Thinocorus orbignyanus orbignyanus I. Geoffroy Saint-Hilaire & Lesson, 1831

Chubut
Citas: Vuilleumier (1993b)

Observaciones: De la Peña (Esquel, dpto. Futaleufú, 01-02-1976)

Córdoba
Citas: Baldo y Ordano (1993); Miatello et al. (1991-1994, 1993, 1999); Nores et al. (1983); Nores (1996)

La Rioja
Citas: Chebez (2005b); Di Giácomo et al. (2007); Giacomelli (1923); Lucero e Izasa (2015)

Mendoza
Citas: Barros (1930); Burmeister (1861); Calí et al. (2008); Darrieu (2014); Gosse (1899);Leybold (1873a); Navas y Bó (1997b); Pereyra (1950a); Pereyra Lobos (2002);Reed (1914, 1916); Roig (1965); Sanzín (1918); Wolffhuegel (1929)

Observaciones: De la Peña (Puente del Inca, dpto. Las Heras, 11-01-1982)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Chehebar et al. (1992); Contreras (1977b); Fiori y Zalba (1999); Gorgoglione (2005); Heredia y Funes (1987); Matarasso (2007); Pereyra (1945); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Gelain (2010, 2012b); Gelain y Tolosa (2011); González (1991); Llanos et al. (2011); Peters (1923b)

San Luis
Citas: Nellar Romanella (1993)

Santa Cruz
Citas: Brodkorb (1928); Darrieu et al. (2008); Di Giacomo et al. (2005c); Hellmayr y Conover (1948b); Imberti (2005e); Maclean (1969b); Scott y Sharpe (1910)

Observaciones: De la Peña (Comandante Piedrabuena, pdto. Corpen Aike,28-01-1972)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1984, 1986); Humphrey et al. (1970); Jehl y Rumboll (1976)

Islas Malvinas
Citas: Couve y Vidal (2003)

AGACHONA CHICA *Thinocorus rumicivorus* Eschscholtz, 1829

Otros nombres: Agachadera. Agachera. Agachona. Agachona común. Agachona de corbata. Agachona del Norte. Agachona del Sur. Agachona semillera patagónica. Boliviana. Canastita. Chorlito. Chorlo. Chorlo

agachón. Chorlo aperdizado menor. Chorlo perdiz. Corralera. Dormilona. Echadero. Petaquita. Perdicilla. Perdicita. Perdicita agachona. Perdicita común. Perdicita de la sierra. Perdicita del norte. Porotera.

DESCRIPCIÓN

Largo: 16-19 cm.

Peso: Humphrey et al. (1970): N= 5 (M) (Rango 56,0 a 85,0); Contreras (1975): N= 15 X= 53,1 g (Rango 48 a 59,9); Navas y Bó (1990); N= 1(M jov.) 57 g; N= 1(H) 73,3 g, N= 1 (M) 62,1 g; Christie et al. (2004): (M) 60,0 g; Salvador (2014a): N= 2 (M) 57,0 y 58,5 g; N= 2 (H) 54,8 y 61,0 g; Salvador y Di Giacomo (2014): N= 2 (M) 53, 3 y 57,0 g

Coloración. Pico pardusco. Patas amarillas. Iris pardo oscuro.

Macho. Dorsal y supracaudales pardas claras con las plumas ribeteadas de ocre. Garganta blanca.
A cada lado bajan dos franjas negras que se juntan y se ensanchan en el pecho. Lados del cuello y del pecho grises. Abdomen blanco.
Primarias pardas oscuras ribeteadas de blanco, secundarias pardas y blancas.
Cola con las plumas centrales pardas y ocres. Laterales pardas oscuras con puntas blancas.

Hembra. Se parece al macho pero tiene los lados del cuello y del pecho pardos ocráceos y sólo vestigios de las franjas negras del cuello y pecho.

COMPORTAMIENTO

Es relativamente mansa. Levanta vuelo sorpresivamente. Coloración del plumaje mimético con el ambiente.

Alimentación

Crawshay (1907). Semillas.
Marelli (1919). Granos. Vegetales.
Zotta (1934). Semillas. Vegetales. Piedritas.
Philippi et al. (1954). Semillas.
Olrog (1956a). Semillas.
Humphrey et al. (1970). Vegetales. Semillas.
Sérsic y Cocucci (1996). Pétalo de *Calceolaria uniflora*.
Aramburú et al. (2007). Semillas de *Anthemis cotula, Chenopodium* sp*., Hordeum* sp*., Melilotus* sp*., Panicum bergii, Panicum* sp*., Polygonum aviculare, Polygonum lapathifolium, Polygonum persicaria, Polygonum* sp*., Scirpus americanus, Scirpus* sp*., Setaria* sp*., Trifolium repens, Triticum* sp.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). Semillas de *Arachis hypogaea*, Gramíneas*Sorghum* sp*.,*restos de hojas. Arena.

Voces

Straneck (*in litt*.). En época de reproducción, el macho emite una voz silbada: Jutujutujutu... que suele finalizar con un gutural jurrrjurrrju..

HÁBITAT

Praderas y estepas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos y/o pichones en Catamarca, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N							N	N	N	N

Depresión en el suelo recubierta con pastos y tallos.



Uranga (*in litt.*). El Huecú, dpto. Ñorquín, Neuquén, 18-12-2007, nido con 4 huevos.
Peters (1923b). Maquinchao, 25 de Mayo, Río Negro, 20-12-1920, nido con huevos.
Belcher (1936). Pilcaniyeu, dpto. Pilcaniyeu, Río Negro, 05-12-1935, nido con 4 huevos. Entre los pastos, muy oculto. Los huevos enterrados con la punta hacia abajo y cubiertos de pajas.
Maclean (1969b). Nidos en Santa Cruz y en Tierra del Fuego.
Albrieu et al. (2004). Nidifica entre setiembre y febrero. El nido es una simple depresión del suelo, en ocasiones cerca de algún coironal, pero también en zonas sin protección.

Huevos
Pone 4 huevos. Ovoidales. De color crema con pintas pardas rojizas, grisáceas y violáceas, distribuidas por toda la supercifie, pero más concentradas en el polo mayor.

PICHONES
Descripción.
De la Peña (2013c). Pichón de 3-4 días de edad. Dorsal gris ocráceo punteado de negro. Ventral blanquecino.

Observaciones
Humphrey et al. (1970). Reynold, 17-01-1930, pichones en Viamonte, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego,
Jehl y Rumboll (1976). Río Grande. Estancia La Indiana, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego. El 25-01-1975, pichones.
Christie et al. (2004). Pichones en diciembre en el noroeste patagónico.
De la Peña (2013c). 25-01-1972. Puerto Deseado, dpto. Deseado, Santa Cruz. Pareja con 2 pichones; 30-01-1974. Río Gallegos, dpto. Güer Aike, Santa Cruz. Varias parejas con pichones; 08-11-1979. Puerto Deseado, dpto. Deseado, Santa Cruz. Pareja con 4 pichones; 28-11-2000. Península Valdés. Adulto con 1 pichón chico.
Salvador (2015). Paso San Francisco, dpto. Tinogasta, Catamarca, 05-03-2007, un hembra con un pichón.

Generalidades
Albrieu et al. (2004). Realizan cortejos característicos, elevándose 40-50 m para dejarse caer con las alas extendidas mientras vocalizan constantemente. Sólo la hembra incuba, cuando dejan el nido cubren los huevos con pastos.
Maclean (1969b). Período de incubación: 25 días.
Navas y Bó (1997b). Villavicencio, dpto. Las Heras, Mendoza, una hembra con huevo por poner y tres en formación.

Más información: Maclean (1969b)

Depredadores
De adultos: *Geranoaetus polyosoma* (Travaini et al. 2012); *Falco sparverius* (Santillán et al. 2009); *Falco peregrinus* (Peres y Peres 1985, Ellis et al. 2002, Santillán et al. 2010b)



Cercanías del Lago Strobel.Santa Cruz.07-02-2013
Foto: Mauro Bianchini



Cercanías del Lago Strobel.Santa Cruz.07-02-2013
Macho. Foto: Mauro Bianchini



El Huecú. Neuquén. 18-12-2007
Foto: Máximo Uranga



El Huecú. Neuquén. 18-12-2007
Foto: Máximo Uranga



Río Gallegos. Santa Cruz. 30-01-1974. Juvenil
Foto: Martín R. de la Peña



Río Gallegos. Santa Cruz. 30-01-1974. Juvenil
Foto: Martín R. de la Peña

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Coloración “aperdizada”. El macho tiene franjas a los lados de la garganta y collar negros. Abdomen blanco.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Thinocorus rumicivorus bolivianus Lowe, 1921 entre los 2.000 y los 3.000 m de altura en Jujuy, Salta y Tucumán hasta el noroeste de Mendoza; *Thinocorus rumicivorus rumicivorus* Eschscholtz, 1829 desde Neuquén y Río Negro hasta Tierra del Fuego. En invierno, hasta Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Observada además en Malvinas y Shetland del Sur.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cuatro subespecies. Se encuentra en áreas costeras de Perú, en los Andes más al sur en Bolivia, Chile y Argentina, entre 2.000 y 3.000 metros de altura. Continúa por el oeste de Argentina ocupando incluso la estepa patagónica en las provincias más sureñas.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Thinocorus rumicivorus bolivianus Lowe, 1921

Catamarca
Citas: Salvador (2015)

Observaciones: Bodrati, A. (*in litt*. 2012)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Laredo (1996); Olrog (1959c); Zotta (1936a)

Mendoza
Citas: Navas y Bó (1997b); Sosa (1993b)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Laredo y Vides-Almonacid (1999); Olrog (1949a)

Thinocorus rumicivorus rumicivorus Eschscholtz, 1829

Buenos Aires
Citas: Aramburú et al. (2007); Babarskas et al. (2003); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Delhey (1992); Fiameni (1994); Gibson (1920); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1927d, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Roesler (2001a); Salvador y Di Giacomo (2014)

Chubut
Citas: Boswall (1973); Camperi (1998); Darrieu y Camperi 2000 (2001); Harris (2008); Sainz-Trápaga (2014); Salvador y Di Giacomo (2014); Vuilleumier (1993b)

Observaciones: De la Peña (Península Valdés, dpto. Biedma, 26-11-1973)

Córdoba
Citas: Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Salvador (1983a); Volkmann y Cargnelutti (2001); Yzurieta (1995)

La Pampa
Citas: Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Pereyra (1937b); Siegenthaler (2004); Tejerina et al. (2006)

Mendoza
Citas: Darrieu (2014); Di Giácomo et al (2007); Lucero (2012b); Reed (1914, 1916); Roig (1965); Sosa (1993, 1995d, 2005); Wolffhuegel (1929)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Chehebar et al. (1992); Christie et al. (1988); Christie et al. (2004); Contreras (1975, 1977b); Daciuk (1983a); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Pereyra (1945); Steulliet y Deautier (1939); Veiga et al. (2005); Wetmore (1926b); Yepes (1939)

Río Negro
Citas: Belcher (1936); Bettinelli y Chebez (1986); Camperi (1998); Casas (1992a); Contreras (1975); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Gelain (1984b, 2001, 2012b); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Navas y Bó (1990); Paz Barreto (1997b); Peters (1923b)

Observaciones: De la Peña (Ñorquinco, dpto. Ñorquinco, 04-02-1976)

San Luis
Citas: Nellar Romanella (1993)

Santa Cruz
Citas: Albrieu et al. (2004); Daciuk (1977b); Darrieu et al. (2008); De la Peña (2013c); De Lucca y Saggese (1992); Di Giacomo et al. (2005c); Edelaar et al. (2005a); Erize (1983); Hellmayr y Conover (1948b); Iglesias y Pérez (1998); Imberti (2005e); Imberti y Albrieu (2001); Lange (1981); Maclean (1969b); Oustalet (1891); Peri (2013); Reichenow (1920); Scott y Sharpe (1910); Steullet y Deautier (1939); Straneck (1990a); Travaini et al. (2004); Wetmore (1926a); Zapata (1969)

Observaciones: De la Peña (Río Gallegos, dpto. Güer Aike, 26-01-1972)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2011f); Manassero et al. (2006); Wilson (1926)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Earnshaw (1973); Humphrey et al. (1970); Jehl y Rumboll (1976); Kovacs et al. (2005); Olrog (1948)

Tucumán
Citas: Lucero (1983)

Islas Malvinas
Citas: Woods (2006)

Shetland del Sur
Citas: Favero y Silva (1999)

JACANA

FAMILIA: JACANIDAE

Aves acuáticas. Tienen los dedos largos. Escudete en la frente.

Construyen el nido en esteros, bañados. Deposita los huevos sobre plantas acuáticas flotantes.

Es expuesto. Rudimentario o poco elaborado. En algunos nidos aporta algunas hojas, notándose un engrosamiento del lugar donde deposita los huevos.

Ponen 4 huevos, raro 5. Ovoidales. De color pardo amarillento u ocre con líneas negras, distribuidas por toda la superficie. Son de cáscara brillante.

Se alimentan de pequeños caracoles, semillas, vermes y de otros animales acuáticos.

Frecuentan lagunas, esteros y bañados.

JACANA *Jacana jacana* (Linnaeus, 1766)

Otros Nombres: Aguapeazó. Alas amarillas. Burrito. Canasta. Canastica. Canastita. Cocha polla. Gallareta. Gallineta. Gallinita. Gallito. Gallito del agua. Gallito de la isla. Pollonita. Sacha pollito. Yacana.

DESCRIPCIÓN
Largo: 21-25 cm
Peso: Contreras (1979f): N= 2 (M) 75 y 106,5 g: N= 2 (H) 132 y 144 g; Salvador y Di Giacomo (2014): N= 2 81 y 98 g
Coloración. Pico amarillo con escudete frontal rojo. Patas oliváceas. Iris pardo amarillento.
Cabeza, cuello, pecho y vientre negros. Dorso castaño.
Escapulares y cubiertas alares castañas. Primarias y secundarias amarillas verdosas con punta de las plumas y parte de la lámina externa de las primarias, pardas. Espolón rojo.
Cola castaña con punta negra.
Juvenil. Corona parda rojiza. Cejas ocráceas. Posterior del cuello pardo oscuro. Garganta, cuello y vientre blancos. Pecho blanco amarillento. Dorso y cola pardos. Rabadilla castaña. Alas como el adulto.

COMPORTAMIENTO
Anda solitario, en pareja o formando grupos, a veces de adultos y juveniles. Camina sobre la vegetación acuática.

Alimentación
Marelli (1919). Insectos. Vegetales.
Fiora (1939). Semillas, piedritas, lentejas de agua.
Zotta (1934). **Insectos:** Coleópteros (Curculionidae, Chrysomelidae, Scarabaeidae). Dípteros. Hemípteros (*Zaita* sp.). Hemípteros. Ortópteros. **Moluscos:** (*Planorbis kermatoides*) (Potamolithus) (*Ampullaria*). Caracoles (*Littoridina piscium*). **Vegetales:** Semillas. **Otros:** Limo. Piedritas. Arena.
Zotta (1940c). Coleópteros. Vegetales. Minerales.
Beltzer y Paporello (1984). **Insectos:** Coleoptera(Dysticidae, *Desmopachria* sp.). (Noteridae, *Hydrocanthus* sp.) (Hydrophillidae, *Tropsternus* sp.). (Curculionidae, *Neochetina* sp.). (Elateridae). (Elmidae, Carabidae). Decapoda (Trichoda, *Trichodactylus borellianus*). Diptera (Chidonomidae, Culicidae). Ephemeroptera. Hemípteros (Corixidae, Pleidae*, Neoplea* sp.). Hemíptero (Belostomidae, *Belostoma micantulum*).

Hymenoptera. Lepidoptera. Caenidae (*Caenis* sp.). Odonata (Anisoptera, Zygoptera). Ortoptera. Polimitarcidae (*Campsurus sp.*). **Vegetales:**Semillas de *Acacia caven*,*Echinochloa* sp.,*Eichhornia crassipes*, *Hydrocotyle ranunculoides*, *Panicum* sp., *Paspalum repens, Plantago* sp*., Polygonum* sp.**Otros:** Amphipoda (Hyalellidae*, Hyalella curvispina*). **Peces:** *Holoshesthes pequira***Moluscos:** (Ampullaridae, *Ampullaria* sp*. Marisa* sp.) (Hidrobidae, *Biomphalaris sp., Littoridina* sp*., Piscidium* sp.)

Voces
Straneck (*in litt*.). Suele repetir una voz nasal: Weth, whet, whet, mientras despliega las alas.

HÁBITAT
Lagunas, esteros, bañados.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos y/o pichones en Salta, Tucumán, Chaco, Formosa, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N							N	N	N	N

En esteros, bañados. Deposita los huevos sobre plantas acuáticas flotantes
Expuesto. Rudimentario o poco elaborado. En algunos nidos aporta algunas hojas, notándose un engrosamiento del lugar donde deposita los huevos.

Rumboll (*in litt*.) a S. Salvador, Presidente de la Plaza, dpto. Presidente de la Plaza, Chaco, 24-19-1972, 2 huevos.
Contino (Instituto Miguel Lillo). Salta, 17-09-1973, 2 huevos.
Salvador y Salvador (en prep.). Dpto. San Martín, Córdoba, 9 nidos entre setiembre y febrero, sobre repollitos del agua y otras plantas acuáticas, posturas de 3 a 4 huevos.
Salvador, Narosky y Fraga (*in litt*.). Intiyaco, dpto. Vera, Santa Fe, 13-12-1982, 3 nidos sobre repollitos del agua, con 3, 3 y 4 huevos; Haumonía, dpto. Tapenagá, Chaco, 16-12-1982, un nido sobre repollitos del agua con 4 huevos incubados.
Salvador (*in litt*.). Parque Nacional Iguazú, dpto. Iguazú, Misiones, 19-10-1984, un nido sobre repollitos del agua con 3 huevos. Isla Colastiné, dpto. La Capital, Santa Fe, 11-12-1988, un nido sobre repillitos del agua con 3 huevos incubador; Ituzaingó, dpto. Ituzaingó, Corrientes, 13-12 1988, dos nidos sobre repollitos del agua, en un bañado junto a un camino, ambos con 3 huevos.
Girard (Instituto Miguel Lillo). Manchalá, dpto. Leales, Tucumán, 4 huevos; 04-02-1932, 2 nidos con 4 huevos cada uno.
Daguerre (1922). Rosas, pdo. Las Flores, Buenos Aires, nidifica en la zona.
Smyth (1927). Manchalá, dpto. Leales, Tucumán, 17-12-1920, 3 huevos.
Pereyra (1932c)**.** Zelaya, río Luján, pdo. Luján, Buenos Aires, nidos en diciembre de 1931.
Pereyra (1938b). Provincia de Buenos Aires. Pone 4 huevos.
Contino (1980). Nidos en el noroeste.
Blendinger (1986). Parque Nacional El Rey, dpto. Anta, Salta, 15-01-1985, 4 huevos.
Narosky y Lozzia (1988). Reserva El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, 10 al 14-09-1987, nido con 4 huevos.
Babarskas, M. et al. (2003). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, nido en noviembre.



Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa. Se localizaron 25 nidos. Nidifica principalmente desde setiembre a mayo. Los huevos son puestos sobre Repollitos de agua.. En algunos casos construye una plataforma simple amontonando materiales vegetales.
De la Peña (2013c). Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 15 nidos: 24-11-1971, 4 huevos; 26-01-1987, 4 huevos, 28-10-1989, 2 huevos y 2 pichones; 22-12-1989, 3 huevos; 03-01-1990, 4 huevos; 12-01-1990, 4 huevos; 11-12-1992, 3 huevos; 25-11-1994, 4 huevos; 21-12-1994, 2 huevos y 3 huevos; 07-12-1996, un huevo; 20-01-1998, 4 huevos; 07-12-2001, 3 huevos; 21-10-2002, 4 huevos y 4 huevos; Aguará Grande, dpto. San Cristóbal, Santa Fe, 4 nidos: 01-11-1973, 3 huevos; 15-11-1975, 4 huevos; 22-11-1975, 4 huevos; 03-01-1997, 3 huevos; Candioti, dpto. La Capital, Santa Fe, 11-01-1979, 2 huevos; Cayastacito, dpto. San Justo, Santa Fe, 05-12-1983, 3 huevos; Campo Andino, dpto. La Capital, Santa Fe, 2 nidos: 27-01-1987, 4 huevos y 4 huevos; Cañada Ombú, dpto. General Obligado, Santa Fe, 08-11-1989, 3 huevos; Villa Guillermina, dpto. General Obligado, Santa Fe, 09-11-1989, 2 huevos; Cacique Ariacaiquín, dpto. San Javier, Santa Fe, 08-10-1992, 4 huevos; El Laurel, dpto. Garay, Santa Fe, 02-12-1991, 4 huevos; Río Salado y Ruta 4, dpto. La Capital, Santa Fe, 31-01-1993; 4 huevos; Cayastá, dpto. Garay, Santa Fe, 2 nidos: 23-10-1995, 4 huevos y 4 huevos, Villa Ocampo, dpto. General Obligado, Santa Fe, 27-11-1995, 4 huevos; Villa Roda, dpto. La Capital, Santa Fe, 6 nidos: 13-01-2001, 4 huevos; 28-12-2001, 4 huevos; 14-12-2011, 4 huevos y 3 huevos; 12-12-2012, 4 huevos; 20-01-2013, 4 huevos.
Segura et al (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 1 nido.

Huevos
Pone 4 huevos, raramente 5. Ovoidales. De color pardo amarillento u ocre con líneas negras distribuidas por toda la superficie. Cáscara brillante.

Medidas
Salvador y Salvador (en prep.): 28,6 a 31,7 x 21,8 a 23,9 X= 30,1 x 22,9 (N= 24)
Salvador, Narosky y Fraga (*in litt*.): 28,6 a 31,5 x 21,9 a 23,7 X= 29,6 x 22,8 (N= 10)
Salvador (*in litt*.): 28,4 a 30,8 x 22,0 a 23,4 X= 30,1 x 22,2 (N= 6)
Salvador (*in litt*.): 30,5 a 31,6 x 22,7 a 23,3 X= 30,9 x 22,9 (N= 6)
Hartert y Venturi (1909): 28 a 32 x 21 a 23
Smyth (1927): 30 a 31,5 x 23 a 23,5
Contino (1980): 31 x 24
Blendinguer (1986) : 30,8 a 33,1 x 21,9 a 22,6 X= 31,4 x 22,1 (N= 4)
Di Giacomo (2005h): 27,8 a 30,3 x 22,0 a 23,3 X= 29,3 x 22,5 (N= 15)
De la Peña (2013c): 28,8 a 31 x 21,8 a 23 X= 29,6 x 22,4 (N= 17)



Pesos
Salvador y Salvador (en prep.): 8,1 a 11,5 X= 9,4 (N= 17)
Salvador, Narosky y Fraga (*in litt*.): 8,1 a 9,5 X= 8,6 (N= 10)
Di Giacomo (2005h): 5,5 a 8,1 X= 7,2 (N= 15)
De la Peña (2013c): 7,64 a 8,15 X= 7,90 (N= 3)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,435 a 0,550 X= 0,520 (N= 12)

Un huevo localizado el 11-01-79 en Candioti, era blanco con pocas manchas castañas y grises, en el polo mayor. La cáscara pesó 0,284 grs y no se la tiene en cuenta para los promedios.

PICHONES
Descripción
De la Peña (2013c). Pichón de 1-2días.
Pico claro. Dorsal franjas pardas y canelas. Corona canela. Línea ocular oscura. Ventralmente blanquecino.

Observaciones

Contino (1980). Pichones desde diciembre a marzo en el noroeste.
Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa. Se observaron pichones pequeños en junio, julio y agosto.
De la Peña (2013c). Aguará Grande, dpto. San Cristóbal, Santa Fe, 22-11-1975, pareja con 3 pichones y otra con 4; 27-01-1987, Campo Andino, dpto. La Capital, Santa Fe, pareja con 3 pichones y otra con 4; Llambi Campbell, dpto. La Capital, Santa Fe, 27-01-1987, pareja con 3 pichones; Calchaquí, dpto. Vera, Santa Fe, 18-03-1988, Adulto con 3 pichones; Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 11-01-1989, pareja con 3 pichones; Esperanza, 28-01-1989, adulto con 3 pichones y otro con 4; Esperanza, 23-04-1989, pareja con 3 pichones; Cayastá, Cayastá, dpto. Garay, Santa Fe, 02-12-1989, adulto con 4 pichones; Esperanza, 07-01-1990, pareja con 3 pichones; Cayastá, dpto. Garay, Santa Fe, 15-12-1990, adulto con 2 pichones; Esperanza, 18-12-1990, dos adultos con 4 pichones cada uno; El Laurel, dpto. Garay, Santa Fe, 02-12-1991, adulto con 3 pichones; Villa Roda, dpto. La Capital, Santa Fe, 26-11-1991, pareja con 2 pichones; Yeso Oeste, dpto. La Paz, Entre Ríos, 06-12-1991, pareja con un pichón; Esperanza, 08-02-1992, 4 adultos con 1, 2, 4 y 5 pichones cada uno; Esperanza, 11-12-1992, adulto con 2 pichones; Esperanza, 07-12-1996, pareja con 3 pichones; Villa Roda, dpto. La Capital, Santa Fe, 20-11-2001, adulto con 4 pichones; Río Salado y Ruta 4, dpto. La Capital, Santa Fe, adultos con 3,4 y 4 pichores.


Generalidades
De la Peña (2013c). Período de incubación, de 23 a 25 días. Pone en días alternos; Di Giacomo (2005h). 26 días.
De la Peña (2013c). Una cópula duró un minuto.
Cuando están con los pichones, ante la presencia de un extraño, realizan ceremonias de distracción. Estas consisten en simular estar heridos, abren las alas, se agachan y aletean, emitiendo fuertes y chillonas voces. En ese imomento los pichones se ocultan entre la vegetación o se sumergen, dejando solamente el pico fuera del agua. Cuando desaparece el peligro, los padres con voces de llamado los reúnen nuevamente.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Cabeza y cuello, negros. Alas amarillentas. Patas y dedos largos. Camina sobre la vegetación acuática. El grito.

Depredadores
De adultos: *Eunectes notaeus* (Waller et al. 2007); *Bubo virginianus* (Di Giacomo 2005h); *Falcoperegrinus* (Notarnicola y Seipke 2004); de juveniles: *Circus buffoni* (Beltzer et al. 2001).


Esperanza. Santa Fe. 27-10-2005


Candioti. Santa Fe. 11-01-1979



Esperanza. Santa Fe. 25-01-2012



Esperanza. Santa Fe. 25-01-2012. Juvenil



Esperanza. Santa Fe. 20-12-2011



Esperanza. Santa Fe. 30-11-2011



Llambi Campbell. Santa Fe. 27-01-1987




Llambi Campbell. Santa Fe. 27-01-1987



Villa Roda. Santa Fe. 13-12-2012. Alarma




Villa Roda.Santa Fe. 24-01-2013



Villa Roda. Santa Fe. 25-01-2013. Irritado



Villa Roda. Santa Fe. 29-01-2013. Pichones protegidos



Villa Roda. Santa Fe. 31-01-2013.Adulto y pichones



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Jacana jacana jacana (Linnaeus, 1766) desde el norte del país hasta San Luis, Córdoba y Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Seis subespecies. Su distribución geográfica se extiende desde Panamá a Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Jacana jacana jacana (Linnaeus, 1766)

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Dabbene (1918a); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Fiameni (1994); Filipello y López de Casenave (1993); Gibson (1920): Hartert y Venturi (1909); Klimaitis (1975b); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); López de Casenave y Filipello (1995); Mérida y Bodtati (2006); Morici (2012b); Myers y Myers (1979); Narosky (1983b); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1932c, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Renard (1920); Weller (1967a); White (1882)

Catamarca
Citas: Barrionuevo et al. (2009a); Carma (2009)

Chaco
Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004)
Observaciones: De la Peña (Basail, dpto. San Fernando, 26-08-1987)

Córdoba
Citas: Heredia (2006); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores y Yzurieta (1980b); Salvador (1983a); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Santa Catalina, dpto. Totoral, 05-02-1975)

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b); Fraga (2001b);Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Marelli (1918); Ordano et al. (2008)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Baliño y Biole (1984); Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b); Hartert y Venturi (1909); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2002); Muzzachiodi et al. (2003); Peltzer (1998); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Zapata (1975, 1977)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c);Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Gorleri et al. (2011); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995); Wetmore (1926)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Fiora (1939); Moschione y Segovia (2005)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); De la Peña y Tittarelli (2011); Siegenthaler (1984)

La Rioja
Citas: Giacomelli (1923); Hayward (1967); Lucero e Izasa (2015)

Mendoza
Citas: Lías (2008); Roig (1965); Sosa (2004)

Misiones
Citas: Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014)

Neuquén
Observaciones:Horacio Matarasso (*in litt*.) en Tromen (2013)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Camperi (1990); Coconier et al. (2007); Echevarría et al. (2014); Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Camperi y Darrieu (2004); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Herrera et al. (2013); Ortiz y Murúa (1994)

San Luis
Citas: Masramón (1983); Nellar Romanella (1993)

Santa Fe
Citas: Beltzer (1986c); Beltzer et al. (2003-2004); Beltzer y Paporello de Amsler (1984); Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Quiroga y Hadad (2004); Straneck (1990e); Wilson (1926)

Santiago del Estero
Citas: Hartert y Venturi (1909); Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996, 1998, 2000); Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Echevarría et al. (2008c); Handford (1983); Laredo y Vides-Almonacid (1999); Lucero (1983); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz y Aráoz (2014); Vides Almonacid (1993)

AGUATERO

FAMILIA: ROSTRATULIDAE

Aves acuáticas. El pico es largo y curvo.

Se alimentan de insectos, larvas y crustáceos.

Frecuentan esteros, bañados y espartillares cubiertos de agua.

Construyen el nido en el suelo, entre pastos. Plataforma plana de pastos. A veces entremezclados con barro. Entre pastos, cerca de campo inundado o lejos del agua.

Pone 2 huevos. Ovoidales. De color ocre o crema con pintas y manchitas castañas, pardas y grises, cubriendo toda la superficie.

AGUATERO *Nycticryphes semicollaris* (Vieillot, 1816)

Otros nombres: Agachona. Becasina chica. Becasina falsa. Becasina pico curvo. Becasina pintada. Carcarén. Carrerito. Chorlito cabeza y cuello oscuros. Chorlito gola oscura y blanca. Chorlo pintado. Dormilón.

DESCRIPCIÓN
Largo: 19-23 cm.
Peso: Salvador (2014a): N= 4 (M) X= 72,4 g (Rango 68,6 a 77,2); N= 1 (H) 73,8 g
Coloración. Pico curvo hacia abajo, verde claro con base amarilla. Patas verdes. Iris pardo.
Cabeza negra con una banda central blanca hasta la nuca. Finas cejas blanquecinas. Cuello y pecho pardos oscuros. Dos bandas a los lados del pecho que continúan hacia el dorso en una línea canela. Resto de lo ventral blanco. Dorso pardo grisáceo. Supracaudales ocráceas vermiculadas de pardo. Alas grises oscuras con lunares blancos y estrías y franjas castañas. Cola canela vermiculada de pardo.

COMPORTAMIENTO
Levanta vuelo sorpresivamente. A veces se "aplasta" contra el suelo, a pocos metros del observador. Es de vuelo silencioso.

Alimentación
Marelli (1919). **Moluscos:** (*Planorbis*). Peces. Vegetales.
Zotta (1934). **Moluscos:** (*Planorbis*) (*Ampullaria canaliculata*). Vegetales. Frutos.
Klimaitis (1993). Coleópteros. Piedritas. Semillas.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Curculionidae, no identificado). Hemiptera (Belostomatidae). Lepidoptera (orugas). **Moluscos:** (Hydrobiidae: *Littoridina parchapei,* Planorbidae: *Biomphalaria* sp.). **Vegetales:** Semillas (*Scirpus* sp.). Semillas (gramíneas). **Anélidos:** (Hirudinidae: sanguijuelas).

HÁBITAT
Bañados.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N				N			N	N	N	N	N



En el suelo, entre pastos. Plataforma plana de pastos. A veces entremezclados con barro.
Expuesto. Poco elaborado.

Nores (*in litt*.) a S. Salvador, Ucacha, dpto. Juárez Celmanm, Córdoba, 16-08-1976, 2 nidos con 2 huevos cada uno.
Salvador y Salvador (en prep.). Dpto. San Martín, Cordoba, 4 nidos en agosto, diciembre y enero, todos en matas de *Distichlis* sp. postura 2 huevos.
Wetmore (1926). Gral Lavalle, pdo. General Lavalle, Buenos Aires, 02-11-1920, nido con 2 huevos.
Smyth (1927). Cacharí, pdo. Azul, Buenos Aires, 13-11-1916, 2 huevos; 05-11-1924, 2 huevos.
Pereyra (1938b). Provincia de Buenos Aires. Construye el nido sobre las gramíneas, en las orillas de arroyos o lugares con agua. Desde junio a octubre.
Olrog (1965b). Bañado de Figueroa, dpto. Figueroa, Santiago del Estero, 26-05-1963, huevos.
Rumboll (1967). Cañada de las Víboras, dpto. 9 de Julio, Santa Fe, 04-08-1966, nido con 2 huevos.
De la Peña (2013c). Cayastacito, dpto. San Justo, Santa Fe, 29-10-1975, 2 huevos; Candioti, dpto. La Capital, Santa Fe, 08-01-1979, 2 huevos.
Medidas promedios de los nidos: diámetro total: de 9 a 10 cm, alto: 2 cm.
Segura et al (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 11 nidos.

Huevos
Pone 2 huevos. Ovoidales. De color ocre o crema con pintas y manchitas castañas, pardas y grises, cubriendo toda la superficie.



Medidas
Salvador y Salvador (en prep.): 30,6 a 34,6 x 22,8 a 24,4 X= 33,1 x 23,5 (N= 6)
Hartert y Venturi (1909): 34 a 37 x 23 a 34,5
Gibson (1920): 35 a 37 x 24
Wetmore (1926): 34,2 a 34,7 x 24,0 a 24,6 X= 34,4 x 24,3 (N= 2)
Smyth (1927): 33 a 33,5 x 24
Pereyra (1938b): 35 x 25
De la Peña (2013c): 33,4 a 35,9 x 23,7 a 24 X= 34,6 x 23,8 (N= 4)

Pesos
Salvador y Salvador (en prep.): 9,8 a 11,5 X= 10,1 (N= 6)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,650 a 0,733 X= 0,701 (N= 4)

PICHONES
Descripción
Pereyra (1938b). El pichón tiene plumón castaño grisáceo con la banda de la cabeza negra y rojiza por la nuca ; otras dos bandas desde el ojo por al costado del cuello y otras dos más que bajan del pico son paralelas a las anteriores, continúan má anchas por todo lo superior del cuerpo hasta la cola, bajando a los costados de las alas, todas ellas son negras y negras rojizas. Pico y patas negros.

Depredadores
De adultos: *Falco peregrinus* (Galmes et al. 2008b)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Lunares blancos en las alas. Bandas blancas en los costados del pecho. Pico largo, curvo en la punta.


Candioti. Santa Fe. 08-01-1979



Esperanza. Santa Fe. 11-08-2003

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Nycticryphes semicollaris (Vieillot, 1816) desde el norte del país hasta Chubut.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Ambientes acuáticos poco profundos en sureste de Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Aravena (1927); Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Fiameni (1994); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis (1975b, 1993); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Mérida y Bodtati (2006); Morici (2012b); Myers y Myers (1979); Narosky y Di Giacomo (1993); Narosky y Fiameni (1986); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1927d, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Weller (1967a)



Catamarca
Citas: Barrionuevo et al. (2009a); Carma (2009)

Chaco
Citas: Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b)

Chubut
Citas: Harris (2008); Kovacs et al. (2005); Navas (1994); Pereyra (1923a); Sainz-Trápaga (2014)

Córdoba
Citas: Brandolín et al. (2007); Bucher y Herrera (1981); Nores et al. (1983); Nores y Yzurieta (1980b); Osinaga Acosta et al. (2006); Salvador (1983a); Yzurieta (1995)

Corrientes
Citas: Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b); Giraudo et al. (2006)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); De la Peña (2012b); Muzzachiodi (2001a, 2001b); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923)

Formosa
Citas: Contreras (1987c);Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Gorleri et al. (2011); López Lanús (1997); Pujalte et al. (1995)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009) Camperi et al. (2012)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Galmes et al. (2008b); Siegenthaler (2004); Tejerina et al. (2006)

La Rioja
Citas: Giacomelli (1923)

Mendoza
Citas: Blendinger y Alvarez (2002); Calí et al. (2008); Contreras y Fernández (1980); Darrieu (2014); Leybold (1873a); Lucero (2013f); Reed (1914, 1916); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (1995d, 2005)

Neuquén
Citas: Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Navas (1994); Pereyra (1945); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Gelain (2012b); Gelain y Tolosa (2011); Peters (1923b); Piacentini et al. (2003)

Salta
Citas: Coconier et al. (2007) ; Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i); Reggio y de la Orden (1997)

San Luis
Citas: Masramón (1983); Nellar Romanella (1993)

Santa Fe
Citas: Bollero y Ramírez (2012);De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Giai (1950); Höhn (1975); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Quiroga y Hadad (2004); Wilson (1926)

Santiago del Estero
Citas: Meneguax (1925); Nores et al. (1991); Olrog (1965b)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996); Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Hartert y Venturi (1909); Laredo y Vides-Almonacid (1999); Lucero (1983); Ortiz y Ruiz (2011)

Islas Malvinas
Citas: Wace (1921)

ESCÚAS Y SALTEADORES

FAMILIA: STERCORARIIDAE

Aves marinas de pico grueso. Patas palmeadas.

Persiguen a otras aves para hacerles vomitar y luego tomar el alimento que llevan. También se alimentan de pichones de otras aves, de cadáveres de elefantes o de lobos marinos.

Nidifican solitariamente o en colonia con nidos dispersos

En el suelo arenoso o entre piedras.

Expuesto. Poco elaborado. Ligera excavación, sin materiales.

Ponen 1 ó 2 huevos.

ESCÚA COMÚN *Stercorarius chilensis* Bonaparte, 1857

Otros nombres: Gaviota acanelada. Gaviota asesina. Gaviota parda común. Gran skúa. Págalo grande. Skúa común.

DESCRIPCIÓN
Largo: 53-59 cm.
Peso: Zapata (1967): N= 1 (H) 1500 g; Humphrey et al. (1970): N= 2 (M) 1193 a 1224,5 g; N= 2 (H) 1433 a 1527 g.
Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo oscuro.
Dorsal parda con estrías delgadas blanquecinas en el cuello y castañas hacia el dorso. Garganta canela, cuello pardo con suave estriado amarillento. Pecho y abdomen pardos claros y canelas rojizos.
Alas pardas oscuras con notable mancha blanca en la base de las primarias.
Cola parda, corta, con forma de cuña.

COMPORTAMIENTO
Se lanza a gran velocidad sobre otras aves para que suelten las presas. Realiza vuelos rasantes sobre los intrusos que se aproximan a los nidos. Cuando está posada suele levantar ambas alas.

Alimentación
Orgeira (1995b). Krill, Lampreas, omnívoro.
Albrieu et al. (2004). Aves (pichones). Huevos. Carroña. Invertebrados. Peces. Regurgitados.
De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). Aves (pichones). Huevos.

Voces
Straneck (*in litt*.) Emite una áspera voz: Kiee.kieekieekieeh..

HÁBITAT
Costas marinas, islotes.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Chubut (desde el Golfo San Jorge), Santa Cruz, Tierra del Fuego.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	

Nidifica solitariamente o en colonia con nidos dispersos
En el suelo arenoso o entre piedras.
Expuesto. Poco elaborado. Ligera excavación, sin materiales.



Shipton (Instituto Miguel Lillo). Río Gallego, dpto. Güer Aike, Santa Cruz, 18-11-1914, un huevo.
Olrog (1948). Nidos en enero, cerca de Ushuaia, dpto. Ushuaia, Tierra del Fuego.
Punta (1989). Isla Viana Mayor, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, mediados de 1980, nidos.
Gandini y Frere (1998). Isla de los Pájaros, Isla Pingüino, Punta Medanosa, dpto. Deseado, Santa Cruz, 1990-1995, nidificando.
Frere y Gandini (1998). Isla Leones, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 1990-1995, nidificando.
Schiavini et al. (1998). Islas Becasses, Isla Martillo, Isla Despard, Islote Lucas Mayor, Islote Lucas Este, Islote Willie Mayor, Islote Bertha Este, Isla H, Isla Bridges, Isla Reynolds, Isla Leeloom, dpto. Ushuaia, Tierra del fuego, 1990-1995, nidificando.
Albrieu et al. (2004). Isla Deseada, dpto. Güer Aike, Santa Cruz, nidifican entre setiembre y noviembre.

Huevos
Pone 1 ó 2 huevos. Ovoidal. De color oliváceo con pintas y manchas castañas, pardas y grises.

Medidas
Goodall et al. (1951): 67 a 72 x 48 a 51

Más información:
Yorio (2005)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Coloración general parda con mancha blanca en las alas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Stercorarius chilensis Bonaparte, 1857 nidifica en costas e islotes de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Islas Malvinas. En otoño migra hacia el norte. Observado en el río Uruguay y en Isla Victoria (Río Negro).

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en costas de Chile y Argentina. En otoño migra al norte



CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Darrieu y Camperi (2001a); Hartert y Venturi (1909); Isacch y Chiurla (1997); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b)



Chubut
Citas: Albrieu et al. (2004); Boswall (1973); Daciuk (1977b); De la Peña (2013c); Kovacs et al. (2005); Lucero (1982); Sainz-Trápaga (2014)

Observaciones: De la Peña (Camarones, dpto. F. Ameghino, 01-02-1974)

Entre Ríos
Citas: Klimaitis (1977b)

Neuquén
Citas: Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Christie et al. (2004); Gelain (2001); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Paz et al. (2004)

Santa Cruz
Citas: Coconier (2005b); Darrieu et al. (2008); Gandini y Frere (1998b); Hellmayr y Conover (1948b); Murphy (1936); Nasca et al. (2004); Oates (1901); Oustalet (1891); Zapata (1967)

Observaciones: De la Peña (Puerto Deseado, dpto. Deseado, 26-01-1972; Río Gallegos, dpto. Güer Aike, 10-11-1979)

Tierra del Fuego
Citas: Castellanos (1935); Chebez y Gómez (1988); Clark (1986); Humphrey et al. (1970); Jehl y Rumboll (1976); Olrog (1948, 1950); Reynolds (1934); Schiavini et al. (1998)

Canal de Beagle
Citas: Olrog (1958a); Stiles (1979a)

Mares
Citas: Orgeira (1995b)

Islas Malvinas
Citas: Wace (1921); Woods (2006)

ESCÚA POLAR *Stercorarius maccormicki* H. Saunders, 1893

Otros nombres: Gaviota parda antártica. Gaviota parda de cuello amarillo. Gaviota parda de las Orcadas. Skúa del polo sur.

DESCRIPCIÓN
Largo: 50-55 cm.
Peso: Linkowski y Rembiszewski (1978): N= 3 (?) X: 1258 g (Rango 1105 a 1412)
Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo oscuro.
Partes dorsales pardas oscuras. Cuello ocráceo amarillento. Frente, lados de la cabeza y ventral pardos claros.
Alas pardas oscuras con mancha blanca en la base de las primarias. Cola parda, corta, redondeada.

COMPORTAMIENTO
Alimentación

Baker y Barbraud (2001). **Aves:** *Daction capense* (huevos y adultos), *Fulmarus glacialoides* (huevos, pichones y adultos), *Pagodroma nivea* (huevos, pichones y adultos), *Pygoscelis adeliae* (adultos), *Thalassoica antarctica* (adultos).
Malzof y Quintana (2008). **Peces:** *Electrona antarctica*, *Gymnoscopelus nicholsi, Pagetopsis* sp*., Pleurogramma antarcticum, Protomyctophum choriodon, Protomyctophum tenisoni, Trematomus* sp. **Otros:** Aves (adultos y pichones). Huevos. Invertebrados. Vegetales.
Montalti et al. (2009). **Peces:** *Chaenocephalus aceratus, Electrona antarctica, Electrona carlbergi*, *Gymnoscopelus braueri, Krefftichthys andersoni, Pleurogramma antarcticum, Protomyctophum normani, Protomyctophum tenisoni,*

HÁBITAT
Costas marinas, islas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Península Potter, Isla 25 de Mayo, Isla Rey Jorge, Isla Media Luna.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N											N

Expuesto. Poco elaborado. Ligera excavación, sin materiales.
Montaltti (comp. pers.). Isla 25 de Mayo, Península Potter, 12-12-1997, nido con un huevo.
Olrog (1958a). Isla Media Luna, 11-01-1953, nidos con huevos.
Coria y Montalti (1993b). Bahía Esperanza, Península Antártica, diciembre de 1989, nidos.
Orgeira (1997c). Punta Cierva, costa de Danco, Península Antártica, nidifica.
García Esponda et al. (2000). Isla Halfmoon, Islas Shetland del Sur, 1995/96, nidificando.
Coria et al. (2011). Isla Laurie, Orcadas del Sur, 1994-95, nidificando.

Huevos
Pone 1 ó 2 huevos. Ovoidal. De color oliváceo con pintas y manchas castañas, pardas y grises.

Medidas
Montaltti (*in litt*.): 65,3 x 48,7



PICHONES
Olrog (1958a). Potter, Isla 25 de Mayo, 20-01-1953, nidos con pichones.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Coloración general parda con mancha blanca en las alas.
Se parece al Escúa común pero es menor, ocrácea en el cuello y más pálida ventralmente.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Stercorarius maccormicki H. Saunders, 1893 nidifica en el continente Antártico e islas adyacentes, Tierra de Graham, Shetland, Georgia y Orcadas del Sur. Accidental en las Islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en el continente antártico e islas adyacentes, Tierra de Graham y Shetland del Sur. Fuera de la época de cría es predominantemente pelágica.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS



Costa patagónioca
Citas: Orgeira (1997a)

Islas Malvinas
Citas: Woods (2006)

Georgias del Sur
Citas: Prince y Croxall (1996)

Orcadas del Sur
Citas: Coria et al. (2011); Orgeira (1997a)

Península Antártica
Citas: Malzof y Quintana (2008); Montalti et al. (1994);Montalti y Soave (2002);Orgeira (1997a, 1997c)

Shetland el Sur
Citas: Coria y Montalti (1993b); García Esponda et al. (2000); Montalti y Coria (1993);Montalti et al. (2009); Olrog (1958a); Orgeira (1997a)

ESCÚA ANTÁRTICA *Stercorarius antarcticus* (Lesson, 1831)

Otros nombres: Escúa parda. Gaviota antártica. Gaviota de las Malvinas. Gaviota parda de las Malvinas. Skúa antártico.

DESCRIPCIÓN
Largo: 52-64 cm.
Peso: Linkowski y Rembiszewski (1978): N= 1 (?) 1575 g
Coloración. Pardo oscuro uniforme. Iris pardo oscuro.

COMPORTAMIENTO
Alimentación
Schulz y Gales (2004). **Aves:** *Aptenodytes patagonicus* (pichones y adultos), *Pachyptila* sp*., Pterodroma lessonii, Pygoscelis papua.* **Mamíferos:***Arctocephalus forsteri, Australophocaena dioptrica, Mirounga leonina, Mus musculus, Orytologus cuniculus, Rattus rattus.***Crustáceos:** (*Lepas* sp.). (*Lithodes murrayi*).**Moluscos:** (*Plaxiphora aurata*).
Malzof y Quintana (2008). **Peces**: *Electrona antarctica*, *Gymnoscopelus nicholsi, Pagetopsis* sp*., Pleurogramma antarcticum, Protomyctophum choriodon, Protomyctophum tenisoni, Trematomus* sp.**Aves:** (adultos y pichones) Huevos. **Otros:** invertebrados. Vegetales.

HÁBITAT
Costas marinas, islas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Chubut, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Isla Rey Jorge, Isla Media Luna.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N										N	N



Expuesto. Poco elaborado. Ligera excavación, sin materiales. En el suelo arenoso o entre piedras.

Montaltti (*in litt.*). Isla 25 de Mayo, Península Potter, 12-12-1997, nido con un huevo.
Olrog (1958a). Isla Media Luna, 11-01-1953, nidos con huevos.
Coria y Montalti (1993b). Bahía Esperanza, Península Antártica, diciembre de 1989, nidos.
García Esponda et al. (2000). Isla Halfmoon, Islas Shetland del Sur, 1995/96, nidificando.
De la Peña (2013c). Punta Tombo, pdto. F. Ameghino, Chubut, 27-11-1973, 2 nidos con 2 huevos cada uno y 2 con uno y el 05-11-1979, 2 nidos con un huevo cada uno. Un nido mide: diámetro de 20 a 25 cm y 1 a 3,5 cm de profundidad.
Coria et al. (2011). Isla Laurie, Orcadas del Sur, 1994-95, nidificando.





Bahía Esperanza, Península Antártica, Antártida. Diciembre 2007. Foto Diego Montalti



Punta Tombo. Chubut. 26-11-1973



Punta Tombo. Chubut. 26-11-1973



Punta Tombo. Chubut. 26-11-1973

Huevos
Pone 1 ó 2 huevos. Ovoidal. De color oliváceo con pintas y manchas castañas, pardas y grises.

Medidas
Montaltti (*in litt*.): 65,3 x 48,7
De la Peña (2013c): 70,6 a 77 x 48,3 a 51 X= 72,5 x 49,8 (N= 4)



Pesos
De la Peña (2013c):cáscaras 5,864 a 7,220 X= 6,953 (N= 4)

PICHONES
Olrog (1958a). Potter, Isla 25 de Mayo, 20-01-1953, nidos con pichones.

Más información:
Yorio (2005)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Difícil de diferenciar en el campo de otros Escúas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Stercorarius antarcticus antarcticus (Lesson, 1831) nidifica en las islas Malvinas, costas e islotes de Chubut y Santa Cruz. En invierno se desplaza hasta la costa de Buenos Aires, y *Stercorarius antarcticus lonnbergi* (Mathews, 1912) nidifica en el norte de la península Antártica, islas Georgias, Sandwich, Orcadas y Shetland del Sur, e islas subantárticas de los océanos Pacífico e Indico.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Nidifica en las Malvinas, costas e islotes de Chubut y Santa Cruz y en el norte de la península Antártica, islas Georgias, Sandwich, Orcadas y Shetland del Sur, e islas subantárticas de los océanos Pacífico e Indico.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS



Stercorarius antarcticus antarcticus (Lesson, 1831)

Buenos Aires
Citas: Daguerre (1922); Pagano et al. (2012)

Chubut
Citas: Daciuk (1975, 1977c); Harris (2008); Olrog (1972a); Sainz-Trápaga (2014)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011)

Santa Cruz
Citas: Coconier (2005b); Daciuk (1977c); Darrieu et al. (2008); Gandini y Frere (1998b); Harris (2008); Imberti (2005e); Nasca et al. (2004); Yorio (2005)

Tierra del Fuego
Citas: Chebez y Bertonatti (1994); Humphrey et al. (1970)

Islas Malvinas
Citas: Bennett (1920);Wace (1921); Woods y Woods (1997); Woods (2006)

Costa patagónica
Citas: Orgeira (1997a)

Orcadas del Sur
Citas:Orgeira (1997a)

Shetland del Sur
Citas: Bennett (1920); Orgeira (1997a)

Islas subantárticas
Citas: Bennett (1920);Montalti y Soave (2002);Orgeira (1997a)

Mares
Ciras: Savigny (2002c)

Stercorarius antarcticus lonnbergi (Mathews, 1912)

Península Antártica
Citas: Coria y Montalti (1993b); Malzof y Quintana (2008); Montalti et al. (1994); Montalti y Coria (1993); Novati (1978); Olrog (1958a)

Orcadas de Sur
Citas: Castellanos (1927); Coria et al. (2011); Montalti y Coria (1993)

Georgia del Sur
Citas: Carcelles (1931); Prince y Croxall (1996)

Shetland del Sur
Citas: Arechabala y Novatti (1983); García Esponda et al. (2000); Montalti y Coria (1993); Olrog (1958a)

SALTEADOR GRANDE *Stercorarius pomarinus* (Temminck, 1815)

Otros nombres: Gaviota de rapiña pomarina. Gaviota pomarina. Págalo pomarino. Salteador pomarino.

DESCRIPCIÓN
Largo: 50-56 cm.
Coloración. Pico pardo con punta negra. Patas negras. Iris pardo oscuro.
Morfo claro. Superior de la cabeza negro. Lados de la misma y semicollar en los lados y en posterior del cuello amarillentos. Dorsal parda. Garganta, cuello anterior y abdomen blancos. Pecho manchado de pardo. Flancos y subcaudales barrados o manchados de pardo. Alas pardas con blanquecino en la base de las primarias.
Cola parda, larga, con forma de cuña y con las plumas centrales alargadas retorcidas.
Morfo oscuro. Las partes ventrales son oscuras como las dorsales.

HÁBITAT
Mares, costas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Plumas alargadas en la cola. Amarillento en el cuello. Capucho negro.
Se parece al Salteador chico.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Stercorarius pomarinus(Temminck, 1815) migratorio del Ártico. Llega a la costa argentina, Antártida, Shetland del Sur.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Migratorio del Ártico en Norte América, Europa y Asia. Fuera de la época de reproducción es estrictamente pelágico.



CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Río Negro
Citas: Rodríguez Astorino et al. (2013)

Santa Cruz
Citas: Darrieu et al. (2008)

Antartida
Citas: Sladen (1954); Watson (1975)

Mares
Citas: Brown et al. (1975); Seco Pon (2015)

SALTEADOR CHICO *Stercorarius parasiticus* (Linnaeus, 1758)

Otros nombres: Gaviota de rapiña. Págalo parasito. Salteador común.



DESCRIPCIÓN
Largo: 41-46 cm.
Peso: Belton (1984): N= 1 (?) 342 g.
Coloración. Pico corneo claro. Patas negras o gris oscuras. Iris pardo oscuro.
Morfo claro. Superior de la cabeza, cuello dorsal, dorso y cola pardos oscuros. Lados de la cabeza y cuello amarillentos. Ventral blanca con una banda parda en el pecho. Abdomen y subcaudales pardos.
Alas pardas con base de las primarias blancas. Cola con forma de cuña, larga y con las dos plumas centrales largas, terminadas en punta.
Morfo oscuro. Dorsal parda. Cuello y partes ventrales pardas más pálidas.
Juveniles. Los juveniles de esta especie y los de *Stercorarius pomarinus* son barrados de pardo ventralmente y carentes de plumas alargadas en la cola. En los adultos en época de muda o por rotura, las plumas alargadas de la cola pueden estar ausentes. Por este motivo y por la semejanza entre los juveniles, es difícil la diferenciación de estos estados en el campo.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Orgeira (1995b). Peces.

HÁBITAT
Costas marinas, lagunas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Ventral blanca. Collar pectoral pardo. Amarillento en el cuello. Plumas alargadas en la cola.
Diferenciarlo del Salteador grande.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Stercorarius parasiticus (Linnaeus, 1758) migratorio del Ártico. Llega por la costa de Buenos Aires a Tierra del Fuego. También en Córdoba e islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en la tundra Ártica de América, Europa y Asia. Fuera de la época reproductiva es casi exclusivamente pelágico.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Darrieu y Camperi (2001a); Fiameni (1994); Grant (1911); Gibson (1920); Isacch y Chiurla (1997); Narosky y Di Giacomo (1993); Olrog (1958a); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Wetmore (1926b)

Chubut
Citas: Harris (2008); Kovacs et al. (2005); Navas (1994); Sainz-Trápaga (2014)

Córdoba
Citas: Michelutti y Torres (2006); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1979, 1980b)

Rio Negro

Citas: Llanos et al. (2011)

Santa Cruz
Citas: Darrieu et al. (2008); Gandini y Frere (1998b); Savigny (2002d)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Humphrey et al. (1970)

Islas Malvinas
Citas:Woods (2006)

Mares
Citas: Orgeira (1995b, 2001a); Savigny (2002c)

SALTEADOR COLUDO *Stercorarius longicaudus* Vieillot, 1819

Otros nombres: Gaviota de cola larga. Gaviota de rapiña de cola larga. Págalo rabero. Salteador de cola larga.

DESCRIPCIÓN
Largo: 50-58 cm.
Coloración. Pico pardo con punta negra. Patas grises. Iris pardo oscuro.
Parte superior de la cabeza negra. Dorsal parda grisácea. Lados de la cabeza y cuello amarillentos. Ventral blanca, más oscura en los flancos.
Primarias negras, cubiertas pardas. Cola parda con dos plumas alargadas terminadas en punta.
Juvenil. Dorsal parda grisácea. Ventral blanca, poco jaspeada en el pecho.
Sin plumas alargadas en la cola.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Humphrey et al. (1970). Peces.

HÁBITAT
Costas marinas y mares.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Plumas muy alargadas en la cola. Alas con las primarias negras y sin mancha blanca.
Diferenciarlo del Salteador chico y del Salteador grande.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Stercorarius longicaudus longicaudus Vieillot, 1819 migratorio del Ártico. Llega a la costa argentina. *Stercorarius longicaudus pallescens* Loppenthin, 1932 migratorio del Ártico. Llega a mares argentinos. Accidental en Islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Nidifica en la tundra Ártica circumpolar. Fuera de la temporada reproductiva es casi exclusivamente pelágico

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Stercorarius longicaudus longicaudus Vieillot, 1819

Buenos Aires
Citas: Dabbene (1929); Jaramillo (2000); Murphy (1936); Olrog (1958a); Pereura (1938b); Prince y Croxall (1996); Wetmore (1926)

Mares
Citas: Brown et al. (1975)

Islas Malvinas
Citas: Woods (1988, 2006)

Georgias del Sur
Citas: Naveen (1989)

Stercorarius longicaudus pallescens Loppenthin, 1932

D.G. Migratorio del Ártico. Llega a mares argentinos.

GAVIOTAS Y GAVIOTINES

FAMILIA: LARIDAE

Aves acuáticas, palmípedas. Las alas son largas y estrechas. Buenas voladoras.

Nidifican en colonias de una sola especie o de varias. En rocas, matas de vegetación, dunas.

Emplean en la construcción del nido materiales vegetales, pastos, juncos, tallos, palitos, algas, plumas Apoyados en embalsados, en el suelo o sostenidos entre juncos, o arbustos emergentes. Expuesto. Elaborado.

Los gaviotines hacen simples excavaciones en el suelo arenoso y en planas marinas entre piedras.

La postura es de 2 a 4 huevos. Período de incubación varía de 29 a 31 días.

Ambos sexos incuban y alimentan a los pichones. Los pichones son nidícolas y nacen cubiertos de plumón. Los juveniles tienen diferente color al de los adultos.

Se alimentan de peces, insectos, pichones de otras aves, desperdicios.

Frecuentan costas del mar, laguna, ríos, esteros y algunas especies campos.

Subfamilia: Larinae

GAVIOTA ANDINA *Chroicocephalus serranus* (Tschudi, 1844)

DESCRIPCIÓN
Largo: 44-48 cm.
Coloración. Pico y patas rojos. Iris pardo.
Cabeza negra, con semicírculo blanco detrás de los ojos. Dorsal y cubiertas alares grises. Las tres primeras primarias negras, con franja a lo largo del ráquis y una banda subapical blanca. Puntas negras. Las internas blancas grisáceas con ancha punta negra. Secundarias grises. Cuello, ventral del cuerpo y la cola blancos con matices rosados en el pecho.
En invierno presenta la cabeza jaspeada de gris. Mancha grisácea alrededor de los ojos.
Juvenil. Pico y patas pardos.
Cabeza, cuello y dorsal blanquecinos moteados de pardo. Secundarias pardas. Cola con franja subterminal negra.



COMPORTAMIENTO
Alimentación
Sosa (1999). Huevos de *Phoenicopterus chilensis*.
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Carroña**: Camélidos: (*Vicugna vicugna*).

Voces
Straneck (*in litt*.). Emite un agudo y áspero Kiihe..kiihe..kiihi..

HÁBITAT
Lagunas, ríos, entre los 3500 y los 4000 m de altura.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Jujuy, Catamarca.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N										

Tazón de juncos, palitos y pajitas. Internamente plumas.

Uranga (*in litt.*). Puesto del Marquez, dpto. Cochinoca, Jujuy, 17-02-2013, nido en un albardón en medio de una pequeña laguna, 2 huevos. Fiambalá, dpto. Tinogasta, Catamarca, 21-01-2015, nido con un huevo y un pichón.








Puesto del Marquez. Jujuy. 17-02-2013 Foto: Máximo Uranga

Huevos
Pone de 2 a 3 huecos de base verde oliva con pintas y manchas negras y grises concentdas en el polo mayor.

PICHÓN
Uranga (*in litt.*). Pichón de 7-10 días, plumón blanco con manchitas negras.



Más información:
Goodall et al. (1951)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Cabeza negra. En invierno se parece a la Gaviota capucho café, pero tiene la punta de las alas negras y anillo ocular blanco.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Chroicocephalus serranus (Tschudi, 1844) entre los 3500 y los 4000 m de altura en Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Neuquén. Observada en Santa Cruz. En invierno baja a menor altura.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Lagos andinos en Ecuador, Perú, Bolivia, norte de Chile y oeste de Argentina. En la parte norte de su distribución nidifica en el Altiplano a más de 4.000 metros mientras que en el sur a menos de 2.000. Estas últimas migran en invierno hacia el norte.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009)

Observaciones: M. Uranga (Fiambalá, dpto. Tinogasta, Catamarca, 21-01-2015)

Jujuy
Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009); Fiora (1939); Straneck (1990f)

Observaciones: De la Peña (Abra Pampa, dpto. Cochinoca, 04-02-1977; 10-02-1983)

La Pampa
Citas:Bianchini y Arenas (2013a)

La Rioja
Citas: de La Fuente (2002)

Mendoza
Citas: Aramburú (1983);Chebez et al. (1993); Darrieu et al. (1985);Darrieu (2014); Martínez et al. (1985); Nores e Yzurieta (1982b); Olivera et al. (2009); Sosa (1993b, 2005)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Bianchini y Arenas (2013a); Chebez et al. (1993); Christie et al. (1988); Christie et al. (2004); Matarasso (2007); Pérez et al. (2006); Veiga et al. (2005)

Rio Negro
Citas: Bianchini y Arenas (2013a)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013); Vides Almonacid (1990)

San Juan
Citas: Gelain (2008b, 2013h); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Nores e Yzurieta (1981); Zucchino en Nores y Yzurieta (1981)

Santa Cruz
Citas: Roesler et al. (2014)

Tucumán
Citas: Capllonch (2007a); Capllonch et al. (2011b); Echevarría et al. (2008c, 2014); Echevarría (2014); Laredo y Vides-Almonacid (1999); Lucero (1983)

GAVIOTA DE CAPUCHO CAFÉ *Chroicocephalus maculipennis* (Lichtenstein, 1823)

Otros Nombres: Atí. Caleu caleu. Caulle. Chille. Gaviota. Gaviota blanca. Gaviota capucho café. Gaviota capucho negro. Gaviota común. Gaviota de cabeza negra. Gaviota de cabeza parda. Gaviota de capucho. Gaviota de capucho negro. Gaviota de capucho pardo. Gaviotina. Nataquec.

DESCRIPCIÓN
Largo: 35-43 cm.
Peso: Zapata (1967): N= 1 305 g;Camperi (1992c): N= 2 (M) 400 g, 300g; N= 1 (H) 325 g, N= 5 (H) 300 g cada una; Salvador (2014a); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 (M) 315 g, N= 2 (H) 362 y 380 g
Coloración. Pico y patas rojos. Iris pardo.
Cabeza y garganta pardas oscuras. Semianillo ocular blanco. Dorso y cubiertas alares grises. Cuello, rabadilla, cola y ventral blancos.
Primeras primarias blancas y negras con puntas blancas; las más internas grises. Las dos primeras con ancha banda subterminal blanca. Secundarias grises.
Ventralmente las alas son grises con las primarias oscuras y una mancha subterminal blanca.
En invierno el capuchón es blanco con una manchita parda en anterior de los ojos y otra en la región auricular.
Juvenil. Manchado de pardo en el dorso y en las cubiertas alares. Banda subterminal parda en la cola.

COMPORTAMIENTO
Forma bandadas. Se la ve detrás de los arados, en tierras recién roturadas.

Alimentación
Aravena (1927). **Insectos:** Coleópteros (Carabidae) (Scarabaeidae) (Torito) (*Diloboderus*) (*Gromphas lacordairei*) *Phanaeus splendidulus*). Dinastino (*Dyscinetus gagates*). Lepidóptero (*Colias*). Hemíptero. **Arácnidos:** Escorpiones.
Zotta (1934).**Insectos:** Coleópteros. Hemíptero (*Blastomidae*). Homoptera (*Tettigonia*). Ortópteros (Acridium) (*Schistocerca paranensis*). **Moluscos. Crustáceos:** Langostinos. **Peces:** Anablepidae: (*Jenynsia multidentata*, Characidae: mojarras).
Escalante (1970). Crustáceos. Gusanos. Insectos. Larvas. **Peces:** (Anablepidae: *Jenynsia multidentata*, Characidae: mojarras)
Carman (1987c). Hormigas voladoras (*Pheidole* sp.)
Lizurume et al (1995). Invertebrados marinos. Pelos. Piedritas. Staphylinidae (*Staphylinus fuscicornis*). Huesos. Insectos.
Savigny (2002c). Descartes.
Ghys y Favero (2004). **Insectos:** Cantharidae. Carabidae (*Pelmatellus* sp*., Scarites anthracinus, Paranortes cordicollis*) (*Metius gilvipes, Metius circumfusus, Calosoma retusum*) (*Notaphus brullei, Incagonum lineapunctatum, Laxandrus* sp.) *Trirammatus chalceus, Trirammatus striatulus*) (*Polpochila flavipes, Argutoridius chilensis*) *Argutoridius bonariensis, Argutoridius* sp.). Coleópteros (Scarabaeidae, *Cyclocephala*

signaticollis) (larva) (Scarabaeidae, *Philocloenia bonaerensis*) (larva) (Scarabaeidae, *Heterogomphus* sp.) (larva) (Scarabaeidae, *Lygirus* sp.*, Dycinetus* sp.*,Aphodinus* sp.). Curculionidae (*Pantomorus* sp.). Chilopoda (Scolopendridae, *Scolopendra* sp.). Elateridae. Hemípteros (Belostomatidae, *Belostoma* sp.). Hymenópteros (Formicidae). Lepidópteros. Ortópteros (Acrididae, Tettigonidae). Tenebrionidae Thysanopteros. **Crustáceos:** Malacostraca (Isopoda). **Anélidos:** Oligochaeta.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Vegetales**: Semillas de *Arachis ypogaea, Glycine max, Helianthus annus, Zea mays,* No determinadas. **Anélidos:** Oligoquetos: (lombrices de tierra). **Insectos:** Coleoptera (Scarabaeidae: adultos y larvas, Tenebrionidae: larvas, no identificado). Hemiptera (Belostomatidae, Pentotamidae). Lepidoptera (orugas). Orthoptera (Acridiidae, Gryllidae, Gryllotalpidae). **Crustáceos:** (Isópodos terrestres). **Moluscos:** (Ampullariidae: *Ampullaria canaliculata,* Planorbidae: *Biomphalaria* sp.).
De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). Insectos. Desperdicios, en basurales (carne, pan). Gusanos (en tierra arada).
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Peces:** (*Odontesthes bonariensis*)…
Salvador (2013e). Hormigas Isaú (*Atta vollenweideri*).
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Voces
Straneck (*in litt*.). Cuando está alarmada, su voz es un agudo y nasal Kleerrrrrh..kierrhh..

HÁBITAT
Lagunas, esteros, praderas, costas marinas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chubut, Malvinas.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N



Nidifica en colonias en juncales o islotes.
Apoyados en embalsados, en el suelo o sostenidos entre juncos, o arbustos emergentes.
Expuesto. Elaborado. Plataforma de juncos o de palitos. Internamente tallos de yuyos o pajas.

Salvador y Salvador (en prep.). Dpto. San Martín, Córdoba, 730 nidos en noviembre y diciembre, en matas de *Typha* sp., postura de 2 a 5 huevos (el 70% de los nidos contenían 3 huevos).
Uranga, M. (*in litt*.). Victoria, dpto. Victoria, Entre Ríos, 02-12-2009, colonia con unos 70 nidos y 15 nidos de *Sterna trudeaui* y un nido de *Chroicocephalus cirrocephalus* en construcción, en un embalsado en una laguna formada por el desborde del río Paraná.

Holland (1890). Estancia El Espartillar, pdo. General Paz, Buenos Aires, nido parasitado por *Heteronetta atricapilla*.
Hartert y Venturi (1909). Cerca de Bahía Blanca, pdo. Bahía Blanca, Buenos Aires, noviembre de 1896, nidos.
Smyth (1927). Cacharí, pdo. Azul, Buenos Aires, 18-11-1920, huevos.
Pereyra (1938b). Colonia en General Lavalle, pdo. General Lavalle, Buenos Aires, con huevos y con pichones.
Narosky (1969a). Azul, pdo. Azul, Buenos Aires, noviembre de 1968, colonia con huevos.

Zuberbühler (1971). Provincia de Buenos Aires. Nidos con huevos.
Narosky e Yzurieta (1973b). Melincué, dpto. General López, Santa Fe, 22 y 29 de octubre de 1972, dos nidos con huevos.
Darrieu et al. (1989). Llancanelo, dpto. Malargüe, Mendoza. En diciembre de 1983, 21 nidos, formando parte de la colonia de *Plegadis chihi.*
Lizurume et al. (1995). Trelew, dpto. Rawson, Chubut, 1992 y 1993, colonias de nidificación. Huevos en octubre, pichones en noviembre.
Woods y Woods (1997). Nidifica en Malvinas.
Vilches y Berasain (1998). Laguna Lacombe, pdo. Chascomús, Buenos Aires, colonia con nidos en octubre de 1997.
González et al. (1998). Islote de los Pájaros, dpto. San Antonio, Río Negro, 1990-1995, nidificando.
Petracci y Basanta (2002). Laguna Los Patos, pdo. Berisso, Buenos Aires, 27-11-1999, colonia con 10 nidos.
Sosa (2005). Llancanelo, dpto. Malargüe, Mendoza. Nidifican en el sector oeste de la reserva, en colonias.
Lyon y Eadie (2013). Gral Lavalle, pdo. General Lavalle, Buenos Aires, 1993-1997, nido parasitado por *Heteronetta atricapilla*.
De la Peña (2013c). Azul, pdo. Azul, Buenos Aires, 11-12-1972, huevos y pichones; Melincué, dpto. General López, Santa Fe, 25-10-1974, huevos; Morteros, dpto. San Justo, Córdoba, 22-12-1981, huevos y pichones (2 nidos estaban parasitados por *Heteronetta atricapilla*); Arias, dpto. Marcos Juárez, Córdoba, 04-12-1991, colonia con unos 350-400 nidos, con huevos y con pichones. Un nido tenía un huevo de *Heteronetta atricapilla* y un huevo estaba depositado en un nido de *Fulica leucoptera,* Isla Verde, dpto. Marco Juárez, Córdoba, 07-11-1994, huevos.
En general nidos sobre el agua, construidos con juncos, en la parte interna pajitas. Los nidos de Melincué, estaban construidos únicamente con palitos secos, de 5 a 10 cm. de largos.
Medidas de 5 nidos: diámetro total: de 26 a 30 cm, diámetro interno: de 12 a 16 cm, profundidad: de 3 a 5,5 cm y alto: 14 a 15 cm.
Segura et al (2014b). Gral. Lavalle y Daireaux, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 21 nidos.
Suárez et al. (2014). Bahía San Blas, Buenos Aires, octubre y noviembre de 2013, colonias de nidificación.

Huevos
Pone 3, a veces 4 o 5 huevos. Ovoidales. De color pardo verdoso o verde oliváceos, con pintas y manchas castañas, pardas y grises, distribuidas por toda la superficie. Algunos huevos presentan líneas y otros tienen las manchas más concentradas hacia el polo mayor.

Medidas
Salvador y Salvador (en prep.): 48,3 a 58,1 x 34,9 a 36,9 X= 52,1 x 36,1 (N= 41)
Gibson (1920): 50 a 52 x 36 a 38
Pereyra (1938b): 43 a 51 x 35 a 37
Narosky (1969a): 44 a 58,2 x 33,4 a 38,5 X= 50,5 x 36,5 (N= 10)
Darrieu et al. (1989): 50,7 a 52,2 x 35,4 a 35,9 X= 51,4 x 35,6 (N= 2)
Lizurume et al. (1995): X= 51,5 x 36,2 (N= 54)
De la Peña (2013c): 47,8 a 54,6 x 34,5 a 38,8 X= 51,3 x 36,2 (N= 14)



Pesos
Salvador y Salvador (en prep.): 31,5 a 42 X= 35,4 (N= 36)
De la Peña (2013c): cáscaras 1,569 a 2,478 X= 1,988 (N= 14)

Anónimo (1933): huevos colectados en Viamonte, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego, por T. L. y G. P. Bridges y P. W. Reynolds, en el Museo Nacional de Historia Natural.

PICHONES

Descripción

De la Peña (2013c). Dorsalmente ocráceo amarillento con manchas y estrías oscuras. Ventral blanquecino.

Generalidades

Lizurume et al. (1995). Período de incubación, 23 días.

Más información:
Lizurume et al. (1995)

Depredadores

De adultos: *Oncifelis geoffroyi* (Canepuccia et al. 2007); de pichones: *Milvago chimango* De la Peña en (De la Peña y Salvador 2010); de huevos: *Milvago chimango* De la Peña en (De la Peña y Salvador 2010).

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Capucho pardo. En invierno se parece a la Gaviota de capucho gris.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Chroicocephalus maculipennis (Lichtenstein, 1823)desde Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos hasta Tierra del Fuego y las islas Malvinas. Observada en Georgias del Sur.
En invierno se desplaza al norte hasta Tucumán, Salta y Jujuy.



Morteros. Córdoba. 22-12-1981Parasitado por *Heteronetta atricapilla*



Arias. Córdoba. 04-12-1991



Arias. Córdoba. 04-12-1991



Azul. Buenos Aires. 11-12-1972



Esperanza. Santa Fe. 27-11-2006



Morteros. Córdoba. 22-12-1981
Parasitado por *Heteronetta atricapilla*

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípioca. Nidifica en el sur de Sud América hasta Tierra del Fuego e Islas Malvinas, Georgias del Sur. Se distribuye por Chile, Uruguay y costa del extremo sur Brasi. En invierno migra a provincias norteñas de Argentina y costas del norte de Chile y centro de Brasil.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires

Citas: Aravena (1927); Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Camperi (1992c); Castro y Cicchino (1992); Codesido et al. (2011); Dabbene (1917c); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); De la Peña (2013c); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Filipello y López de Casenave (1993); García y Gómez Laich (2007); Gibson (1880b, 1920); Ghys y Favero (2004); Hartert y Venturi (1909); Isacch et al. (2006); Klimaitis (1975b); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Leveau y leveau (2004b); Lucero (1982); Lucero et al. (2011); Marelli (1933); Mérida y Bodtati (2006); Morici (2012b); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Salvador y Di Giacomo (2014); Soave et al. (1999); Straneck (1990b); Suárez et al. (2014);Weller (1967a); White (1882); Zapata (1965, 1998); Zuberbhüler (1971)

Chaco

Citas: Contreras et al. (1990b)

Chubut

Citas: Camperi (1998);Daciuk (1977); Darrieu y Camperi 2000 (2001); Gatto et al. (2005); Hecker y Vidoz (1998); Lizurume et al. (1995); Parera (1992); Sainz-Trápaga (2014)

Observaciones: De la Peña (Esquel, dpto. Futaleufú, 02-02-1976)

Córdoba

Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Brandolín et al. (2007); Bucher y Herrera (1981); De la Peña (2013c); Heredia (2006); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores y Yzurieta (1980b); Nores y Cerana (2010); Salvador (1983a, 2013e); Yzurieta (1995)

Corrientes

Citas: Chatellenaz et al. (2010)

Entre Ríos
Citas: Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); De la Peña (2012b); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Zapata (1975, 1977)



Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Bruno et al. (2007); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (1999, 2001); Siegenthaler (1984, 2004); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006)

Observaciones: De la Peña (Realicó, dpto. Realicó, 19-11-1998)

Mendoza
Citas: Aramburú (1983); Blendinger y Alvarez (2002); Calí et al. (2008); Darrieu (2014); Darrieu et al. (1989); Reed (1914); Roig (1965); Sosa (1993b, 2005)

Observaciones: De la Peña (Las Leñas, dpto. Malargüe, 13-10-2004)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Chebez et al. (1993); Chehebar et al. (1992); Christie et al. (1988, 2004); Daciuk (1968, 1983a); Fiori y Zalba (1999); Gorgoglione (2005); Heredia y Funes (1987); Matarasso (2007); Pereyra (1945); Veiga et al. (2005)

Observaciones: De la Peña (La Rinconada, dpto. Huiliches, 27-01-1976)

Río Negro
Citas: Camperi (1998); Casas (1992a); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Gelain (1984a, 1984b, 2001, 2011b, 2012b); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); González (1990, 1991); González et al. (1998); Grigera y Rubulis (1985); Hecker y Vidoz (1998); Llanos et al. (2011); Paz Barreto (1997b); Pérez y Petracci (1998); Peters (1923b)

Observaciones: De la Peña (Viedma, dpto. A. Alsina, 03-11-1979)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

San Luis
Citas: Masramón (1983); Nellar Romanella (1993)

Observaciones: De la Peña (Mercedes, dpto. Gral. Pedernera, 13-10-2004)

Santa Cruz
Citas: Albrieu et al. (2004); Gandini y Frere (1998b); Imberti (2005e); Imberti y Albrieu (2001); Lange (1981); Murphy (1936); Scott y Sharpe (1910); Zapata (1967)

Observaciones: De la Peña (Puerto Deseado, dpto. Deseado, 09-11-1979)

Santa Fe
Citas: Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Wilson (1923a, 1926)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Observaciones: De la Peña (Argentina, dpto. Aguirre, 29-01-1977)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Humphrey et al. (1970); Olrog (1948, 1950)

Observaciones: De la Peña (Río Grande, dpto. Río Grande, 30-01-1972)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983)

Islas Malvinas
Citas: Wace (1921); Woods y Woods (1997); Woods (2006)

Mares
Citas: Savigny (2002c)

Georgias del Sur
Citas: Delany et al. (1988)

GAVIOTA DE CAPUCHO GRIS *Chroicocephalus cirrocephalus* (Vieillot, 1818)

Otros nombres: Gabriela. Gaviota capucho gris. Gaviota cenicienta. Gaviota de cabeza gris.

DESCRIPCIÓN
Largo: 38-46 cm
Peso: Fiora (1933): N= 2 X= 450 g (Rango 440 a 460)
Coloración. Pico y patas rojos. Iris amarillo.
Cabeza y garganta grises. Cuello, rabadilla, cola y partes ventrales blancos. Dorso y cubiertas alares grises. Las dos primeras primarias negras con mancha blanca subterminal; en las tres siguientes la mancha es basal y se continúa en parte de las cubiertas. Resto de las primarias y de las secundarias gris.
En el período de reposo sexual presenta un capuchón gris y línea en la nuca.
Juvenil. Cabeza y dorsal blanquecinas moteadas de pardo. Alas pardas. Cola blanca con banda subterminal parda.

COMPORTAMIENTO
Forma bandadas. Muy gritona.

Alimentación
Marelli (1919). Vegetales.
Pereyra (1923b). Larvas de escarabajos.
Aravena (1927). Coleópteros (*Aphodios*).
Zotta (1932). Crustáceos. Peces.
Silva et al. (2005). Carroña. Desperdicos (pesqueros).

De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). Desperdicios, en basurales (carne, pan). Gusanos (en tierra arada).
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). Peces (*Odontesthes bonariensis*).

HÁBITAT
Lagunas, esteros, costas marinas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N



Nidifica en colonias, en esteros o en islas.
En el suelo, en islote.
Expuesto. Elaborado. Plataforma de palitos, tallos de yuyos, pajas.

Uranga, M. (*in litt*.). Victoria, dpto. Victoria, Entre Ríos, 02-12-2009, nido en construcción en un embalsado en una laguna formada por el desborde del río Paraná. Había además una colonia con unos 70 nidos de *Chroicocephalus maculipennis* y 15 nidos de *Sterna trudeaui*.
Salvador y Salvador (en prep.). Dpto. San Martín, Cordoba, 3 nidos en diciembre en el medio de una colonia de *Chroicocephalus maculipennis*, en matas de *Typha* sp., con 2, 3 y 3 huevos.
Daguerre (1922). Rosas, pdo. Las Flores, Buenos Aires, se reúnen en grandes cantidades para nidificar.
Pereyra (1938b). Povincia de Buenos Aires, nidifica en colonias.
Narosky e Yzurieta (1973b). Melincué, dpto. General López, Santa Fe, 22 y 29 de octubre de 1972, colonia con huevos y pichones.
Los nidos estaban construidos sobre el suelo o entre una cubierta de tréboles o también bajo la protección de gruesas ramas secas, caídas, de Quinoa (*Chenopodium* sp.).
El nido tiene forma de cráter chato, de 25 cm de diámetro exterior promedio, por 16 de diámetro interior y 4 cm de profundidad. Hechos con tallos y gramíneas secos.
De la Peña (2013c). Melincué, dpto. General López, Santa Fe, 25-10-1974, colonia con unos 1.200 nidos, en una isla. Un nido construido con palitos finos y pajas gruesas. Huevos y pichones.
Los nidos están próximos unos de otros. Medidas: diámetro total: de 20 a 24 cm y profundidad: 1 a 3 cm.

Huevos
Pone 3 huevos. Ovoidales. De color ocre verdoso con pintas y manchitas grises y castañas, distribuidas por toda la superficie. En algunos más concentradas hacia el polo obtuso formando corona y otros presentan líneas.
No existe uniformidad en el color de base y algunos carecen de manchas.

Medidas
Salvador y Salvador (en prep.): 51,7 a 55,8 x 35,3 a 36,8 X= 54,51 x 35,92 (N= 8)
Pereyra (1938b): 55 a 57 x 40
Narosky e Yzurieta (1973b): 51,2 a 56,2 x 37,2 a 40 X= 54,3 x 38,9

De la Peña (2013c): 51,8 a 55 x 39,5 a 40,5 X= 53,3 x 39,8 (N= 6)



Pesos
Salvador y Salvador (en prep.): 35,0 a 40,5 X= 38,6 (N= 8)
Narosky e Yzurieta (1973b): 30 a 40
De la Peña (2013c): cáscaras 2,530 a 2,719 X= 2,531 (N= 6)

PICHONES
Descripción
Narosky e Yzurieta (1973b). Pico y patas liláceos. Iris pardo.
De la Peña (2013c). Dorsal crema amarillenta con manchas pardas. Ventral blanquecino.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Cabeza gris. En el período de reposo sexual y los juveniles se parecen a los de la Gaviota de capucho café.



Esperanza. Santa Fe. 21-08-2011



Esperanza. Santa Fe. 25-09-2011



Esperanza. Santa Fe. 28-08-2011



Esperanza. Santa Fe. 29-06-2008



Melincué. Santa Fe. 25-10-1974



Esperanza. Santa Fe. 27-11-2006

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Chroicocephalus cirrocephalus cirrocephalus (Vieillot, 1818) en el norte del país, sur de Misiones, hasta Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Observada además en el oeste de Río Negro y en Santa Cruz. Accidental en las Islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies. Esta especie se encuentra en África y en Sud América presentando a su vez 2 poblaciones separadas una en costas de Ecuador y Perú y otra en Argentina, Uruguay y extremo sur Brasil.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Chroicocephalus cirrocephalus cirrocephalus (Vieillot, 1818)

Buenos Aires

Citas: Aravena (1927); Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Fiameni (1994); Filipello y López de Casenave (1993); García y Gómez Laich (2007); Gibson (1880b, 1920); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Marelli (1933); Mérida y Bodtati (2006); Morici (2012b); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Renard (1920); Straneck (1990c); Zapata (1998)

Córdoba

Citas: Brandolín et al. (2007); Bucher y Herrera (1981); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores y Yzurieta (1980b); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Miramar, dpto. San Justo, 28-02-1976)

Corrientes

Citas: Cano et al. (2010); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b); Giraudo et al. (2006)

Observaciones: De la Peña (Paso de los Libres, dpto. Paso de los Libres, 11-12-2002)

Entre Ríos

Citas: Baliño (1984); Baliño y Biole (1984); Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); De la Peña (2012b); Marateo et al. (2009); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Zapata (1975, 1977)



Formosa
Citas: Contreras (1987c, 1993b); Gorleri y Di Giacomo (2002)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Fiora (1933, 1939); Zotta (1932)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Tejerina et al. (2006)

Río Negro
Citas: Christie et al. (2004); Gelain (2001); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

Santa Cruz
Citas: Daneri (1959); Darrieu et al. (2008); Scott y Sharpe (1910)

Santa Fe
Citas: Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Narosky e Yzurieta (1973b); Pautasso (2002b); Wilson (1923, 1926)

Santiago del Estero
Citas: Ménéguax (1925); Nores et al. (1991)

Observaciones: De la Peña (Selva, dpto. Rivadavia, 03-12-1977)

Tucumán
Citas: Brandán y Navarro (2009);Echevarría (2001); Echevarría y Chani (1999, 2000, 2006); Lucero (1983)

Islas Malvinas
Citas: Woods (2006)

GAVIOTA GRIS *Leucophaeus scoresbii* (Traill, 1823)

Otros nombres: Gaviota austral. Gaviota cenicienta. Gaviota del sur. Gaviota de pico rojo.

DESCRIPCIÓN
Largo: 40-46 cm.
Peso: Humphrey et al. (1970): N= 1 (M) 621 g; N= 1 (?) 621 g; Yorio et al. (1996): N= 42 (?) X: 524 g.
Coloración. Pico y patas rojos. Iris gris claro.
Cabeza, cuello y ventral, grises. Dorsal y cubiertas alares negras.
Primarias y secundarias negras con punta blanca. Ventral de las alas gris. Cola blanca.
Juvenil. Pico pardo con la punta negruzca. Patas pardas.
Cabeza, cuello y superior del pecho pardos. Supracaudales, inferior del pecho y abdomen blancos.
Alas pardas oscuras. Cola blanca con franja subterminal negra.

COMPORTAMIENTO
Anda solitaria o en grupos. Carroñera. Se la ve en las colonias de pingüinos y de cormoranes.

Alimentación
Castellanos (1935). Materias fecales.
Devillers (1977). Materias fecales.
Milat (1987).**Moluscos:** Mejillones. **Otros:**Desperdicios.
Yorio et al. (1996). Huevos.
Albrieu et al. (2004). Aves (pichones) Huevos.
Suárez y Yorio (2005). Materias fecales. Regurgitados.
Gandini et al. (2008). **Peces:** *Engraulis anchoita, Gerypterus blacodes, Merluccius hubbsi, Patagonotothen cornucola, Patagonotothen ransayi, Patagonotothen sima, Pinguipes brasileanus, Salilota australis, Sprattus fuegensis.***Crustáceos:** Anfípodos *Balanus* sp. Cangrejos *Cyrtograpsus angutatus.* Isópodos *Paralomis granulosa, Pleoticus muelleri.***Moluscos:** *Aulocomya atra atra, Loligo gabi, Mytilus edulis platenses, Octopus* sp*., Perumytilus purpuratus.***Otros:** Algas (*Enteromorpha* sp*., Ulva* sp*., Ulothrix* sp*., Porfira* sp*., Coralinna* sp*., Gigartina* sp*., Ceramium* sp.), Fanerógamas (*Salicornia* sp.). Poliquetos (*Aphrodita* sp.).
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). Carroña (Pingüinos). Huevos.
De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). Huevos.

Voces
Straneck (*in litt*.). Su voz es un agudo y áspero Chieh.chieh.chieh.chieh.

HÁBITAT
Costas e islas marinas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Islas Malvinas.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N

Expuesto. Elaborado. Estructura con forma de plato hondo. Empleas pastos, algas y plumas.



Castellanos (1935). Isla Observatorio, dpto. Ushuaia, Tierra del Fuego, pichones el 14-01-1934.
Olrog (1948). Cabo Peñas y Puerto de Río Grande, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego, colonias con nidos.
Zapata (1965). Cabo Blanco, dpto. Deseado, Santa Cruz, 01-01-1965, 7 nidos.
Humphrey et al. (1970). Cabo Peñas, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego, nidos.
Boswall y Prytherch (1972). Punta Tombo, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 15-11-1971, 6 nidos con un huevo cada uno.
Yorio et al. (1996). Punta Tombo, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 1983-1987, nidos en noviembre-diciembre.
Woods y Woods (1997). Diciembre y enero, nidos en Malvinas.
Yorio et al. (1998a). Isla Cumbre, Isla Blanca, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 1990-1995, nidificando.
Yorio et al. (1998b). Isla Moreno, Isla Arce, Península Lanaud, Isla Buque, Islote Puente, Isla Este, Isla Gran Robledo, Isla Lobos, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 1990-1995, nidificando.
Yorio et al. (1998b). Isla Quintano, Isla Ceballos, Isla Vernaci Este, Isla Vernaci Oeste, Isla Viana Menor, dpto. Escalante, Chubut, 1990-1995, nidificando.

Gandini y Frere (1998). Cabo Blanco, Isla Larga, Isla Pingüino, dpto. Deseado, Santa Cruz, 1990-1995, nidificando.
Frere y Gandini (1998). Isla Leones, Isla de Monte León, dpto. Corpen Aike, Santa Cruz, Isla Deseada, dpto. Güer Aike, Santa Cruz, 1990-1995, nidificando.
Schiavini et al. (1998). Islas Becasses, dpto. Ushuaia, Tierra del Fuego, 1990-1995, nidificando.
Albrieu et al. (2004). Nidifica entre setiembre y marzo. Forma colonias laxas, con nidos dispersos.
Nidos semiesféricos, tapizado con algas, plumas, ramas delgadas y guano, apoyado sobre una plataforma de ramas más gruesas.
Suárez y Yorio (2005). Punta Tombo, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, nidos.

Huevos
Pone 3-4 huevos. Gris oliváceos con manchas y puntos pardos oscuros.

Medidas
Yorio et al. (1996): X= 60,9 x 42,3 (N= 136)

Peso
Yorio et al. (1996): X= 55,6 (N= 136)

Generalidades
Yorio et al. (1996). Período de incubación, 24-27 días.

Más información:
Yorio et al. (1996). Yorio et al. (2005)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Coloración gris en la cabeza y ventralmente. Negra en dorsal. Ventral de las alas gris. Pico y patas rojos.
El juvenil pardo con franja negra en la cola.



Punta Tombo.Chubut. 05-11-1979

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Leucophaeus scoresbii (Traill, 1823) nidifica en las costas e islas de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y las islas Malvinas. Observada en Georgias del Sur.

En otoño migra hacia Buenos Aires y Entre Ríos por el río Uruguay. Observada además en el norte de Córdoba y Mendoza.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípioca. Su distribución comprende las costas del extremo sur del continente en Chile, Argentina e Islas Malvinas y Georgias del Sur.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Olrog (1979b)

Córdoba
Citas: Michelutti y Torres (2006)

Chubut
Citas: Bó (1958); Boswall (1973); Daciuk (1977b, 1977c); Gatto et al. (2005); Humphrey y Bridge (1970); Lucero (1982); Manriquez (1988); Parera (1992); Sainz-Trápaga (2014); Yorio et al. (1996, 1998a)

Observaciones: De la Peña (Punta Tombo, dpto. F. Ameghino, 27-11-1973)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006)

Mendoza
Citas: Sosa (1995d)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Paz et al. (2004); Paz, D. (1991b)

Santa Cruz
Citas: Albrieu et al. (2004); Coconier (2005b); Daciuk (1977b); Darrieu et al. (2008); Frere y Gandini (1998); Gandini y Frere (1998a, 1998b); Gould y Darwin (1838-1841); Humphrey y Bridge (1970); Murphy (1936); Oustalet (1891); Renard (1931); Sclater y Salvín (1871); Steullet y Deautier (1939); Yorio et al. (2005); Zapata (1965a, 1969)

Observaciones: De la Peña (Puerto Deseado, dpto. Deseado, 07-11-1979)



Tierra del Fuego
Citas: Castellanos (1935); Chebez y Bertonatti (1994); Clark (1986); Earnshaw (1973); Humphrey et al. (1970); Olrog (1948, 1950, 1958a); Pereyra (1950a); Schiavini et al. (1998)

Observaciones: De la Peña (Río Grande, dpto. Río Grande, 01-02-1972)

Islas Malvinas
Citas: Wace (1921); Woods y Woods (1997); Woods (2006)

Georgias del Sur
Citas: Bourne y Curtis (1985,1986)

GAVIOTA GARUMA *Leucophaeus modestus* (Tshudi, 1843)



Otro nombre: Gaviota gris.

DESCRIPCIÓN
Largo: 45-46 cm.
Coloración. Pico y patas negros. Iris negro.
Gris plomizo más oscuro en las alas. Cabeza blanca. Secundarias con punta blanca.
Cola gris con franja negra
En invierno la cabeza es parda.
El **inmaduro** es pardo.

HÁBITAT
Costas marinas, ambientes desérticos en montañas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Leucophaeus modestus (Tshudi, 1843) se reproduce en Perú y norte de Chile.
Observada en las islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en el desierto de nitratos en em norte de Chile (Atacama). Llegando hasta Perú y Ecuador. Aparece en costas vecinas en esa época y en toda la costa de Sudamérica migrando fuera de la temporada reproductiva.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Salta
Citas: Carrillo (2015)

Islas Malvinas
Citas: Cawkell y Hamilton (1961); Olrog (1979b); Woods (2006)

GAVIOTA CHICA *Leucophaeus pipixcan* (Wagler, 1831)

DESCRIPCIÓN
Largo: 32-38 cm.
Peso: Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 (?) 233 g
Coloración.
Plumaje de reposo sexual.
Pico y patas pardos. Iris pardo.
Frente y anterior de la corona blancos. Resto de la corona pardo jaspeado de blanco.
Dorso y cubiertas alares grises. Garganta, cuello anterior y base posterior del mismo, rabadilla, cola y partes ventrales blancos. Secundarias y terciarias grises con puntas blancas. Las cinco primeras primarias negras con puntas blancas, las restantes grises con puntas blancas.
Plumaje nupcial. Pico rojo. Patas rojizas.
Cabeza negra. Resto del cuerpo igual al plumaje de reposo sexual.
Juvenil. Pico y patas pardos.
Frente blanca. Corona, lados de la cabeza, partes dorsales pardo grisáceo. Cola gris con ancha banda subterminal negra.



HÁBITAT
Lagunas, ríos y costas marinas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Corona negruzca con frente blanca y dorso gris.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Leucophaeus pipixcan (Wagler, 1831) migratoria de Norteamérica. Observada en Jujuy, Catamarca,Córdoba, Mendoza, oeste de Río Negro, Neuquén, costas de Chubut y de Santa Cruz. También en islas Malvinas y Georgias del Sur.

poner catamarca
SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en el interior del continente en Norteamérica. Migra durante el invierno boreal se hace muy marina apareciendo en las costas del Pacífico de Chile, Perú y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca
Citas: Carma (2009)

Chubut
Citas: Devillier y Terschoren (1978)

Córdoba
Citas: Nores et al. (1983); Nores e Yzurieta (1980b); Nores (1996); Salvador y Di Giacomo (2014); Yzurieta (1995)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009)

La Rioja
Citas: Bodrati y Ferrari (2014)

Mendoza
Citas: Canevari et al (1998);Darrieu et al (1985, 1999); Darrieu (2014); Lucero y Chebez (2011); Martínez et al. (1985); Olivera et al. (2009, 2010); Olrog y Pescetti (1991); Sosa (1993b, 2005)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Bianchini y Arenas (2013a); Chebez et al. (1993); Christie et al. (2004); Veiga et al. (2005); Matarasso (2007)
Río Negro
Citas: Christie et al. (2004); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero y Chebez (2011); Lucero (2013i)

Santa Cruz
Citas: Imberti (2003, 2005e)

Santiago del Estero
Citas: Torres y Michelutti (2001a)

Islas Malvinas
Citas: Woods (1988, 2006)

Georgias del sur
Citas: Reid (1998)

Estrecho Magallanes
Citas: Olrog (1979b)



GAVIOTA PERUANA *Larus belcheri* Vigors, 1829

Otros nombres: Gaviota de Belcher. Gaviota de Simeón.

DESCRIPCIÓN
Largo: 48-51 cm.
Coloración. Pico amarillo con franja negra y punta roja. Patas amarillas. Iris pardo.
En verano, cabeza, cuello, partes ventrales y rabadilla blancos. Dorsal y cubiertas alares negras. Primarias negras, secundarias grises con punta blanca.
Cola blanca con franja negra
En invierno la cabeza es negra pardusca.
El **inmaduro** es moteado de pardo. Primarias negras. Ventral blanquecina.
Pico amarillo con punta negra. Patas grisáceas.
Cola negra con punta blanca.

HÁBITAT
Costas marinas, lagos.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Larus belcheri Vigors, 1829 observada posiblemente en Mendoza y en el lago Nahuel Huapi (Río Negro). Accidental en las Islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Restringida a las costas de Perú y Chile. Se dispersa a Ecuador.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Mendoza
Citas: Sosa (1995d)

Río Negro
Citas: Chebez (2009); Gelain (2010); Gelain y Tolosa (2011); Paz Barreto (1997b); Sympson en Gelain (2010)

Islas Malvinas
Citas:Woods (2006)

GAVIOTA CANGREJERA *Larus atlanticus* Olrog (1958)

Otros nombres: Gaviota cocinera de cola blanca y negra. Gaviota de cola negra. Gaviota de Olrog. Gaviota garuma. Gaviota gris. Gaviotón de cola blanca y negra.

DESCRIPCIÓN
Largo: 49-56 cm.
Peso: Devillers (1977): N= 2 (M) 900 y 960g; N= 3 (H) X: 763 g (Rango 750 a 790); Camperi (1992c): N=3 (M) X: 1017 gr (RA: 950 a 1100); N= 2 (H) 850 y 900 g.
Coloración. Pico amarillo con una franja negra y punta roja. Patas amarillas. Iris pardo oscuro.
Cabeza, cuello, partes ventrales y rabadilla blancos. Dorsal y cubiertas alares negras.
Primarias negras. Secundarias grises con puntas blancas.
Cola blanca con una ancha banda negra subterminal.
En invierno la cabeza es pardusca y los párpados blancos.
Juvenil. Pico amarillo con punta negra. Patas grisáceas.
Partes dorsales moteadas de pardo. Ventral blanquecina jaspeada de pardo.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Olrog (1967a).**Crustáceos:** Cangrejos (*Uca uruguayensis*), (*Crytograpsus angulatus*), (*Chasmagnathus granulata*).
Jehl y Rumboll (1976). Carnada (carne, langostinos).
Devillers (1977).**Crustáceos:** Cangrejos (*Crytograpsus angulatus*), (*Chasmagnathus granulata*), (*Uca uruguayensis*)
Spivak y Sanchez (1992). **Crustáceos:** Cangrejos (*Crytograpsus angulatus*), (*Chasmagnathus granulata*), (*Uca uruguayensis*). Peces. Aves.
Martínez e Isacch (1995).**Crustáceos:** Cangrejos (*Crytograpsus angulatus*), (*Chasmagnathus granulata*), (*Uca uruguayensis*).
Carrete et al. (1996a). **Crustáceos:** Cangrejo (*Chasmagnathus granulata*), (*Balanus* sp.).
Carrete y Delhey (1997). **Crustáceos:** Cangrejos (*Crytograpsus angulatus*), (*Chasmagnathus granulata*), (*Uca uruguayensis*). (*Balanus glandula*).Peces. Moluscos. Carnada (carne, langostinos).
Martínez et al. (2000). Aves Insectos.
Copello y Favero (2001). **Crustáceos:** Cangrejos (*Crytograpsus angulatus*), (*Chasmagnathus granulata*).
Savigny (2002c). Descartes de *Loligo* sp.
Berón (2003). **Crustáceos:** Cangrejos (*Crytograpsus angulatus*), (*Uca uruguayensis*), (*Chasmagnathus granulata*). Peces. Moluscos. Insectos.
Petracci et al. (2005). **Crustáceos:** Cangrejos (*Crytograpsus angulatus*), (*Chasmagnathus granulata*). Camarones. **Peces. Moluscos. Insectos:** (Himenópteros, Hemípteros, Ortópteros). **Vegetales:** Granos (maiz).
Silva Rodríguez et al. (2005). Peces. Moluscos. Insectos. Crustáceos.
Berón et al. (2005). Peces. Moluscos. Insectos. Desperdicios.
Seco Pon y Favero (2011). Descarte pesquero.

Voces
Straneck (*in litt*.). Emite un gutural Guchu..guouhh..guchu.. entre otras voces más agudas.

HÁBITAT
Costas marinas, estuarios, lagunas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Buenos Aires, Chubut.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N



Construye el nido en general en zonas desprovistas de vegetación o muy baja, cerca del agua.
Expuesto. Elaborado. Estructura con forma de plato hondo. Empleas pastos y plumas.

Daguerre (1933). Banco Noreste, pdo. Patagones, Buenos Aires, nidos en 1932.
Olrog (1967a). Isla Arroyo Jabalí Oeste, pdo. Patagones, Buenos Aires, nidos en 1963.
Devillers (1977). Posiblemente en banco Nordeste, pdo. Patagones, Buenos Aires, nidos en 1975.
Yorio y Harris (1992). Isla Brightman, pdo. Villarino, Buenos Aires, Isla Puestos, Isla Gama, Isla Arroyo Jabalí, pdo. Patagones, Buenos Aires, Islas Vernaci, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 18 de noviembre a 5 de diciembre de 1990, colonias de nidificación con huevos y con pichones.
Rábano et al. (1996). Isla Embudo, Bermejo, Trinidad, islote entre isla Colonia de los Riachos e isla Morro de Indio, noviembre de 1995, pdo. Villarino, Buenos Aires, colonias nidificantes.
Yorio et al. (1997). Isla Brightman, pdo. Villarino, Isla Puestos, isla Gama, isla Arroyo Jabalí. pdo. Patagones, Buenos Aires, 1990, nidificando; Islas Trinidad, pdo. Villarino, 1995 nidificando; Isla Laguna, dpto. Florentino Ameghimo, Isla Felipe, dpto. Escalante, 1993-94, nidificando; Isla Vernaci Sudoeste, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 1990-93-94, nidificando.
Yorio et al. (1998c). Isla Trinidad, Islote Norte de Isla Morro de Indio, Isla Puestos, Islote Arroyo Jabalí Oeste, pdo. de Patagones, Buenos Aires, 1990-1995, nidificando.
Yorio et al. (1998b). Islote Laguna, Isla Vernaci Sudoeste, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, Isla Felipe, dpto. Escalante, Chubut, 1990-1995, nidificando.
Delhey et al. (2001c). Isla del Puerto, pdo. Villarino, Buenos Aires, 21-10-1999, colonia con 1635 nidos.
Yorio et al. (2001c). Islote Arroyo Jabalí Oeste y Banco Nordeste, dpto. Patagones, Buenos Aires, colonias con nidos en octubre de 1998.
Rábano et al. (2002). Islote Canal Ancla, pdo. Villarino, Buenos Aires, 16-11-2001, colonia de nidificación.
Herrera et al. (2005). Isla Vernaci Sudoeste, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, Isla Felipe, dpto. Escalante, Chubut, colonias de nidificación en 1994.
Petracci et al. (2008). estuario de Bahía Blanca, Buenos Aires, 26-12-2006, colonia con nidos.
Yorio et al. (2013). Isla del Puerto, 2004, 2007 y 2009, nidos; Islote Tres Brazas, 2007, nidos; Isla Golfada Chica, 2007 y 2009, nidos; Isla Luana, 2007 y 2009, nidos; Islote Canal Ancla, 2007, nidos; Isla Embudo, 2004, nidos; Islas Trinidad, (Islote Norte, 2007, nidos; Islote Rodondo, 1009, nidos); Isla Brightman, 2007, nidos; pdo. Villarino. Buenos Aires; Isla Gaviota, 2004, 2007 y 2009, nidos; Islote Arroyo Jabalí Oeste, 2004, 2007 y 2009, nidos; Banco Nordeste, 2004, 2007 y 2009, nidos, pdo. Patagones, Buenos Aires.
Yorio et al. (2013). Islas Laguna (Islote Luisoni, 2004, nidos); dpto. Florentino Ameghimo, Chubut. Islas Vernacci (Isla Vernacci Sudoeste, 2004, nidos; Isla Vernacci Oeste Noroeste, 2007 y 2009, nidos). Isla Felipe, 2007 y 2009, nidos; dpto. Escalante, Chubut.
Suárez et al. (2014). Bahía San Blas, Buenos Aires, octubre y noviembre de 2013, colonias de nidificación.

Huevos
Pone 3 huevos. Ovoidales. De color oliváceo con pintas y manchas pardas, castañas y grises, distribuidas por toda la superficie.

Medidas
La Sala et al (2011): 69,0 a 73,3 x 48,0 a 49,1

Observaciones
La Sala et al. (2011). Período de incubación: 27 días

Más información:
Yorio et al. (2005). Yorio et al. (2012). La Sala et al (2011)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Ventral y rabadilla blancas. Dorsal negra.
Se parece a la Gavita cocinera, pero es más chica y tiene una franja negra en la cola y en el pico.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Larus atlanticus Olrog (1958) por la costa desde Buenos Aires a Santa Cruz. Se reproduce en islas e islotes del sur de Buenos Aires en Chubut. Observada además en Córdoba, Santa Fe e islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Se reproduce en islas e islotes del ***s*** Argentina (costa de Buenos Aires y Chubut). En invierno se dispersa a costas de Río Negro, Chubut, Santa Cruz y hacia el norte por la costa misma de la provincia de Buenos Aires, llegando a las de Uruguay y sur de Brasil.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Berón (2003); Camperi (1992c); Casares (1939); Coconier (2005a); Daguerre (1933); Darrieu y Camperi (2001a); De Francesco (2005); Delhey et al. (2001c); Fiameni (1994); García y Gómez Laich (2007); Klimaitis (1975b); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); La Sala et al. (2011, 2013); Narosky y Di Giacomo (1993); Olivera (2011); Olrog (1958a, 1967a); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b); Petracci et al. (2007, 2008); Pugnali y Chamorro (2008); Rábano et al. (1996); Savigni y Favero (2005); Seco Pon y Favero (2011); Straneck (1990c); Suárez et al. (2008, 2014); Yorio y Harris (1992); Yorio et al. (1998c, 2001, 2012, 2013), Zapata (1998)



Chubut
Citas: Bradley et al. (1985); Herrera et al. (2005); Gatto et al. (2005); Sainz-Trápaga (2014); Yorio et al. (1998a, 2005, 2012); Yorio y Harris (1992)

Córdoba
Citas: Nores (1996); Torres y Micheluti (2005); Yzurieta (1995)

Mendoza
Citas: Sosa (1995d)

Río Negro
Citas: Gelain (2012b); Gelain y Tolosa (2011); González (2005); Llanos et al. (2011); Masello y Quillfeldt (2005b); Paz (1991b)

Santa Cruz
Citas: Coconier (2005b); Darrieu et al. (2008); Di Giacomo et al. (2005c); Imberti (2003, 2005e); Olrog (1948); Savigny et al. (2005)

Santa Fe
Citas: Luna y Manassero (2010)

Santa Cruz
Citas: Ferrari et al. (2005); Gelain y Tolosa (2011); Olrog (1948)

Tierra del Fuego
Citas: Savigny et al. (2005b)

Islas Malvinas
Citas: Alexander (1921); Woods (1998)

GAVIOTA COCINERA *Larus dominicanus* Lichtenstein, 1823

Otros nombres: Cole. Gaviota dominicana. Gaviota de espalda negra. Gaviota gigante. Gaviota mayor. Gaviotón.

DESCRIPCIÓN
Largo: 54-65 cm.
Peso: Humphrey et al. (1970): N= 3 (M) X: 1223,3 g (Rango 1130 a 1326); Jehl (1974): N= 6 (M) X: 952 g (Rango 850 a 1130); N= 8 (H) X: 865 g (Rango 680 a 1040); Contreras (1975):N= 1 (H) 1112 g; Camperi (1992c): N= 2 (M) 1100,0 g , 900,0; N= 3 (H) 775,0, 750,0 y 800 g; Christie et al. (2004): N= 1 (H) 650 g; Salvador (2014a): N= 1 (M) 1021 g

Coloración. Pico amarillo con una mancha roja en la punta de la mandíbula inferior. Patas amarillas verdosas. Iris blancuzco o amarillento.
Cabeza, cuello, partes ventrales, borde anterior de las alas, rabadilla y cola blancos. Dorsal del cuerpo y de las alas negras.
Primarias y secundarias negras con puntas blancas. La primera primaria tiene una mancha subterminal blanca.
Juvenil. Pico negruzco. Pardo jaspeado de ocráceo en las partes dorsales y ventrales. Rabadilla y supracaudales barradas de pardo y blanco. Alas y cola pardas.

COMPORTAMIENTO
Andan solitaria o en grupos. Muy bullanguera. A veces se la ve lejos de ambientes acuáticos. Se alimenta de moluscos, peces, medusas, lombrices, artrópodos, reptiles, anfibios, desperdicios,
pequeños mamíferos, carroña, aves

Alimentación
Philippi et al. (1954). Aves (pichones). Cefalópodos. Desperdicios.
Orgeira (1995b). Carroña, peces.
Giaccardi et al. (1997). Desperdicios (pesqueros y en basurales).
Bertellotti y Yorio (1998). Descartes (pesqueros). Desperdicios (pesqueros y en basurales).
Bertellotti et al. (1998a). **Moluscos:** (*Tellina petitiana*), (*Darina solenoides*).

Silva et al. (2000). Algas. Anélidos. Cangrejos. Carroña. **Moluscos:**Caracoles (*Adelomedon* sp. (Mejillín, *Brachidontes rodriguezi*), (Mejillón, *Mytilus platensis*)
Yorio y Bertellotti (2002). Basura (nylon, papel, huesos). Aves (pichones). Carroña. **Crustáceos:** (*Leucippa pentagona*), (*Pilumnoides hassieri),* (*Halicarcinus planatus*), (*Pachycheles chubutensis*), (*Balanus glandula*), (*Idotea baltica*), (*Libina spinosa*), (*Artemisa longinaris*), (*Pleoticus muelleri*),(*Peltarion spinosulum*), (*Lepidurus* sp.). Equinodermos. Huevos. Insectos. **Moluscos:** (*Aulacomya atra*), (*Perumytilus rodriguezi*), (*Brachidontes purpuratus*), (*Mytilus edulis*),(*Tellina petitiana*), (*Darina solenoides*).(*Diodora patagonica*), (*Lucapinella hanseli*), (*Trophon geversianus*), (*Epitonium georgetina*), (*Paraeuthria plumbea*), (*Nacella magellanica*), (*Tegula patagonica*), (*Olivela* sp.), (*Buccinanops globulosum*), (*Anachis isabellei*). Placóforos. **Poliquetos:** (*Eunica* sp*., Aphrodita* sp*., Nereis* sp.) **Vegetales. Peces:** *Engraulis anchoita, Genypterus* sp*., Merluccius hubbsi, Odonthestes* sp. *Paralichthys* sp., *Raneya fluminensis, Ribeiroclinus eigenmani, Triathalassothia argentina.*
Bertellotti et al. (2003). **Crustáceos:** (*Balanus glandula*), (*Halicarcinus planatus*), (*Leucippa pentagona*). **Moluscos:** Gasterópodos: (*Olivella tehuelcha*), (*Paraeuthria plumbea*), (*Tegula patagonica*), (*Trophon geversianus*).,**Equinodermos. Insectos. Moluscos**: (*Perumytilus purpuratus*), (*Brachidontes rodriguezi*), (*Tellina petitiana*), (*Darina solenoides*), (*Mytilus edulis*), (*Aulacomya atra*), Peces. Poliquetos. Quitones (Poliplacóforos).
Giaccardi y Yorio (2004). Aguas servidas. Desperdicios (pesqueros y en basurales).
Albrieu et al. (2004). Moluscos.
Petracci et al. (2004b). Aceitunas. Aves. Basura. **Crustáceos:** (*Balanus glandula*), (*Balanus amphitrite*), (*Libinia spinosa*), (*Artemesia longinaris*). Carroña. **Insectos:** (Trichoptera, Coleópteros, Ortópteros) (Hymenópteros, Lepidópteros, Dípteros). **Mamíferos:** (Muridae), (*Microcavia australis*). **Granos. Moluscos:**(*Crepidula* sp.) (*Heleobia australis*), (*Olivella* sp.), (*Corbula patagonica*), (*Tagelus plebeius*),(*Brachydontes rodriguezi*).**Vegetales.Peces:** *Cynoscion guatucupa, Micropogonias furnieri, Odonthestes argentinensis, Porichthys porosissimus.*
Silva et al. (2005).**Crustáceos:** Cangrejo (*Platyxanthus crenulatus*). Desperdicios. Peces: *Acanthistius brasilianus, Cynoscion guatucupa, Engraulis anchoita, Micropogonias furnieri, Mugil liza, Porichthys porosissimus, Raneya fluminensis, Trachurus lathami,Urophysis brasiliensis, Mugil liza,Odonthestes argentinensis.*
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). Carroña.**Peces:** (*Odontesthes bonariensis*).
De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). Descartes (en frigoríficos). Desperdicios (pesqueros y en basurales). Huevos. Aves (pichones).
Frixione et al. (2012). **Insectos:** Coleoptera. **Desperdicios**. **Peces**: *Galaxias maculatus*, *Percichtys* sp., salmónidos (no ident.). **Crustáceos**: *Aegla abtao riolimayana*, *Samastacusspinifrons***. Aves:** pichones (no ident.). **Moluscos:** gasterópodos (*Pseudosuccinea columella*).
Bianchini (2014a). **Peces.**

Voces

Straneck (*in litt*.). Emite varias voces, una muy común es un repetido Keeeehh.kieh.keeh.keeh.

HÁBITAT

Lagunas, ríos, costas marinas, lagos.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Santa Fe, Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Malvinas.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N

Nidifica en colonias.
En el suelo, en playas marinas, islotes en lagunas o isla marinas.

Expuesto. Elaborado. Estructura con forma de plato hondo. Emplea algas, pastos, plumas.

Salvador y Narosky (*in litt*.). Punta Tombo, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 18 y 19 de noviembre de 1983, colonia con aproximadamente 1500 nidos, construídos en acantilados bajos, restingas, áreas pedregosa y en la arena. La mayoría de los nidos con 3 huevos.
Durnford (1878). Punta Tombo, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, diciembre de 1877, colonia, nidos con 2 o 3 huevos.
Smyth (1927). Islas Malvinas, 05-12-1923, huevos.
Pereyra (1938b). Anida en colonias en bañados y cangrejales de la costa este de Buenos Aires.
Olrog (1958a). Isla Media Luna, 11-01-1953, nidos con huevos.
Zapata (1965). Cabo Blanco, 01-01-1965 y Fitz Roy, Punta de los Pájaros, 29-12-1964, dpto. Deseado, Santa Cruz, nidos.
Zapata (1967). Puerto Deseado, dpto. Deseado, Santa Cruz, 20-10-1961, colonia con 30 nidos con huevos en la isla Quiroga y el día 28 en la isla Larga, otra colonia con 30 nidos.
Narosky e Yzurieta (1973b). Melincué, dpto. General López, Santa Fe, 22 y 29 de octubre de 1972, nidos.
Jehl y Rumboll (1976). Río Grande. Los Flamencos, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego, colonia el 31 de octubre.
Malacalza (1987). Punta León, dpto. Rawson, Chubut, 1981-1983, nido en octubre y noviembre.
Yorio y Harris (1992). Isla Brightman, pdo. Villarino, Buenos Aires, Isla Puestos, Isla Gama, Isla Arroyo Jabalí, pdo. Patagones, Buenos Aires, Islas Vernaci, dpto. Escalante, Chubut, 18 de noviembre a 5 de diciembre de 1990, colonias de nidificación con huevos y con pichones.
Coria y Montalti (1993b). Bahía Esperanza, Península Antártica, noviembre de 1989 a enero de 1990, nidos.
Yorio et al. (1994b). Punta León, dpto. Rawson, Chubut, 1989 y 1991, colonias con nidos.
Woods y Woods (1997). Nidifica en Malvinas.
Yorio y Harris (1997). Isla Brightman, pdo. Villarino, Buenos Aires, Isla Gama, pdo. Patagones, Buenos Aires, 1990, colonia de nidificación.
Orgeira (1997c). Punta Cierva, costa de Danco, Península Antártica, nidifica.
Quintana y Yorio (1998a). Punta León, dpto. Rawson, Chubut, 1990-1992, nidificando.
Quintana y Yorio (1998b). Punta León, dpto. Rawson, Chubut, 1989-1990, nidificando.
Yorio et al. (1998c). Islotes al oeste del canal del Embudo, Isla Trinidad, Islote Norte de Isla Morro de Indio, Isla Puestos, Banco Nordeste, Islote Arroyo Jabalí Este y Oeste, dptos. Villarino y Patagones, Buenos Aires, 1990-1995, nidificando.
González et al. (1998). Isla Novaro, Islotes del Canal Escondido, Isla La Pastosa, Islote de los Pájaros, dpto. San Antonio, Río Negro, 1990-1995, nidificando.
Yorio et al. (1998a). Islote Notable, Islas de la Caleta, Isla Gaviota, Punta Delgada, Playa La Pastosa, Punta Pirámide, dpto. Biedma, Punta León, dpto. Rawson, Chubut, Punta Clara, Punta Gutiérrez, Cabo San José, Isla Acertada, Isla Cumbre, Islas Blancas, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 1990-1995, nidificando.
Yorio et al. (1998b). Isla Moreno, Isla Sola, Isla Aguilón del Norte, Isla Rasa, Península Lanaud, Isla Buque, Isla Pan de Azúcar, Islotes Arellano, Islotes Massa, Islas Laguna, Islote Galfráscoli, Islote Luisoni, Isla Patria, Islote frenta a la Isla Patria, Isla Blanca, Isla Tova, Isla Tovita, Isla Gaviota, Isla Este, Isla Sur, Islotes Goëland, Isla Gran Robredo, Isla Pequeño Robledo, Isla Lobos, Islas Galiano, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 1990-1995, nidificando.
Yorio et al. (1998b). Isla Felipe, Islas Isabel, Isla Ceballo, Islas Vernaci, Islas Viana, Isla Quintano, dpto. Escalante, Chubut, 1990-1995, nidificando.
Gandini y Frere (1998). Monte Loayza, Cabo Blanco, Punta Guanaco, Isla Chaffers, Isla Larga, Isla Quiroga, Islote Burlotti, Isla de los Pájaros, Islote de Cañadón del Puerto, Isla del Rey, Isla Pingüino, Isla Schwarz, Isla Liebres, dpto. Deseado, Santa Cruz, 1990-1995, nidificando.



Frere y Gandini (1998). Islote del Bajío, Isla Rasa Chica, Islote Sin Nombre, Banco Cormorán, Banco Justicia I y II, Isla Leones, Isla de Monte León, Isla Deseada, Cabo Vírgenes, dpto. Güer Aike, Santa Cruz, 1990-1995, nidificando.
Schiavini et al. (1998). Islote al norte de Lucas Este, Isla H, Isla Bridges, Isla Reynolds, Isla Leeloom, Isla Mary Ann, Isla Chata, Isla Conejo, dpto. Ushuaia, Tierra del Fuego, 1990-1995, nidificando.
García Esponda et al. (2000). Isla Halfmoon, Islas Shetland del Sur, 1995/96, nidificando.
Bertellotti et al. (2001). Islote La Pastosa, Islote Redondo, dpto. San Antonio, Río Negro, Islote de los Pájaros, Islote Notable, Estancia San Lorenzo, Isla Primera, Playa La Pastosa, Punta Pirámide, Punta León, dpto. Rawson, Chubut, Punta Clara, (2002), nidificando.
Delhey et al. (2001c). Isla del Puerto, pdo. Villarino, Buenos Aires, 21-10-1999, colonia de nidificación.
Bertellotti et al. (2001). Isla de los Pájaros, dpto. Biedma, Chubut, colonia de nidificación.
Rábano et al. (2002). Islote Canal Ancla, pdo. Villarino, Buenos Aires, 16-11-2001, colonia de nidificación.
Christie et al. (2004). Huevos en diciembre en el noroeste patagónico.
Albrieu et al. (2004). Isla Deseada, dpto. Güer Aike, Santa Cruz. Nidifica en el suelo o en matas. El número de parejas reproductoras fue estimado en 12.200.
Petracci et al. (2004a). Isla del Puerto, estuario de Bahía Blanca, Buenos Aires, octubre-diciembre de 2003, colonia con nidos.
Yorio et al. (2005a).Isla Puestos, Banco noreste de Isla del Jabalí, Isla Arroyo Jabalí Este, Isla Arroyo Jabalí Oeste, pdo de Patagones, Buenos Aires, (2000). Punta Tombo, Islote Puente, Islotes Arellanos, Islotes Massa, Islote Laguna, Islote Laguna, Islote Galfráscoli, Islote Luisoni, Isla Tovita, Isla Gaviota, Isla Este, Isla Sur, (2001). Isla Mayor, Isla Menor Oeste, Isla Menor Este, Isla Moreno, Isla Sola, Isla Leones, Península Lanaud, Isla Buque, (2002). Isla Norte, Isla Central, Isla Sur, Isla Ceballo, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, Isla Felipe, Isla Ezquerra, Islas Vernaci, dpto. Escalante, Chubut, (2003), nidificando.
Mauco et al. (2007). Isla de la Ría San Clemente, San Clemente del Tuyú, pdo. Partido de la Costa, Buenos Aires, colonia de nidificación el 03-09-2005.
Suárez et al. (2010). Islas Conejo y Bridges, dpto. Ushuaia, Tierra del Fuego, 2005, colonias con nidos.
Coria et al. (2011). isla Laurie, Orcadas del Sur, 1993-94 y 1994-95, nidificando.
De la Peña (2013c). Isla de los Pájaros, dpto. Biedma, Chubut, 26-11-1973, 2, 3 y 4 huevos; Punta Tombo, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 27-11-1973, 2 y 3 huevos; Melincué, dpto. General López, Santa Fe, 25-10-1974, huevos y pichones; Isla de los Pájaros, dpto. Biedma, Chubut, 04-11-1979, de uno a 3 huevos. Medidas: diámetro total: de 18 a 25 cm, profundidad: 1 a 4 cm.
Segura et al (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 4 nidos.
Suárez et al. (2014). Bahía San Blas, Buenos Aires, octubre y noviembre de 2013, colonias de nidificación.

Huevos
Pone 3, a veces 4 huevos. Ovoidales. De color oliváceo u ocre oliváceo con pintas y manchas pardas, castañas y grises, distribuidas por toda la superficie. Algunos huevos con líneas oscuras.

Medidas
Salvador y Narosky (*in litt*.): 65,5 a 74,1 x 45,3 a 50,1 X= 70,2 x 48,2 (N= 9)
Gibson (1920): 73 x 51
Pereyra (1938b): 75 x 53
Malacalza (1987): 65 a 77,1 x 41,2 a 49,4 X= 70,4 x 46,6 (N= 27)
De la Peña (2013c): 69,2 a 75,8 x 47 a 50,2 X= 72,2 x 48,9 (N= 10)



Pesos
Salvador y Narosky (*in litt*.): 76 a 95 X= 86,8
Malacalza (1987): X= 86,8 (N= 5)
De la Peña (2013c): cáscaras 5,892 a 6,813 X= 6,249 (N= 10)

Anónimo (1933): huevos colectados en Viamonte, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego, por T. L. y G. P. Bridges y P. W. Reynolds, en el Museo Nacional de Historia Natural.

PICHONES

Descripción

De la Peña (2013c). Pico oscuro con punta clara. Plumón grisáceo amarillento. Cabeza ocrácea con manchas y puntos pardo oscuro. Ventral blanquecino.

Observaciones

Reynolds (1934). Lago Yehuin, pichones.
Olrog (1958a). Potter, Isla Rey Jorge, 20-01-1953, nidos con pichones.
Christie et al. (2004). Pichones en diciembre en el noroeste patagónico.

Generalidades

Malacalza (1987); Yorio y García Borboroglu (2002). Período de incubación: 26-27 días.
De la Peña, (2013). 07-11-79. Puerto Deseado. Pobladores locales sacaban huevos para consumo.

Más información:
Malacalza (1987). Yorio y García Borboroglu (2002). Yorio et al. (2005a)

Depredadores

De adultos: *Falco peregrinus* (Santillán et al. 2010b); *Oncifelis geoffroyi* (Canepuccia et al. 2007)

Otros

Petracci et al (2001). Albinismo en Gaviota cocinera (*Larus dominicanus*).

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño grande. Dorsal negra con el borde de las alas blanco. Ventral y cola blancas. El juvenil, pardo jaspeado de blanquecino.
Se diferencia de la Gaviota cangrejera por ser más grande y no tener franja negra en la cola.



Punta Tombo. Chubut. 27-11-1973



Isla de los Pájaros. Chubut. 26-11-1973



Isla de los Pájaros. Chubut. 26-11-1973



Punta Tombo. Chubut. 27-11-1973




Punta Tombo. Chubut. 27-11-1973



Punta Tombo. Chubut. 27-11-1973

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Larus dominicanus dominicanus Lichtenstein, 1823 costas e islas desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, las islas Malvinas. Por el interior desde San Juan, Mendoza Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos a Santa Cruz; *Larus dominicanus austrinus* Fleming, 1924, Antártida e islas antárticas, Georgias, Shetland, Orcadas, Sandwich del Sur y archipiélago Antártico.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Cinco subespecies. Costas del Pacífico de Ecuador, Perú y Chile. Costas del Atlántico de Brasil, Uruguay y Argentina. Por el interior en Argentina. Una subespecie nidifica en la Antártida. Se encuentra también en Australia, Nueva Zelanda, sur de África, Madagascar e islas del Océano Indico.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Larus dominicanus dominicanus Lichtenstein, 1823

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Camperi (1992c); Castro y Cicchino (1992); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Durnford (1878); Fiameni (1994); Filipello y López de

Casenave (1993); García y Gómez Laich (2007); Gibson (1880b, 1920); Hartert y Venturi (1909); Isacch et al. (2006); Klimaitis (1975b); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); La Sala et al. (2013); Lucero (1982); Marelli (1933); Mérida y Bodtati (2006); Morici (2012b); Narosky et al. (1990); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Silva et al. (2000); Suárez et al. (2014); Weller (1967a); Yorio et al. (1998c); Zapata (1965, 1998)

Observaciones: De la Peña (Claromecó, 07-02-1976)

Chubut
Citas: Bertellotti et al. (2001); Bó (1958); Boswall (1973); Camperi (1998); Contreras et al. (1980b) ; Daciuk (1977c); Darrieu y Camperi 2000 (2001); De la Peña (2013c); Gatto et al. (2005); Giaccardi et al. (1997); Giaccardi y Yorio (2004); Grigera y Rubullis (1985); Lucero (1982); Malacalza (1987); Parera (1992); Quintana y Yorio (1998a, 1998b, 1999); Sainz-Trápaga (2014); Straneck (1990a); Yorio et al. (1994b, 1998a)

Observaciones: De la Peña (Esquel, 02-02-1976)

Córdoba
Citas: Nores (1996); Nores et al. (1983); Nores y Yzurieta (1980b); Salvador (1983a); Yzurieta (1995)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); De la Peña (2012b); Raffo et al. (2008); Zapata (1975, 1977)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Di Giacomo et al. (2001); Narosky et al. (1990); Siegenthaler (1984, 2004); Tejerina et al. (2006)

Mendoza
Citas: Sosa (1995d, 2003, 2005)

Neuquén
Citas: Bianchini (2014a); Contreras (1975, 1977b); Chehebar et al. (1992); Christie et al. (2004); Daciuk (1968, 1978, 1983a); Giai (1942); Gollán (1951); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Pereyra (1945); Steullet y Deautier (1939); Veiga et al. (2005)

Observaciones: De la Peña (La Rinconada, dpto. Huiliche, 27-01-1976)

Río Negro
Citas: Bergkamp (1995a); Bianchini (2014a); Camperi (1998); Casas (1992a); Contreras et al (1980b); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Daciuck (1977); Gelain (1984a, 1984b, 2001, 2007b, 2011b, 2012b); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); González et al. (1998); Grigera y Rubulis (1985); Llanos et al. (2011); Paz (1991b); Pérez y Petracci (1998); Peters (1923b)

Observaciones: De la Peña (San Carlos de Bariloche, dpto. Bariloche, 31-01-1976)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Gelain (2009a)

Santa Cruz
Citas: Albrieu y Navarro (1997); Albrieu et al. (2004); Arrighi y Navarro (1998); Coconier (2005b); Daciuk (1977); Daneri (1959); Darrieu et al. (2008); De la Peña (2013c); Erize (1983); Frere et al. (2000); Frere y Gandini (1998); Gandini y Frere (1998a, 1998b); Goodall et al. (1991); Hellmayr y Conover (1948b); Imberti

(2005e) ; Imberti y Albrieu (2001); Lange (1981); Lucero (1982); Nasca et al. (2004); Oates (1901); Oustalet (1891); Roesler et al. (2013a); Scott y Sharpe (1910); Steullet y Deautier (1939); Yorio et al. (2005a); Zapata (1965, 1967, 1969)

Observaciones: De la Peña (Puerto Deseado, dpto. Deseado, 26-01-1972)

Santa Fe
Citas: Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f, 2013c); Wilson (1926)

Tierra del Fuego
Citas: Castellanos (1935); Chebez y Bertonatti (1994); Clark (1986); Earnshaw (1973); Humphrey et al. (1970); Jehl y Rumboll (1976); Olrog (1948, 1950); Reynolds (1934); Ripley (1950); Schiavini et al. (1998); Suárez et al. (2010)

Observaciones: De la Peña (Río Grande, 31-01-1972; Ushuaia, 01-01-1972)

Canal de Beagle
Citas: McGehee y Eitniear (2007); Stiles (1979a)

Islas Malvinas
Citas: Bennett (1920); Wace (1921); Woods y Woods (1997); Woods (2006)

Larus dominicanus austrinus Fleming, 1924

Islas subantárticas
Citas: Bennett (1920); Castellanos (1927); Coria y Montalti (1993b); Daciuk (1983a); Montalti y Soave (2002); Olrog (1958a); Orgeira (1997a, 1997c, 2004); Silva et al. (1998b)

Georgias del Sur
Citas: Prince y Croxall (1996)

Orcadas del Sur
Citas: Bennett (1920); Coria et al. (2011); Orgeira (1997a); Paz (1990a); Silva et al. (1998b)

Shetland del Sur
Citas: Arechabala y Novatti (1983); Bennett (1920); García Esponda et al. (2000); Montalti y Orgeira (2001); Olrog (1958a); Orgeira (1997a); Orgeira y Montalti (1998); Shuford y Spear (1988); Silva et al. (1998b)

Mares
Citas: Montalti y Orgeira (1998); Orgeira (1995b, 2001a); Savigny (2002c)

Subfamilia: Sterninae

GAVIOTÍN CHICO BOREAL *Sternula antillarum* Lesson, 1847

Otros nombres: Charrancito americano. Gaviotín chico menor.

DESCRIPCIÓN
Largo: 22-24 cm.
Coloración. Pico negruzco en reposo sexual. Amarillo con punta negra en período nupcial. Patas amarillas. Iris pardo oscuro.

Plumaje de reposo sexual.
Frente blanca. Corona, nuca y cuello posterior blancos moteados de oscuro. Dorsal y superior de las alas grises. Ventral y cola blancas.
Alas grises con las primarias externas negras.
Plumaje nupcial.
Frente blanca. Corona, cuello posterior y una línea desde el pico hasta los ojos negros. Resto del plumaje semejante al de reposo sexual.
Juvenil. Nuca blanquecina jaspeada de oscuro. Mancha oscura detrás de los ojos. Dorsal grisácea jaspeada de ocráceo. Pico negro. Patas amarillas.



HÁBITAT
Costas marinas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. Se parece al Gaviotín chico común pero tienen diferente color de pico.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Sternula antillarum antillarum Lesson, 1847 migratorio de Norteamérica. Observado en la costa de Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Nidifica desde Estados Unidos a Honduras en Centro América. Durante el invierno boreal migra a Sud América.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Sternula antillarum antillarum Lesson, 1847

Buenos Aires
Citas: Jaramillo (2000); Narosky y Sutton (1991); Olrog (1969); Pugnali y Chamorro (2008)

GAVIOTÍN CHICO COMÚN *Sternula superciliaris* (Vieillot, 1819)

Otros nombres: Atí ceja blanca. Atí maculado. Gaviotín chico. Gaviotín chico mayor. Gaviotín de ceja blanca. Martincito pescador.

DESCRIPCIÓN
Largo: 23 cm
Peso: Contreras (1986a) N= 2 (M) 71,0 y 62,78); N= 2 (H) 63,0 y 66,5 g
Coloración. Pico y patas amarillos. Iris pardo.
Corona, nuca y cuello posterior negros. Franja desde el pico a los ojos negra. Frente y línea hacia los ojos blancas. Dorsal y superior de las alas grises. Ventral blanca. Las cuatro primarias externas negras, orilladas de blanco en la lámina interna; las restantes grises. Secundarias grises con puntas blanquecinas. Cola gris, ahorquillada.
Plumaje de reposo sexual.
Nuca y posterior del cuello blancos, moteados de oscuro.
Juvenil. Corona jaspeada de oscuro. Dorsal moteada de parda.

COMPORTAMIENTO
Anda solitario o en grupos.
Alimentación
Olguín et al. (2013b). **Peces:** *Holoshestes pequira, Astyarax* sp., *Cheirodon* sp. , *Cnesterodon decenmaculatus.* **Insectos:** *Belostoma micantulum, Belostoma elongatum*, Coleoptera no identificados.
Crustáceos:*Macrobrachium borelli*

HÁBITAT
Ríos, lagos, costas marinas.

NIDIFICACIÓN

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N								N	N	N	N



Se localizaron nidos en Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Corrientes.

Nidifica en colonias, a veces solitario. Forma colonias junto a otras especies.

En el suelo. En arenales en islas o en bancos de arena en los ríos.
Expuesto. Poco elaborado. Escavación.

Hartert y Venturi (1909). Bella Vista, setiembre de 1903, nidos.
Smyth (1927). Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, 19-09-1926 y 03-10-1926, huevos.
Klimaitis y Moschione (1984). Banco Caraballo, dpto. Colón, Entre Ríos, 3 nidos con 2 huevos, 2 huevos y un pichón, en una colonia de *Charadrius collaris* y *Rynchops niger.*
Povedano (1999). Mar Chiquita, pdo. Mar Chiquita, Buenos Aires, 29-01-1994, nido con 3 huevos.
Maugeri (2005) Río Paraná inferior, pdo. Ramallo, Buenos Aires, 27-01-2001, colonia de nidificación junto al Chorlito de collar (*Chadrius collaris*) en banco de arena, con huevos. El 23-01-2003, en otro arenal otro nido con 2 huevos.
Salvador y Narosky (*in litt*.). Banco Caraballo, dpto. Colón, Entre Ríos, 19-12-1984, 6 nidos en depresiones en la arena de 14 a 15 cm de diámetro y de 4 a 5 cm de profundidad, postura de 2 ó 3 huevos.
De la Peña (2013c). Reconquista, dpto. General Obligado, Santa Fe, 4 nidos: 15-11-1975, 2 huevos y 3 huevos; 28-11-1975, un huevo y 3 huevos; Río Paraná (Paraná), dpto. Paraná, Entre Ríos, 04-10-1977, colonia junto a *Phaetusa simplex y Rynchops niger,* huevos; Río Paraná (Paraná), dpto. Paraná, Entre Ríos, 31-10-1977, colonia junto a nidos de *Rynchops niger,* huevos; Río Paraná (Paraná), dpto. Paraná, Entre Ríos, 22-11-1977, colonia con 20 nidos con huevos; El Cerro, dpto. Paraná, Entre Ríos, 23-10-1981, 2 huevos; Colón, dpto. Colón, Entre Ríos, 21-01-1987, colonia junto a *Phaetusa simplex y Rynchops niger* con pichones; Río Paraná. (La Paz), dpto. La Paz, Entre Ríos, 10-11-1994, Huevos.
Total de colonias: 4 Total de nidos solitarios: 6
Medidas: diámetro total: de 10 a 13 cm, profundidad: 2 a 3 cm.

Huevos
Pone 3 huevos. Ovoidales. De color ocre o crema con pintas y manchitas castañas y grises, distribuidas por toda la superficie.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 30 a 44 x 24 a 25

Salvador y Narosky (*in litt*.): 30,8 a 33,8 x 22,9 a 24,6 X= 32,5 x 23,7 (N= 11)
Klimaitis y Moschione (1984): 30, 4 a 32,8 x 23,3 a 24,1 X= 31,8 x 23,7 (N= 4)
De la Peña (2013c): 30,4 a 34 x 23,5 a 25 X= 31,6 x 24,1 (N= 13)

Pesos
Salvador y Narosky (*in litt*.): 11,3
De la Peña (2013c): cáscaras 0,520 a 0,614 X= 0,566 (N= 7)

PICHONES
Descripción
De la Peña (2013c). Plumón dorsalmente ocráceo o crema con escasas estrías y manchitas oscuras. Ventralmente blanquecino.

Destrucción
De la Peña (2013c). Río Paraná (Paraná), dpto. Paraná, Entre Ríos, 31-10-1977, en esta colonia un pescador recolectó casi todos los huevos para consumo.
De la Peña (2013c). Colón, dpto. Colón, Entre Ríos, 21-01-1987, la creciente del río la destruyó a esta colonia.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. Pico y patas amarillos. Capucho negro, con frente blanca.
Se parece al Gaviotín chico boreal pero se diferencia por el color del pico.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Sternula superciliaris (Vieillot, 1819) en Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y noreste de Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. En Sud América, al este de los Andes, desde el norte, Colombia, Venezuela hasta Argentina, en ríos y lagos. Comprende: Trinidad y Tobago, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay.



Colón. Entre Ríos.10-01-2005




Colón. Entre Ríos.10-01-2005




Colón. Entre Ríos.10-01-2005




La Paz. Río Paraná. Isla Curuzú Chalí. Entre Ríos.10-11-1994

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Darrieu y Camperi (2001a); Gibson (1920); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis (1975b); Maugeri (2005); Mérida y Bodtati (2006); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pereyra (1938b); Poverano (1999); Pugnali y Chamorro (2008)


Córdoba
Citas: Cobos et al. (1999)

Chaco
Citas: Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b)

Corrientes
Citas: Chatellenaz et al. (2010); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); De la Peña (2012b, 2013c); Klimaitis y Moschione (1984); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2001a, 2001b); Muzzachiodi et al. (2003); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923)



Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c);Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Gorleri et al. (2011); López Lanús (1997); Narosky y Martelli (1995)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2012b); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); López-Lanús et al. (2013a); White (1882)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

Santa Fe
Citas: De la Peña (1979j, 2011f, 2013c); Hartert y Venturi (1909); Olguín et al. (2013b)

ATÍ *Phaetusa simplex* (J. F. Gmelin, 1789)

Otros nombres: Atí cabeza negra. Atí pico corto. Gaviotín. Gaviotín de pico grande. Gaviotín de pico grueso.

DESCRIPCIÓN
Largo: 37-39 cm.
Peso: Contreras (1986a) N= 2 (H) 242,0 y 226,5 g
Coloración. Pico amarillo. Patas amarillas verdosas. Iris pardo oscuro.
Superior de la cabeza negro. Estrecha línea blanca por encima del pico. Dorsal y cola grises. Garganta, cuello y ventral blancos.
Primarias negras. Secundarias blancas. Cubiertas grises.
En el plumaje de reposo sexual tiene la corona grisácea con la nuca y banda posocular más oscuras.

Juvenil. Semejante al adulto en reposo sexual pero con las partes dorsales grisáceas moteadas de pardo.

COMPORTAMIENTO
Anda solitario, en parejas o en grupos dispersos. Emite un grito fuerte.

Alimentación
Beltzer (1984c). **Insectos:** Coleoptera (Carabidae, Curculionidae). Hemípteros (*Belostoma* sp*., Ranata* sp.). Odonatos anisópteros. Ortópteros. **Peces:***Apareiodon affinis, Astyanax* sp., *Auchenipterus nuchalis,Cichlaurus bimaculatus*, *Corydoras hastatus*, *Crenicichla* sp., *Cheirodon* sp.*,Eigenmannia virescens*, *Gymnotus carapo, Holoshesthes pequira,Hyphessobrycon lutkenii*, *Pachyurus* sp., *Pimelodella* sp., *Salminus maxillosus*, *Serrasalmus nattereri.*
De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). Peces.

HÁBITAT
Ríos, lagunas.

NIDIFICACIÓN

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
							N	N	N	N	N

Se localizaron nidos en Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes.



Nidifica en colonias, a veces junto a otras especies.
En el suelo, en bancos de arena.
Expuesto. Poco elaborado. Excavación.

Salvador y Narosky (*in litt*.). Banco Caraballo, dpto. Colón, Entre Ríos, 19-12-1984, un nido en una depresión en la arena con un pichón.
Hartert y Venturi (1909). Bella Vista, 15-09-1903, nidos
Smyth (1927). Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, 15-10-1922, 19-10-1926 y 03-10-1926, huevos.
De la Peña (2013c). Proximidades de la isla Chapetón, Río Paraná, dpto. Paraná, Entre Ríos, 22-11-1977, nidos junto a una colonia de *Sterna superciliaris y Rynchops niger,* un huevo, otro, 2 pichones; Colón, dpto. Colón, Entre Ríos, 3 nidos: 3 huevos, 2 pichones y un pichón; Río Paraná, Isla Curuzú Chalí, dpto. La Paz, Entre Ríos. La creciente destruyó muchos nidos, 10-11-1994, huevos y pichones; Río Paraná, Isla Yaguareté, dpto. Goya, Corrientes, colonia con unos 200 nidos, con 1 a 3 huevos, algunos con 4 y uno con 5. Había además unos pocos nidos de *Rynchops niger*, 26-08-1995, huevos y pichones.
Excavación en el suelo arenoso. Medidas: diámetro total: de 21 a 23 cm.



Huevos
Pone 2 ó 3, a veces 4 ó 5 huevos. Ovoidales. De color crema o verdoso con pintas y manchitas castañas y grises distribuidas por toda la superficie.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 46 a 51,5 x 35 a 37
De la Peña (2013c): 48 a 49,5 x 36 a 37 X= 48,5 x 36,3 (N= 4)

Pesos
De la Peña (2013c): cáscaras 1,80 a 1,90 X= 1,85 (N= 4)

PICHONES
Descripción
Salvador y Narosky (*in litt*.). Plumón acanelado, con patas y pico amarillentos.
De la Peña (2013c). Pico claro. Cuerpo cubierto de plumón crema (color arena).

Generalidades
De la Peña (2013c). A las mojarritas que traían para alimentar a los pichones, les cortaban la cabeza, antes de dárselas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Pico grande, amarillo. Cola cuadrada. Gris, blanco y negro a las alas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Phaetusa simplex chloropoda (Vieillot, 1819) en Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Misiones, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.


Campo Andino. Santa Fe. 11-12-2007


Colón. Entre Ríos. 10-01-2005




Colón. Entre Ríos. 10-01-2005



Colón. Entre Ríos. 10-01-2005



Esperanza. Santa Fe. Río Salado. 05-03-2014

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies. Nidifica en ríos y lagos en Sud América desde el norte hasta Argentina y Uruguay. Comprende: Cuba, Trinidad y Tobago, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Phaetusa simplex chloropoda (Vieillot, 1819)

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati (2001); Bodrati et al. (1997a, 2006b); Darrieu y Camperi (2001a); Dunford (1877); Hartert y Venturi (1909); Lynch Arribálzaga (1878); Mérida y Bodrati (2006); Pereyra (1938b); Pugnali y Chamorro (2008)

Chaco

Citas: Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b)

Observaciones: De la Peña (Resistencia, dpto. San Fernando, 26-09-1972)

Córdoba

Citas: Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1980b); Yzurieta (1995)


Corrientes

Citas: Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b, 1986a); De la Peña (2013c); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); Straneck (1990e)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos

Citas: Baliño (1984); Baliño y Biole (1984); Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); De la Peña (2012b, 2013c); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2001a, 2001b); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923)



Formosa
Citas: Contreras (1987c);Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Gorleri et al. (2011); López Lanús (1997); Pujalte et al. (1995)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009) Camperi et al. (2012)

Misiones
Citas: Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005)

Salta
Citas: Echevarría et al. (2014); Moschione et al. (2013)

Santa Fe
Citas: Beltzer (1984, 1986); De la Peña (2011f); Fandiño y Pautasso (2011); Hartert y Venturi (1909);López-Lanús et al. (2013a); Pautasso (2002b)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Lucero (1983)

GAVIOTÍN DE PICO GRUESO *Gelochelidon nilotica* (J. F. Gmelin, 1789)

Otros nombres: Gaviotín de pico negro. Gaviotín de pico y patas negros. Gaviotín pico grueso. Gaviotín pico de gaviota.

DESCRIPCIÓN
Largo: 33-43 cm.
Peso: Camperi (1992c): N= 2 (M) 280 y 300 g; N= 3 (H) X: 216,7 g (Rango 200 a 250); Salvador (2014a): N= 1 (M) 188 g; N= 1 (H) 173 g
Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo oscuro.
Corona, nuca y lados de la cabeza negros. Dorsal, cola y cubiertas alares grises. Ventral blanca. Primarias grises, con parte de la lámina interna blanca.
En el período de reposo sexual presenta la frente y anterior de la corona blancas. Resto de la corona y nuca grises con finas rayitas negras. Franja ocular u auricular negra.
Juvenil. Semejante al adulto en invierno, pero jaspeado de pardo en la cabeza y dorso y con la banda ocular poco notable. Patas pardas rojizas.

COMPORTAMIENTO
Anda solitario o a veces en grupos.


Alimentación
De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). Peces.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Peces:** (Anablepidae: *Jenynsia multidentata*, Poeciliidae: *Cnesterodondecenmaculatus*).

HÁBITAT
Lagunas, ríos, costas marinas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Mendoza, Córdoba, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N											N

Excavación recubierta de palitos o pajas.



Nores e Yzurieta (1979b). Laguna de Mar Chiquita, desembocadura del río Segundo, dpto. San Justo, Córdoba, mediados de diciembre de 1976, en un islote, colonia con unos 70 a 100 nidos con huevos.
Sosa (2005). Llancanelo, dpto. Malargüe, Mendoza. El 16-01-1991 se localizaron nidos en una isleta, con cáscaras de huevos y pichones muertos. Al año siguiente en la misma zona se registraron 8 nidos activos.
Suárez et al. (2014). Bahía San Blas, Buenos Aires, durante 2007 y 2008, se registraron nidos.

Huevos
Pone 3 huevos. Base amarillenta oliváceo con manchas pardo oscuro, pardo rojizo y violeta diluido.
Hay variación en el color de base.

Medidas
Nores e Yzurieta (1979): 46 x 33

PICHONES
Descripción
Nores e Yzurieta (1979b). Superior del cuerpo leonado claro con manchas negras, que se disponen formando tres bandas longitudinales en el lomo y una en las alas. Partes inferiores blancas. Iris negro.
Mandíbula inferior córnea con base negruzca. Mandíbula superior, comisura e interior de la boca, naranja.
Patas anaranjadas, más ocuro en los nudillos y más naranja en las membranas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Pico grueso. Capucho negro. Cola gris poco ahorquillada.
En el período sexual puede confundirse con el Gaviotín lagunero.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Gelochelidon nilotica groenvoldi (Mathews, 1912) en Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Córdoba , Santa Fe y Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Seis subespecies. Se encuentra tanto en el Viejo como Nuevo Mundo. Nidifica en Europa, Asia, Australia, ambas costas de Norte América y Centro América. En Sud América, nidifica en la costa noroeste del Pacífico y en el este Atlántico, en Guayana Francesa, Brasil, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Gelochelidon nilotica groenvoldi (Mathews, 1912)



Buenos Aires
Citas: Camperi (1992c); Darrieu y Camperi (2001a); Deveillers (1977); Gibson (1920); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Maugeri (2002a); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Suárez et al. (2014)

Observaciones: De la Peña (Claromecó, pdo. Tres Arroyos, 07-02-1976)

Chubut
Citas: Sainz-Trápaga (2014)

Córdoba
Citas: Bucher y Herrera (1981); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1979b, 1980b); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Miramar, dpto. San Justo, 27-11-1977)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Bruno (2009); Bruno et al. (2007); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (1999); Siegenthaler (2004); Tejerina et al. (2006)

Mendoza
Citas: Blendinger y Alvarez (2002); Chebez et al. (1993); Sosa (1995d, 2005)

Río Negro
Citas: Canevari (1979); Llanos et al. (2011)

Salta
Citas:Echevarría et al. (2014)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2011f); Di Giacomo et al. (2001); Fandiño y Pautasso (2011); Pautasso (2002a); Romano et al. (2005)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

GAVIOTÍN NEGRO *Chlidonias niger* (Linnaeus, 1758)

Otro nombre: Fumarel.

DESCRIPCIÓN
Largo: 23-28 cm.
Peso: Contreras (1979c): N=1 (M) 64,5 g**.**
Coloración. Pico negro. Patas pardas. Iris pardo.
Plumaje de reposo sexual.
Línea ocular, corona posterior, nuca y parte del cuello posterior negras. Frente, corona anterior, lados de la cabeza, garganta, parte del cuello posterior y todo lo ventral, blancos. Dorsal, alas y cola color gris plomizo. Margen blanco delgado en la parte anterior de las alas.
Plumaje nupcial.

Cabeza, cuello, pecho y ventral, negros. Dorsal, alas y cola color gris pizarra. Subcaudales blancas. Ventral de las alas gris clara.
Juvenil. Se parece a los adultos en reposo sexual pero con la cabeza y el dorso moteados de pardo.

HÁBITAT
Costas marinas, lagunas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. Frente y anterior de la corona blancos. Posterior de la corona negro. Ventral blanca. Cola corta, poco ahorquillada.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Chlidonias niger surinamensis (J. F. Gmelin, 1789) migratorio de Norteamérica.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Se lo encuentra tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo (holoartico). En América nidifica en Canadá y Norte de Estados Unidos, migrando hacia las costas atlánticas y del Pacífico de Centro América y Sud América. Existen numerosos reportes de su presencia en Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Chlidonias niger surinamensis (J. F. Gmelin, 1789)


Buenos Aires
Citas: Bodrati et al. (2006b); Camperi et al. (2012); Darrieu y Camperi (2001a); Ferrari y Henschke (2002); Jaramillo (2000); Narosky y Di Giacomo (1993); Pugnali y Chamorro (2008)

Chaco
Citas: Chatellenaz (2005a); León y Diaz Neto (1988)

Córdoba
Citas: Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1980b); Yzurieta (1995)

Corrientes
Citas: Contreras y Contreras (1984)

Formosa
Citas: Contreras et al. (2014)



Jujuy
Citas: Olrog (1969); Moschione (2010b);Rodríguez et al. (2010)

Mendoza
Citas: Aramburú (1983); Contreras (1979c); Contreras y Fernández (1980); Darrieu et al. (1985); Darrieu (2014); Martínez et al. (1985)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

San Luis
Citas: Nellar Romanella (1993)

Santiago del Estero
Citas: Quiroga et al. (2015)

GAVIOTÍN GOLONDRINA *Sterna hirundo* Linnaeus 1758

Otros nombres: Charrán común. Gaviotín agolondrinado. Gaviotín de norteamérica. Gaviotín de Wilson. Gaviotín golondrina chico. Gaviotín golondrina cosmopolita. Golondrina de mar de pico y dedos bermejos.

DESCRIPCIÓN
Largo: 33-40 cm.
Peso: Haverschmidt (1968): (M) de 122 a 131 g; (H) de 111 a 128 g.
Coloración. Pico rojo con punta negra. En el período de reposo sexual pasa a ser negro con algo de rojo en la base. Patas rojas. Iris pardo oscuro.
Plumaje de reposo sexual.
Frente y anterior de la corona blancos. Posterior de la corona y nuca negros, jaspeados de blanco. Dorsal gris.
Alas grises con lámina externa de las primarias gris oscura, las internas grises y blancas. Secundarias grises y blancas. Cubiertas alares superiores grises oscuras. Borde de las alas, rabadilla y parte ventral blancos. Cola gris, con la lámina externa de las plumas externas gris y la interna blanca.
Plumaje nupcial.
Superior de la cabeza negro. Ventral gris clara.
Juvenil.
Semejante al plumaje de reposo sexual pero con las partes dorsales moteadas de pardo. Cubiertas superiores pardas formando una banda.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Mauco y Favero (2004). **Insectos:** Coleópteros (*Dyscinetus rugifrons, Dyscinetus gagates*). (Scarabacidae, *Cyclocephala signaticollis*). Hemípteros (Bellostomidae, *Bellostomaelegans*). Lepidópteros. Odonata (Aeshnidae, *Aeshna* sp.) .Ortópteros (Grillidae, Tettigoniidae) (Grillotalpidae, *Scapteriscus* sp.). **Peces:***Anchoa marinii, Brevoortia aurea, Cynoscion guatucupa, Engraulis anchoita, Micropogonias furnieri, Odonthestes argentinensis, Odonthestes incise, Pomatomus saltatrix, Urophysis brasiliensis.*
Silva Rodríguez et al. (2005).**Peces:** *Anchoa marinii, Cynoscion guatucupa, Engraulis anchoita, Micropogonias furnieri, Odonthestes argentinensis, Paralonchurus brasiliensis, Pimelodella gracilis, Rhamdia quelen, Sorgentinia incisa.*
De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). Peces.

HÁBITAT
Lagunas, costas marinas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño mediano. Pico fino, cola ahorquillada que no pasa la longitud de las alas plegadas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Sterna hirundo hirundo Linnaeus 1758 migratorio Norteamérica. Llega por la costa atlántica hasta Tierra del Fuego y las Malvinas. En el interior, Santiago del Estero, Mendoza, San Luis, Córdoba, Misiones y Chubut.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cuatro subespecies. Nidificación holoártica, circumpolar, en Europa, Asia y Norte América. En América inverna a lo largo de toda la costa de Sud América hasta Tierra del Fuego e islas Malvinas.



CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Sterna hirundo hirundo Linnaeus 1758

Buenos Aires
Citas: Coconier (2005b); Darrieu y Camperi (2001a); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Mauco y Favero (2004); Mauco et al. (2001);Narosky y Di Giacomo (1993)

Observaciones: De la Peña (San Clemente del Tuyú, pdo. Gral. Lavalle, 14-01-1983)

Córdoba
Citas: Bucher y Herrera (1981); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1980b, 1981); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Miramar, dpto. San Justo, 27-11-1977)

Chubut
Citas: Kovacs et al. (2005); Sainz-Trápaga (2014)

Mendoza
Citas: Martínez y Calí (2013)

Misiones
Citas: Chebez (1996a)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011); Paz Barreto (1997b); Llanos et al. (2011)

Salta
Citas : Moschione et al. (2013)

San Luis
Citas: Nellar Romanella (1993)

Santiago del Estero

Observaciones: Salvador, S. (Río Dulce, cerca de Loreto, pdto. Loreto, octubre 2007)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986)

Islas Malvinas
Citas: Woods (2006)

GAVIOTÍN ÁRTICO *Sterna paradisaea* Pontoppidan, 1763

Otros nombres: Charrán ártico. Golondrina ártica.

DESCRIPCIÓN
Largo: 33-38 cm.
Peso: Belton (1984): N= 1 (M) 108 g.
Coloración. Pico y patas negros. En el período de reproducción son rojos. Iris pardo oscuro.
Plumaje de reposo sexual.
Frente blanca. Corona y nuca negras moteadas de blanco. Dorsal gris. Rabadilla y partes ventrales blancas. Alas grises con blanco en las secundarias. Cola gris claro con las plumas más externas grises oscuras.
Plumaje nupcial.
Superior de la cabeza negro. Franja blanca por debajo del negro, desde la base del pico hasta el cuello. Dorsal y partes ventrales grises.
Juvenil. Semejante al adulto en reposo sexual, pero con las partes dorsales pardas cenicientas.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Orgeira (1995b). Peces, krill.

HÁBITAT
Costas marinas, islas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño mediano a grande. Cola muy ahorquillada y un poco más larga que las alas plegadas. Diferenciarlo del Gaviotín golondrina.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Sterna paradisaea Pontoppidan, 1763 migratorio del Ártico. Llega hasta Tierra del Fuego y costa patagónica hasta Buenos Aires, las islas Malvinas, el archipiélago Antártico, Georgia del Sur.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en áreas cercanas al Océano Ártico y fuera de la epoca reproductiva viaja hasta la Antártida en un viaje anual ida y vuelta de 40.000 Km

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS



Buenos Aires
Citas: Jaramillo (2000); Murphry (1936); Olrog (1979b); Pereyra (1938b)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011)

Tierra del Fuego
Citas: Humphrey et al. (1970); Keith (1970)

Islas Malvinas
Citas: Woods (2006)

Archipiélago Antártico y Antártida
Citas: Blendinger (1998);Montalti y Soave (2002); Olrog (1958a); Orgeira (1997, 2004)

Georgias del Sur
Citas: Prince y Croxall (1996)

Orcadas del Sur
Citas: Coria et al. (2011); Orgeira (1997a)

Mares
Citas: Orgeira (1995b, 2001a)

GAVIOTÍN SUDAMERICANO *Sterna hirundinacea* Lesson, 1831

Otros nombres: Charrán colilargo. Gaviotín de cola larga. Gaviotín de lomo blanco. Gaviotín golondrina. Gaviotín golondrina grande. Golondrina de mar.

DESCRIPCIÓN
Largo: 40-43 cm.
Peso: Lisnizer et al. (2014): N= 18 (M) X: 176 g (Rango 160 a 200); N= 20 (H) X: 178 g (Rango 150 a 198).
Coloración. Pico y patas rojos en el período nupcial. Negros en reposo sexual. Iris pardo.
Superior de la cabeza negro. Partes dorsales y cubiertas alares grises. Supracaudales y cola blancos. Garganta y pecho grisáceos. Resto de lo ventral blanco.
Primarias y secundarias grises con margen blanco. Primarias más externas con lámina externa gris pizarra.
En el período de reposo sexual tiene la frente y todo lo ventral blancos.

COMPORTAMIENTO
Forma bandadas. Muy bullanguero.

Alimentación
Orgeira (1995b). Peces, krill.
Favero et al. (1998a). **Crustáceos. Peces:** Pejerreyes (Atherinidae),*Cysnoscion striatus, Engraulis anchoita, Micropogonias furnieri.*
Favero et al. (2000b).**Crustáceos:** (Decapoda). **Insectos:** (Coleoptera). Peces: *Cynoscion guatupuca, Engraulis anchoita, Macrodon ancylodon, Micropogonias furnieri, Odontesthes argentinensis, Sorgentinia incisa, Anchoa marinii.*
Albrieu et al. (2004). Peces.
Gatto y Yorio (2005).**Peces:** *Engraulis anchoita, Odonteshtes* sp.
Silva Rodríguez et al. (2005). **Peces:** *Anchoa marinii, Engraulis anchoita, Paralonchurus brasiliensis, Sorgentinia incisa, Trachurus lathami.*
De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). Peces.

Voces
Straneck (*in litt*.). En vuelo repite un agudo y nasal Kerp..kierp..

HÁBITAT
Costas marinas y de ríos.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y las Malvinas.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N									N	N



Nidifica en colonias.
En el suelo. En islotes o playas marinas.
Expuesto. Poco elaborado. Ligera excavación, a veces aporta palitos, tallos de yuyos o fibras vegetales.

Salvador y Narosky (*in litt*.). Isla Escondida, dpto. Rawson, Chubut, 19-11-1983, entre 450 y 500 nidos próximos entre sí, en una colonia mixta, los nidos son simples depresiones de 13 a 18 cm de diámetro y de 2 a 4 cm de profundidad, postura de 2 huevos; Isla Pingüino, puerto San Julián, pdto. Magallanes, Santa cruz, 12-02-1986, colonia de unos 100 nidos, en pequeñas depresiones en canto rodado, el 40% de los nidos con 2 huevos, los restantes con pichones de distintas edades.
Durnford (1878). Punta Tombo, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, diciembre de 1877, colonia de unos 67.000 nidos, con 1, 2 o 3 huevos.
Olrog (1948 y 1950). Colonias en el Canal de Beagle.
Hartert y Venturi (1909). Leones, Río Santa Cruz, dpto. Lago Argentino, Santa Cruz, nidos.
Zapata (1965). Fitz Roy, Punta de los Pájaros, dpto. Deseado, Santa Cruz, 29-12-1964, nidos.
Zapata (1967). Isla Larga e Isla Quiroga, dpto. Deseado, Santa Cruz, nidos en 1961.
Korschenewski (1969). Punta Tombo, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, nidificando.
Humphrey et al. (1970). varias colonias a lo largo del Canal de Beagle, en diciembre de 1960.
Boswall y Pytherch (1972). Punta Tombo, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, nidificando en 1969.
Daciuk (1973a). Punta Cero, dpto. Biedma, Chubut, nidos en 1969 y 1970.
Daciuk (1977). Punta Pardelas, dpto. Biedma, Chubut y Punta Guanaco, dpto. Deseado, Santa Cruz, colonias de nidificación.
Salvador y Narosky (1987). Altura de Sierra Grande, dpto. San Antonio, Río Negro, 21-11-1983, colonia.
Sutton et al. (1988). Monte León, dpto. Corpen Aike, Santa Cruz, nidos en 1986.
Punta (1989). Isla Viana, dpto. Escalante, Chubut, nidifican en la década de 1980.
Paz (1992b). Punta Pozos, dpto. San Antonio, Río Negro, 08-12-1990, colonia con huevos.
Pérez et al. (1995). Isla Chaffers y Punta Guanaco, dpto. Deseado, Santa Cruz, nidificando en 1986 y 1987 y en Punta Bustamante, dpto. Escalante, Chubut en 1986.
Zalba y Belenguer (1996). Isla del Jabalí, pdo. Patagones, Buenos Aires, Bahía San Blas, 11-01-1994
Scolaro et al. (1996a). Punta Loma, dpto. Biedma, Chubut, colonia en 1992.
Petracci y Pérez (1997). Viedma (45 km río arriba del río Negro). dpto. Adolfo Alsina, Río Negro, 15-01-1997, colonia con 11 nidos, uno con un pichón, uno con un huevo y otro con 2 huevos.
Woods y Woods (1997). Nidifica en Malvinas.
Yorio et al. (1998c). Isla del Jabalí, pdo. Patagones, Buenos Aires, 1990-1995, nidificando.
González et al. (1998). Islote frente a Punta Verde, Islotes del Canal Escondido, Punta Pozos, dpto. San Antonio, Río Negro, 1990-1995, nidificando.
Gandini y Frere (1998a). Caleta Olivia (La Lobería). Punta Pájaros, Monte Loayza, Punta Guanaco, Isla Larga, Islote de Cañadón del Puerto, Isla Pingüino, Punta Médano Negro, dpto. Deseado, Santa Cruz, 1990-1995, nidificando.
Schiavini et al. (1998). Península El Páramo, Islote Faro Sur, Isla Casco, dpto. Ushuaia, Tierra del Fuego, 1990-1995, nidificando.



Yorio et al. (1998a). Punta Conos, Punta Buenos Aires, La Armonía, Punta Norte, Punta Cero, Punta Pardelas, Punta Loma, dpto. Biena, Chubut, Playa El Pedregal, dpto. Rawson, Chubut, Punta Tombo, Punta Gutiérrez, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 1990-1995, nidificando.
Yorio et al. (1998b). Islas Aguilón, Islote Luisoni, Isla Galiano Norte, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 1990-1995, nidificando.
Yorio et al. (1998b). Isla Ezquerra, Isla Vernaci Este, Isla Viana Mayor, dpto. Escalante, Chubut, 1990-1995, nidificando.
Frere y Gandini (1998). Cuevas de Monte León, dpto. Corpen Aike, Santa Cruz, 1990-1995, nidificando.
Albrieu et al. (2004). Santa Cruz, nidifica en playas de grava o en zonas rocosas. También en repisas en acantilados.
Yorio (2005a). Punta Conos y Punta Norte, dpto. Biedma, Chubut, G. Harris observó colonias en 1985 y 1987 en el primer lugar y en 1979 en el segundo.
Yorio (2005a). Isla Escondida, dpto. Rawson, Chubut, R. Manríquez observó colonias en 1985 y 1987.
Yorio (2005a). Isla Aguilón del Norte, dpto.Florentino Ameghino, Chubut, G. Punta observó nidos.
De la Peña (2013c). Río Grande, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego, 30-01-1972, huevos; Isla de los Pájaros, dpto. Biedma, Chubut, 26-11-1973, huevos y pichones.
En Río Grande, la colonia estaba entre piedras, a 30 metros del mar, con unos 50 nidos. Nidos muy próximos unos de otros (aproximadamente a 1 m.). Algunos nidos no tenían materiales y los huevos estaban puestos sobre las piedritas.
Medidas: diámetro total: de 9 a 10 cm.
Suárez et al. (2014). Bahía San Blas, Buenos Aires, octubre y noviembre de 2013, colonias de nidificación.

Huevos
Pone 1 ó 2 huevos. Ovoidales. De color ocre o crema con pintas y manchas castañas, pardas y grises, distribuidas por toda la superficie.
No hay uniformidad en el color de base ni en la forma y distribución de las manchas.

Medidas
Salvador y Narosky (*in litt*.): 45,2 a 50,8 x 32,3 a 35,5 X= 47,8 x 33,4 (N= 8)
Hartert y Venturi (1909): 43 a 44 x 33
Petracci y Pérez (1997): 42,0 a 44,0 x 33,0 a 34,4 X= 42,6 x 33,6 (N= 3)
De la Peña (2013c): 47,5 a 50,3 x 32,7 a 35,7 X= 48,8 x 34,1 (N= 5)

Pesos
De la Peña (2013c): cáscaras 1,757 a 1,937 X= 1,847 (N= 2)

Anónimo (1933): huevos colectados en Viamonte, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego, por T. L. y G. P. Bridges y P. W. Reynolds, en el Museo Nacional de Historia Natural.

PICHONES
Descripción
Petracci y Pérez (1997). Plumón crema jaspeado de negro.
De la Peña (2013c). Dorsalmente pardusco con puntos oscuros. Ventralmente blanquecino.

Generalidades
Perído de incubación. Scolaro et al. (1996a). 21,5 días.

Más información:
Yorio (2005a). Bertellotti et al. (1995); Suárez et al. (2014)

Depredadores
De adultos: *Falco peregrinus* (Peres y Peres 1985).

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Cola muy ahorquillada que sobresale de las alas cuando están plegadas.



Río Grande. Tierra del Fuego. 31-01-1972


Río Grande. Tierra del Fuego. 31-01-1972
Ubicación de la colonia.


Río Grande. Tierra del Fuego. 31-01-1972
Incubando.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Sterna hirundinacea Lesson, 1831 nidifica en la costa atlántica desde Río Negro a Tierra del Fuego y las islas Malvinas. En invierno llega hasta Buenos Aires. Observado además en el oeste de Río Negro.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en las costas del sur de Perú y Chile. En el Atlántico desde este de Brasil hasta Tierra del Fuego e islas Malvinas. En el invierno austral migran hacia el norte llegando a Uruguay, Brasil y Ecuador.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS



Buenos Aires
Citas: Darrieu y Camperi (2001a); Favero et al. (1998a); Fiameni (1994); García y Gómez Laich (2007); Klimaitis (1975b); Moschione (1989); Narosky y Di Giacomo (1993); Olrog (1958a); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Suárez et al. (2014); Yorio et al. (1998c); Zalba y Berenguer (1996)

Chubut
Citas: Blanco et al. (1998);Bó (1958); Boswall (1973); Daciuk (1972a, 1977b, 1977c); Darrieu y Camperi 2000 (2001); De la Peña (2013c); Gatto et al. (2005); Harris (2008); Parera (1992); Quintana y Yorio (1998b); Scolaro et al. (1996a); Sainz-Trápaga (2014); Straneck (1990a); Yorio et al. (1998a)

Observaciones: De la Peña (Punta Loma, dpto. Biedma, 27-11-2000)

Río Negro
Citas: Christie et al. (2004); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); González et al. (1998); Llanos et al. (2011); Paz (1992); Petracci y Pérez (1997); Salvador y Narosky (1987); Tolosa y Gelain (2012)

Santa Cruz
Citas: Albrieu et al. (2004); Coconier (2005b); Daciuk (1977); Darrieu et al. (2008); Frere y Gandini (1998); Gandini y Frere (1998a, 1998b); Hartert y Venturi (1909); Hellmayr (1932); Hellmayr y Conover (1948b); Imberti (2005e); Imberti y Albrieu (2001); Nasca et al. (2004); Oustalet (1891); Saunders (1896) ; Yorio et al. (2005a); Zapata (1965, 1969)

Observaciones: De la Peña (Puerto Deseado, dpto. Deseado, 26-01-1972)

Tierra del Fuego
Citas: Chebez y Bertonatti (1994); Clark (1986); De la Peña (2013c); Humphrey et al. (1970); Keith (1970); Olrog (1948, 1950); Schiavini et al. (1998)

Canal de Beagle
Citas: Olrog (1958a); Stiles (1979a)

Islas Malvinas
Citas: Bennett (1920);Wace (1921); Woods y Woods (1997); Woods (2006)

Islas subantárticas
Citas: Orgeira (1997a)

Georgias del Sur
Citas: Castellanos (1927)

Shetland del Sur
Citas: Bennett (1920); Orgeira (1997a)

Orcadas del Sur
Citas: Bennett (1920);Castellanos (1927); Hartert y Venturi (1909); Orgeira (1997a)

Mares
Citas: Montalti y Orgeira (1998); Orgeira (1995b, 1997a, 2001a); Savigny (2002c)

GAVIOTÍN ANTÁRTICO *Sterna vittata* J. F. Gmelin, 1789

Otros nombres: Charrán antártico. Gaviotín de Georgia.

DESCRIPCIÓN
Largo: 35-40 cm.
Peso: Linkowski y Rembiszewski (1978): N= 2 (?) 154 y 166 g.
Coloración. Pico y patas rojos. Iris pardo oscuro.
Frente, corona y nuca negras. Dorso y alas grises. Rabadilla blanca. Ventral gris blanquecina. Subcaudales blancas. Cola furcada, blanca.
Juvenil. Corona jaspeada de negro. Pico y patas negros.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Casaux et al. (2008). **Peces:** *Bovallia gigantea, Euphausia superba, Eurimera monticulosa, Electrona antarctica, Notothenia coriiceps.*
Jazdzewski y Konopacka (1999). **Peces:** *Abyssorchomene plebs, Cheirimedon femoratus, Hippomedon kergueleni, Orchomenella rotundifrons, Waldeckia obesa.*

HÁBITAT
Costas marinas, islas, mares.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Shetland del Sur, Orcadas del Sur, Península Antártica.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N

Nidifica en colonias. Depresión en el suelo.

El nido es una depresión en el suelo. Mide15-20 cm. de diámetro y
3,5-4 cm. de profundidad.

Olrog (1958a). Isla Media Luna, Decepción, Rey Jorge, Bahía Esperanza, Melchior, Isla Laurie, 11 y 17 de enero de 1953, nidos con huevos. El día 20 de enero, los primeros pichones.
Poretti (1993). 25 de Mayo, Shetland del Sur, colonias entre octubre de 1991 y febrero de 1992
Coria y Montalti (1993b). Bahía Esperanza, Península Antártica, noviembre de 1989 a enero de 1990, nidos.
Orgeira (1997c). Punta Cierva, costa de Danco, Península Antártica, nidifica.
García Esponda et al. (2000). Isla Halfmoon, Islas Shetland del Sur, 1995/96, nidificando.
Coria et al. (2011). Isla Laurie, Orcadas del Sur, 1993-94 y 1994-95, nidificando.
Casaux y Ramón (in litt.) (datos no publicados). Isla Nelson, Shetland del Sur, 2001 a 2005, nidificando.
Montaltti (comp. pers.). 25 de Mayo, Shetland del Sur, 20-12-1996 y 12-12-1997, nidos.



Huevos
Pone 1 ó 2 huevos, ovoidales. Oliváceos con manchas pardas y grises.

Medidas
Montaltti (*in litt*.): 43 a 45 x 31,4 a 33,5
Straneck (*in litt*.): 43 a 45 x 31,5 a 34

Peso
Straneck (*in litt*.): 23

Generalidades
Poretti (1993). Perído de incubación, 22 a 26 días.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Cola muy ahorquillada. Ventral gris.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Sterna vittata georgiae Reichenow, 1904 nidifica en Georgias del Sur. En otoño se desplaza a la costa argentina. *Sterna vittata gaini* Murphy, 1938 nidifica en Sandwich, Orcadas, Shetland del Sur y en el archipiélago Antártico. En otoño migra a las costas argentinas. También islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Seis subespecies. Esta especie es parecida al Gaviotín Ártico (*Sterna paradisaea*) y se encuentran en la Antártida durante el verano austral.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Sterna vittata georgiae Reichenow, 1904

Sterna vittata gaini Murphy, 1938

Buenos Aires
Citas: Savigny y Favero (2005)

Rio Negro
Citas: Llanos et al. (2011)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Humphrey et al. (1970)

Islas Malvinas
Citas: Woods (2006)

Orcadas del Sur
Citas: Coria et al. (2011); Orgeira (1997a); Paz (1990a)

Shetland del Sur
Citas: Arechabala y Novatti (1983); García Esponda et al. (2000); Montalti y Orgeira (2001); Olrog (1958a); Orgeira (1997a); Shuford y Spear (1988)

Archipiélago Antártico y Antártica
Citas: Coria y Montalti (1993b); Montalti y Soave (2002); Novati (1978); Olrog (1958a); Orgeira (1997a, 1997c, 2044)

GAVIOTÍN LAGUNERO *Sterna trudeaui* Audubon, 1838

Otros nombres: Gaviotín cabeciblanco. Gaviotín común. Gaviotín de caperuza y nuca blancos. Gaviotín de corona blanca. Gaviotín de laguna.

DESCRIPCIÓN
Largo: 34-35 cm.
Peso: Belton (1984): N= 1 (M) 160 g; N= 1 (H) 146 g; Camperi (1992c): N= 1 (M) 200 g; N= 1 (H) 200 g.
Coloración. Pico amarillo con una banda negra en el medio. En el período de reposo sexual el pico es negro con punta amarilla. Patas naranjas. Iris pardo oscuro.
Superior de la cabeza, garganta y rabadilla blancos. Banda ocular negra. Resto de la cabeza, partes dorsales y ventrales grises. Subcaudales blancas grisáceas.
Primarias y secundarias grises. Las secundarias con bordes blancos. Ventral de las alas blanco.
Cola gris, con las plumas externas blancas.
Plumaje de reposo sexual.
Superior de la cabeza con tinte gris. Banda ocular más clara.
Juvenil.
Semejante al adulto en reposo sexual pero con las partes dorsales y las cubiertas alares jaspeadas de pardo. Frente blanca. Pico negruzco. Patas amarillentas.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Garcia, G y L. Josens, en Silva Rodríguez et al. (2005). **Peces:** *Brebortia aurea, Engraulis anchoita, Micropogonias furnieri, Odontesthes* sp*., Pomatomus saltatrix, Paralichthys* sp*., Sorgentinia incisa.*
García y Mariano-Jelicich (2005).**Peces:** *Odontesthes* sp*., Paralichthys* sp.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Peces.** *Odontesthes bonariensis.*
De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). **Peces:** *Paralichthys* sp*.*



HÁBITAT
Lagunas, ríos, costas marinas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N										N	N

Nidifica en colonias, a veces solitariamente.



Sobre embalsados, en lagunas.
Expuesto. Elaborado. Plataforma con forma de plato hondo. Emplea tallos y hojas de plantas acuáticas.

Salvador (*in litt*.). Jovita, dpto. Gral. Roca, Córdoba, 10-01-1993, 3 nidos en un extenso bañado, construídos sobre matas de *Scirpus californicus*, con 3 huevos cada uno.
Uranga, M. (*in litt*.). Victoria, dpto. Victoria, Entre Ríos, 02-12-2009, colonia con unos 15 nidos y de 70 nidos de *Chroicocephalus maculipennis* y un nido de *Chroicocephalus cirrocephalus* en construcción, en un embalsado en una laguna formada por el desborde del río Paraná.
Gibson (1920). Cabo San Antonio, pdo. Partido de la Costa, Buenos Aires, 1890, nidos.
Daguerre (1922). Rosas, pdo. Las Flores, Buenos Aires, nidos con huevos y pichones.
Pereyra (1938b). Nidos en General Lavalle, pdo. General Lavalle, Buenos Aires, con huevos
Darrieu et al. (1989). Llancanelo, dpto. Malargüe, Mendoza. Diez nidos en un totoral, formando parte de la colonia de Cuervillo de cañada y uno solitario en la zona periférica de la colonia de *Podiceps occipitalis*.
Nidos construidos con totora seca formando una plataforma de 90 cm de diámetro, elevada 10 cm sobre el nivel del agua, con una cavidad central en forma de taza de 15 cm.
En algunos casos fueron utilizados nidos abandonados de Cisne de cuello negro.
González et al. (1998). Islote Rodondo, pdo. Villarino, Buenos Aires, 1990-1995, nidificando.
De la Peña (2013c). Aguará Grande, dpto. San Cristóbal, Santa Fe, 01-11-1974, colonia con 10 nidos, seis con 3 huevos, tres con 2 y uno con 1; Morteros, dpto. San Justo, Córdoba, 22-12-1981, 2 huevos.
Los nidos estaban construidos sobre un embalzado flotante de plantas acuáticas. Miden promedio, diámetro total: de 22 a 30 cm, diámetro de la depresión central: de 7 a 10 cm, profundidad: de 1,5 a 3 cm, alto: de 9 a 10 cm.
Total de colonias: 1 Total de nidos solitarios. 1
Segura et al (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 14 nidos.
Suárez et al. (2014). Bahía San Blas, Buenos Aires, octubre y noviembre de 2013, colonias de nidificación.

Huevos
Pone 3 huevos. Ovoidales. De color pardo castaño o pardo oliváceo, con pintas y manchitas castañas y grises distribuidas por toda la superficie.

Medidas
Salvador (*in litt*.): 41,6 a 42,7 x 29,9 a 31,7 X= 42,1 x 30,6 (N= 9)
Gibson (1920): 43 a 44 x 29 a 31
Pereyra (1938b): 45 x 32
Darrieu et al. (1989): 44,1 a 46 x 29,8 a 31,7 X= 45,0 x 30,6 (N= 5)
De la Peña (2013c): 39,4 a 43 x 29,5 a 32,2 X= 41,6 x 30,8 (N= 8)

Pesos
De la Peña (2013c): cáscaras 1,002 a 1,248 X= 1,145 (N= 5)

PICHONES
Descripción
Bó et al. (1995). Dorso ocráceo moteado y estriado con manchitas parduscas. Parte ventral ocrácea más pálida y sin manchas. Pico ocráceo con el ápice negro. Patas y dedos ocráceos verdoso.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño mediano. Corona blanca. Banda ocular oscura. Pico amarillo con banda negra.



Morteros. Córdoba. 22-12-1981



Aguará Grande. Santa Fe. 01-11-1974

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Sterna trudeaui Audubon, 1838 en Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Neuquén.
Ocasionalmente Chubut, Santa Cruz e islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Se lo encuentra por la costa desde Río de Janeiro hasta la costa de Argentina, llegando hasta Chubut. Tambien en el interior del este de Argentina. Nidifica asimismo en la costa del Pacífico en Chile.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Camperi (1992c); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Fiameni (1994); Filipello y López de Casenave (1993); García y Gómez Laich (2007); Gibson (1920); Hartert y Venturi (1909); Isacch et al. (2006); Klimaitis (1975b) , Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Morici (2012b); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Straneck (1990c); Suárez et al. (2014); Weller (1967a); Zapata (1998)

Observaciones: De la Peña (Las Flores, pdo. Las Flores, 10-12-1972)

Chaco

Citas: Linch Arribalzaga (1920)

Chubut

Citas: Sainz-Trápaga (2014)

Córdoba

Citas: Bucher y Herrera (1981); De la Peña (2013c); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1979, 1980b); Salvador (1983a); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Miramar, dpto. Miramar, 19-07-2007)

Corrientes

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)



Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); De la Peña (1996, 2012); Mancini (2011); Serié y Smyth (1923)

Formosa
Citas: Di Giacomo (2005h)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bruno (2009); Bruno et al. (2007); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (1999); Tejerina et al. (2006)

Mendoza
Citas: Aramburú (1983); Blendinger y Alvarez (2002); Darrieu et al. (1985, 1989); Lucero y Chebez (2011); Martínez et al. (1985, 1997a); Sosa (2005)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Contreras et al. (1980b); Del Valle et al. (1989); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Contreras et al (1980b); Gelain (2010, 2012b); Gelain y Tolosa (2011); Gelain y Diez Peña (2006); González (1991); González et al. (1998); Grigera y Rubulis (1985); Llanos et al. (2011); Nores e Yzurieta (1982b);Paz Barreto (1997b); Tolosa y Gelain (2012)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Lucero (2012h, 2013i)

Santa Fe
Citas: Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Wilson (1926)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Islas Malvinas
Citas: Woods (2006)

GAVIOTÍN DE PICO AMARILLO *Thalasseus sandvicensis* (Latham, 1787)

Otros nombres: Gaviotín de copete y pico negros. Gaviotín de México. Gaviotín grande de pico negro. Gaviotín pico amarillo.

DESCRIPCIÓN
Largo: 36-46 cm.
Peso: Lisnizer et al. (2014): N= 25 (M) X: 345 g (Rango 214 a 270); N= 11 (H) X: 241 g (Rango 212 a 310).
Coloración. Pico negro con punta amarilla. Patas negras. Iris pardo.
Plumaje de reposo sexual.

Frente blanca. Corona jaspeada de blanco y negro. Dorsal gris.
Alas grises con las primarias con los márgenes blancos en las barbas internas. Ventralmente, supracaudales y cola, blancás.
Plumaje nupcial.
Frente, corona, cresta nucal y cuello posterior negros.
Juvenil.
Frente y corona jaspeadas de blanco y negro. Partes dorsales moteadas de blanco y negro. Pico y patas negros.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Quintana y Yorio (1997a).**Peces:** *Engraulis anchoita, Odontesthes* sp*., Sprattus fuegensis, Stromateus brasiliensis.*
Favero et al. (2000a). **Peces:** *Cynoscion guatucupa, Engraulis anchoita, Micropogonias furnieri, Paralonchurus brasiliensis.* **Crustáceos. Insectos.**
Silva Rodríguez et al. (2005).**Peces:** *Cynoscion guatucupa, Macrodon ancylodon, Micropogonias furnieri, Paralonchurus brasiliensis, Stromateus brasiliensis.*
Gatto y Yorio (2009).**Peces:** *Cynoscion guatucupa, Engraulis anchoita, Odontesthes argentinensis, Odontesthes incisa, Odontesthes nigricans, Seriolella porosa, Sprattus fuegensis.*
De la Peña en De la Peña y Salvador (2010).**Peces**.
Salvador en De la Peña y Salvador (2010).**Peces:** *Engraulis anchoita.*

HÁBITAT
Costas marinas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N										N	N

Nidifica en colonias en islotes o costas marinas. A veces junto a otras especies.
En el suelo. Expuesto. Poco elaborado. Excavación.



Salvador y Narosky (*in litt*.). Isla Escondida, dpto. Rawson, Chubut, 19-11-1983, se hallaron entre 500 a 600 nidos próximos entre sí, en una colonia mixta, los nidos son simples depresiones de 13 a 20 cm de diámetro y de 2 a 4 cm de profundidad, postura de 1 ó 2 huevos (el 80% de los nidos con uno).
Zapata (1965). Fitz Roy, Punta de los Pájaros, dpto. Deseado, Santa Cruz, 29-12-1964, 18 nidos.
Korschenewski (1969). Punta Tombo, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, nidificando.
Boswall y Pytherch (1972). Punta Tombo, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, nidificando en 1968.
Daciuk (1972a). Isla de los Pájaros, dpto. Biedma, Chubut, nidos en 1970.
Daciuk (1973a). Punta Cero, Caleta Valdés, dpto. Biedma, Chubut, 19-01-1970, colonia con huevos.



Daciuk (1976b). Puerto Melo. Dpto. Florentino Ameghino, Chubut, colonia con nidos en 1971 y 1972.
Devillers (1977). Sur de Bahía Anegada (posiblemente, Banco nordeste). Pdo. Patagones, Buenos Aires. Tres nidos en 1975.
Yorio et al. (1994b). Punta León, dpto. Rawson, Chubut, 1989 y 1990, colonias con nidos.
Pérez et al. (1995). Punta Pájaros, dpto. Deseado, Santa Cruz, nidificando en 1991.
Quintana y Yorio (1996a). Punta León, dpto. Rawson, Chubut, colonias de nidificación.
Yorio y Harris (1997). Banco Culebra, Dpto. Patagones, Buenos Aires, nidificando en 1990.
Quintana y Yorio (1998a). Punta León, dpto. Rawson, Chubut, 1990-1992, nidificando.
Yorio et al. (1998c). Banco Culebra, pdo. Patagones, Buenos Aires, 1990-1995, nidificando.
Yorio et al. (1998a). La Armonía, dpto. Biedma, Chubut, Punta León, dpto. Rawson, Chubut, Punta Tombo, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 1990-1995, nidificando.
Yorio et al. (1998b). Islote Luisoni, Isla Chata, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 1990-1995, nidificando.
Isla Ezquerra, Isla Isabel Norte, Isla Viana Mayor, dpto. Escalante, Chubut, 1990-1995, nidificando.
Gandini y Frere (1998). Punta Pájaros, Monte Loayza, Punta Guanaco, dpto. Deseado, Santa Cruz, 1990-1995, nidificando.
Yorio (2005a). G. Harris observó nidos en 1988 en Punta León, dpto. Rawson, Chubut, y en Ensenada Medina, dpto. Biedma, Chubut en 1979, 3 nidos.
Yorio (2005a). G. Punta observó nidos a fines de la década de 1980 en Islas Galiano, dpto. Florentino Ameghino, Chubut.
De la Peña (2013c). Isla de los Pájaros, dpto. Biedma, Chubut, 26-11-1973, huevos y pichones.
Medidas: diámetro total: de 11 a 15 cm y profundidad: de 1,5 a 2 cm.
Suárez et al. (2014). Bahía San Blas, Buenos Aires, octubre y noviembre de 2013, colonias de nidificación.

Huevos
Pone 1 huevo. Ovoidales. De color blanco o crema blanquecino con pintas y manchas grises y pardo oscuro, distribuidas por toda la superficie.

Medidas
Salvador y Narosky (*in litt*.): 50,3 a 54,7 x 35,2 a 38,7 X= 53,7 x 37,3 (N= 7)
Daciuk (1973a). 50,0 a 56,4 x 36,1 a 40 X= 53,5 x 37,0 (N= 31)
De la Peña (2013c): 52,8 x 35,5 (N= 1)

Pesos
Salvador y Narosky (*in litt*.): 39,5
De la Peña (2013c): cáscaras 2,242 (N= 1)

PICHONES
Descripción
De la Peña (2013c). Plumón blanquecino amarillento con puntos y estrías oscuras, dorsalmente. Ventralmente blanquecino.

Generalidades
Quintana y Yorio (1996). Período de incubación, 29 días.

Más información:
Yorio et al. (1999). Quintana y Yorio (1997a)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Plumas nucales alargadas. Pico negro con punta amarilla.


Isla de los Pájaros. Chubut. 25-11-1973


Isla de los Pájaros. Chubut. 25-11-1973


Isla de los Pájaros. Chubut. 25-11-1973

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Thalasseus sandvicensis acuflavidus (Cabot, 1848) migratorio de Norteamérica. Llega a las costas de Buenos Aires. *Thalasseus sandvicensis eurygnatha* (Saunders, 1876) por la costa, desde Buenos Aires a Santa Cruz. Accidental en las Islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Se la encuentra en Europa, África, Asia y América donde nidifica desde Virginia a Texas, en la Península de Yucatan, en las Antillas menores. En Sud América nidifica en las costas de Venezuela, Guayana Francesa, del este de Brasil y de Argentina. Una subespecie nidifica en Argentina y otra es migratoria de Estados Unidos a Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Thalasseus sandvicensis acuflavidus (Cabot, 1848)

D.G. Migratorio de Norteamérica. Llega a las costas de Buenos Aires.



Buenos Aires
Citas: Fiameni (1994); Narosky y Di Giacomo (1993); Narosky y Fiameni (1986); Savigny y Favero (2005)

Thalasseus sandvicensis eurygnatha (Saunders, 1876)

Buenos Aires
Citas: Darrieu y Camperi (2001a); Deveillers (1977); Favero et al. (2000a); Fiameni (1994); García y Gómez Laich (2007); Jaramillo (2000); Narosky y Di Giacomo (1993); Narosky y Fiameni (1986); Olrog (1979b); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b); Suárez et al. (2014); Yorio et al. (1998c); Yorio (2005a)

Chubut
Citas: Boswall (1973); Bradley et al. (1985); Daciuk (1972a, 1973a, 1976b, 1977b, 1977c); De la Peña (2013c); Gatto et al. (2005); Quintana y Yorio (1999); Sainz-Trápaga (2014); Yorio (2005); Yorio et al. (1994b, 1998a)

Río Negro
Citas: Daciuk (1972a); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); González (1991); Yorio (2005a)

Santa Cruz
Citas: Darrieu et al. (2008); Gandini y Frere (1998a, 1998b); Junge y Voous (1955); Nasca et al. (2004); Olrog (1979b); Saunders (1896); Yorio (2005a); Zapata (1965a, 1969)

Islas Malvinas
Citas: Woods (2006)

Mares
Citas: Montalti y Orgeira (1998)

GAVIOTÍN REAL *Thalasseus maximus* (Boddaert, 1783)

Otros nombres: Gaviotín mayor de pico anaranjado.

DESCRIPCIÓN
Largo: 45-51 cm.
Peso: Camperi (1992c): N= 1 (M) 500,0 g; N= 1 (H) 500,0 g; Lisnizer et al. (2014): N= 9 (M) X: 477 g (Rango 445 a 510); N=10 (H) X: 454 g (Rango 405 a 510).
Coloración. Pico rojo. Patas negras. Iris pardo oscuro.
Corona y plumas nucales alargadas, negras. Frente, rabadilla, partes ventrales, borde de las alas y cola blancos. Partes dorsales grises.
Alas grises con las primarias más externas gris oscuro.

COMPORTAMIENTO
Forma bandadas. Grita fuerte.

Alimentación
Favero et al. (2000a). **Peces:***Anchoa marinii, Cynoscion guatucupa, Engraulis anchoita, Micropogonias furnieri, Odontesthes argentinensis, Paralonchurus brasiliensis.***Insectos. Crustáceos.**

Quintana y Yorio (1997a). **Peces:** *Engraulis anchoita, Odontesthes* sp.*, Pleoticus muelleri, Seriolella porosa, Sprattus fueguensis, Stromateus brasiliensis.*
Silva Rodríguez et al. (2005).**Peces:** *Cynoscion guatucupa, Engraulis anchoita, Micropogonias furnieri, Netuma barbus, Paralonchurus brasiliensis.*
Gatto y Yorio (2009).**Peces:** *Cynoscion guatucupa, Engraulis anchoita, Odontesthes argentinensis, Odontesthes incisa, Odontesthes nigricans, Raneya fluminea, Stromateus brasiliensis.*
Salvador en De la Peña y Salvador (2010).**Peces:** *Engraulis anchoita.*
De la Peña en De la Peña y Salvador (2010).**Peces**.

HÁBITAT
Costas marinas, islotes.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Buenos Aires, Chubut.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	



Nidifica en colonias en islotes o costas marinas. A veces junto a otras especies.
En el suelo. Expuesto. Poco elaborado. Excavación.

Salvador y Narosky (*in litt*.). Isla Escondida, dpto. Rawson, Chubut, 19-11-1983, se hallaron entre 45 a 50 nidos próximos entre sí, en una colonia mixta, los nidos son simples depresiones de 25 a 30 cm de diámetro y de 3 a 4 cm de profundidad, postura de 1 huevo.
Korschenewski (1969b). Punta Tombo, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, nidificando en 1967.
Boswall y Pytherch (1972). Península Valdés, dpto. Biedma, Chubut, nidificando en 1969.
Yorio et al. (1994b). Punta León, dpto. Rawson, Chubut, 1989 y 1990, colonias con nidos.
Quintana y Yorio (1996a). Punta León, dpto. Rawson, Chubut, colonias de nidificación.
Yorio et al. (1998c). Banco Culebra, pdo. Patagones, Buenos Aires, 1990-1995, nidificando.
Quintana y Yorio (1998a). Punta León, dpto. Rawson, Chubut, 1990-1992, nidificando.
Yorio et al. (1998a). Punta León, dpto. Rawson, Chubut, 1990-1995, nidificando.
Yorio et al. (1998b). Islote Luisoni, Isla Chata, dpto. Florentino Ameghino, Chubut, 1990-1995, nidificando.
Isla Ezquerra, Isla Isabel Norte, dpto. Escalante, Chubut, 1990-1995, nidificando.
Yorio (2005a). G. Harris, observó nidificando en 1988, en Punta León, dpto. Rawson, Chubut. G. Punta observó nidos a fines de la década de 1980 en Islas Galiano, dpto. Florentino Ameghino, Chubut.
De la Peña (2013c). Isla de los Pájaros, Biedma, Chubut, 26-11-1973, huevos y pichones.
Medidas: diámetro total: de 12 a 15 cm y profundidad: 1,5 a 2 cm.
Suárez et al. (2014). Bahía San Blas, Buenos Aires, octubre y noviembre de 2013, colonias de nidificación.



Huevos
Pone 1 huevo. Ovoidales. De color crema o verde pálido con pintas y manchitas pardas y grises, distribuidas por toda la superficie.



Medidas
Salvador y Narosky (*in litt*.): 62,1 a 65,6 x 42,6 a 43,5 X= 63,8 x 43,1
De la Peña (2013c): 60 a 65,1 x 43,6 a 45,8 X= 62,5 x 44,7 (N= 2)

Pesos
De la Peña (2013c): cáscaras 3,969 a 4,846 X= 4,407 (N= 2)

PICHONES
Descripción
De la Peña (2013c). Dorsalmente blanquecino con manchas negras. Ventral blanco.

Generalidades
Quintana y Yorio (1996a). Período de incubación, 29 días.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Pico grueso, rojo. Copete. Cola ahorquillada.


Isla de los Pájaros. Chubut. 25-11-1973


Isla de los Pájaros. Chubut. 25-11-1973

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Thalasseus maximus maximus (Boddaert, 1783) por la costa desde Buenos Aires a Patagonia. Nidifica en Chubut, Santa Cruz y en Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Se encuentra en América y en la costa Atlántica de África.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Thalasseusmaximus maximus (Boddaert, 1783)

Buenos Aires
Citas: Camperi (1992c); Darrieu y Camperi (2001a); Devillers (1977); Favero et al. (2000); Fiameni (1994); García y Gómez Laich (2007); Gibson (1920); Moschione (1989); Narosky y Di Giacomo (1993); Pereyra (1938b); Suárez et al. (2014); Yorio et al. (1998)

Chubut
Citas: De la Peña (2013c); Gatto et al. (2005); Quintana y Yorio (1998b, 1999); Savigny et al. (2005b); Sainz-Trápaga (2014); Straneck (1990a); Yorio et al. (1994b)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); González (1991); Paz Barreto (1997b)

Santa Cruz
Citas: Gandini y Frere (1998b); Yorio (2005a)

Tierra del Fuego
Citas: Savigny et al. (2005b)

Malvinas
Citas: Wood (1988)

Mares
Citas: Savigny (2002c)

RAYADOR

FAMILIA:RYNCHOPIDAE

Aves acuáticas de pico característico: la parte superior es más corta que la inferior.

Las alas son largas y estrechas. Las patas cortas, con membrana interdigital.

Se alimentan de peces y de insectos acuáticos.

Nidifican en colonias.

RAYADOR *Rynchops niger* Linnaeus, 1758

Otros nombres: Cortador de agua. Pico tijera.

DESCRIPCIÓN
Largo: 44-50 cm.
Peso: Schulz Neto et al. (2008): N= 7 (?) X: 285,6 g (Rango 195 a 380).
Coloración. Pico rojo en la base, resto negro. Patas rojas. Iris pardo oscuro.
Frente, cara y parte ventral blancas. Partes dorsales negras.
Alas negras con puntas de las secundarias blancas. Ventralmente las alas son grisáceas.
Cola parda con las plumas más externas blancas.
Plumaje de reposo sexual.
Las partes dorsales son pardas oscuras y un collar blanco en dorsal del cuello.
Juvenil. Moteado de pardo en las partes dorsales.
La raza *R. r. cinerascens*, se diferencia de la anterior por tener la franja alar muy angosta, ventral de las alas parda y la cola parda sin blanco.

COMPORTAMIENTO
Forma bandadas. Vuela a ras del agua con la mandíbula semisumergida, para capturar peces.

Alimentación
Mariano-Jelicich et al. (2003).**Peces:** *Anchoa marinii, Engraulis anchoita, Odonthestes argentinensis,Odonthestes incisa, Pomatomus saltatrix.*
Silva Rodríguez et al. (2005).**Peces:** *Anchoa marinii, Cynoscion guatucupa, Engraulis anchoita, Micropogonias furnieri, Odonthestes argentinensis, Odonthestes incisa.*
Mariano-Jelicich y M. Favaro. (2005). **Peces:** *Odonthestes argentinensis, Odonthestes incisa.*
De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). **Peces.**

HÁBITAT
Ríos, lagunas, lagos, costas marinas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Entre Ríos, Corrientes.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N							N	N	N	N	N

Nidifica en colonias, a veces junto a otras especies.
En el suelo. En bancos de arena, en ríos. Expuesto. Poco elaborado.
Excavación.



Salvador y Narosky (*in litt*.). Banco Caraballo, dpto. Colón, Entre Ríos, 19-12-1984, se halló una colonia compuesta de 18 nidos, en un extremo de un banco de arena, 5 nidos contenían 2 ó 3 pichones de pocos días de vida: Los 13 restantes tenían de 2 a 4 huevos.
Smyth (1927). Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, 21-10-1922, 17-11-1922, 19-09-1926, 03-10-1926, huevos.
Kliamitis y Moschione (1984). Banco Caraballo, dpto. Colón, Entre Ríos, una colonia junto a *Charadrius collaris* y *Sternula superciliaris.*
De la Peña (2013c). Total de colonias: 12. Río Paraná (Paraná), dpto. Paraná, Entre Ríos, 04-10-1977, nidos junto a *Sterna superciliaris* y *Phaetusa simplex,* huevos y pichones; Río Paraná (Paraná), dpto. Paraná, Entre Ríos, 31-10-1977, un huevo; 22-11-1977, Pueblo Brugo, Río Paraná, dpto. Paraná, Entre Ríos, 5 nidos: 4 huevos, 2 pichones, 4 huevos, 3 huevos y un pichón; Río Paraná (Paraná), dpto. Paraná, Entre Ríos, 04-11-1978, huevos (10 nidos); Río Paraná (Paraná), dpto. Paraná, Entre Ríos, 23-10-1981, huevos (3 nidos); Colón, dpto. Colón, Entre Ríos, 21-01-1987, colonia junto a *Sterna superciliaris* y *Phaetusa simplex,* huevos y pichones; Río Paraná (La Paz), dpto. La Paz, Entre Ríos, 10-11-1994, pichones; Río Paraná (Goya), dpto. Goya, Corrientes, 26-08-1995, colonia junto a *Phaetusa simplex,* huevos y pichones. Medidas: diámetro total: de 15 a 25 cm, profundidad: 3 a 5 cm.

Huevos
Pone 4 huevos. Ovoidales. De color crema con pintas y manchitas castañas, pardas y grises, distribuidas por toda la superficie. Uno de los huevos tiene base amarillenta.

Medidas
Salvador y Narosky (*in litt*.): 32,1 a 34,1 x 40,6 a 45,9 X= 42,9 x 32,9 (N= 24)
Hartert y Venturi (1909): 45 a 46,5 x 30 a 34
Klimaitis y Moschione (1984): 42, 6 a 45,8 x 31,8 a 34,5 X= 44,0 x 33,3 (N= 6)
De la Peña (2013c): 42,5 a 45,7 x 30,8 a 34,5 X= 44,7 x 33,2 (N= 13)



Pesos
Salvador y Narosky (*in litt*.): 21,6 a 25,5 X= 23,8 (N= 12)
De la Peña (2013c): cáscaras 1,225 a 1,698 X= 1,528 (N= 12)

PICHONES

Descripción
De la Peña (2013c). Pico rojizo. Dorsalmente crema amarillento moteado de negruzco. Ventral blanquecino.



IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Alas largas. Plumaje negro y blanco. Pico comprimido lateralmente, con el maxilar superior más corto que el inferior. Forma de capturar a los peces.




Colón. Entre Ríos. 10-01-2005




Colón. Entre Ríos. 10-01-2005




Colón. Entre Ríos. 10-01-2005




Río Paraná. Pueblo Brugo. Entre Ríos. 22-11-1977



Isla Yaguareté. Goya. Corrientes. 26-08-1995



Campo Andino. Santa Fe. 01-12-2007

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Rynchops niger cinerascens Spix, 1825 nidifica en el norte de Sudamérica. Observado en Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires y *Rynchops niger intercedens* H. Saunders, 1895 desde el norte del país hasta Mendoza, La Pampa, Buenos Aires y por la costa hasta Santa Cruz y Tierra del Fuego.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Tres subespecies. A las dos subespecies sudamericanas se les suma *Rynchops niger niger* que nidifica en Estados Unidos por la costa en Golfo de Mejico, Peninsula de Florida y costa Atlántica.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Rynchops niger cinerascens Spix, 1825

Buenos Aires

Citas: Delhey et al. (2001c); Olrog (1979b)

Córdoba

Citas: Miatello et al. (2003); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores y Yzurieta (1980b); Torres y Michelutti (2001a)

Santa Fe
Citas: Hartert y Venturi (1909)

Santiago del Estero
Citas: Torres y Michelutti (2001a)

Rynchops niger intercedens H. Saunders, 1895

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Fiameni (1994); Filipello y López de Casenave (1993); García y Gómez Laich (2007); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis (1975b); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Mariano-Jelicich, et al. (2003); Morici (2012b); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1927d, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); White (1882)

Catamarca
Citas**:** Carma (2009)

Chaco
Citas: Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b)

Chubut
Citas: Sainz-Trápaga (2014)

Córdoba
Citas: Miatello et al. (2003); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores e Yzurieta (1980b); Torres y Michelutti (2001a); Yzurieta (1995)

Corrientes
Citas: Chatellenaz et al. (2010); De la Peña (2013c); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Baliño y Biole (1984); Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); De la Peña (2012b, 2013c); Klimaitis y Moschione (1984); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2001a, 2001b); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923)

Formosa
Citas: Contreras (1987c);Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Gorleri et al. (2011); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Pujalte et al. (1995)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009)

La Pampa
Citas: Bruno y Erro (2010); Maceda et al. (1999)

Mendoza
Citas: Lucero y Chebez (2011); Sosa (1995d, 2003)

Misiones
Citas: Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2009)

Rio Negro
Citas: Llanos et al. (2011)

Salta
Citas: Luna et al. (2008); Moschione et al. (2013)

Santa Cruz
Citas: Darrieu et al. (2008); Humphrey y Bridge (1970)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011); Lucero y Chebez (2011); Lucero (2013i)

Santa Fe
Citas: Beltzer (1986c); De la Peña (2011f); López-Lanús et al. (2013a, 2013d)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Observaciones: Salvador, S. (Río Dulce, cerca de Loreto, dpto. Loreto, octubre 2007)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Imberti (2003); Jehl y Rumboll (1976)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Echevarría et al. (1998); Echevarría y Chani (1999, 2000, 2006); Lucero (1983)


AMBIENTES, LUGARES, EXCURSIONES
1977-1978-1979



1977. Cachipampa. Salta



1977. La Quiaca. Jujuy




1977. Cuesta de Miranda. La Rioja



1977. Patquía. La Rioja





1977. Arroyo Leyes. Santa Fe

1977. Arroyo Leyes. Santa Fe. Nido Martín pescador





1977. Esperanza. Santa Fe

1977. Esperanza. Santa Fe. Filmación






1977. Monte Vera. Santa Fe. Colonia de Biguá.

1978. Cachipampa. Salta. Nido de Cacholote





1978. Tartagal. Santa Fe. Busqueda nido de Guaicurú.





1978. Esperanza. Santa Fe.



1978. Parque Nacional. El Rey. Salta.

1978. Valle Encantado. Salta.





1978. Valle Encantado. Salta



1978. Valle Encantado. Salta



1979. Humahuaca. Jujuy




1979. El Volcán. Jujuy



1979. Quebrada de Humahuaca. Jujuy





1979. Azul Pampa. Jujuy



1979. Abra Pampa. Jujuy.

1979. Abra Pampa. Jujuy



1979. Abra Pampa. Jujuy. Nido de pato.



1979. Abra Pampa. Jujuy.




1979. Península Valdés. Chubut.



1979. Isla de los Pájaros. Chubut



1979. Punta Norte. Chubut



1979. Punta Tombo. Chubut



1979. Punta Tombo. Chubut



1979. Puerto Deseado. Santa Cruz



1979. Punta Tombo. Chubut



1979. Puerto Deseado. Santa Cruz



1979. Puerto Deseado. Santa Cruz



1979. Puerto Deseado. Santa Cruz.



1979. Paso Gregores. Santa Cruz.



1979. Paso Gregores. Santa Cruz.



1979. Río Turbio. Santa Cruz.



1979. Laguna La Loca. Santa Fe.



1979. Isla El Rico. Santa Fe.

ORDEN: COLUMBIFORMES

PALOMAS

FAMILIA: COLUMBIDAE

Aves de cabeza pequeña, pico débil y cuello corto.

De hábitos terrícolas y arborícolas. Andan solitarias, en pareja o formando bandadas.

Son buenas voladoras.

Construyen el nido en los árboles, arbustos, rocas, construcciones y en el suelo.

La postura es de 1 ó 2 huevos.

Frecuentan praderas, estepas, áreas rurales y urbanas, serranías, montañas.

Construyen el nido en los árboles, arbustos, rocas, construcciones, huecos, planteras y en el suelo.

Nidifican en forma solitaria. Una especie (*Zenaida auriculata*) puede formar colonias.

Emplean en la construcción palitos, pajitas, hojas, líquenes, plumas.

La postura es de 1 ó 2 huevos. Raro posturas de 3 huevos.

Se alimentan de granos, semillas, frutas y algunas especies, además de insectos.

Frecuentan praderas, estepas, montes, selvas, áreas rurales y urbanas, serranías, montañas.

Subfamilia: Columbinae

PALOMA DOMÉSTICA *Columba livia* J. F. Gmelin, 1789

Otros nombres: Paloma bravía. Paloma casera. Paloma común. Paloma de las rocas. Paloma de plaza. Paloma mensajera.

DESCRIPCIÓN
Largo: 31-34 cm.
Peso: Salvador (*in litt*.): N= 13 (?) X: 337 g
Coloración. Pico negro. Patas rojizas. Iris anaranjado oscuro o naranja pálido.
Coloración general gris azulada con reflejos verdes violáceos en el cuello y en el pecho.
Dos bandas negras en las alas.
Existe una gran variación en los colores; algunas tienen dominancia del blanco, otras del negro o diversas combinaciones.

COMPORTAMIENTO
Anda en grupos o en bandadas.

Alimentación
Klimaitis (1993). Semillas. Piedritas.
Christie et al. (2004). Frutos. Semillas. Desperdicios. Pan.
De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). Semilla (partida) de *Glycine max, Sorghum* sp. *, Zea mays*. Pan.

Voces
Straneck (*in litt*.). El macho durante el cortejo hace un gutural Cuturrucú...cuturrucú... Otra voz emitida en el nido es un grave Buuú..buú..

HÁBITAT
Praderas, áreas rurales, plazas, parques, edificios, acantilados.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Córdoba, San Luis, San Juan, Santa Fe, Santa Cruz.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

En construcciones, casilleros, huecos en paredes o en árboles, recipientes colocados de exprofeso, sobre techos o en plataformas diversas. A veces nidos superpuestos.
Expuesto. Elaborado. Plataforma de palitos, tallos, pajas.

Nellar Ramonella (1993). Las especies asilvestradas, nidifican en barrancas.
Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba, nidifica en la zona.
Maceda et al. (2001). Reserva Provincial Parque Luro, dpto. Toay, La Pampa, nidifica.
Albrieu et al (2004). Estuario del río Gallegos, dpto. Güer Aike, Santa Cruz, nidifica sobre cualquier superficie lisa, con forma de balcón, que le brinde soporte y refugio para la construcción del nido.
Christie et al. (2004). Noroeste patagónico, nidifica en construcciones en huecos o repisas.
De la Peña (2013c). Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, se observaron 6 nidos, entre 04-10-1979 y 01-08-2003, desde 2,20 m a 5,0 m del suelo. Los nidos miden: diámetro total: de 9 a 20 cm, profundidad: de 1 a 2 cm y alto: de 2 a 7 cm.
Gelain (2014b). Villa del Salvador, dpto. Angaco, San Juan. Se reproduce durante todo el año.

Huevos
Pone 2 huevos. Elípticos. Blancos.

Medidas
De la Peña (2013c): 37,5 a 43,2 x 27,8 a 31,2 X= 39,5 x 30,3 (N= 6)

Pesos
De la Peña (2013c): cáscaras 1,000 a 1,305 X= 1,163 (N= 6)



PICHONES
Descripción
De la Peña (2013c). Ojos cerrados. Pico gris con banda negra cerca de la punta. Ápice claro. Plumón crema amarillento.
5 días. Abre los ojos. Pico oscuro con punta blanca.
7 días. En las vainas de las plumas primarias y secundarias, de 1 cm., aparecen las láminas. Apenas se ven las vainas de las plumas de la cola.

10 días. Vainas dorsales grises de 0,7 cm. Abriendo las láminas de todas las plumas.
14 días. Emplumado.

Días de vida	Medidas							
	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Tarsometatarso	Tibiotarso	Pico
	Vaina o cañón	Lámina	Vaina o cañón	Lámina				
1						1,4	1,9	1
2						1,5	2,3	1,2
3						2,1	2,9	1,4
5						2,2	3,3	1,5
7	1,0		1,0			2,8	4,3	1,9
10	1,3		1,4		0,5	3,1	4,6	1,9
12	2,3	0,5	1,6	1,0	1,4	3,4	5,0	2,0
14	2,7	2,4	2,4	1,1	2,5	3,4	5,6	2,2
16	2,9	3,7	2,4	3,1	4,9	3,6	5,8	2,5
18	2,6	4,9	2,7	3,5	5,1	3,7	6,1	2,5
20	2,5	6,2	2,3	4,5	5,4	3,8	6,2	2,5

No se describen los colores de las plumas por la variación existente.


Generalidades
De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido de 8 a 10 días, pero es variable. Pone los huevos en días alternos. Período de incubación, 16-18 días. Los pichones permanecen en el nido 30-32 días.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Gris azulada. Bandas negras en las alas.
Variados colores. Bandadas. Común en poblaciones.

Depredación
De adultos: *Parabuteo unicinctus* (Gelain y Pereyra Lobos 2011a), *Tyto alba* (Nores y Gutiérrez 1990), (Morici 1990a y 2009e), *Caracara plancus* (Vargas et al. 2007, De la Peña en (De la Peña y Salvador 2010), *Falco femoralis* (Bó 1999), *Falco peregrinus* (Vasina 1975), (Nellar 1991), (Notarnicola y Seipke 2004), (Galmes et al. 2008b), Salvador y Salvador en (De la Peña y Salvador 2010), (Santillán et al. 2010b)


Esperanza. Santa Fe. 02-11-2008


Esperanza. Santa Fe. 26-11-2006



Santa Fe. 09-09-2006. Nido en hueco en árbol



Jesús María. Córdoba. 12-06-2009. Bañándose

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Columba livia livia J. F. Gmelin, 1789 en todo el país.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Trece subespecies. Nativa de Europa, África y Asia. Introducida en todo el mundo (en América a fines del siglo XVII) donde hoy existe doméstica y silvestre.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Columba livia livia J. F. Gmelin, 1789

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Castro y Cicchino (1992); Codesido et al. (2011); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Klimaitis (1975b, 1993); Klimaitis y Moschione (1986, 1987b); Leveau y Leveau (2004a, 2005, 2006, 2011b); Lucero et al. (2011); Marelli (1933); Mérida y Bodtati (2006); Montaldo y Claver (1986); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pugnali y Chamorro (2008)

Observaciones: De la Peña (Claromecó, pdo. de Tres Arroyos, 07-02-1976)

Catamarca
Citas : Carma (2009)

Observaciones: De la Peña (San Fernando del Valle de Catamarca, dpto. Capital, 09-03-1981)



Chaco
Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b)

Observaciones: De la Peña (Resistencia, dpto. San Fernando, 27-08-1987)

Chubut
Citas: Sainz-Trápaga (2014)

Observaciones: De la Peña (Esquel, dpto. Futaleufú**,** 01-02-1976)

Córdoba
Citas: Brandolín et al. (2007); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Salvador (1983a); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Mina Clavero, dpto. San Alberto, 05-12-1981)

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Contreras (1981b); López-Lanús et al. (2013b)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Beltzer et al. (2006); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2002); Muzzachiodi et al. (2003); Raffo et al. (2008)

Formosa
Citas: Contreras (1987c); Chebez et al. (1998); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); López Lanús (1997)

Jujuy
Citas : Camperi et al. (2012); Chebez et al. (1998); Moschione y Segovia (2005)

Observaciones: De la Peña (San Salvador de Jujuy, dpto. Capital**,** 03-02-1977)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bruno et al. (2007); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Galmes et al. (2008a); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Siegenthaler (1984); Tejerina et al. (2006)

Observaciones: De la Peña (Realicó, dpto. Realicó, 19-11-1998)

La Rioja

Observaciones: De la Peña (Patquía, dpto. Independencia, 16-01-1982)

Mendoza
Citas: Aramburú (1983); Blendinger y Alvarez (2002); Contreras (1979g); Contreras y Fernández (1980); Gómez (2006); Lucero (2013f); Marone (1991, 1992a, 1992b); Martínez et al. (1997a); Olivera et al. (2009); Sosa (2005)

Observaciones: De la Peña (Tupungato, dpto. Tupungato, 12-01-1982)

Misiones
Citas: Chebez (1996a); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014)

Observaciones: De la Peña (Posadas, dpto. Capital, 10-10-1981)

Neuquén
Citas: Christie et al. (2004); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007);Veiga et al. (2005)

Observaciones: De la Peña (San Martín de los Andes, dpto. Lácar, 26-11-1998)

Río Negro
Citas: Christie et al. (2004); Gelain (2001, 2010, 2012b); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Navas (1987a); Paz Barreto (1997b)

Observaciones: De la Peña (Viedma, dpto. A. Alsina**,** 03-11-1979)

Salta
Citas: Coconier et al. (2007) ; Moschione et al. (2013)

Observaciones: De la Peña (Tartagal, dpto. Gral. J. de San Martín, 01-02-1977)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Gelain (2014a, 2014b); Lucero (2013f, 2013i); Ortiz y Murúa (1994)

Observaciones: De la Peña (San Juan, dpto. Capital, 15-01-1982)

San Luis
Citas: Masramón (1983); Nellar Romanella (1993)

Observaciones: De la Peña (San Luis, dpto. La Capital, 10-01-1982)

Santa Cruz
Citas: Albrieu et al. (2004); Daciuk (1977b); De Lucca y Saggese (1992); Imberti (2005e); Imberti y Albrieu (2001); Zapata (1967)

Observaciones: De la Peña (Río Turbio, dpto. Güer Aike, 09-11-1979)

Santa Fe
Citas: Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f, 2013c);López-Lanús et al. (2013a); Pautasso (2002b)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Observaciones: De la Peña (Selva, dpto. Rivadavia, 29-01-1977)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán (2000, 2006); Antelo et al. (2006, 2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch y Aráoz (2007); Echevarría et al. (2007, 2011b); Echevarría y Chani (2000); Juri y Chani (2005); Juri (2007); Lucero et al. (2002, 2005)Navarro et al. (2000);Ortiz y Aráoz (2014); Presti y Echevarría (2009);Vides Almonacid (1993)

Observaciones: De la Peña (San Miguel de Tucumán, dpo. Capital, 30-01-1977)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Humphrey et al. (1970); Jehl y Rumboll (1976); Keith (1970)

PALOMA TROCAL *Patagioenas speciosa* (J. F. Gmelin, 1789)

DESCRIPCIÓN
Largo: 28-34 cm (macho) - 28-32 cm (hembra)

Peso: ffrench (1973): N= 1 (M) 325 g; N= 2 (H) 335 y 335 g.
Coloración. Pico rojo con punta clara. Patas pardas rojizas. Iris anaranjado.
Macho. Cabeza castaña purpúrea. En la nuca, cuello, garganta y pecho, las plumas presentan un triángulo blanco, orillado de negro, lo que le da el aspecto de "escamado". Dorso castaño con las plumas orilladas de negro, por lo cual parece "escamado". Hombros violáceos. Pecho salpicado de castaño. Abdomen blanquecino con el extremo de las plumas castaño. Subcaudales blancas.
Alas pardas; cubiertas pardas con reflejos purpúreos. Cola negra.
Hembra. Es de colores más apagados y dorso pardo.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Partridge en Navas y Bó (1986c). Frutos de *Allophyllus edulis.*

HÁBITAT
Bosques y selvas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Baptista et al. (1997)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Cuello y pecho "escamados". Alas pardas. Cola negra. Pico rojo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Patagioenas speciosa (J. F. Gmelin, 1789) en Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y norte de Santa Fe.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Amplia área de distribución desde sur de Méjico. Comprende: Méjico, Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Chaco
Citas: Contreras et al. (1990b)

Corrientes
Citas: Baldo et al. (1995)

Formosa.
Citas: Contreras et al. (2014)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010a); Chebez (1992a, 1996a); Navas y Bó (1986c)

Santa Fe
Citas: Giai (1950); Zotta (1939a)



PALOMA PICAZURÓ *Patagioenas picazuro* (Temmninck, 1813)

Otros nombres: Kono. Paloma campera. Paloma de monte. Paloma gaucha. Paloma grande. Paloma montaraz. Paloma montera. Paloma pampeada. Paloma turca. Palomón. Picazuro. Salera. Torcaza. Torcaza colorada. Torcaza paraguaya.

DESCRIPCIÓN
Largo: 34-36 cm.
Peso: Salvador (1988): N= 1 (?) 435,0 g; Salvador (2014a): N= 12 (M) X= 439,1 g (Rango 409 a 463); N= 15 (H) X= 420,4 g (Rango 412 a 446); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 (M) 426, N= 1 (H) 413 g

Coloración. Pico negro. Patas rojizas. Iris rojo.
Cabeza y cuello borravinos. Posterior del cuello vinoso con estrecha banda blanca subterminal y punta negra en las plumas. Dorso pardo. Dorso inferior, rabadilla y supracaudales, de color gris plomizo. Ventral gris vinosa.
Alas grises con pardo oscuro en las primarias. Cubiertas mayores grises orilladas de blanco; menores grises ocráceas orilladas de blanquecino. Cola gris con ancha banda negra en el extremo

COMPORTAMIENTO
Anda solitaria, en pareja o en pequeños grupos. Tiene un vuelo rápido y sostenido.

Alimentación
De la Peña y Pensiero (en prensa): **Frutos:** Ligustro (*Ligustrum lucidum*), Mora (*Morus alba*)
Zotta (1932). Semillas. Huesos de columna vertebral, posiblemente de roedor.
Baliño (1984). **Frutos:** *Melia azedarach.*
Magno (1984a). Brotes. Frutos. Hojas. Insectos. Moluscos.
Klimaitis (1993).**Insectos:** Coleópteros. Libélula (Odonata). Semillas: *Zea mays*.
Montaldo (1993a). **Frutos:***Citharexylum montevidense, Ligustrum* sp.
Montaldo (2000). **Frutos:***Blepharocalyx salicifolius, Citharexylum montevidense, Ligustrum lucidum*.
Montaldo (2005). **Frutos:** *Citharexylum montevidense, Ligustrum lucidum*, *Ligustrum sinense, Myrsine laetevirens.*
Di Giacomo (2005h). **Frutos:** *Maclura tintoria.***Semillas:** *Sorghum* sp*., Zea mays.*
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Frutos:** Fruto *Melia azedarach.*
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Frutos:** *Celtis* sp., *Ligustrum* sp., *Morus alba,Pyracantha coccinea.***Semillas:** *Glycine max*, *Helianthus annuus, Panicum miliaceum, Sorghum* sp*., Triticum aestivus, Zea mays,*Gramíneas. **Brotes:** *Medicago sativa.*

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto es un Ouuuuu uh uh ouu repetido 3 ó 4 veces. Luego de una pausa vuelve a iniciarlo.

HÁBITAT
Praderas, sabanas, orillas de montes.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Formosa, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N



En árboles. Altos y a mediana altura.
Expuesto. Poco elaborado. Plataforma de palitos, sostenida entre las ramas.

Wilson (*in litt*.), a S. Salvador, Mercedes, dpto. Mercedes, Corrientes, 18-11-1972, dos nidos en *Eucalyptus* sp. a 3,0 y 3,5 m de altura, ambos con un huevo.
Rumboll (*in litt*.), a S. Salvador, Lobería, pdo. Lobería, Buenos Aires, 06-09-1972, dos nidos en *Eucalyptus* sp. a 3,5 y 4,5 m de altura, uno con un huevo y el otro con un pichón. Gral. Lavalle, pdo. Gral. Lavalle, Buenos Aires, dos nidos en Coronillos a 2,5 y 3,5 m de altura, ambos con un pichón.
Salvador y Narosky (*in litt*.). Villa Ángela, dpto. Mayor Luis Jorge Fontana, Chaco, 17-12-1982, 2 nidos, uno en un *Prosopis* sp., a 3,5 m de altura, con un huevo y el otro en un *Celtis* sp., a 4 m del suelo, con un huevo. Médanos, dpto. Villarino, Buenos Aires, 17-11-1986, un nido en un *Prosopis caldenia*, a 3,5 m de altura con un huevo incubado.
Salvador y Salvador (en prep.). Dpto. Gral. San Martín, Córdoba, se hallaron 348 nidos, posturas en todos los meses del año. Ubicados principalmente en *Celtis tala*, *Prosopis alba*, *Eucalyptus* sp., *Geoffroea decorticans*, *Acacia caven*, *Prosopis nigra*, *Jodina rombifolia* y *Ulmus procera*, entre 1,5 y 11 m de altura (X= 4,8). Ponen un huevo.
Hartert y Venturi (1909). Ocampo, dpto. Gral. Obligado, Santa Fe, nido con 2 huevos.
Gibson (1920). Cabo San Antonio, pdo. Partido de la Costa, Buenos Aires, nidos en 1873, 1875 y 1909.
Smyth (1927). Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, 24-01-1925, un huevo.
Dinelli (1929). Nido en noviembre.
Carman (1971a). San Mayol, pdo. Tres Arroyos, Buenos Aires, el 30-09-1970, nido con un pichón.
Wilson (1977). Mercedes, dpto. Mercedes, Corrientes, nidifica en Eucaliptos.
Klimaitis y Moschione (1987). Nidifica en el estrato superior de la selva.
Brocca (1997). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, nido con un huevo.
Maceda et al. (2001). Reserva Provincial Parque Luro, dpto. Toay, La Pampa, nidifica.
Di Giacomo y Krapovickas (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, anida entre julio y enero.
De la Peña (2013c). Desde el 07-02-1976 a 13-12-2003, se hallaron 45 nidos, de los cuales, 39 estaban en Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe. En Claromecó, pdo. Tres Arroyos, Buenos Aires, el 07-02-1976, 2 nidos en *Eucalyptus* sp. con un huevo cada uno; 03-09-1993, Isla Verde, dpto. Marcos Juárez, Córdoba**.** Nido en una Ligustrina, a 8 m. del suelo, con un huevo; en Santa Rosa, dpto. Capital, La Pampa, el 19-11-1998 y en Picún Leufú, dpto. Picún Leufú, Neuquén, nidos en construcción. 18-12-2001, El Remanso, Ruta 4 y río Salado, dpto. La Capital, Santa Fe, nido en un Araucaria a 4,50 m con un huevo.
Posturas durante todo el año. En una oportunidad ocupó el mismo nido del año anterior. Nido más bajo: 2,50 m, nido más alto: 8,00 m. Medidas: diámetro total: de 17 a 30 cm, profundidad: 0,5 cm, alto: de 2 a 4 cm.

Huevos
Pone 1 huevo. Elíptico. Blanco.



Medidas
Salvador y Salvador (en prep.): 35,8 a 44,6 x 26,3 a 31,3 X= 41,4 x 29,1 (N= 98)
Hartert y Venturi (1909): 40,5 a 44 x 28 a 30,5
Gibson (1920): 38 x 27
Smyth (1927): 38,5 x 28,0
Dinelli (1929): 38 x 28,5
Di Giacomo (2005h): 40,2 a 32,2 x 27,5 a 29,6 X= 42,0 x 28,6 (N= 6)
De la Peña (2013c): 40,8 a 43,7 x 28,7 a 30,7 X= 41,9 x 29,5 (N= 4)

Pesos

Salvador y Salvador (en prep.): 15,5 a 21,0	X= 18,9	(N= 69)
Di Giacomo (2005h): 14,5 a 19,5	X= 16,7	(N= 5)
De la Peña (2013c): 18,6	X= 18,6	(N= 2)
De la Peña (2013c): cáscaras 1,1 a 1,5	X= 1,29	(N= 4)

PICHONES

Descripción

De la Peña (2013c). Ojos cerrados. Piel gris pardusca. Pico grisáceo con banda oscura cerca de la punta. Ápice claro.
Cavidad bucal grisácea oscura. Patas grises. Plumón canela claro.
5días. Abre los ojos y apenas de ven las vainas de las plumas alares.

Generalidades

De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido 6-8 días. Período de incubación18-19 días. Permanencia de los pichones en el nido 20-22 días.

Depredación

Di Giacomo (2005h). Un nido con un huevo fue depredado por un grupo de Urracas moradas (*Cyanocorax cyanomelas*). Varios adultos fueron capturadas por un Gato montés (*Oncifelis geoffroyi*) cunado comían granos de maíz.

Otros

Antoniazzi et al (2011). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño grande. Posterior del cuello “escamado”. Línea blanca en las alas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Patagioenas picazuro picazuro (Temmninck, 1813) desde el norte del país hasta Neuquén, Río Negro y Chubut. Observada en Santa Cruz.



Esperanza. Santa Fe. 06-01-2006



J. Arauz. Santa Fe.12-01-2008



Esperanza. Santa Fe. 16-08-2006



Esperanza. Santa Fe. 22-08-2015

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies. Amplio rango de distribución desde el noreste de Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Patagioenas picazuro picazuro (Temmninck, 1813)

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Carman (1975); Codesido et al. (2011); Dabbene (1917c); Darrieu y Camperi (2001a); De la Peña (2013c); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Durnford (1878b); Fiameni (1994); Gibson (1920); Isacch et al. (2006); Klimaitis (1975b, 1993); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Leveau y Leveau (2004a, 2004b, 2005, 2006, 2011b); Lucero et al. (2011); Mérida y Bodtati (2006); Morici (2012b); Montaldo (1993, 2000, 2005); Montaldo y Claver (1986); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Soave et al. (1999b); Zapata (1998)

Catamarca

Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009);Salvador y Di Giacomo (2014)

Observaciones: De la Peña (Singuil, dpto. Ambato, 14-12-1999)



Chaco

Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004)

Observaciones: De la Peña (Resistencia, dpto. San Fernando, 05-10-1972)

Chubut

Citas: Kovacs et al. (2005); Sainz-Trápaga (2014)

Córdoba

Citas: Brandolín et al. (2007); De la Peña (2013c); Nores et al. (1983); Nores (1996); Salvador (1983a, 1988); Straneck (1999d); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (La Granja, dpto. Colón, 13-01-1971)

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b); Fraga (2001b);Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Ordano et al. (2008); Wilson (1977)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979; Gobernador Virasoro, dpto. Santo Tomé, 12-12-2002)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Baliño y Biole (1984); Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2002); Muzzachiodi et al. (2003); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Straneck (1990b)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c);Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995); Wetmore (1926b)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009);Cabezas (1988); Camperi et al. (2012); Fiora (1933); Moschione y Segovia (2005); Zotta (1932)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bruno et al. (2007); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011b); De la Peña (2013c); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Siegenthaler (1984, 2004); Tejerina et al. (2006)

Observaciones: De la Peña (Catriló, dpto. Catriló, 01-12-2000)

La Rioja
Citas: Giacomelli (1907, 1923)

Mendoza
Citas: Contreras (1979g); Sosa (2005)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b); Camperi y Darrieu 2000 (2001b); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Babarskas et al. (1996); De la Peña (2013c); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Christie et al. (2004); Gelain (2001); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Kovacs et al. (2005); Nores y Yzurieta (1995); Pérez y Petracci (1998); Llanos et al. (2011)

Observaciones: De la Peña (Río Colorado, dpto. Pichi Mahuida, 26-11-2000)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Coconier et al. (2007); Echevarría et al. (2014); Hartert y Venturi (1909); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b)

San Juan
Citas: Gelain (2008a, 2014a); Gelain y Pereyra Lobos (2011b)

San Luis
Citas: Nellar Romanella (1993); Nores e Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Mercedes, dpto. Gral. Pedernera, 10-01-1982)

Santa Cruz
Citas: Roesler et al. (2014)

Santa Fe
Citas: Beltzer (1986c); Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b);Giai (1950); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009); Rossetti y Giraudo (2003)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Antelo et al. (2006, 2013); Brandán (2005); Brandán et al. (2006); Brandán y Antelo (2000, 2009); Brandán y Navarro (2009); Capllonch y Aráoz (2007); Echevarría (2001); Echevarría y Chani (1999, 2000, 2006); Echevarría et al. (1998, 2007, 2011b); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Navarro et al. (2000); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz y Aráoz (2014); Vides Almonacid (1993)

PALOMA MANCHADA *Patagioenas maculosa* (Temmninck, 1813)

Otros nombres: Conú. Maikono. Paloma ala manchada. Paloma campera. Paloma cenicienta. Paloma de alas moteadas. Paloma de campo. Paloma de cobijas manchadas. Paloma de lunares blancos en las alas. Paloma de monte. Paloma de monte de alas manchadas. Paloma de monte pintada. Paloma goteada. Paloma grande de alas manchadas. Paloma montaraz. Paloma montera. Paloma montera grande común. Paloma moteada. Paloma pintada. Paloma torcaza. Picazuró. Torcaza batataraza. Torcaza grande. Torcaza puntana. Turca.

DESCRIPCIÓN
Largo: 33 cm.
Peso: Navas y Bó (1986b): N= 2 (M) 308,4 y 389,5 g;Camperi (1992c): N= 1 (H) 350 g; Salvador (2014a): N= 16 (M) X= 358,6 g (Rango 318 a 398); N= 13 (H) X= 334,5 g (Rango 322 a 352); Salvador y Di Giacomo (2014): N = 4 (?) 289, 392, 289 y 408 g

Coloración. Pico gris oscuro. Patas rojas. Iris blanco o apizarrado.

Cabeza, cuello y parte ventral grises vinosos. Manto y escapulares pardos. Dorso, rabadilla y supracaudales, grises plomizas.
Alas pardas. Cubiertas mayores pardas orilladas de blanco, menores pardas con mancha blanca en la extremidad. Cola gris plomiza con ancha banda terminal negra.

COMPORTAMIENTO
Anda solitaria, en pareja o en grupos. Es de vuelo rápido y sostenido.

Alimentación
Pereyra (1927e). Uvas, semillas, arena.
Zotta (1940c). **Insectos:** Coleópteros. Hemípteros (Pentatomidae). Himenópteros. **Otros:** Vegetales (frutos, semillas). Arácnidos. Minerales.
Martínez et al. (1975). **Semillas:** *Avena byzantina, Erodium* sp.
Magno (1983). Vegetales (frutos, semillas). Caracoles. Moluscos.
Baliño (1984). **Frutos:** *Melia azedarach.*
Di Giacomo (2005h).**Semillas:** *Sorghum* sp.*,Zea mays*.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Semillas:** *Arachis hypogaea, Avena sativa, Chenopodium* sp.*, Fraxinus pensylvanica, Glycine max, Ligustrum* sp.*, Panicun mileaceum, Sorghum* sp.*, Triticum aestivum,Zea mays*. **Frutos:** *Pyracantha coccinea, Melia azedarach, Morus alba.* Arena.
De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). **Frutos:** *Celtis ehrenbergiana, Morus alba.* **Semillas:** *Glycine max, Sorghum* sp., *Zea mays.*

Voces
Straneck (*in litt*.). La voz es similar a la de la Paloma picazuró pero más ronca.

HÁBITAT
Praderas arboladas, sabanas, montes, parques, áreas urbanas, serranías.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Salta, Santiago del Estero, La Pampa, San Luis, San Juan, Mendoza, Córdoba, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

En árboles, arbustos o enredaderas.
Expuesto. Poco elaborado. Plataforma de palitos.

Rumboll (*in litt*.) a S. Salvador, Santa Rosa, dpto. Capital, La Pampa, 02-11-1972, 2 nidos, uno en un Chañar a 2,20 m de altura y el otro en un Caldén a 1,50 m de altura, ambos con un huevo.
Straneck (*in litt*.) a S. Salvador, Villa General Belgrano, dpto. Calamuchita, Córdoba, 25-10-1976, nido a 4 m de altura con un huevo.
Salvador (inéd.). Carnerillo, dpto. Juárez Celman, Córdoba, 19-07-1979, un nido en un *Geoffroea decorticans*, a 4 m. de altura, un huevo. El Rincón, dpto. Merlo, San Luis, 26-06-1981, un nido en *Lithraea ternifolia*, a 3 m de altura, un huevo incubado. Nono, dpto. San Alberto, Córdoba, 20-12-1986, nido en un *Schinus* sp., a 2,80 m de altura, un huevo.



Salvador y Salvador (en prep.). Dpto. Gral. San Martín, Córdoba, se hallaron 595 nidos, posturas en todos los meses del año, ubicados principalmente en *Prosopis alba*, *Geoffroea decorticans*, *Celtis tala*, *Eucalyptus* sp., *Acacia caven*, *Prosopis nigra*, *Ulmus procera*, *Prosopis nigra, Cassuarina cunninghamiana, Fraximus pennsylvanica, Pinus* sp. y *Melia azederach*, entre 1,9 y 11,0 m de altura (X= 4,2). Pone un huevo.
Hartert y Venturi (1909). Sur de Santiago del Estero, nido.
Dinelli (1929). Pone en el mes de noviembre.
Contino (1980). Nidifica en el chaco salteño. Nido precario, a unos 5 m de altura. Pone 1 huevo.

Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba, nidifica en la zona.
Maceda et al. (2001). Reserva Provincial Parque Luro, dpto. Toay, La Pampa, nidifica.
Mezquida y Marone (2001). Reserva de Ñacuñán, Mendoza, nidifica.

De la Peña (2013c). Se localizaron 42 nidos, en las provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, San Luis y Córdoba. Medidas: diámetro total: de 12 a 25 cm, alto: 3 a 3,5 cm. Ubicados en árboles, arbustos o enredaderas., desde 1,60 a 8,00 m del suelo.
Gelain (2014d). Villa del Salvador, dpto. Angaco, San Juan. Nidos el 14-07-2012 y 04-11-2013. Se reproduce durante todo el año.
Gelain (2014i). Villa del Salvador, dpto. Angaco, San Juan, 07-12-2014, nido con un huevo.

Huevo
Pone 1 huevo. Elíptico. Blanco.

Medidas
Salvador y Salvador (en prep.): 36,2 a 41,9 x 27,6 a 29,9 X= 39,4 x 28,4 (N= 123)
Hartert y Venturi (1909): 37 a 40 x 28
Dinelli (1929): 37 x 27
Contino (1980): 39,6 x 16,2
De la Peña (2013c): 38,3 a 43 x 26,2 a 30 X= 39,2 x 27,5 (N= 7)
Gelain (2014i): 37,2 x 26,4



Peso
Salvador y Salvador (en prep.): 16 a 20,5 X= 15,4 (N= 91)
Contino (1980): 14
De la Peña (2013c): 13,6 a 15,2 X= 14,4 (N= 2)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,80 a 1,01 X= 0,93 (N= 6)

Más información:
De la Peña (2013c)

Otros
Urcola (2011). Un ejemplar con la coloración general canela. (Brown)

Depredadores
De adultos: *Falco peregrinus* (Galmes et al. 2008b)

Más información:
Mezquida y Marone (2001). Reserva de Ñacuñán, Mendoza, nidifica.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Cuello gris vinoso. Manchas blancas en las alas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Patagioenas maculosa albipennis (P. L. Sclater y Salvín, 1876) en el oeste de Salta y en el norte de Jujuy y *Patagioenas maculosa maculosa* (Temmninck, 1813) desde el norte del país hasta Chubut.



Esperanza. Santa Fe. 06-04-2010. Ubicación nido



Esperanza. Santa Fe. 08-01-2006. Pichón de 8 días.



Esperanza. Santa Fe. 22-12-2005



Jesús María. Córdoba. 24-09-2006. Incubando



Jesús María. Córdoba. 31-01-2015. Comiendo frutos de Tala



Jesús María. Córdoba. 16-09-2006



Jesús María. Córdoba. 05-05-2007.
Comiendo granos de maiz



La Granja. Córdoba. 17-10-2015

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies. El rango de distribución de la especie se extiende por el sur de Perú, Bolivia, Paraguay, extremo sur de Brasil y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Patagioenas maculosa albipennis (P. L. Sclater y Salvín, 1876)

Jujuy

Citas: Pearman en Navas y Camperi (2005)

Salta

Citas: Höy (1969a); Moschione et al. (2013)

Patagioenas maculosa maculosa (Temmninck, 1813)

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Camperi (1992c); Cueto y López de Casenave (2000a, 200b); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Jaramillo (2000); Leveau y Leveau (2005); Lucero et al. (2011); Mérida y Bodtati (2006); Morici (2012b); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Tambussi y Moschione (1988); Zapata (1998)



Observaciones: De la Peña (Juan Cousté, pdo. Villarino, 05-02-1976)

Catamarca

Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009);Salvador y Di Giacomo (2014); Steullet y Deautier (1935-1946); White (1882)

Observaciones: De la Peña (Singuil, dpto. Ambato, 14-12-1999)

Chaco

Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004)

Observaciones: De la Peña (Resistencia, dpto. San Fernando, 03-05-1988)

Chubut
Citas: Kovacs et al. (2005); Sainz-Trápaga (2014)

Córdoba
Citas: Brandolín et al. (2007); Castellanos (1931); De la Peña (2013c); Haro y Gutierrez (1992); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Partridge (1953c); Salvador (1983a); Sferco y Nores (2003); Straneck (1990d); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (La Cumbrecita, dpto. Calamuchita, 24-06-1972)

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b); De la Peña (2013c); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Marelli (1918)

Observaciones: De la Peña (Mercedes, dpto. Mercedes, 19-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Baliño y Biole (1984); Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2011b, 2013c); Hartert y Venturi (1909); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi et al. (2003); Navas (1982); Peltzer (1998); Raffo et al. (2008); Zapata (1975, 1977)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c);Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); López Lanús (1997)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Bruno et al. (2007); Canevari et al. (1991); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Güller (2008); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Navas y Bó (1986b); Pereyra (1927d, 1937b); Siegenthaler (1984, 2004); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006); Wetmore (1926)

Observaciones: De la Peña (General Acha, dpto. Utracán, 19-11-1998)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Capurro y Bucher (1982, 1986); Giacomelli (1923); Hayward (1967); Koslowsky (1895b); Salvador y Di Giacomo (2014)

Mendoza
Citas: Calí et al. (2008); Contreras (1979g); Contreras y Fernández (1980); Darrieu (2014); Gómez (2006); López de Casenave y Marone (1996);Lucero (2013f); Marone (1990, 1991, 1992a, 1992b); Mezquida y Marone (2001); Pereyra (1927e); Reed (1916); Roig (1965); Sosa (1995d, 2005)

Misiones
Citas: Chebez (1996a)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Babarskas et al. (1996); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Gelain (2001); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Paz Barreto (1997b); Pérez y Petracci (1998); Piacentini et al. (2003)

Observaciones: De la Peña (Villa Regina, dpto. Gral. Roca, 05-02-1976)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Hartert y Venturi (1909); Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Acosta y Murúa (2001); Camperi y Darrieu (2004); Gelain (2008a, 2012e, 2014a, 2014b, 2014i); Gelain y Pereyra Lobos (2011b);Haene (1987); Lucero (2013f, 2013i); Moschione y Banchs (1992); Ortiz y Murúa (1994)

San Luis
Citas: Casares (1944b); De la Peña (2013c); Masramón (1983); Nellar Romanella (1993); Partridge (1953c)

Santa Fe
Citas: Beltzer (1986c); Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009); Rossetti y Giraudo (2003)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Observaciones: De la Peña (Malbrán, dpto. Aguirre, 29-01-1977)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Antelo et al. (2013); Brandán y Navarro (2009); Echevarría et al.(1998, 2007, 2011b); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Navarro et al. (2007);Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Aráoz (2014)

PALOMA DE NUCA BLANCA *Patagioenas fasciata* (Say, 1823)

Otros nombres: Paloma de collar blanco. Paloma nuca blanca.

DESCRIPCIÓN
Largo: 34-40 cm. (macho) - 33-39 cm. (hembra)
Peso: Fiora (1933): N= 15 X= 322 g (Rango 300 a 350); Salvador (1988): N= 1 (M) 300 g; N= 1 (H) 270 g; Salvador y Di Giacomo (2014):N= 1 (M) 332 g

Coloración. Pico y patas amarillos. Anillo ocular rojo. Iris rojo.
Cabeza y partes ventrales grises con tinte violáceo. Banda en posterior del cuello blanca. Por debajo de la misma hasta el dorso superior, verde bronceado. Dorso superior con tinte verdoso. Dorso inferior y rabadilla grises.
Alas pardas oscuras. Cola gris pardusca con banda oscura en la parte media.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

Salvador (obs. pers.). **Semillas:** de *Alnus jorullensis* yde Gramíneas.
Dinelli (1929). Frutos de Solanáceas y Vervenáceas.
Magno (1982). Frutos. Pimpollos.



HÁBITAT

Bosques entre los 1800 y los 2500 m de altura. En invierno baja a 1000 m

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Más información:
Baptista et al. (1997)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño grande. Banda blanca en la nuca. Pico y patas amarillos.
Se parece a la Paloma araucana. Se diferencian en el color del plumaje, el color del pico y patas y en la distribución geográfica.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Patagioenas fasciata albilinea (Bonaparte, 1854) entre los 1800 y los 2500 m de altura en Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca. En invierno baja hasta los 1000 m

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Siete subespecies. Desde Alaska hasta noroeste deArgentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Patagioenas fasciata albilinea (Bonaparte, 1854)

Catamarca

Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009);Salvador y Di Giacomo (2014)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Chebez et al. (1998); Salvador (1988): N= 1 (?) 360,0 g
Fiora (1933); Salvador (1988)

Salta

Citas: Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009);Gianini (2000); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Navarro et al. (2007); Ortiz y Aráoz (2014); Vides Almonacid (1993)

PALOMA ARAUCANA *Patagioenas araucana* (Lesson, 1827)

Otros nombres: Paloma de la Patagonia. Torcaza chilena. Torcaza de Patagonia. Torcaza de la Patagonia.



Lago Puelo. Chubut. 14-12-1994 Foto Anibal Casas

DESCRIPCIÓN
Largo: 35 cm.
Coloración. Pico negro. Patas rojas. Iris rojo amarillento.
Cabeza, cuello y dorso superior castaños vinosos. Banda en la nuca blanca. Por debajo de ésta, verde bronceado, dando un aspecto "escamado". Dorso inferior, rabadilla y supracaudales grises azulados.
Alas pardas. Cubiertas superiores y media, pardas y grises. Cola gris con ancha banda subterminal negra.

COMPORTAMIENTO
Alimentación
Magno (1984b).**Semillas:** *Araucaria araucana*. **Frutos:** *Aristolochia chilensis, Persea lingue, Peumus boldus, Pseudopanax laetevirens.*
Christie et al. (2004).**Semillas:** *Chusquea culeou*. **Frutos:** *Luma apiculata, Pseudopanax laetevirens*.
Sainz-Trápaga, S. 2014a. **Frutos:** Crateus (*Pyracantha copccinea*), Ciprés común (*Cupressus sempervirens*)

HÁBITAT
Bosques.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Chubut.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
							N				

En árboles, a baja y mediana altura. Plataforma de palitos.

Vidoz (*in litt*.). Lago Puelo, dpto. Cushamen, Chubut, nido en Pitra (*Myrceugenia exsucca*) a 3 m del suelo, el 14-08-1992 con un huevo y el 17-08-1992, otro sin postura.
Kovacs et al. (2005). Nidifica en el oeste de Chubut, en la parte media y baja de los árboles.

Huevo
Pone 1 huevo. Blanco.

Medidas
Goodall et al. (1946): 37,5 a 44,1 x 28,0 a 30,5



Más información:
Baptista et al. (1997). Goodall et al. (1946). Housse (1945). Wexman et al. (2013)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Coloración general oscura con línea blanca en la nuca.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Patagioenas araucana (Lesson, 1827) en el oeste de Mendoza, de Neuquén, de Río Negro, de Santa Cruz y este y oeste de Chubut. Accidental en las Islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Bosque Araucano de Chile y Argentina.



CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Chubut
Citas: Camperi (1998); Kovacs et al. (2005); Lynch Arribalzaga (1902); Sainz-Trápaga (2014a); Vidoz (1995)

Observaciones: De la Peña (Lago Puelo, dpto. Cushamen, 22-11-1998)

Mendoza
Citas: Chebez (2009)

Observación: Pereyra Lobos (*in litt*.)

Neuquén
Citas: Canevari et al. (1991b); Casas y De la Peña (1987); Contreras et al. (1980b); Chehebar y Ramilo (1989); Dabbene (1913); Del Valle et al. (1989); Gorgoglione (2005); Hellmayr y Conover (1942); Matarasso (2007); Pereyra (1945); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Camperi (1998); Casas y De la Peña (1987); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Contreras et al. (1980b); Gelain (2001); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Hecker y Vidoz (1998); Kovacs et al. (2005); Paz Barreto (1997b); Peters (1923b)

Santa Cruz
Citas: Zoratti en Darrieu et al. (2008); Di Giacomo et al. (2005); Fjeldsa y Krabbe (1990); Imberti (2003, 2005e)

PALOMA COLORADA *Patagioenas cayennensis* (Bonnaterre, 1792)

Otro nombre: Llanta colorada.

DESCRIPCIÓN
Largo: 25-28 cm.

Peso: Contreras (1979): N= 2 (M) 425 y 464 g
Coloración. Pico negro. Patas rojas. Iris rojo.
Frente, corona anterior y pecho vinosos purpúreos. Corona posterior y nuca verdes bronceadas con reflejos purpúreos. Lados de la cabeza grises. Garganta blanquecina. Dorso y cubiertas alares castaños purpúreos. Dorso inferior, rabadilla y supracaudales grises plomizos. Abdomen, flancos y subcaudales grises.
Alas pardas. Cola gris con banda gris pardusca en la extremidad.

COMPORTAMIENTO

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto es similar al de la Picazuró, pero algo más agudo y la primera nota: houuuu es más larga.

HÁBITAT
Bosques y selvas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Salta, Santa Fe, Misiones.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	

Plataforma de palitos, pajitas.



Delpietro, H. A. (*in litt.*). Posadas, dpto. Capital, Misiones, 24-11-2012, nido en un mandarino a 3 m del suelo, 2 huevos.
Hartert y Venturi (1909). Ocampo, dpto. Gral. Obligado, Santa Fe, nidos con 2 huevos.
Di Giacomo y López Lanús (1998). Parque Nacional Baritú, dpto. Santa Victoria, Salta, dos nidos a mediados de noviembre de 1992, a baja altura, en matorrales densos, orillas de un camino abandonado, separados unos 15 m entre sí.

Huevos
Pone 2 huevos. Blancos.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 35,5 a 39 x 26,5 a 28

Depredadores
De adultos: *Falco deiroleucus* (Olrog 1985a)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Coloración general vinosa purpúrea con las cubiertas alares castañas. Garganta blanquecina. Cola gris.
Se parece a las Yerutí pero carece de blanco en la cola y de canela en la parte ventral del ala.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Patagioenas cayennensis sylvestris (Vieillot, 1818) en Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y noreste de Santa Fe.



Posadas. Misiones. 24-11-2012
Foto: H. A. Delpietro

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cinco subespecies. Amplio rango de distribución desde el sur de Méjico hasta el norte de Argentina

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Patagioenas cayennensis sylvestris (Vieillot, 1818)

Catamarca
Citas: Carma (2009)

Chaco
Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b)

Corrientes
Citas: Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Nores e Yzurieta (1985)

Observaciones: De la Peña (Corrientes, dpto. Capital, 31-10-1991)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c);Di Giacomo (2005h); Laubmann (1930); Narosky y Martelli (1995)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009) Camperi et al. (2012); Chebez et al. (1998); Malizia et al. (2005); Moschione y Segovia (2005)

La Rioja
Citas: Giacomelli (1907)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Hartert y Venturi (1909); Krauczuk (2005, 2009);Martínez Gamba (2014); Straneck (1990h)



Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Coconier et al. (2007); Di Giacomo y López Lanús (1998b); Moschione et al. (2013)

Santa Fe
Citas: Manassero et al. (2004); Hartert y Venturi (1909)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Antelo et al. (2013); Brandán (2005); Brandán y Navarro (2009);
Echevarría et al. (2007, 2011b); Fanjul (2010); Hartert y Venturi (1909); Juri y Chani (2005); Juri (2007);Lucero (1983); Malizia et al. (1998); Navarro et al. (2007); Ortiz y Aráoz (2014); Vides Almonacid (1993)

PALOMA PLOMIZA *Patagioenas plumbea* (Vieillot, 1818)

DESCRIPCIÓN
Largo: 34 cm.
Peso: Willis y Oniki (2002): N= 1 (M) 320 g; N= 1 (H) 250 g
Coloración. Pico negro. Patas rojizas. Iris rojo vinoso.
Cabeza, cuello y parte ventral grises plomizos. Dorsal, alas y cola grises parduscas.

HÁBITAT
Selvas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de información.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Patagioenas plumbea plumbea (Vieillot, 1818) enMisiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cinco subespecies. Amplia área de distribución desde Colombia hasta sureste deBrasil y extremo noreste de Argentina. Comprende: Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Argentina.



CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Patagioenas plumbea plumbea Vieillot, 1818

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b); Pearman et al. (2011)

PALOMA MONTERA CASTAÑA *Geotrygon montana* (Linnaeus, 1758)

Otros nombres: Paloma castaña. Paloma colorada. Paloma perdiz. Paloma perdiz rojiza.

DESCRIPCIÓN
Largo: 20-26 cm.
Peso: Stouffer y Bierregaard (1993): N= 169 (M) X: 115,6 g (Rango: 70 a 165); N= 154 (H) X: 111,4 g (Rango: 74 a 170)
Coloración. Pico y patas rojizos. Iris pardo anaranjado.
Macho. Dorsal, alas y cola castañas rojizas con reflejos purpúreos en la nuca y en la espalda. Línea debajo de los ojos y en los hombros blanca. Franja castaña a los lados de la cabeza. Garganta blanca. Pecho vinoso. Abdomen ocráceo. Parte ventral de las alas canela.
Hembra. Frente y lados de la cabeza canelas. Dorso y plumas centrales de la cola pardos oliváceos con reflejos verdosos. Plumas externas de la cola pardas olivas y rojizas. Garganta y anterior del cuello blancos. Pecho canela. Vientre y subcaudales ocráceos.
Alas pardas.



HÁBITAT
Bosques y selvas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Misiones.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N		

Casquete de forma irregular, emplea tallitos y hojas verdes y secas.

Almirón et al. (2012). Reserva Natural Cultural Papel Misionero, Colonia La Flor, dpto. Guaraní, Misiones, 18-01-2010, nido a 1,30 m del suelo con un huevo.
Bodrati y Salvador (2013a). Parque Provincial Cruce Caballero, dpto. San Pedro, Misiones, 12-10-2012, nido a 1,18 m de altura en un chachí bravo (*Alsophila procera*). Era un casquete de forma irregular, elaborado con tallitos y abundantes hojas verdes y secas. Mide 17 cm de diámetro y 9 cm de alto. Contenía 2 huevos de color crema ocráceo claro. El 14-10-2009, nido en construcción. Ambos miembros de la pareja aportaban materiales. El 18-10-2010 se localizó otro nido con 2 huevos.

Huevos
Pone 2 huevos. Color crema ocráceo.

Medidas
Bodrati y Salvador (2013a): 27,1 x 20,6 y 27,1 x 21,2

Pesos
Bodrati y Salvador (2013a): 6,3 y 6,5

PICHONES
Descripción

Bodrati y Salvador (2013a). Nacen con los ojos cerrados y tienen la piel de color rosa violáceo. En la porción dorsal y pecho estaban cubiertos con un plumón natal, corto y ralo de color crema acanelado. Patas color violáceo negruzcas oscuro, uñas color marfil. Pico violáceo negruzco oscuro.



Generalidades
Bodrati y Salvador (2013a). El período de incubación es de 12 días.

Más información:
Kuecker et al. (2012)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño mediano. Cola corta. Macho con franjas castañas a los lados de la cabeza. Dorso, alas y cola rojizos. Línea blanca en los hombros. Hembra, canela en la cabeza y pecho. Dorso pardo verdoso. Ambos sexos con rojo alrededor de los ojos.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Geotrygon montana montana(Linnaeus, 1758) en Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Islas del Caribe, Centro América y Sud América hasta extremo noreste de Argentina. Comprende: Cuba, Jamaica, Barbados, Puerto Rico, Antigua y Barbuda, Islas Caimán, Haití, República Dominicana, Méjico, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Geotrygon montana montana (Linnaeus, 1758)

Misiones
Citas: Almirón et al. (2012); Bodrati et al. (2010b, 2012b); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Martínez Gamba (2014); Partridge (1954)

PALOMA MONTERA VIOLÁCEA *Geotrygon violacea* (Temminck, 1810)

Otros nombres: Paloma de espalda violácea. Paloma perdiz violácea. Palomita de dorso violáceo. Yerutí. Yurutí-pirang.

DESCRIPCIÓN
Largo: 21-24 cm.
Peso: Contreras et al. (1994): N= 1 (M) 105 g
Coloración. Pico rojo. Patas rosadas. Iris anaranjado.
Macho. Lados de la cabeza grises. Frente y garganta blancas. Corona gris con reflejos violáceos. Cuello posterior y dorso superior violáceos metálicos. Dorso inferior, rabadilla y supracaudales color oliva con las plumas orilladas de violáceo. Anterior del cuello y pecho grises vináceos. Resto de la parte ventral blanco. Alas y cola castañas.
Hembra. Frente castaña. Dorso oliváceo con ápice de las plumas más oscuro. Garganta blanquecina. Pecho pardo. Resto de la parte ventral blanquecino.
Alas y cola, pardos.



COMPORTAMIENTO

Alimentación
Pineschi (1990). Fruto de *Myrsine coriacea.*

HÁBITAT
Bosques y selvas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Baptista et al. (1997)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño mediano. Anillo ocular rojo. Macho, ventral blanquecino con reflejos violáceos en la parte dorsal del cuello y en la espalda. Hembra, frente castaña y olivácea en el dorso.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Geotrygon violacea violacea(Temminck, 1810) en Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Extenso rango de distribución con poblaciones separadas que rodean la Amazonia.
En Centro América: Nicaragua, Costa Rica, Panamá. En norte de Sud América: Ecuador, Colombia, Venezuela y Guayanas. A esta distribución se le suma Perú, este de Brasil, este de Paraguay, este de Bolivia y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Geotrygon violacea violacea (Temminck, 1810)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b); Contreras et al. (1994b); Chebez (1996a); Dabbene (1919a); Giai (1950); Krauczuk (2009); Martínez Gamba (2014); Militello y Chebez (2009); Navas y Bó (1988a)

YERUTÍ COMÚN *Leptotila verreauxi* Bonaparte, 1855

Otros nombres: Bumbuna. Cuncuna. Llanta. Paloma ala colorada. Paloma cuyana. Paloma de la isla. Paloma del monte. Paloma montaraz. Paloma montaraz común. Paloma montaraz menor. Paloma montera. Paloma parda tapadas roxas. Paloma yerutí de los bosques. Palomita del monte. Pumpuna. Puposa. Quejona. Yierutí.

DESCRIPCIÓN
Largo: 30 cm.
Peso: Fiora (1933): N= 140 X= 172 g (Rango 160 a 205); Contreras (1979f): N= 32 (M) 185,0, 169,0 y 164,0, N= 1 (H) 183,0 g; Fraga (1983a): N= 2 223,0 y 212,0 g;Salvador (1990a): N= 1 (?) 186,0 g; Camperi (1992a): N= 1 (M) 210,0 g, N= 2 (H) 164,3 y 207,3 g; Di Giacomo (2005h): N= 6 207 g (Rango 165 a 290); Salvador (2014a): N= 6 (M) X= 185 g (Rango 172 a 193); N= 4 (H) X= 181 g (Rango 172 a 188); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 3 (?) 291 g, N= 1 (M) 193 g, N= 1 (H) 188 g; N= $, X= 191 g (Rango 172 a 214)
Coloración. Pico negro. Patas rosadas. Iris anaranjado.
Corona grisácea. Nuca, cuello posterior y espalda tornasolados de verde y violeta. Dorso pardo.

Garganta blanca. Resto de las partes ventrales vinoso. Abdomen y subcaudales blanquecinos.
Alas pardas. Ventralmente son canelas.
Cola parda con banda blanca en las plumas externas.

COMPORTAMIENTO
Anda solitaria o en pareja. Bastante terrícola.

Alimentación
De la Peña y Pensiero (en prensa): **Semillas:** Maíz (*Zea mays*) (partidas en el suelo)
Baliño (1984). **Fruto:***Melia azedarach*.
Montaldo (1993a). **Fruto:** *Ligustrum* sp.
Montaldo (2000). **Fruto:** *Ligustrum lucidum*.
Montaldo (2005). **Fruto:** *Ligustrum* sp.
Bodrati y Haene (2008). **Fruto:** *Allophylus edulis*.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Semillas:** *Amaranthus* sp., *Chenopodium* sp.,Gramíneas **Frutos:** *Cestrum parqui, Condalia microphylla,Sapium haematospermum*,Solanáceas. Arena.
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Fruto:** *Morus alba*.
De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). **Fruto:** *Ligustrum lucidum*.

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto es melancólico y suave: Hou huuuuuu, repetido esporádicamente.

HÁBITAT
Bosques, sabanas, montes, selvas, selvas en galería.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Tucumán, Formosa, Corrientes, Córdoba, Catamarca, La Rioja, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N					N	N	N	N	N

A baja y mediana altura, en árboles, arbustos o enredaderas.
Semiexpuesto. Elaborado. Plataforma de palitos finos, tallos de yuyos o de enredaderas, hojas. Internamente fibras finas o plumitas.



Salvador (inéd.). Gobernador Virasoro, dpto. Santo Tomé, Corrientes, 20-10-1984, nido en un árbol seco cubierto en parte por una enredadera, a 3,4 m de altura, con 2 huevos. Valle Hermoso, dpto. Punilla, Córdoba, 10-12-1984, un nido en un *Schinus* sp., a 2,1 m de altura, con 2 huevos. Aguas Blancas, dpto. Castro Barros, La Rioja, 01-11-1985, un nido en un *Lithraea ternifolia*, a 2,2 m de altura, con 2 pichones de unos 10 días. Tanti, dpto. Punilla, Córdoba, 21-12-1989, un nido en un *Acacia* sp., a 2,6 m de altura, con 2 pichones de unas 48 hs., Chuquis, dpto. Castro Barros, La Rioja, 09-02-1990, un nido en un *Schinus* sp., a 1,9 m de altura, con 2 huevos.
Salvador y Salvador (en prep.). Dpto. San Martín, Córdoba, se hallaron 41 nidos, posturas entre agosto y marzo, ubicados principalmente en *Schinus longifolia*, *Celtis tala*, *Geoffroea decortican*, *Sapium haematospermum*, *Solanum* sp., *Baccharis* sp. y *Celtis iguanea*, también en el suelo entre gramíneas, altura (X: 1,9 m). Ponen 2 huevos.

Hartert y Venturi (1909). Barracas al Sur, nido con 2 huevos.
Smyth (1927). Manchalá, dpto. Leales, Tucumán, 22-01-1923, nido.
Pereyra (1938b). Zona ribereña del noreste de Buenos Aires, nidifica en la zona.
Masramón (1977). Ubica el nido en horquetas a baja altura.
Contino (1980). Nidifica entre los meses de noviembre y febrero, a poca altura.
Fraga (1983a). Lobos, pdo. Lobos, Buenos Aires, nidifica desde agosto a enero. Se localizaron 15 nidos entre 1974 y 1979. De este total, 2 estaban en edificios abandonados, uno de estos sobre el tanque de agua de un baño a 40 cm del cielorraso. Parque San Martín, dpto. Paraná, Entre Ríos, 03-08-1980, nido con un huevo.
Klimaitis y Moschione (1987). Nidifica en la vegetación más densa y sombría.
Alabarce y Antelo (1998). San Felipe, dpto. Lules, Tucumán, nidifica en noviembre.
Babarskas et al. (2003). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, un nido con pichones en noviembre.
Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, anida entre octubre y enero.
De la Peña (2013c). Se localizaron 30 nidos en Santa Fe, Entre Ríos y el 13-03-1981, uno en la Puerta, dpto. Amabato, Catamarca. Medidas: diámetro total: de 9 a 20 cm, diámetro interno: 9 a 10 cm, profundidad: 2 a 3 cm y alto: 3,5 a 10 cm. El nido más bajo: 1,10 m y el más alto: 3,50 m.
Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos "Pablo Girard", tres nidos con 2 huevos cada uno.
Segura et al (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos "Ronald Runnacles", 4 nidos.

Huevos
Pone 2 huevos. Elípticos. De color crema.

Medidas
Salvador y Salvador (en prep.): 27,3 a 31,6 x 21,6 a 24,4 X= 29,83 x 23,12 (N= 48)
Hartert y Venturi (1909): 27 a 34 x 22 a 24,5
Smyth (1927): 27,5 a 29,5 x 20,5 a 21,5
Pereyra (1938b): 31 x 25
Contino (1980): 31,5 x 24
Fraga (1983a): 28,4 a 32,8 x 21,6 a 24,0 X= 30,8 x 22,9 (N= 8)
Alabarce y Antelo (1998): 32,8 x 24,0
Di Giacomo (2005h): 29,2 a 34,1 x 22,1 a 22,6 X= 31,0 x 22,3 (N= 4)
De la Peña (2013c): 28,3 a 34,9 x 20,7 a 25,3 X= 31,4 x 22,9 (N= 9)



Pesos
Salvador y Salvador (en prep.): 6,9 a 10,2 X= 8,8 (N= 32)
Contino (1980): 4
Fraga (1983a): X= 9,1 (N= 11)
Di Giacomo (2005h): 7,4 a 8,4 X= 7,8 (N= 4)
De la Peña (2013c): 6,31 a 8,70 X= 7,63 (N= 4)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,547 a 0,675 X= 0,567 (N= 9)

PICHONES
Descripción
Fraga (1983a). Nacen con los ojos cerrados. Corto plumón ocráceo cubre la piel rosada. Pico grisáceo con banda subterminal negra y diente blanco. Al tercer día comienzan a abrir los ojos.
Los pichones abandonan el nido entre los 14 a 17 días.
De la Peña (2013c). Nacen con los ojos cerrados. Piel oscura. Pico oscuro con punta de color natural. Por detrás de la punta tiene una línea más oscura que el resto del pico. Cavidad bucal oscura (morada). Mandíbula ventralmente oscura. Fino plumón crema en las zonas ptéridas.
4 días. Abre los ojos, marrones. Patas grises. Uñas largas.
5 días. Se nota más el contraste entre la punta del pico y el resto. Cañones alares largos, aparecen las láminas finas que parecen pelos. Más fuerte el color ventral crema.

10 días. Láminas de las plumas externas de la cola, blancas. Las dos que siguen, blanquecinas. Las centrales, no. Alas con láminas como plumas de adulto, también en el cuello y lados del pecho. Abdomen blanco. Quedan escaso plumón crema en el cuello.

Observaciones
De la Peña (2013c). Los adultos con los pichones continúan juntos durante 8 a 10 días, después de abandonar el nido.

Generalidades
Fraga (1983a). El período de incubación es de 14 días.
Di Giacomo (2005h). Permanencia de los pichones en el nido, 15 días.
De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido, 5 a 6 días, pero puede ser variable. Pone en días alternos. Período de incubación de 14 días. Los pichones nacen en 24 horas y permanecen el nido de 14 a 17.

Más información:
Fraga (1983a). De la Peña (2013c)


Cayastá. Santa Fe. 16-04-2008


Esperanza. Santa Fe. 23-10-2010. Incubando


Esperanza. Santa Fe. 30-10-2010. Juveniles



Esperanza. Santa Fe. 26-08-2009. Ubicación nido



Cayastá. Santa Fe.14-01-2008. Juvenil



Esperanza. Santa Fe. 26-08-2009



Esperanza. Santa Fe. 26-08-2009




Esperanza. Santa Fe. 22-10-2015

Depredación

Di Giacomo (2005h). Varios adultos fueron capturadas por un Gato montés (*Oncifelis geoffroyi*) cunado comían granos de maíz.

Otros

Antoniazzi et al (2011). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*



IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño grande. Nuca y espalda con reflejos verdosos. Parte ventral de las alas canela y la punta de la cola blanca, visibles cuando vuela. Difícil de diferenciar de las otras Yerutíes .
Prestar atención al canto.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Leptotila verreauxi chalcauchenia P. L. Sclater y Salvin, 1870 desde el norte del país hasta San Juan, San Luis, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Catorce subespecies. Amplio rango de distribución desde el sur de Texas, hasta centro Argentina y Uruguay. Comprende: Estados Unidos, Méjico,

Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Leptotila verreauxi chalcauchenia P. L. Sclater y Salvin, 1870

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Cueto y López de Casenave (2000); Darrieu y Camperi (2001a); Fiameni (1994); Fraga (1983a); Hartert y Venturi (1909); Isacch et al. (2006); Klimaitis (1975b); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Lucero et al. (2011); Mérida y Bodtati (2006); Morici (2012b); Montaldo (1993a, 2000); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1933b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Roda y Danti (2015); Soave et al. (1999b)

Observaciones: De la Peña (Pinamar, pdo. Gral. J. Madariaga, 14-01-1983)

Catamarca
Citas: Alabarce et al. (1990); Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009);De la Peña (2013c); White (1882)

Chaco
Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004)
Córdoba
Citas: Castellanos (1931); Dardanelli et al. (2006a); Dardanelli y Nores (2001); Heredia (2006); Nores et al. (1983);
Nores (1996); Salvador (1983a); Sferco y Nores (2003); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Jesús María, dpto. Colón, 18-07-2004)

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Ordano et al. (2008)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Baliño y Biole (1984); Baliño y Biole (1984); Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); Camperi (1992a.); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b, 2013c); Fandiño et al. (2010); Hartert y Venturi (1909); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2002); Muzzachiodi et al. (2003); Navas (1982); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Zapata (1975, 1977)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c);Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997);Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995); Salvador y Di Giacomo (2014); Wetmore (1926b)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009);Fiora (1933); Chebez et al. (1998); Malizia et al. (2005); Moschione y Segovia (2005)

La Pampa
Citas: Bodrati (2005c)

La Rioja
Citas: Bodrati y Ferrari (2014); Giacomelli (1923)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b); Camperi y Darrieu 2000 (2001b); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014)

Salta
Citas: Alabarce y Lucero (1977); Babarskas et al. (1995); Camperi (1990); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b); Salvador (1990); Salvador y Di Giacomo (2014); Straneck (1990f)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Haene (1987); Nores e Yzurieta (1982b)

San Luis
Citas: Casares (1944); Masramón (1977, 1983); Nellar Romanella (1993)

Santa Fe
Citas: Beltzer (1986c); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009); Rossetti y Giraudo (2003)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991); Salvador y Di Giacomo (2014)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996, 1998, 2000); Antelo y Brandán Fernández (2000, 2006, 2013); Antelo y Brandán (2006); Brandán y Antelo (2000, 2009); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (1998, 2007); Capllonch y Aráoz (2007); Echevarría y Chani (1999, 2000, 2006); Echevarría (2001); Echevarría et al. (2007, 2008a, 2011b); Fanjul (2010); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Navarro et al. (2000); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz y Aráoz (2014); Presti y Echevarría (2009); Rougés y Blake (2001); Vides Almonacid (1991, 1993)

YERUTÍ COLORADA *Leptotila rufaxilla* (Richard & Bernard, 1792)

Otros nombres: Paloma colorada de monte. Paloma montaraz rojiza. Yerutí rojiza.

DESCRIPCIÓN
Largo: 28 cm.
Peso: Contreras (1979): N= 1 (M) 169 g; N= 1 (H) 183 g
Coloración. Pico negro. Patas rojas. Iris pardo naranja claro.
Frente grisácea. Corona gris azulada. Posterior del cuello y espalda violáceos tornasolados. Dorso y cubiertas alares pardos oliváceos oscuros. Garganta blanquecina. Partes ventrales ocráceas vinosas más claras en el abdomen. Subcaudales blancas.
Alas pardas, ventralmente canelas.
Cola pardaoscura con banda blanca en las plumas externas.

COMPORTAMIENTO
Anda solitaria o en pareja. Terrícola.

Voces
Straneck (*in litt*.). La voz es un suave y grave Houuuuu... repetido en forma esporádica.

HÁBITAT
Bosques y selvas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Misiones.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N

En árboles, arbustos, matorrales o enredaderas.
Oculto o Semiexpuesto. Elaborado. Plataforma de palitos, tallitos de enredaderas, pajitas.

Uranga (*in litt.*). El Soberbio, dpto. Guaraní, Misiones, 08-11-2013, nido con 2 huevos.
Salvador y Salvador en De la Peña (2010b). Jardín América, dpto. San Ignacio, Misiones, 12-12-1988, un nido se hallaba en un área selvática a 20 m de un arroyo, bien oculto a 2,8 m de altura en un pequeño árbol con abundantes epífitas, hecho con tallitos de enredaderas, tallitos con líquenes adheridos y por dentro gramíneas, tenía 13 cm de diámetro, 5 cm de altura y 3,5 cm de profundidad. Contenía 2 huevos.
Bodrati y Salvador (2013b). Localizaron 4 nidos en Misiones: 12-12-1988, Jardín América, dpto. San Ignacio, nido bien oculto en un árbol seco, cubierto por epífitas, a 2,80 m del suelo. Casquete elaborado de tallitos, líquenes, ramitas finas, tallos, zarcillos y en la base algunas cortezas. Diámetro externo de 13 cm, interno de 8 cm, alto 5 cm y 3,5 cm de profundidad. Tenía 2 huevos. Otro fue hallado el 21-10-2001, en 9 de Julio, dpto. El Dorado, a 1,30 m del suelo, contenía un huevo y un pichón. El 11-11-2006, en el Parque Provincial de la Araucaria, dpto. San Pedro, nido a 1,50 m del suelo dentro de una densa mata de Yuquerí (*Acacia polyphylla*), contenía 2 huevos. El 07-11-2007, en el Parque Provincial Cruce Caballero, dpto. San Pedro, nido muy oculto dentro de un Tala gateador (*Celtis iguanea*) a 1,30 m de altura. Contenía 2 huevos blanco cremosos.
De la Peña (2013c). Puerto Iguazú y Cataratas del Iguazú, dpto. Iguazú, Misiones, 12-10-1981, nido en una enredadera, a 1,50 m del suelo con 2 pichones y el otro en un matorral, a 1,60 m de altura con 2 huevos.
Medidas, diámetro total: de 13 a 15 cm.



Huevos
Pone 2 huevos. Elípticos. Blancos con tinte crema o crema.

Medidas
Salvador y Salvador en De la Peña (2010b): 29,8 a 30,3 x 22,7 a 22,8
Bodrati y Salvador (2013b): 29,4 a 31,1 x 22,1 a 22,8 X= 30,1 x 22,4 (N= 5)

Pesos
Salvador y Salvador en De la Peña (2010b): 8,2 y 8,4
Bodrati y Salvador (2013b): 7,1 a 8,4 X= 7,9 (N= 3)

PICHONES

Descripción

Bodrati y Salvador (2013b). Ojos cerrados. Piel color carne rosada, plumón dorsal amarillento acanelado, pico gris claro con una faja subterminal negra y ápice blanco, patas color carne grisácea.

Peso al nacer

Bodrati y Salvador (2013b): 7,1



Cataratas del Iguazú. Misiones. 21-09-1993



Puerto Iguazú. Misiones.12-10-1981

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño grande. Parte ventral de las alas canela y punta de la cola blanca, visibles en vuelo. Piel alrededor de los ojos rojiza. Corona gris azulada.
Difícil de diferenciar de las otras Yerutíes. Prestar atención al canto.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Leptotila rufaxilla reichenbachii Pelzeln, 1870 en Misiones, Corrientes y Formosa.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Seis subespecies. En buena parte de Sud América al este de los Andes. Comprende: Venezuela, Trinidad y Tobago, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina.



CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Leptotila rufaxilla reichenbachii Pelzeln, 1870

Corrientes

Citas: Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b); Giraudo et al. (2006)

Formosa

Citas: Contreras (1987c);Contreras et al. (2014)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Camperi y Darrieu 2000 (2001b); Chebez (1996a); De la Peña (2013c); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2009);Martínez Gamba (2014); Straneck (1990h)

YERUTÍ YUNGUEÑA *Leptotila megalura* P. L. Sclater y Salvin, 1879

Otros nombres: Paloma de cola grande. Paloma montaraz colilarga. Paloma montaraz de cola larga. Yerutí coluda.

DESCRIPCIÓN
Largo: 28-32 cm.
Peso: Salvador y Di Giacomo (2014): N= 2 138 y 161 g
Coloración. Pico negro. Patas rojas. Iris pardo castaño.
Frente grisácea. Corona, cuello y dorso superior violáceos tornasolados. Dorso inferior, cubiertas alares, rabadilla pardos oliváceos. Garganta blanquecina. Ventral ocrácea vinosa. Subcaudales blancas.
Remeras pardas oscuras. Parte ventral de las alas canela.
Cola parda oscura con las plumas externas con punta blanca.

COMPORTAMIENTO
Anda solitaria o en pareja. Terrícola.

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto está compuesto por cinco notas: Uh.uh.uh.uh.Uuuuu.. Uh.uh.uh.uh.Uuuuu.. repetido con cierta frecuencia.

HÁBITAT
Bosques entre los 1500 y los 2500 m de altura.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Baptista et al. (1997)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Cola larga. Canela en la parte ventral de las alas y blanco en la punta de la cola, visibles en vuelo.
Se parece a la Yerutí colorada,pero tiene la corona violácea.
Diferenciarla de las otras Yerutíes. Prestar atención al canto.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Leptotila megalura P. L. Sclater y Salvin, 1879 entre los 1500 y los 2500 m de altura en Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja y oeste de Santiago del Estero.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. En la cordillera de los Andes entre 1.500 y 2.500 metros de altura en Bolivia y noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca
Citas: Carma (2009); Esteban (1953); Nores et al. (2000); Nores y Cerana (1990); Salvador y Di Giacomo (2014); White (1882)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009) Chebez et al. (1998); Chebez (2005); Moschione y Segovia (2005); Straneck (1990f)

La Rioja
Citas: Nores e Yzurieta (1982a)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Camperi (1990); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013); White (1882)

Santiago del Estero
Citas: Ferrari et al. (2004b)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Boletta et al. (1995);Brandán (2005); Brandán y Navarro (2009); Echevarría et al. (2008d); Gianini (2000); Lucero (1983); Malizia et al. (1998); Navarro et al. (2007); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Aráoz (2014); Rougés y Blake (2001) Vides Almonacid (1993)

TORCAZA DE ALAS BLANCAS *Zenaida meloda* (Tschudi, 1843)

Otro nombre: Paloma china.



DESCRIPCIÓN
Largo: 25-33 cm.
Coloración. Gris ocrácea con tinte rosado en la corona. Banda blanca en las alas.

HÁBITAT
Zonas áridas.


NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en La Rioja.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N										N

Plataforma de palitos entrelazados.

Vitale et al. (2010). Banda Florida, dpto. General Felipe Varela, La Rioja, el 10-02-2009, se localizó un nido en una rama lateral de un Olivo, a unos 7 m del suelo. Plataforma de palitos entrelazados. El 29 y 30 de diciembre de 2007, en Villa Unión, dpto. General Felipe Varela, el 30 y 31 de diciembre de 2007 en Alto Jagüé, dpto. General Sarmiento, se observaron ejemplares transportando materiales para nidificar.

Observaciones
Fava et al. (2013). Canal Ing. G. Céspedes, dpto. Pocitos, San Juan, pareja en cortejo.



IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño mediano. Banda blanca en las alas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Zenaida meloda (Tschudi, 1843) en La Rioja y San Juan.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Regiones áridas de Ecuador, Perú, norte y centro de Chile, oeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

La Rioja
Citas: Bodrati y Cockle (2008); Ramos, D. en Chebez (2009); Vitale et al. (2010)

San Juan
Citas: Fava et al. (2013)

TORCAZA *Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847)

Otros nombres: Apoca. Cubincoqui. Cucule. Llanta. Mediana. Paloma. Paloma con orejas. Paloma de monte. Paloma de pecho dorado. Paloma dorada. Paloma mediana. Paloma moteada. Paloma parda manchada. Paloma puntana. Paloma sacha. Paloma segunda. Paloma torcaz. Paloma torcaz común. Paloma torcaza. Pecho dorado. Quitu. Sacha. Sacha paloma. Torcaza de cola blanca. Tórtola. Tórtola dorada. Tórtola mediana. Tórtola torcaza. Tortolita. Tortolita puntana. Tuerca. Urpila. Zurita.

DESCRIPCIÓN
Largo: 26 cm.
Peso: Fiora (1933): N= 5 X= 128 g (Rango 116 a 140); Humphrey et al. (1970): N= 2 (M) 134 y 140 g; Contreras(1975): N= 8 X= 145,9 g (Rango 130,7 a 168,5); Salvador (1988): N= 13 (H) X= 130,9 g (Rango 117 a 153), N= 30 (M) X= 138,2 g (Rango 116 a 155); Camperi (1992a): N= 1 (H) 124,8 g;Camperi (1992c): N= 1 (M) 150 g; N= 1 (H) 175 g; Darrieu y Bó (1992) : N= 3 (M) X= 135,0 g (Rango 119 a 146) , N= 24 (M) X= 138,8 g (Rango 103,6 a 173,2), N= 10 (H) X= 133,9 g (Rango 110,3 a 147,3);Christie et al. (2004): 120 g; Camperi y Darrieu (2004): N= 1 130,1 g; Salvador (2014a): N= 43 (M) X= 133,4 g (Rango 116 a 155); N= 27 (H) X= 129,6 g (Rango 117 a 153); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 12 X= 130 g (Rango 102 a 144)
Coloración. Pico negro. Patas rojizas. Iris pardo.
Frente gris vinosa. Corona y nuca grises. Manchitas subauriculares negras azuladas. A los lados del cuello, plumas tornasoladas. Dorso pardo. Garganta blanquecina. Pecho gris vinoso. Abdomen más claro.
Alas grises oscuras con manchas negras en las cubiertas. Cola con las plumas centrales grises, externas grises con banda subterminal negra y punta blanca en las más distales.

COMPORTAMIENTO
Anda en pareja o formando bandadas.

Alimentación

De la Peña y Pensiero (en prensa): **Frutos:** Tala (Celtis ehrenbergiana), Mora (*Morus alba*). **Semillas:** Nabiza (*Brassica napus*), Soja (*Glycine max*), Mamón (pulpa y semilla), Rayito de sol (*Lampranthus productus*), Mijo (*Panicum miliaceum*), Brucuyá (*Passiflora caerulea*) (en el suelo), Trigo (*Triticum aestuvum*)
Marelli (1919). Vegetales. Insectos.
Aravena (1927).**Semillas:** *Medicago sativa*, *Triticum sp., Zea mays.* Insectos.Piedritas.
Zotta (1940).**Semillas:** *Triticum sp.*
Bucher y Nores (1973). **Semillas:** *Amaranthus* sp. *,Arachis hypogaea, Argemone subfusiformis, Chenopodium* sp.*, Digitaria sanguinalis, Croton* sp.*, Echinochloa colona, Panicum miliaceum, Polygonum convolvulus, Helianthus annuus, Secale cereale, Setaria italica, Setaria pampeana, Sorghum almum, Sorghum halepense, Sorghum* sp.*, Zea mays, Triticum* sp.
Martínez et al. (1975).**Semillas:** *Erodium sp.,Sorghum almum*.
Bucher y Nores (1976).**Semillas:** *Amaranthus quitensis, Amaranthus* sp.*, Arachis hypogaea, Argemone subfusiformis*, Brachiaria extensa, *Brassica* sp.*, Chenopodium album, Chenopodium* sp.*, Croton* sp.*, Descurainia argentina, Digitaria sanguinalis, Echinochloa colona, Eragrostis cilianensis, Euphorbia hirta, Euphorbia ovalifolia, Euphorbia serpens, Helianthus annuus, Hordeum hexastichume, Kochia scoparia, Linum usitatissimum,Panicum miliaceum,Polygonum convolvulus, Polygonum aviculare, Secale cereale, Setaria italica, Setaria pampeana, Sorghum halepense, Sorghum* sp., *Stipa brachychaeta, Zea mays, Triticum* sp.
Pergolani de Costa y Zapata (1980). **Semillas:** *Amaranthus* sp.*, Ambrosia ternifolia, Brassica campestris, Brassica* sp.*, Carduus alantoides, Carduus nutans, Carduus pycnocephalus, Centaurea calcitrapa, Cerastium arvense, Certhamus lanatus, Cirsium vulgare, Chenopodium* sp.*, Cuscuta* sp.*, Cynara cardunculus, Cynodon* sp.*, Digitaria sanguinalis, Echinochloa colona, Echinochloa* sp.*, Echinum plantagineum, Eleusine indica, Euphorbia peplus, Galium mollugo, Galium* sp.*, Geranium* sp.*, Heleocharis* sp.*, Heliotropium* sp.*, Linum usitatissimum, Lolium multiflorum, Malvastrum coramandalianum,Panicum urbilleanum, Paspalum dilatatum, Oryzopis* sp., *Oxalis corniculata, Panicum bergii, Panicummiliaceum, Polygonum aviculare, Polygonum convolvulus, Potamogetom* sp., *Rannuculus* sp *,Setaria* sp., *Sida sp., Silene gallica, Urtica urens, Vaccaria segestalis, Vicia irsuta, Vicia* sp.*, Vigna* sp.*, Raphanus sativus, Rumex crispus,Sorghum halepense.*
Insectos: Langostas (desoves). **Crustáceos:** *Porcellus* sp. (bicho bolita).
Klimaitis (1993).**Semillas:** no determinadas. Piedritas.
Di Giacomo (2005h).**Semillas:** *Cirsium vulgare,Sorghum* sp., *Zea mays.*
De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). **Semillas:** *Lampranthus* sp., *Euphorbia serpens, Helianthus annuus,Portulaca oleracea, Oryza sativa, Sorghum* sp.,*Zea mays.* **Hojas:** *Lampranthu*s sp. Pan
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Semillas**: *Avena sativa, Chenopodium* sp.*,Panicum miliaceum*, *Sorghum* sp., *Zea mays, Glycine max.*

Voces

Straneck (*in litt*.). El canto del macho es un suave y descendente huu.huu.huu.. repetido esporádicamente.

HÁBITAT

Praderas, estepas, montes, plazas, parques, áreas rurales y urbanas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Tucumán, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, San Juan, San Luis, La Pampa, Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

Nidifica en forma solitaria generalmente. Pero puede formar colonias.



Ubica el sostenido en árboles, arbustos, enredaderas, matorrales. También en el suelo, tirantes de techos o sobre plataformas de palitos de nidos abandonados o semidestruidos, en planteras colgantes. Expuesto. Elaborado. Plataforma de palitos finos, tallos de yuyos, gramillas, hojitas. A veces alguna pluma.

Salvador y Salvador (en prep.). Dpto. Gral. San Martín, Córdoba, se hallaron cientos de nidos (solitarios y en colonias). Posturas en todos los meses del año, ubicado en todo tipo de árboles y arbustos, en el suelo, en construcciones humanas y en totorales en lagunas. Ponen 2 huevos, pero también se han encontrado varios con 3 huevos.
Peters (1923). Maquinchao, 25 de Mayo, Río Negro, 01-12-1920, nido con huevos.
Serié y Smyth (1923). Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, pone 2 ó 3 huevos.
Smyth (1927). Cacharí, pdo. Azul, Buenos Aires, 16-10-1916, Tigre, pdo. Tigre, Buenos Aires, 25-12-1917, Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, 10.11.1923, nidos.
Dinelli (1929). Nidos desde noviembre a marzo.
Castellanos (1931). Valle de los Reartes, dpto. Calamuchita, Córdoba, diciembre de 1919, nido en el suelo con huevos.
Humphrey et al (1970). Viamonte, 12 a 24 de octubre, varios nidos con 2 huevos cada uno
Bucher y Nores (1973). Piquillín, dpto. Río Primero y Villa Ascasubi, dpto. Tercero Arriba, Córdoba, anida durante todo el año.
Bucher y Di Tada (1975). Piquillín, dpto. Río Primero, Córdoba, nidos en abril y junio de 1970.
Masramón (1977). Anida durante todo el año.
Bucher y Orueta (1977). En el período de 1970-1972, colonias de nidificación en: 5 km al este de Marull, dpto. San Justo, 5 km al oeste de Salsipuedes, dpto. Colón, 2 km al este de Piquillín, dpto. Río Primero, 3 km al norte de Río Primero y Santiago Temple, dpto. Río Primero, dos colonias a 12 km y 5 km al norte de Despeñaderos, dpto. Santa María, El Parador, entre San Agustín y Embalse de río Tercero y en el Río de los Sauces, dpto. Calamuchita, Villa Ascasubi y 30 km al sur de Gral. Fotheringham, dpto. Tercero Arriba, 5 km al norte de Algodón, dpto. Gral. San Martín, 7 km al norte de Ballesteros, dpto. Unión, 11 km al este de Berrotarán, 14 km al este de Alcira y 12 km al este de Coronel Baigorria, dpto. Río Cuarto, Córdoba.
Wilson (1977). Mercedes, dpto. Mercedes, Corrientes, nidifica en Eucaliptos.
Klimaitis y Moschione (1987). Nidifica en la reserva.
Carman (1979). San Cayetano, pdo. San Cayetano, Buenos Aires, 18-12-1972, nido con 2 pichones.
Contreras (1980o). Laguna del Viborón, dpto. Maipú, Mendoza, 05-11-1975, nido parasitado por *Molothrus bonariensis.*
Maceda et al. (2001). Reserva Provincial Parque Luro, dpto. Toay, La Pampa, nidifica.
Mezquida y Marone (2001). Reserva de Ñacuñán, Mendoza, nidifica.
Pautasso (2002b). Reserva "El Pozo", dpto. La Capital, Santa Fe, 5 nidos entre el 23-11-1999 y el 11-11-2000, con huevos o con pichones.
Babarskas et al. (2003). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, 4 nidos con huevos entre octubre y noviembre.
Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, anida desde agosto a enero.
De la Peña (2013c). Se localizaron 534 nidos en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Chubut y Entre Ríos. Miden: diámetro total: de 12 a 15 cm. El nido más bajo, en el suelo, el más alto a 25 m.
Gelain (2014b). Villa del Salvador, dpto. Angaco, San Juan. Nidifica localmente. Un nido el 12-10-2008.
Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos "Pablo Girard", tres nidos con 2 huevos cada uno.
Segura et al (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos "Ronald Runnacles", 4 nidos.

Huevos
Pone 2, a veces 3 ó4 huevos. Elípticos. Blancos.

Medidas
Salvador y Salvador (en prep.): 25,4 a 32,3 x 20,3 a 24,2 X= 29,1 x 22,3 (N= 93)
Hartert y Venturi (1909): 27 a 32 x 20,5 a 24,5
Gibson (1920): 31 x 22
Smyth (1927): 28,5 a 31,5 x 20,5 a 22,5
Dinelli (1929): 29 a 30 x 21 a 22
Zapata y Cabrera (1969): 29,2 a 32,4 x 21,8 a 23,4
Contino (1980): 30 x 22
Di Giacomo (2005h): 25,4 a 29,8 x 20,2 a 22,5 X= 27,9 x 21,4 (N= 18)
De la Peña (2013c): 28 a 30,8 x 21,4 a 23,5 X= 29,3 x 22,1 (N= 12)

Pesos
Salvador y Salvador (en prep.): 6,2 a 9,1 X= 7,8 (N= 66)
Di Giacomo (2005h): 5,6 a 7,5 X= 6,7 (N= 18)
Zapata y Cabrera (1969): 7
De la Peña (2013c): 8,60 a 8,90 X= 8,7 (N= 2)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,40 a 0,51 X= 0,499 (N= 10)

PICHONES
Descripción
De la Peña (2013c). Nacen con los ojos cerrados. Piel rosada. Pico color natural con punta negra. Cavidad bucal y paladar rosado claro. Plumón amarillento. Garganta desnuda.
1 día. Largo del cuerpo: 3,5 cm.
3 días. Largo del cuerpo: 4,8 cm.
5 días. Ojos abiertos. Apenas se ven las láminas en las alas. Largo del cuerpo: 5,3-6,0 cm.
8 días. Cañones de las plumas alares grises con punta ocráceo-canela. Plumas laterales de la cola blancas, centrales grises. Largo del cuerpo: 6,5-8,0 cm.
10 días. Largo del cuerpo: 8-9 cm.
Se escapan del nido si son molestados.
El largo del cuerpo se tomó estando el pichón apoyado sobre el nido, desde el buche a la rabadilla.

Días de vida	Medidas							
	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Tarsometatarso	Tibiotarso	Pico
	Vaina o cañón	Lámina	Vaina o cañón	Lámina				
1						1,0-1,1	1,4	0,6-0,7
2						1,4	1,8	0,9
3						1,0-1,5	1,7-2,0	0,8-0,9
5	0,7-1,2		0,6-1,0			1,6-1,9	2,3-2,6	1,0-1,1
6	1,8	0,3	1,3		0,7	2,0	3,0	1,1
8	2,5-3,6	1,0-1,2	2,0-2,1	0,9-1,2	1,1-1,8	2,3	3,1-3,2	1,2-1,4
10	2,7-2,8	1,4-2,2	1,7-2,0	1,3-1,7	1,4-2,2	2,3	3,5-4	1,3-1,4

Observaciones
De la Peña (inéd.). Jesús María, dpto. Colón, Córdoba, el 14-02-2014 un nido tenía 4 huevos. Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, el 01-10-2014 un ejemplat Albino con nido a 5 m del suelo en un Fresno.

De la Peña (2013c). Se localizaron cinco nidos construidos sobre nidos semidestruidos de *Furnarius rufus*, uno en *Turdus amaurochalinus*, uno a 25 m de altura, en uno de *Parabuteo unicinctus* y uno en *Taraba major*.
El 18-09-1989, en Morteros, dpto. San Justo, Córdoba, una colonia con cientos de nidos. Algunos con 3 huevos.
El 21-11-1993, en Las Cuevas, dpto. Diamante, Entre Ríos, colonia con muchos nidos. Ejemplares de *Turdus amauchalinus* les comían los huevos.

Generalidades
Bucher y Orueta (1977). El período de incubación es de 14 días.
Di Giacomo (2005h): La postura ocurre en días alternos. El período de incubación es de 14 días. Los pichones permanecen en el nido entre 12 y 15 días.
De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido, 5-6 días pero puede ser variable. Pone en días alternos. Período de incubación 14 días. Los pichones nacen en 24 horas y permanecen en el nido de 12 a 14 días.

Más información:
Bucher y Nores (1973). Bucher et al. (1977). Bucher y Di Tada (1975). Bucher y Orueta (1977). De la Peña (2013c)

Otros
De la Peña (inéd.). Un ejemplar albino.
Harper (1923a). Un ejemplar Albino.
Haro (2002). Un ejemplar con Albinismo total en el Museo de Zoología de la Universidad Nacional de Córdoba.
De la Peña y Bruno (2008). Un ejemplar Albino (F. Bruno)
Urcola (2011). Un ejemplar con Leucismo parcial.
Antoniazzi et al (2011). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*

Depredadores
De adultos: *Elanus leucurus* (Leveau et al. 2002), *Circus cinereus* (Cáceres et al. 1996), (Bó et al. 2000c), Salvador y Salvador en (De la Peña y Salvador 2010), *Circus buffoni* (López 1993), (Bó et al. 1996), Salvador y Salvador en (De la Peña y Salvador 2010), *Accipiter chilensis* Reynolds en (Humphrey et al. 1970), *Rupornis magnirostris* (Morici 2010), *Parabuteo unicinctus* (Castellanos 1932, (Aguilar y Kowalinski 1996), Salvador en (De la Peña y Salvador 2010), (Salvador 2012), *Geranoaetus melanoleucus* Salvador y Salvador en (De la Peña y Salvador 2010), *Buteo albigula* (Trejo et al. 2006), *Tyto alba* (Massoia 1988k), (Morici 1990a), (Noriega et al. 1990), (García Esponda et al. 1998), (Trejo et al. 2005), *Bubo magellanicus* (Donázar et al. 1997), (Teta et al. 2001), *Asioclamator* (Martínez et al. 1998), *Asio flammeus* (Diéguez 1996), *Caracara plancus* (Vargas et al. 2007), *Falco femoralis* (Nellar Romonella 1993), (Bó 1999), Salvador y Salvador en (De la Peña y Salvador 2010), (Salvador 2012), *Falco peregrinus* (Zotta 1940), (Vasina y Straneck 1984), (Nellar 1991), (Ellis et al. 2002), (Notarnicola y Seipke 2004), Salvador y Salvador en (De la Peña y Salvador 2010)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño mediano. Plumas tornasoladas en el cuello. Manchas negras en las cubiertas alares. Franja negra y punta blanca en la cola.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Zenaida auriculata virgata W. Bertoni, 1901desde el norte del país hasta La Rioja en el oeste y Río Negro en el Sur y *Zenaida auriculata auriculata* (Des Murs, 1847) por el oeste, desde La Rioja, San Juan y Mendoza a Tierra del Fuego. Accidental en las islas Malvinas y Georias del Sur.

En algunas provincias hay áreas de superposición entre ambas razas.




Esperanza. Santa Fe. 06-09-2008. Incubando



Esperanza.Santa Fe. 06-10-2005



Esperanza. Santa Fe. 20-02-2010



Esperanza. Santa Fe. 17-08-2007. Nido en semáforo



Esperanza. Santa Fe. 24-11-2006. Nido en plantera



Esperanza.Santa Fe.25-01-2009. Juvenil



Esperanza. Santa Fe. 26-08-2009. Nido en el suelo



Esperanza. Santa Fe. 31-10-2010

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Once subespecies. Amplio rango de distribución en toda Sud América a excepción de Amazonia. Comprende: Venezuela, Trinidad y Tobago, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Zenaida auriculata virgata W. Bertoni, 1901

Buenos Aires

Citas: Aravena (1927); Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Camperi (1992c); Codesido et al. (2011); Cueto y López de Casenave (2000a, 200b); Dabbene (1917c); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Darrieu y Bó (1992); De la Peña (2013c); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Gibson (1920); Hartert y Venturi (1909); Isacch et al. (2006); Klimaitis (1975b, 1993); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Leveau y Leveau (2004a, 2004b, 2005, 2006, 2011b); Lucero et al. (2011); Marelli (1933); Mérida y Bodtati (2006); Morici (2012b, 2014); Montaldo y Claver (1986); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pereyra, C. B. de. (1927); Pugnali y Chamorro (2008); Salvador y Di Giacomo (2014); Soave et al. (1999); White (1882); Zapata (1998); Zuberbhüler (1971)

Catamarca

Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009);Darrieu y Bó (1992); White (1882)

Observaciones: De la Peña (Santa María, dpto. Santa María, 08-02-1977)

Chaco

Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004)
Observaciones: De la Peña (Resistencia, dpto. San Fernando, 03-05-1988)

Córdoba

Citas: Brandolín et al. (2007); Bucher et al. (1977); Bucher (1970); Bucher y Di Tada (1975); Bucher y Orueta (1977); Bucher y Nores (1976); Castellanos (1931); Darrieu y Bó (1992); Haro (2002); Haro y Gutierrez (1992); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Partridge (1953c); Salvador (1983a, 1988); Sferco y Nores (2003); Straneck (1990d); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Río Primero, dpto. Río Primero, 14-08-1972)



Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b); Darrieu y Bó (1992); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Marelli (1918); Wilson (1977)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Baliño y Biole (1984); Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); Camperi (1992a); Canavelli et al. (2004); Darrieu y Bó (1992); De la Peña (2011b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2001, 2011a, 2002); Muzzachiodi et al. (2003); Navas (1982); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Zapata (1975, 197/)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c);Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995); Wetmore (1926b)

Jujuy
Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Moschione y Segovia (2005); Darrieu y Bó (1992); Fiora (1933)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Bruno et al. (2007); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011b) (*chrysauchenia);*Darrieu y Bó (1992); De la Peña y Bruno (2008); De la Peña y Tittarelli (2011); Galmes et al. (2008); Maceda y Kin (2001); Noriega et al. (1993); Siegenthaler (1984); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006); Wetmore (1926b)

Observaciones: De la Peña (La Adela, dpto. Caleucaleu, 05-02-1976)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Capurro y Bucher (1982, 1986); Darrieu y Bó (1992); Giacomelli (1923); Hayward (1967); Koslowsky (1895b)

Observaciones: De la Peña (Patquía, dpto. Independencia, 09-02-1977)

Mendoza
Citas: Darrieu y Bó (1992)

Observaciones: De la Peña (Las Heras, dpto. Las Heras, 12-01-1982)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Darrieu y Bó (1992); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014)

Neuquén
Citas: Christie et al. (2004)

Río Negro
Citas: Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Daciuk (1977); Gelain (2001); Gelain et al. (2003);

Gelain y Tolosa (2011); Grigera y Pavic (2007); Grigera y Rubulis (1985); Hecker y Vidoz (1998); Peters (1923b)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Darrieu y Bó (1992) ; Echevarría et al. (2014); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b)

Observaciones: De la Peña (Salta, dpto. La Capital, 30-01-1977)

San Juan
Citas: Acosta y Murúa (2001); Camperi y Darrieu (2004); Darrieu y Bó (1992); Gelain (2008a, 2014a, 2014b); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i); Ortiz y Murúa (1994)

Observaciones: De la Peña (San Agustín del Valle Fértil, dpto. Valle Fértil, 16-01-1982)

San Luis
Citas: Bó (1965b); Casares (1944b); Darrieu y Bó (1992); Masramón (1977, 1983); Nellar Romanella (1993); Partridge (1953c)

Observaciones: De la Peña (Mercedes, dpto. Gral. Pedernera, 10-01-1982)

Santa Fe
Citas: Antoniazzi et al (2011); Beltzer (1986c); Bollero y Ramírez (2012); Darrieu y Bó (1992); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009); Rossetti y Giraudo (2003); Wilson (1926)

Santiago del Estero
Citas: Codesido y Bilenca (2000); Darrieu y Bó (1992); López de Casenave et al. (1998); Nores et al. (1991)

Observaciones: De la Peña (Selva, dpto. Rivadavia, 29-01-1977)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996, 2000); Antelo et al. (2006, 2013); Antelo (1992, 1999); Antelo y Brandán (2000, 2006, 2013); Brandán et al. (2006); Brandán y Antelo (2000, 2009); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch y Aráoz (2007); Chani et al. (2000); Darrieu y Bó (1992); Echevarría y Chani (1999, 2000, 2006); Echevarría (2001); Echevarría et al. (1998, 2007, 2008c, 2011b); Juri (2007); Juri y Chani (2005); Lucero (1983); Lucero et al. (2002); Marigliano et al. (2005b); Navarro et al. (2007); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz y Aráoz (2014); Presti y Echevarría (2009)

Observaciones: De la Peña (San Miguel de Tucumán, dpto. Capital, 30-01-1977)

Zenaida auriculata auriculata (Des Murs, 1847)

Chubut
Citas: Camperi (1998); Daciuk (1977b); Darrieu y Bó (1992); Darrieu y Camperi 2000 (2001); De la Peña (2013c); Harris (2008); Sainz-Trápaga (2014); Vidoz (1995)

Observaciones: De la Peña (Epuyén, dpto. Cushamen,01-02-1976)

La Pampa
Citas: Maceda et al. (2001)

Mendoza
Citas: Aramburú (1983); Blendinger y Alvarez (2002); Contreras (1979g); Contreras y Fernández (1980); Darrieu (2014); Gómez (2006);López de Casenave y Marone (1996); Lucero (2013f); Marone (1990, 1991, 1992a, 1992b); Martínez et al. (1997a); Milesi et al. (2002); Mezquida y Marone (2001); Naumburg (1933);Olivera et al. (2009);Ordano y Bosisio (2001); Pereyra (1927e); Reed (1916); Roig (1965); Sanzín (1918); Steullet y Deautier (1939); Wetmore (1926b)

Observaciones: De la Peña (San Rafael, dpto. San Rafael, 13-10-2004)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000);Contreras (1975, 1977b); Daciuk (1978); Darrieu y Bó (1992); Gorgoglione (2005); Hellmayr y Conover (1942); Matarasso (2007);Pereyra (1945); Steullet y Deautier (1939); Veiga et al. (2005); Wetmore (1926b); Yepes (1939)

Observaciones: De la Peña (La Rinconada, dpto. Huiliches, 27-01-1976)

Río Negro
Citas: Bettinelli y Chebez (1986); Camperi (1998); Casas (1992); Contreras (1975); Daciuk (1977c); Darrieu y Bó (1992); Gelain (2010, 2012b); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Pérez y Petracci (1998); Piacentini et al. (2003)

Observaciones: De la Peña (Ñorquinco, dpto. Ñorquinco, 04-02-1976)

Santa Cruz
Citas: Daciuk (1977b); Darrieu et al. (2008); De Lucca y Saggese (1992); Hellmayr y Conover (1942); Imberti (2005e); Imberti y Albrieu (2001); Lange (1981); Scott y Sharpe (1904a); Steullet y Deautier (1939); Zapata (1967, 1969)

Observaciones: De la Peña (Río Turbio, pdo. Güer Aike, 09-11-1979)

Tierra del Fuego
Citas: Castellanos (1935); Clark (1986); Earnshaw (1973); Humphrey et al. (1970); Olrog (1948)

Islas Malvinas
Citas: Grerory (1994); Wace (1921); Wood (1988, 2006)

Georgias del Sur
Citas: Curtis (1994)

Alta mar
Citas: Seco Pon y Favero (2013)

PALOMA MONTERA GRANDE *Zentrygon frenata* (Tschudi, 1843)

Otros nombres: Paloma perdiz parda. Paloma tonta.

DESCRIPCIÓN
Largo: 30-34 cm.
Coloración.
Peso: Salvador (1988): N= 5 (M) X: 310 g (Rango: 265 a 325); N= 5 (H) X: 304 g (Rango: 270 a 320).
Coloración. Pico rojizo. Patas rosadas. Iris amarillento.

Dorso pardo oscuro con reflejos violáceos. Estrecha línea negra a través de los ojos. Otra línea negra pasa por debajo de la cara hasta la nuca. Garganta blanca. Partes ventrales grises parduscas.
Alas y cola pardas. Secundarias ribeteadas de castaño.



COMPORTAMIENTO
Terrícola. Relativamente mansa.

Voces
Straneck (*in litt*.). Su canto es un suave y sonoro Buuuuup.. repetido en forma esporádica.

HÁBITAT
Bosques y selvas entre los 1500 y los 2500 m de altura. En invierno a menos altura.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Baptista et al. (1997)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Parte dorsal oscura, ventral más clara. Garganta blanca. Dos líneas negras en la cara.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Zentrygon frenata margaritae Blake, Höy y Contino, 1961 entre los 1500 y los 2000 m de altura en Jujuy y Salta.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cuatro subespecies. Selva montana en los Andes hasta los 3.000 metros en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia *y* noroeste deArgentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Zentrygon frenata margaritae Blake, Höy y Contino, 1961

D.G. Entre los 1.500 y los 2.000 metros de altura en Jujuy y Salta.

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Moschione y Segovia (2005);Salvador (1988); Straneck (1990f)

Salta
Citas: Chebez et al. (1998); Coconier et al. (2007); Höy (1969a); Moschione et al. (2013)

Subfamilia: Peristerinae

TORCACITA ENANA *Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)

Otros nombres: Palomita de la Virgen. Palomita enana. Tortolita. Tortolita minuta.



DESCRIPCIÓN
Largo: 14-16 cm.
Coloración. Pico pardo. Patas rosadas. Iris rojo violáceo.
Macho. Cabeza gris. Parte dorsal gris pardusca. Supracaudales grises con el ápice pardo. Ventral color gris rosáceo con el ápice de las plumas del pecho canela.
Alas pardas. Cubiertas alares con puntos azules. Parte ventral de las alas rojiza. Cola con las plumas centrales grises, externas grises con ancha banda negra y las dos distales orilladas de canela.
Hembra. Coloración general parda, más clara en la zona ventral.
Cubiertas alares mayores y secundarias orilladas de blanco.
Alas y cola como el macho.

HÁBITAT
Sabanas, orillas de selvas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Baptista et al. (1997)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño muy chico. Rojizo en las alas, notable en vuelo. Manchitas azules en las alas. Cola corta.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Columbina minuta minuta(Linnaeus, 1766) en Misiones y este de Formosa.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cuatro subespecies. Amplio rango de distribución desde sur de Méjico hasta extremo noreste de Argentina en 2 áreas discontínuas. Comprende: Méjico, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Columbina minuta minuta (Linnaeus, 1766)

Corrientes
Citas: Mazar Barnett y Pearman (2001)

Formosa
Citas: Contreras et al. (2014)

Misiones
Citas: Chebez (1996a); Navas y Bó (1986c); Partridge (1954)

TORCACITA COLORADA *Columbina talpacoti* (Temminck, 1811)

Otros nombres: Palomita castaña. Palomita rojiza. Palomita talpacoti. Tortolita.



DESCRIPCIÓN
Largo: 14-18 cm.
Peso: Contreras (1979f): N= 4 (M) X: 52,1 gr (Rango: 50,5 a 53,5); Salvador (2014a): N= 1 (M) 51,5 g; Salvador y Di Giacomo (2014):N= 1 (M) 51,5 g
Coloración. Pico pardo. Patas rosadas. Iris amarillo rojizo.
Macho. Cabeza gris. Parte dorsal castaña rojiza. Garganta blanquecina. Ventral gris rosácea.
Alas pardas oscuras. Cubiertas alares con puntos negros, cubiertas internas negras. Plumas centrales de la cola pardas, externas negras con punta castaña.
Hembra. Similar al macho, pero pardo oliváceo en la parte dorsal y pardo ocráceo ventralmente.

COMPORTAMIENTO
Anda generalmente en pareja.

Alimentación
Ordano et al. (1999). Semillas.
Cintra et al. (1990). **Semillas:** *Amaranthus retroflexus, Amaranthus viridis, Brassica nigra, Eleusine indica, Euphorbia hirta, Melinis minutiflora, Portulaca oleracea, Triticum aestivum, Oryza sativa.*
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Semillas:** *Panicum maximun* y Gramíneas. **Frutos:** no determinados.

Voces
Straneck (*in litt*.). La voz es similar a la de la Torcacita común, pero en lugar de tener dos sílabas tiene tres. Es un Uhu.hú..Uhu.hú..Uhu.hú..Uhu.hú.. repetido de 4 a 10 veces. Luego de un silencio vuelve a iniciar esta estrofa.

HÁBITAT
Sabanas, bosques, orillas de selvas, orillas de selvas en galería.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Formosa, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Santa Fe.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N

En árboles, arbustos o enredaderas. A baja y mediana altura.
Expuesto. Poco elaborado. Plataforma de palitos. Internamente pajitas y/o plumitas.

Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, anida entre noviembre y enero. Nidos ubicados a baja o mediana altura, entre 1 a 3 m del suelo.
De la Peña (2013c). Puerto Rico, dpto. Lib. Gral. San Martín, Misiones, 10-02-1973, nido en un arbusto a 2,00 m del suelo, 2 huevos, Santo Pipó, dpto. San Ignacio, Misiones, 2 nidos: 14-10-1981, en arbustos a 2,30 m del suelo, 2 huevos y 2,50 m de altura con 2 huevos, 27-11-1995, Villa Ocampo, dpto. Gral. Obligado, Santa Fe, en Tala (*Celtis* sp.). a 2,30 m del suelo, 2 pichones. Medidas: diámetro total: de 8 a 9 cm, alto: 2 a 3 cm.
Nores e Yzurietta (*in litt*. a S. Salvador). Arroyo Garupá, dpto. Capital, Misiones, 16-12-1984, nido con 2 huevos.

Salvador (*in litt*.). Santo Tomé, dpto. Santo Tomé, Corrientes, 14-10-1984, nido en una *Bougainvillea* sp. a 1,00 m de altura, 2 huevos. Apóstoles, dpto. Apóstoles, Misiones, 14-12-1988, nido en un arbusto a 1,50 m del suelo, 2 huevos, Sachayoj, dpto. Alberdi, Santiago del Estero, 05-12-1997, nido en una *Acacia* sp. a 1,90 m de altura, con 2 pichones.

Huevos
Pone 2 huevos. Elípticos u ovoidales. Blancos.

Medidas
Salvador (*in litt*.): 21,8 a 23,6 x 16,8 a 18,0 X= 22,7 x 17,4 (N= 4)
Hartert y Venturi (1909): 20 a 24 x 15,5 a 17
Di Giacomo (2005h): 21,5 a 23,7 x 16,0 a 18,0 X= 22,4 x 16,7 (N= 10)
De la Peña (2013c): 21,0 a 23,6 x 16,7 a 17,8 X= 22,0 x 17,1 (N= 6)

Pesos
Salvador (*in litt*.): 3,4 a 3,8 X= 3,5 (N= 4)
Di Giacomo (2005h): X= 3,4 (N= 10)
De la Peña (2013c):2,6 a 3,0 X= 2,8 (N= 4)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,190 a 0,235 X= 0,222 (N= 6)

Generalidades
De la Peña (1996). Período de incubación, 12 días. Los huevos son puestos en días alternos. Los pichones permanecen en el nido de 10 a 11 días.

Otros
Bodrati en Salvador y Bodrati (2013a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*

Más información:
Hart et al. (2011)


Puerto Rico. Misiones. 10-02-1973


Villa Ocampo. Santa Fe. 27-11-1995. Juvenil

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. Coloración rojiza en la parte dorsal. Manchitas negras en las cubiertas alares. Cola corta.

La hembra se diferencia de la hembra de la Palomita azulada por tener puntos negros en las alas y en las tapadas internas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Columbina talpacoti talpacoti (Temminck, 1811) en Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Córdoba, San Juan, La Rioja, norte y este de Santa Fe, La Pampa y noreste de Buenos Aires. Accidental hasta Chubut y en las Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Cuatro subespecies. Desde el norte de Mejico hasta este de Peru y Argentina. Comprende: Méjico, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Columbina talpacoti talpacoti (Temminck, 1811)

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2001b, 2006b); Bruno y Morici (2009); Darrieu y Camperi (2001a); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Mérida y Bodtati (2006); Narosky (1983b); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008)

Chaco

Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Bodrati en Salvador y Bodrati (2013a); Chatellenaz (2005a); Chebez et al. (1998); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004)


Observaciones: De la Peña (Resistencia, 26-10-1973)

Chubut

Citas: Edelaar y Escudero (2006); Kovacs et al. (2005)

Córdoba

Citas: Di Giacomo et al. (2001); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores y Yzurieta (1981); Salvador (1983a); Yzurieta (1995)



Corrientes

Citas: Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b); Esteban (1953); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Ordano et al. (2008)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 18-09-1979)

Entre Ríos

Citas: De la Peña (2012b); Marateo et al. (2009)

Formosa

Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c);Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Narosky y Martelli (1995); Ordano et al. (1999); Pujalte et al. (1995)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Moschione y Segovia (2005)

La Pampa
Citas: Bruno y Morici (2009); Darrieu (1994); Darrieu et al (2011); De la Peña y Tittarelli (2011)

La Rioja
Citas: Spinuzza (2014)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b); Camperi y Darrieu 2000 (2001b); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); De la Peña (2013c); Giraudo et al. (1993); Hartert y Venturi (1909); Krauczuk (2005, 2009);Martínez Gamba (2014); Salvador y Bodrati (2013a)

Observaciones: De la Peña (Cataratas del Iguazú, dpto. Iguazú, 21-09-1983)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Chebez et al. (1998); Coconier et al. (2007); Hartert y Venturi (1909); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b); White (1882)

Observaciones: De la Peña (San Ramón de la Nueva Orán, dpto. Orán, 02-02-1977)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2009); Lucero (2013i)

Santa Fe
Citas: De la Peña et al. (2003b); De La Peña (2011f, 2013c); López-Lanús et al. (2013a);

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991); Salvador y Eroles (1994); Salvador y Di Giacomo (2014)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Lucero (1983); Ortiz y Aráoz (2014); Vides Almonacid (1993)


Islas Malvinas
Citas: Woods (2006)

TORCACITA ESCAMADA *Columbina squammata* (Lesson, 1831)

Otros nombres: Palomita escamada. Palomita escamosa.

DESCRIPCIÓN
Largo: 18-22 cm.
Coloración. Pico pardo oscuro. Patas rosadas. Iris pardo rojizo.
Cabeza y parte dorsal pardas claras con ápice de las plumas pardo oscuro. Ventral blanquecina con las puntas de las plumas pardas.

Primarias pardas con las barbas internas castañas. Secundarias pardas orilladas de blanquecino. Cubiertas pardas y blancas, teñidas de pardo oscuro. Parte ventral de las alas parda oscura y castaña.
Cola con las plumas centrales pardas, las laterales negras con el tercio terminal blanco.



HÁBITAT
Matorrales, orillas de selvas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Baptista et al. (1997)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. Dorso y parte ventral muy "escamados". Cola larga.
En vuelo muestra castaño en las alas y las plumas externas de la cola blanco y negro.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Columbina squammata squammata (Lesson, 1831) en Misiones, Corrientes y este de Formosa.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies, con poblaciones separadas, una en el norte de Sud América que comprende Venezuela, Trinidad y Tobago, Guayana Francesa y Colombia. La otra subespecie se extiende más al sur comprendiendo Brasil, este de Paraguay, este de Bolivia y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Columbina squammata squammata (Lesson, 1831)

Corrientes
Citas: Gandoy et al. (2015)

Formosa
Citas: Gandoy et al. (2015); Gorleri et al. (2011)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b); Chebez (1996a); Krauczuk (2009); Partridge (1961)

TORCACITA COMÚN *Columbina picui* (Temminck, 1813)

Otros nombres: Cuyanita.Palomita. Palomita común. Palomita de la Virgen. Palomita de plaza. Palomita torcaza. Picuí. Picu-í. Torcacita. Torcacita chica. Tortolita. Tortolita de la Virgen. Tuku tuku. Ulpishita. Urpila. Urpillita.

DESCRIPCIÓN
Largo: 18 cm.
Peso: Fiora (1933): N= 30 X= 47 g (Rango 41 a 51); Contreras (1979f): N= 2 (M) 47,5 y 56,4 g, N= 1 (H) 59,0 g: Salvador (1988): N= 9 (?) X= 55,2 g (Rango 52,5 a 83,3); Navas y Bó (1990): N= 2(M) 49,3 y 50,0 g; Camperi

(1992c): N= 2 (M) 52,5 g; N= 1 (H) 400 g; Blendinger (1999): 45,0 g;Christie et al. (2004): N= 1 (H) 40,0 g; Camperi y Darrieu (2005): N= 7 (M) X= 51,4 g (Rango 40,6 a 56,2), N= 2 (H) 45,0 y 49,5 g;Di Giacomo (2005h): N= 3 X= 47,8 g (Rango 42,7 a 53,7 g; Salvador (2014a): N= 19 (M) X= 49,8 g (Rango 44,5 a 54,8). N= 17 (H) X= 46,4 g (Rango 42,0 a 51,5); Salvador y Di Giacomo (2014):N= 8 (M) X= 50 g (Rango 45,2 a 56,0), N= 9 (H) X= 46,2 (Rango 44,7 a 47,5), N= 3 (?) X= 48,3 g (Rango 45 a 54,5), N= 4 (H) X= 39,3 g (Rango 37,7 a 41,0)
Coloración. Pico negro. Patas rojizas. Iris lila.
Macho. Cabeza gris plomiza. Dorso pardo grisáceo. Garganta blanca. Pecho grisáceo vinoso. Abdomen blanquecino.
Alas pardas grisáceas. Cubiertas alares superiores con manchitas negras azuladas formando una banda. Medianas pardas y blanquecinas. Secundarias negras. Cola parda con las plumas externas blancas.
Hembra. Semejante al macho pero más oscura en la zona dorsal. Más blanquecina ventralmente y sin azulino en la cabeza.

COMPORTAMIENTO
Anda en pareja o formando grupos.

Alimentación
De la Peña y Pensiero (en prensa): **Semillas:** Nabiza (*Brassica napus*), Mijo (*Panicum miliaceum*), Sorgo (*Sorghum caffrorum*), Brachiaria (*Urochloa plantaginea*)
Marelli (1919). Vegetales.
Aravena (1927). Semillas.
Zotta (1934). Semillas. Piedritas.
Olrog (1956a). Semillas. Piedritas .
Martínez et al. (1975). Semillas: *Dichondra repens, Erodium* sp.
Klimaitis (1993). Semillas. Vegetales. Piedritas.
Ordano et al. (1999). Semillas.
De la Peña y Pensiero (2003). Semilla de *Chenopodium album.*
Di Giacomo (2005h). Fruto de *Policarpon suffruticosum.*
De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). Frutos de *Morus alba.* Semilla (partida de *Zea mays*). Pan migas o mojado
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). Semilla *Amaranthus sp Chenopodium sp..* Gramíneas *Panicum mileaceum*

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto del macho es una voz de dos sílabas que emite de 4 a 10 veces: uhú.. uhú..uhú.. uhú.. uhú.. uhú.. luego de un silencio vuelve a iniciar esta estrofa. Canta durante todas las horas de luz.

HÁBITAT
Sabanas, montes, praderas, áreas rurales y periurbanas, parques.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Tucumán, Formosa, Corrientes, Córdoba, San Luis, San Juan, Mendoza, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

A baja y mediana altura. Sostenido en ramas de árboles, arbustos, matorrales, enredaderas, cactáceas, sobre plataformas de barro o de palitos de nidos abandonados por otras aves, tirantes o ladrillos en construcciones o sobre postes u otros elementos.



Expuesto. Elaborado. Plataforma de tallos de yuyos, gramíneas, raicillas. Internamente plumas.

Gibson (1920). Cabo San Antonio, pdo. Partido de la Costa, Buenos Aires, nidos en 1895.
Serié y Smyth (1923). Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, pone 2 huevos, a veces 3.
Smyth (1927). Cacharí, pdo. Azul, Buenos Aires 18-10-1916 y Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, 03-11-1921, 16-10-1922, 24-01-1925, 02-10-1926 y 17-10-1926, nidos con huevos.
Castellanos (1931). Valle de los Reartes, dpto. Calamuchita, Córdoba, enero de 1917, nido con 2 pichones.
Pereyra (1937b). Conhelo, dpto. Conhelo, La Pampa, anidaron varias parejas en una quinta, donde hasta entonces no las hubo.
Masramón (1977). Ubica el nido a baja altura.
Wilson (1977). Mercedes, dpto. Mercedes, Corrientes, nidifica en Eucaliptos.
Contino (1980). En el noroeste nidifica en primavera, ubica en nido en los árboles, pone 2 ó 3 huevos.
Contreras (1980o). Gustavo André, dpto. Lavalle, Mendoza, enero de 1978, nido parasitado por *Molothrus bonariensis*.
Alabarce y Antelo (1998). San Felipe, dpto. Lules, Tucumán, se localizaron 15 nidos en el año 1992.
Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba, nidifica en la zona.
Maceda et al. (2001). Reserva Provincial Parque Luro, dpto. Toay, La Pampa, nidifica.
Mezquida y Marone (2001). Reserva de Ñacuñán, Mendoza, nidifica.
Pautasso (2002b). Reserva "El Pozo", dpto. La Capital, Santa Fe, 12 nidos entre el 23-11-1999 y el 05-11-2000, con huevos o con pichones.
Babarskas et al. (2003). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, 11 nidos entre octubre y febrero.
Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, nidifica entre mediados de agosto y marzo.
De la Peña (2013c). Desde el 30-10-1970 hasta el 09-11-2004, se localizaron 256 nidos, de los cuales 247, estaban en Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe. El nido más bajo a 0,30 m del suelo y el más alto a 4,70 m. Ubicados en arbustos o en árboles, excepto uno en un tirante de una construcción, otro en poste de alambrado y el 11-12-1982, en Villa Elisa, dpto. Colón, Entre Ríos, en el asiento de un arado. Pone durante todo el año, con mayor cantidad de nidos entre setiembre y enero. Medidas: diámetro total: de 6 a 10 cm; profundidad: 0,50 cm y alto: 2 a 2,5 cm.
Salvador y Salvador (en prep.). Dpto. Gral. San Martín, Córdoba, se hallaron 315 nidos, posturas en todos los meses del año (con un pico entre octubre y enero), ubicados en todo tipo de árboles y arbustos y en construcciones humanas, entre 0,4 y 8 m de altura, (X= 2,8). Ponen 2 huevos.
Gelain (2014d). Villa del Salvador, dpto. Angaco, San Juan. Nido en Mora el 05-07-2014, un pichón muerto en el nido y un huevo en el suelo.
Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos "Pablo Girard", tres nidos con 2 huevos cada uno.
Segura et al (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos "Ronald Runnacles", 3 nidos.

Huevos
Pone 2, raramente 3 huevos. Ovoidales o elípticos. Blancos.

Medidas
Salvador y Salvador (en prep.): 21,8 a 25,9 x 16,3 a 18,9 X= 23,6 x 17,6 (N= 82)
Hartert y Venturi (1909): 21 a 26 x 16,5 a 18,5
Gibson (1920): 24 x 17
Serié y Smyth (1923): 23 a 26,5 x 18 a 19
Smyth (1927): 22 a 26 x 16 a 20

Castellanos (1931): 22 x 17
Contino (1980): 22 a 23 x 17 a 18
Alabarce y Antelo (1998): 22,3 x 18,0
Di Giacomo (2005h): 20,8 a 25,5 x 15,8 a 17,9 X= 23,6 x 17,2 (N= 34)
De la Peña (2013c): 21,6 a 26,6 x 16,6 a 19,0 X= 23,0 x 17,8 (N= 30)

Pesos
Salvador y Salvador (en prep.): 3,2 a 4,8 X= 3,9 (N= 68)
Di Giacomo (2005h): 2,7 a 4,2 X= 3,6 (N= 34)
De la Peña (2013c): 3,3 a 4,7 X= 3,8 (N= 21)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,200 a 0,249 X= 0,222 (N= 6)

PICHONES
Descripción
De la Peña (2013c). Nacen con los ojos cerrados. Piel oscura. Pico claro con banda subapical negra y punta blanca. Cavidad bucal rosada. Abundante plumón crema. Patas grises.
3 días. Ojos cerrados. Mandíbula gris. Maxilar claro. Anillo negro casi en la punta. Piel morada, ventralmente es amarillenta. Plumón crema.
6 días. Abre los ojos. Aparecen las láminas en alas y cola. Ventralmente plumas claras.
8 días. Cañones alares grises. Láminas de las plumas secundarias orilladas de ocráceo. Láminas de las plumas primarias oscuras. Cubiertas alares orilladas de blanquecino. Ventralmente blanquecina. Cubiertas menores marrones. Vainas y láminas de las plumas externas de la cola blancas.
Se nota más la punta del pico blanquecina. En la cola cañones chicos, los externos blancos. Plumón cremoso.
9 días. La base de la cola gris y la mitad terminal de las plumas externas, blanco.
11 días. Plumas externas de la cola blancas. Alas: primarias oscuras con blanco.
Si se lo molesta vuela.

Días de vida	Medidas							
	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Tarsometatarso	Tibiotarso	Pico
	Vaina o cañón	Lámina	Vaina o cañón	Lámina				
1						1,0	1,2	0,5
6	2		1,8		1	1,6	2,2	0,8
8	2,4	1,0-1,3	1,8	0,7	1,8	1,7	2,6	1

Generalidades
Di Giacomo (2005h). El período de incubación es de 12 a 13 días. Los pichones permanecen en el nido de 13 a 14 días.
De la Peña (2013c). Demora en construir el nido de 4 a 6 días, pero puede ser variable. Pone los huevos en días alternos. El período de incubación es de 12 días. Los pichones nacen en 24 horas y permanecen en el nido de 12 a 13 días.

Más información:
De la Peña (2013c)

Depredadores
De adultos: *Circus cinereus* (Bó et al. 2000c), *Accipiters striatus* (Seipke y Cabanne 2008), Salvador y Salvador en (De la Peña y Salvador 2010), *Parabuteo unicinctus* Salvador en (De la Peña y Salvador 2010), (Salvador 2012), *Tyto alba* (Massoia 1988k), (Morici 1990a, 2009), (García Esponda et al. 1998), *Megascops choliba* De la Peña en (De la Peña y Salvador 2010), *Glaucidiumbrasilianum* (Pereyra, C. B. de 1927), (Carrera et al. 2008), *Falco sparverius* (Sarasola et al. 2003), *Falcofemoralis* (Bó 1999), Salvador y Salvador en (De la Peña y Salvador 2010), (Salvador 2012), *Falcoperegrinus* Salvador y Salvador en (De la Peña y Salvador 2010)



Esperanza. Santa Fe. 12-12-2004. Nidos superpuestos



Esperanza. Santa Fe. 14-11-2007



Esperanza. Santa Fe. 17-01-2003



Esperanza. Santa Fe. 17-12-2007



Esperanza. Santa Fe. 15-01-1999



Esperanza. Santa Fe. 30-09-2007



Jesús María. Córdoba. 05-05-2007



Villa Elisa. Entre Ríos. 11-12-1982



Esperanza.Santa Fe.15-01-1999
Nido en poste de alambrado



Esperanza.Santa Fe.11-04-2008

Otros

Urcola (2011). Un ejemplar con Albinismo.
Pereyra (1937c)**.** Un ejemplar con Leucismo total.
Pereyra (1937b)**.** Un ejemplar Albino completo.
Dinelli (1941);Antoniazzi et al. (2011); Salvador en Salvador y Bodrati (2013a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*
Contreras (1980o). Anfitrión de *Molothrus bonariensis.*

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño chico. Una línea blanca y otra negra se notan cuando las alas están plegadas. Manchitas negro-azuladas en las cubiertas alares. Plumas externas de la cola blanca, visibles en vuelo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Columbina picui picui (Temminck, 1813) desde el norte del país hasta Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies. Su área de distribución se extiende por el centro de Sud América al este de los Andes, hasta la Patagonia y al oeste de la cordillera al centro de Chile. Comprende: Brasil con poblaciones separadas en el este y el oeste, Bolivia, Paraguay, Uruguay, centro de Chiley Argentina. En invierno migra al norte alcanzando Perú.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Columbina picui picui (Temminck, 1813)

Buenos Aires

Citas: Aravena (1927); Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Camperi (1992c); Castro y Cicchino (1992); Codesido et al. (2011); Dabbene (1917); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Gibson (1920); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis (1975b, 1993); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Leveau y Lleveau (2005, 2011b); Lucero et al. (2011); Marelli (1933); Mérida y Bodtati (2006); Morici (2012b, 2014); Montaldo y Claver (1986); Narosky y Di Giacomo (1993); Pereyra (1923b, 1932c, 1933b, 1938b); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pugnali y Chamorro (2008); Salvador y Di Giacomo (2014); Soave et al. (1999); White (1882); Zapata (1998); Zuberbhüler (1971)

Observaciones: De la Peña (Claromecó, pdo. Tres Arroyos, 08-02-1976)

Catamarca

Citas: Alabarce et al. (1990); Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009)

Observaciones: De la Peña (El Alto, dpto. El Alto, 29-01-1977)

Chaco

Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004)

Chubut

Citas: Camperi (1998); Harris (2008);Kovacs et al. (2005); Nores y Yzurieta (1981); Sainz-Trápaga (2014)

Observaciones: De la Peña (Trelew, dpto. Rawson, 31-11-2000)

Córdoba

Citas: Brandolín et al. (2007); Castellanos (1931); De la Peña (2013c); Haro y Gutierrez (1992); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Partridge (1953c); Salvador (1983a); Salvador y Bodrati (2013a); Sferco y Nores (2003); Straneck (1990b); Yzurieta (1995)



Observaciones: De la Peña (Miramar, dpto. San Justo, 28-02-1976)

Corrientes

Citas: Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Marelli (1918); Ordano et al. (2008); Wilson (1977)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Baliño y Biole (1984); Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b, 2013c); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2002); Muzzachiodi et al. (2003); Peltzer (1998); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Zapata (1975, 1977)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c);Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995); Wetmore (1926b)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009);Fiora (1933)

Observaciones: De la Peña (San Salvador de Jujuy, dpto. Capital, 01-02-1977)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Bruno et al. (2007); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Pereyra (1937b); Siegenthaler (1984, 2004); Tejerina et al. (2006); Wetmore (1926)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Capurro y Bucher (1982, 1986); Giacomelli (1923); Hayward (1967); Koslowsky (1895b)

Observaciones: De la Peña (Patquía, dpto. Independencia**,** 16-01-1982)

Mendoza
Citas: Blendinger (1999); Blendinger y Ojeda (2001); Contreras (1979g); Contreras y Fernández (1980); Darrieu (2014); Gómez (2006); Lucero (2013f); Marone (1992); Mezquida y Marone (2001); Olivera et al. (2009); Reed (1921); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (1995d, 2005); Steullet y Deautier (1939); Wetmore (1926)

Observaciones: De la Peña (Tupungato, dpto. Tupungato, 12-01-1982)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Camperi y Darrieu 2000 (2001b); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Capmourteres et al. (2015); Chebez et al. (1993); Gorgoglione (2005); Nores e Yzurieta (1982b); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005)

Observaciones: De la Peña (Picún Leufú, dpto. Picún Leufú, 20-11-1998)

Río Negro
Citas: Camperi y Darrieu (2005); Contreras et al. (1980b); Christie et al. (2004); Gelain (2001); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Grigera y Rubulis (1985); Kovacs et al. (2005); Llanos et al. (2011); Navas y Bó (1990); Paz Barreto (1997b); Pérez y Petracci (1998); Piacentini et al. (2003)

Observaciones: De la Peña (General Roca, dpto. General Roca, 28-11-1998)

Salta
Citas: Alabarce y Lucero (1977); Babarskas et al. (1995); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Echevarría et al. (2014); Moschione et al. (2013); Ordano et al. (1999); Rodríguez (2012b)
Observaciones: De la Peña (Salta, dpto. La Capital, 30-01-1977)

San Juan
Citas: Acosta y Murúa (2001); Camperi y Darrieu (2004); Gelain (2008a, 2014a); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i); Moschione y Banchs (1992); Ortiz y Murúa (1994)

Observaciones: De la Peña (San Agustín del Valle Fertil, dpto. Valle Fertil, 16-01-1982)

San Luis
Citas: Casares (1944b); Masramón (1977, 1983); Nellar Romanella (1993); Partridge (1953c)

Observaciones: De la Peña (Mercedes, dpto. Gral. Pedernera, 13-10-2004)

Santa Cruz
Citas: Chebez et al. (1998)

Santa Fe
Citas: Antoniazzi et al. (2011); Beltzer (1986c); Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009); Rossetti y Giraudo (2003); Wilson (1926)

Santiago del Estero
Citas: Codesido y Bilenca (2000); López de Casenave et al. (1998); Nores et al. (1991)

Observaciones: De la Peña (Malbrán, dpto. Aguirre, 29-01-1977)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996, 1998, 2000); Antelo y Brandán Fernández (2013); Antelo y Brandán (2000, 2006); Antelo (1999);Antelo et al. (2013);Brandán (2005); Brandán et al. (2006); Brandán y Navarro (2009); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch y Aráoz (2007); Chani et al. (2000); Echevarría y Chani (1999, 2000, 2006); Echevarría (2001); Echevarría et al. (1998, 2011b); Handford (1983); Hartert y Venturi (1909); Juri y Chani (2005); Juri (2007); Lucero (1983); Lucero et al. (2002, 2005); Marigliano et al. (2005b); Ortiz et al. (2011b); Navarro et al. (2000); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz y Aráoz (2014); Presti y Echevarría (2009); Salvador y Bodrati (2013a); Vides Almonacid (1993)

Observaciones: De la Peña (San Miguel de Tucumán, dpto. Capital, 30-01-1977)

PALOMITA AZULADA*Claravis pretiosa* (Ferrari-Pérez, 1886)

Otros nombres: Palomita azul. Palomita azul menor. Palomita azulada menor. Palomita elegante. Palomita plomiza. Picuhí. Pihení. Pihuí. Tórtola azul.

DESCRIPCIÓN
Largo: 18-23 cm.
Peso: Oniki y Willis (1999): N= 48 (M) X: 71 g (Rango: 58 a 103); N= 52 (H) X: 65,6 g (Rango: 41 a 93).
Coloración. Pico amarillo. Patas rojizas. Iris rojo amarillento.
Macho. Dorso gris azulado. Garganta blanquecina. Parte ventral gris pálida.
Primarias pardas oscuras. Cubiertas alares grises plomizas con puntos negros.

Plumas centrales de la cola grises plomizas, externas negras.
Hembra. Dorso y pecho pardos. Garganta y vientre blanquecinos.
Alas pardas con grandes puntos castaños.
Cola con las plumas centrales castañas, externas negras.



COMPORTAMIENTO
Anda solitaria, en pareja o formando pequeños grupos

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto es una repetición de una suave y corta nota:
Uup...uup...uup...uup...

HÁBITAT
Bosques y selvas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Baptista et al. (1997). Kala et al. (2011)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. El macho gris plomizo con puntos negros en las alas. La hembra parda con puntos castaños en las alas y cola castaña y negra.
Diferenciarla de la Palomita morada y la hembra de la hembra de la Palomita colorada.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Claravis pretiosa (Ferrari-Pérez, 1886) en Jujuy, Salta, Tucumán, San Juan, Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Desde Méjico hasta Argentina. Comprende: Méjico, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Chaco
Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Bodrati y Klavins (2004b)

Corrientes
Citas: Giraudo (1996)

Formosa
Citas: Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Nores (1992)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Moschione y Segovia (2005)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Navas y Bo (1988a); Straneck (1990h)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

Observaciones: De la Peña (Parque El Rey, dpto. Anta, 28-11-1978)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011); Lucero y Chebez (2011); Lucero (2013i)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Lucero (1983)

PALOMITA MORADA *Claravis geoffroyi* (Temminck, 1811)

Otros nombres: Paloma morada. Paloma plomiza.Paloma de Geoffroy. Palomita. Palomita ala barrada. Palomita azulada. Palomita gris azulada. Palomita plomiza. Pararú. Tórtola morada.

DESCRIPCIÓN
Largo: 19-23 cm.
Peso: Willis y Oniki (2002): N= 1 (M)85 g.
Coloración. Pico negruzco. Patas rojas. Iris pardo oscuro.
Macho. Azulado grisáceo. Frente blanquecina. Abdomen y subcaudales blancos. Banda azul en las cobijas menores. Banda castaña rojiza sobre las cobijas medianas y las mayores. Estas bandas están orilladas de negro azulado.
Alas pardas. Las dos plumas centrales de la cola son grises azuladas, las restantes blancas con la base gris.
Hembra. Pardo rojiza, más clara en la frente, garganta y abdomen. Banda azul en las cobijas medianas y mayores. Remeras pardas con estrecho margen rojizo. Plumas centrales de la cola pardas rojizas, las externas grisáceas en la base, negras en el medio y rojizas en la punta.

HÁBITAT
Bosques y selvas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Baptista et al. (1997)



IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. Macho azulado con bandas rojizas en las alas y las plumas externas de la cola blancas. La hembra parda rojiza, con igual modelo de alas que el macho pero con las plumas externas de la cola con punta rojiza.
Se diferencia de la Palomita azulada por tener barras en las cubiertas alares (en lugar de puntos) y distinta coloración de cola.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Claravis geoffroyi (Temminck, 1811) en Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Endémica de la Selva Atlántica en el este Paraguay, sur este de Brasil y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Misiones
Citas: Areta et al. (2009); Bertoni (1913); Chebez (1996a); Chebez y Casañas (2000); Navas y Bó (1986c); Tarak y Christie en Olrog (1979)

PALOMITA MOTEADA *Metriopelia ceciliae* (Lesson, 1845)

Otros nombres: Palomita boliviana. Tortolita moteada.

DESCRIPCIÓN
Largo: 16-17 cm.
Coloración. Pico negro. Patas rosadas. Iris violáceo.
Piel desnuda alrededor de los ojos amarilla- naranja.
Región dorsal parda grisácea con la punta de las plumas del dorso y cubiertas alares bordeadas de blanco ocráceo. Garganta blanquecina. Corona, cuello y superior del pecho vinosos. Resto de la parte ventral ocráceo.
Remeras pardas oscuras. Las secundarias con ápice blanco ocráceo. Plumas centrales de la cola pardas con tono castaño, las externas casi enteramente negras con punta blanca castaña y las más exteriores con la lámina externa blanca.
La **hembra** tiene el pecho grisáceo.

HÁBITAT
Estepas pedregosas arbustivas entre los 2500 y los 3500 m de altura.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Baptista et al. (1997). Goodall, et al. (1946)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. Alas oscuras jaspeadas de blanquecino, al igual que el dorso. Plumas externas de la cola negras con puntas blancas.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Metriopelia ceciliae zimmeri J. L. Peters, 1937 entre los 2500 y los 3500 m de altura en Jujuy y Salta.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Andes desde el extremo norte de Perú, Bolivia, Chile y Argentina entre los 2000 y 4500 metros.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Metriopelia ceciliae zimmeri J. L. Peters, 1937

Jujuy
Citas: Abadie (1991); Areta y Monteleone (2011); Blendinger (1998); Bó (1961); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Mazar Barnett et al. (1998c); Moschione et al. (2011); Narosky (1988); Veiga et al. (2014)

Salta
Citas: Bó (1961); Moschione et al. (2013); Pearman (2001); Veiga et al. (2014)

PALOMITA DE OJOS DESNUDOS *Metriopelia morenoi* (Sharpe, 1902)

Otros nombres: Palomita de Moreno. Palomita ojos desnudos. Tortolita.

DESCRIPCIÓN
Largo: 17 cm.
Peso: Camperi y Darrieu (2004): N= 2 (M) 55,3 y 60,7 g
Coloración. Pico negro. Patas amarillentas. Iris blanquecino amarillento.
Piel desnuda alrededor de los ojos amarilla- naranja.
Enteramente parda.
Alas pardas oscuras. Plumas centrales de la cola pardas; los dos pares siguientes pardos en la base y negros hacia el extremo; las más externas negras con las puntas blancas.



COMPORTAMIENTO

Alimentación
Zotta (1932). Piedritas. Semillas.
Olrog (1956). Semillas.

HÁBITAT
Estepas pedregosas arbustivas entre los 2000 y los 3200 m de altura.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Jujuy.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N										

Casquete simple y poco elaborado, hecho de gramíneas.

Hartert y Venturi (1909). Nidifica en paredes arcillosas de las quebradas. (G. A. Baer)
Salvador y Salvador, en De la Peña (2010b). Las Cuevas, dpto. Humahuaca, Jujuy, 21-02-1995, un nido se hallaba en una barranca de tierra, sobre un lecho seco, en un hueco a 1,9 m de altura y de 15 cm de boca y a 30 cm de profundidad. Es un casquete simple y poco elaborado, hecho de gramíneas y de 11 cm de diámetro. Contenía un pichón de unos 5-6 días de nacido.
Salvador (2015). Las Cuevas, dpto. Humahuaca, Jujuy, 03-03-1983, dos nidos en barranca de tierra, sin postura.



IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. Color general pardo con las alas oscuras. Cola oscura con punta blanca. Amarillo naranja alrededor de los ojos.
Diferenciarla de la Palomita dorada.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Metriopelia morenoi(Sharpe, 1902) entre los 2500 y los 3000 m de altura en Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja, San Juan y noroeste de Mendoza.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Endémica del noroeste de Argentina en ambiente árido montañoso.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009); Hellmayr y Conover (1942); Nores (1995)

Observaciones: De la Peña (El Alamito, dpto. Andalgalá, 17-12-1999)

Jujuy
Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Chebez et al. (1998); Zotta (1932)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Giacomelli (1907); Koslowsky (1895b); Salvador (2015); Nores (1995)

Mendoza
Citas: Lucero (2012b); Martínez et al. (2009)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013); Nores (1995)

Observaciones: De la Peña (Valle Encantado, dpto. Chicoana, 05-12-1977)

San Juan
Citas: Camperi y Darrieu (2004); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Haene (1996a); Lucero (2013i)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Areta y Monteleone (2011); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007); Capllonch et al. (2011b); Handford (1983); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Nores (1995)

PALOMITA CORDILLERANA *Metriopelia melanoptera* (Molina, 1782)

Otros nombres: Cuyaca. Paloma serrana. Palomita alinegra. Palomita de alas negras. Palomita del cerro. Palomita de la sierra. Palomita serrana. Tórtola cordillerana. Tortolita alinegra.

DESCRIPCIÓN
Largo: 21-23 cm
Peso: Fiora (1933): N= 2 X= 100 g; Navas y Bó (2001): N= 52 (M) X= 100,7 g (Rango 89,1 a 114,1); N= 4 (H) X= 89,8 g (Rango 86,0 a 96,1)
Coloración. Pico negro. Patas pardas. Iris blanco plateado.
Piel desnuda alrededor de los ojos amarilla- naranja.
Color general pardo grisáceo, más claro en el abdomen.
Remeras pardas oscuras. Cobijas alares menores pardas grisáceas con fino margen blanquecino. Borde anterior de las alas blanco. Subcaudales negras. Cola con las plumas centrales pardas; externas negras.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Zotta (1932). Semillas.
Reynolds en Humphrey et al. (1970). Semillas.


HÁBITAT
Estepas y quebradas hasta los 3000 m de altura.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Tucumán, Río Negro, Neuquén.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N									N	N

Tiene forma de casquete bien elaborado, construido con tallos e internamente unas pocas cerdas y plumas.

Peters (1923). Huanu-Luan, 25 de Mayo, Río Negro, 14-11-1920, nido con un huevo.
Salvador (1992). El Infiernillo, dpto. Tafí del Valle, Tucumán, el 05-12-1987 un nido a 7 m del suelo en un arbusto, en una quebrada húmeda. El nido tiene forma de casquete bien elaborado, construido con tallos e internamente unas pocas cerdas y plumas. Mide 11 x 14 cm de diámetro externo, 7 cm en el interno, 5,5 cm de alto y 2,5 cm de profundidad. Contenía 2 huevos.
Salvador (1992). M. Nores y D. Yzurieta (com. pers.). En el Parque Nacional Laguna Blanca, dpto. Zapala, Neuquén, localizaron el 18-01-1982 un nido con 2 huevos y el 03-02-1982 otro con 2 pichones.



Huevos
Pone 2 huevos. Blancos.

Medidas
Salvador (1992): 29,9 x 21,1 y 32,0 x 20,8

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. Alas oscuras con mancha blanca en la curvatura anterior, visible en reposo y en vuelo. Cola oscura.
La mancha blanca en las alas la diferencia de la Palomita dorada y de la Palomita ojo desnudo.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Metriopelia melanoptera melanoptera (Molina, 1782) por el oeste del país desde Jujuy a Tierra del Fuego.
Observada además en La Pampa y en las proximidades de Comodoro Rivadavia.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Andes de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile hasta Tierra del Fuego.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Metriopelia melanoptera melanoptera (Molina, 1782)

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009); Nores (1995)

Chubut
Citas: Camperi (1998); Kovacs et al. (2005); Petracci et al. (2004)

Observaciones: De la Peña (Leleque, dpto. Cushamen, 01-02-1976)

Jujuy
Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Fiora (1933); Zotta (1932)

Observaciones: De la Peña (Chorrillos, dpto. Humahuaca, 23-02-1979)

La Pampa
Citas: Babarskas y Gil (1996); Chebez et al. (1998); Siegenthaler (2004)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Chebez (2005); Giacomelli (1907, 1923); Koslowsky (1895b)

Mendoza
Citas: Barros (1930);Calí et al. (2008); Darrieu (2014); Ferrer et al. (2011); Navas y Bó (2001); Olivera et al. (2009); Pereyra Lobos (2002); Pereyra (1942a);Sanzín (1918); Sosa (2005); Steullet y Deautier (1939); Roig (1965);Wetmore (1926b); Wolffhuegel (1929)

Observaciones: De la Peña (Llancanelo, dpto. Malargüe, 15-10-2004)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Contreras (1977b); Christie et al. (2004); Funes en Fiori y Zalba (1999); Gorgoglione (2005); Hellmayr y Conover (1942); Matarasso (2007);Navas (1978); Pereyra (1945); Salvador (1992); Steullet y Deautier (1939); Veiga et al. (2005); Wetmore (1926b)

Observaciones: De la Peña (San Martín de los Andes, dpto. Lácar, 29-01-1976; Confluencia, dpto. Los Lagos, 20-11-1998)

Río Negro
Citas: Camperi (1998); Christie et al. (2004); Gelain (2001, 2010, 2012b); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Kovacs et al. (2005); Peters (1923b)

Observaciones: De la Peña (Las Bayas, dpto. Ñorquinco, 04-02-1976; Arroyo La Fragua, dpto. Pilcaniyeu, 21-11-1998)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013); Nores (1995)

Observaciones: De la Peña (Cachipampa, dpto. Cachi, 30-11-1978)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Haene (1996); Lucero (2013i); Navas y Bó (2001); Nores (1995)

Santa Cruz
Citas: Darrieu et al. (2008); Di Giacomo et al. (2005); Imberti (2003, 2005e);

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Humphrey et al. (1970)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Areta y Monteleone (2011); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch et al. (2011b); Handford (1983); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Nores (1995); Salvador (1992)

PALOMITA DORADA *Metriopelia aymara* (Prévost, 1840)

Otros nombres: Palomita aymará. Palomita de alas doradas. Palomita de la sierra de alas manchadas. Tórtola dorada.

DESCRIPCIÓN
Largo: 17-19 cm
Peso: Fiora (1933): N= 6 X= 61,0 g (Rango 60,0 a 61,0); Contino (1980): 63,0 g; Navas y Bó (2001): N= 3 (M) X= 63,5 g (Rango 59,3 a 69,5); N= 2 (H) X= 57,2 y 58,9 g
Coloración. Pico negro. Patas rosadas. Iris pardo.
Enteramente parda grisácea, con tinte rosado en la zona ventral. Garganta blanquecina. Centro del abdomen y subcaudales ocráceos.
Primarias pardas oscuras con base rojiza en la barba interna. Cubiertas alares con puntos dorados. Mancha canela en la parte ventral de las alas.
Cola con las plumas centrales grisáceas, laterales negras. Supracaudales muy largas, casi cubriendo la cola.



COMPORTAMIENTO

Alimentación
Zotta (1932). Piedritas. Semillas.
Olrog (1956). Semillas.

HÁBITAT
Estepas y quebradas entre los 3000 y los 4000 m de altura.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Jujuy.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N		

Nido poco elaborado, en el suelo entre los arbustos.

Contino (1980). Abra Pampa, dpto. Cochinoca, Jujuy, comienza a nidificar en octubre. Construye un nido rústico en el suelo entre los arbustos de tola. Pone 2 huevos.

Salvador (2015). Cuesta de Lipan, dpto. Tumbaya, Jujuy, 26-02-2007. Nido en el suelo oculto por una mata.Elaborado con tallitos, gramímeas y detritos vegetales. Mide 12 cm de diámetro y una profundidad de 2 cm.Contenía 2 pichones.



Huevos
Pone 2 huevos. Blancos.

Medidas
Contino (1980): 23 a 24 x 17,2 a 17, 4

Peso
Contino (1980): 4 (N=2)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. Parda grisácea con las alas y la cola oscuras. Puntos dorados en las cubiertas alares. Mancha canela en la parte ventral de las alas. Cola corta.
Se diferencia de la Palomita ojo desnudo por carecer de blanco y tener puntos dorados y manchas canelas en las alas.
Ver además Palomita cordillerana.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Metriopelia aymara(Prévost, 1840) entre los 3000 y los 4000 m de altura, desde Jujuy hasta Mendoza.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Andes de Perú, Bolivia, Chile y Argentina.
.
CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009); Nores (1995); Steullet y Deautier (1935-1946)

Observaciones: De la Peña (Minas Capillitas, dpto. Angalgalá, 08-02-1977)

Jujuy
Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Chebez et al. (1998); Fiora (1933); Salvador (2015); Zotta (1932)

Observaciones: De la Peña (Cieneguillas, dpto. Santa Catalina, 10-02-1983)

La Rioja
Citas: Koslowsky (1895b); Nores (1995)

Mendoza
Citas: Darrieu (2014); Ferrer et al. (2011); Holmberg (1898); Navas y Bó (2001); Olivera et al. (2009); Pereyra (1942);
Roig (1965)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013); Nores (1995); Vides Almonacid (1990)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Haene (1996); Lucero (2013i); Navas y Bó (2001)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch et al. (2011b); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Nores (1995)

ORDEN: CUCULIFORMES

CUCLILLOS, ANÓES Y PIRINCHO

FAMILIA: CUCULIDAE

Aves de alas cortas y cola larga. Tienen dos dedos de las patas dirigidos hacia adelante y dos hacia atrás.

Algunas especies son parásitas y en otras varias hembras ponen en un mismo nido.

Frecuentan praderas, arboledas, parques, montes y selvas.

Construyen el nido sostenido en matorrales, ramas en los árboles, arbustos, a veces cubiertos por enredaderas, construcciones. Una especie además en juncales, espadañales, recipientes, molinos.

Emplean en la construcción palitos, pajitas, líquenes, tallos de yuyos o de enredaderas. Internamente hojas, hilos, flores.

La postura es de 3 ó 4 huevos, pero según la especie pueden ser más.

Algunas especies son parásitas y en otras varias hembras ponen en un mismo nido.

Se alimentan de insectos, gusanos, pequeños reptiles, anfibios, pichones de aves.

Frecuentan praderas, arboledas, parques, áreas rurales, poblaciones, montes y selvas.

Subfamilia: Cuculinae

CUCLILLO CHICO *Coccycua cinerea* Vieillot, 1817

Otros nombres: Ceniciento. Cuclillo ceniciento. Cuclillo de ojos colorados. Cuclillo gris. Pavita de monte. Pequeña urraquita. Urraca chica.

DESCRIPCIÓN
Largo: 23-25 cm.
Peso: Contreras (1979f): 1 (M) 34,8 g;Contreras (1983a) N= 1 (M) X= 47,5 g; N= 1 (?) 54,0 g; Salvador (2014a): N= 2 (M) X= 52,9 g (Rango 51,6 a 54,3); N= 3 (H) X= 50,8 g (Rango 49,8 a 51,8)
Coloración. Pico negro. Patas grises. Anillo ocular rojo. Iris rojo.
Cabeza gris plomiza. Dorso gris pardusco. Garganta y pecho grises parduscos claros. Abdomen blanquecino ocráceo. Vientre y subcaudales amarillentos.
Alas pardas. Cola gris pardusca oscura con punta blanca.

COMPORTAMIENTO
Anda solitario. Se desplaza por la parte media de los árboles.

Alimentación
Aravena (1928). Coleópteros. Lepidópteros (larvas) (*Colias*). Piedritas. Vegetales.
Zotta (1940). Oruga (Mariposa, *Hylesia nigricans*).
De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). Arácnidos. Orugas.

Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Curculionidae). Lepidoptera (orugas velludas y verdes). Mantodea (Mantidae). Othoptera (Acridiidae, Tettigonidae).
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Voces
Straneck (*in litt*.). La voz es un áspero: cherro.cherro.cherro.cherro. lo repite de 3 a 6 veces en forma esporádica.

HÁBITAT
Sabanas, montes.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Tucumán, Formosa, San Luis, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N							N	N	N

En arbustos o árboles, a veces cubiertos por enredaderas.
Expuesto o semioculto. Poco elaborado. Plataforma de palitos con y sin espinas. Internamente pajitas, nervaduras y/u hojas.

Girard (IML). Leales, dpto. Leales, Tucumán, 05-11-1925, nido con 3 huevos. Simoca, dpto. Simoca, Tucumán, 24-02-1932, nido con 3 huevos.
Salvador (*in litt*.). Bell Ville, dpto. Unión, Córdoba, 01-12-1983, un nido en un *Geoffroea decorticans*, a 1,8 m de altura, con 2 pichones y un huevo infértil. Morrison, dpto. Unión, Córdoba, 17-12-1988, un nido en una *Acacia caven*, a 1,6 m de altura, con 3 huevos incubados. Villa Giardino, dpto. Punilla, Córdoba, 22-11-2005, un nido en un *Schinus* sp. a 1,4 m de altura, con 3 huevos frescos.
Withington (1888). Lomas de Zamora, pdo. Lomas de Zamora, Buenos Aires, comienzan a criar a fines de octubre, hacen el nido en arbustos a unos 2,5 m del suelo, ponen huevos blancos.
Goodall (1923). Estancia La Ethel, Buena Esperanza, dpto. Gobernador Dupuy, San Luis, diciembre de 1912, 3 nidos en chañares, con 2 o 3 huevos.
Pereyra (1937b). Conhelo, dpto. Conhelo, La Pampa, a finales de diciembre se encuentran nidos, generalmente con 3 huevos.
Babarskas et al. (2003). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, nido en construcción a principios de noviembre, el 9 del mismo mes, un nido con un huevo y a fines del mes, otro con pichones.



Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, anida entre noviembre y diciembre. Se localizaron 5 nidos, ubicados entre 1,70 y 3,50 m del suelo.
Salvador (2011). Dpto. Gral. San Martín, Córdoba, se localizaron 16 nidos, a una altura que varió de 1,40 a 3,10 m del suelo. Pone de noviembre a febrero, 2 ó 3 huevos por nido.
De la Peña (2013c). Se hallaron en total 19 nidos, 15 nidos en Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, entre el 06-12-1979 a 29-10-2004, 2 en Grutly, dpto. Las Colonias, Santa Fe, el 16-12-1972 y 25-03-1972 y 2 el 01-11-1972 en Aguará, dpto. San Cristóbal, Santa Fe. Los nidos tenían de 1 a 4 huevos y hasta 3 pichones. Posturas desde octubre a marzo. Nido más bajo a 1,50 m, más alto a 5,00 m. Los nidos miden: diámetro total: de 10 a 15 cm, diámetro interno: 8 cm, alto: de 3 a 8,5 cm y profundidad: de 0,5 a 3,5 cm.



Huevos
Pone 3 ó 4 huevos. Ovoidales o elípticos. De color blanco.

Medidas
Goodall (1923): 25,5 x 20,5
Pereyra (1937b): 29 x 22
Salvador (*in litt*.): 25,2 a 27,4 x 19,8 a 21,2 X= 26,3 x 20,3 (N= 4)
Hartert y Venturi (1909): 23 a 25 x 17,5 a 20
Di Giacomo (2005h): 23,6 a 28,2 x 18,5 a 19,6 X= 24,7 x 19,0 (N= 8)
Salvador (2011): 25,1 a 27,7 x 18,6 a 21,6 X= 26,2 x 20,7 (N= 35)
De la Peña (2013c): 24,4 a 26,4 x 18,3 a 21,5 X= 25,4 x 19,4 (N= 10)

Pesos
Di Giacomo (2005h): 4,0 a 5,4 X= 4,7 (N= 8)
Salvador (2011): 5,8 a 7,3 X= 6,7 (N= 24)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,389 a 0,531 X= 0,452 (N= 7)

PICHONES
Descripción
Salvador (2011). Nacen con los ojos entreabiertos. Piel negruzca con tinte verdoso, cubiertos con plumón, tipo cerda, de color ocráceo acanelado con puntas cremas. Pico gris, interior de la boca rojo pálido con puntos blancos en el paladar y en la base de la lengua. Patas grises.
De la Peña (2013c). Nacen con los ojos semiabiertos. Piel oscura, verdosa. Plumón largo, gris claro. Comisura y pico color natural. Paladar rosado con seis puntos blancos, cuatro grandes y dos chicos y dos en la lengua. El resto de la cavidad bucal y la lengua rosados.
3 días. Ojos abiertos, marrones. Patas oscuras. Gritan. Pico gris oscuro. Comisura más clara. Escaso plumón gris claro. Piel oscura. Pliegues verdosos. Vainas de primarias grises. Apenas se notan las láminas.
6 días. Aparecen las láminas de las plumas ventrales, blancas. Flancos ocráceos-canelas. Las láminas de las plumas de la cabeza y dorso, cubiertas alares y cola, pardas.
7 días. Mancha negra en la punta de la lengua y una mancha redonda y otra transversal en la parte superior y posterior.
Tiran la cabeza hacia atrás hasta tocar el dorso.
8 días. Emplumado. Pico negro. Dorsalmente gris pardusco. Garganta y pecho, gris claro. Abdomen blanquecino ocráceo. Alas pardas. Cola gris pardusca.
Si se los molesta se van del nido.
9 días. Plumaje de adulto (sin blanco en la cola).

MEDIDAS Y PESOS

Días de vida	Medidas									
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola		Peso
				Vaina o cañón	Lámina	Vaina o cañón	Lámina	Total	Lámina	
1	0,5	0,8	1,2							3,6
2	0,6	1,0	1,8							7,5
3	0,6	1,3	2,0	0,2						11,7
4	0,7	1,5	2,1	0,4						13,0
5	0,8	1,7	2,3	0,7		0,5		0,4		14,0
6	1,0	1,7	2,4	0,8				0,7		16,0
8	1,0	1,7	2,4	1,0	0,2	0,8	0,2	0,8	0,2	18,7

Peso al nacer
Salvador (2011): 4,9 a 5,8 X= 5,5 (N= 6)

Generalidades
Salvador (2011). El período de incubación es de 13 a 14 días y la permanencia de los pichones en el nido de 10 a 11 días.
De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido de 6 a 8 días. Pone los huevos en días corridos. El período de incubación es de 12 a 13 días y la permanencia de los pichones en el nido de 13 a 15 días.
De la Peña (2013c). El nido muy sucio por las materias fecales, a los 9 días de edad.
Los padres les traen orugas, insectos y arañas.

Más información:
De la Peña (2013c)


Esperanza. Santa Fe. 04-11-1999


Esperanza. Santa Fe. 04-11-1999


Esperanza. Santa Fe. 11-02-2008


Esperanza. Santa Fe. 12-11-2011

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pico negro. Ojos rojos. Coloración general gris, más clara en la zona ventral. Flancos y abdomen ocráceos.
Diferenciarlo del Cuclillo de ojos colorados.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Coccycua cinerea Vieillot, 1817 desde el norte del país hasta Mendoza, San Luis, La Pampa, Neuquén y Río Negro.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en el sur Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina. En el invierno austral migra (migrador austral) a Bolivia, oeste de Brasil y sur de Perú.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Aravena (1928); Bodrati et al. (2006b); Camperi (1992c); Contreras (1983a); Dabbene (1918b); Darrieu y Camperi (2001a); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis (1975b); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Marelli (1924); Mérida y Bodtati (2006); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1927d, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Roda y Danti (2015); Soave et al. (1999); White (1882)

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009)

Chaco
Citas: Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004)

Córdoba
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Castellanos (1932); Heredia (2006); Nores et al. (1983); Nores (1996); Partridge (1953c); Salvador (1983a); Sferco y Nores (2003); Straneck (1990c); Yzurieta (1995)
Observaciones: De la Peña (Morteros, dpto. San Justo, 02-11-1990)

Corrientes
Citas: Contreras (1981b); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006)

Observaciones: De la Peña (Bonpland, dpto. Paso de los Libres, 11-12-2002)

Entre Ríos
Citas: Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b); Hartert y Venturi (1909); Marateo et al. (2009); Serié y Smyth (1923)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c);Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); López Lanús (1997)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Moschione y Segovia (2005)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bruno et al. (2007); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Pereyra (1937b); Siegenthaler (1984, 2004); Tejerina et al. (2006); Wetmore (1926b)

La Rioja
Citas: Capurro y Bucher (1986); Giacomelli (1923); Koslowsky (1895b)

Mendoza
Citas: Contreras (1983a); Darrieu (2014); López de Casenave y Marone (1996); Marone (1991, 1992a, 1992b)

Neuquén
Citas: Matarasso (2007)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Salvador y Narosky (1987)

Salta
Citas: Capurro y Bucher (1988); Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b)

San Luis
Citas: Masramón (1983); Nellar Romanella (1993)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Rodríguez Graves et al. (2009)

Santiago del Estero
Citas: Codesido y Bilenca (2000); Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Ortiz y Aráoz (2014)

TINGAZÚ *Piaya cayana* (Linnaeus, 1766)

Otros nombres: Alma de gato. Anó colorado. Anó del monte. Cachó. Gallo del monte. Gato de monte. Güirá-payé. Pirincho marrón. Urraca colorada.

DESCRIPCIÓN
Largo: 45 cm.
Peso: Fiora (1933): N= 4 X= 112 g (Rango 110 a 115); Contreras (1979f): N= 3 (H) X: 115,2 g (Rango: 92 a 134)
Coloración. Pico amarillo verdoso. Patas grises. Iris rojo.
Frente y corona pardas grisáceas. Nuca y parte dorsal castañas. Garganta y zona anterior del cuello castaños con suave tono rosado. Resto de la parte ventral gris plomizo.
Alas castañas.
Cola castaña con la punta de las plumas externas blanca. Ventralmente es negra con blanco en el ápice de las plumas.

COMPORTAMIENTO
Salta y se desplaza entre las ramas de los árboles, en la parte media y alta.

Alimentación
Bodrati (2006b). *Plinia trunciflora* (Fruto)
Bodrati y Haene (2008). *Allophylus edulis* (Fruto)
Repenning et al. (2009). **Insectos:** Coleoptera (Chrysomelidae). Hemiptera (Pentatomidae). Homoptera Cicadidae, Fulgoridae). Hymenoptera (Pergidae). Lepidoptera. Orthoptera (Acridiidae, Tettigonidae). **Arácnidos:** Araneidae.

Voces
Straneck (*in litt*.). La voz es una sucesión de cortos y silbados Juit.juit.juit.juit.juit.juit. Esporádicamente hace un fuerte y sonoro Juiit juee. También un Chrrrrrr de poco alcance.

HÁBITAT
Bosques y selvas hasta los 2000 m de altura.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Salta, Formosa, Misiones.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N										N	

Sostenido en árboles. Alto.
Expuesto. Elaborado. Plataforma con forma de semiesfera de ramitas finas y hojas en el interior.

Uranga (*in litt.*). San Ignacio, dpto. San Ignacio, Misiones, 05-11-2013, nido en una palmera con un huevo.
Di Giacomo y López Lanús (2000). Lipeo, dpto. Santa Victoria, Salta, 25-01-1991, nido a 7 m de altura, entre el follaje de una enredadera. Nido en construcción, forma de semiesfera de ramitas finas y hojas en el interior. La pareja construía.
Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, el 11-11-2004, nido en construcción en un Ombú (*Phytolacca dioica*) a 12 m del suelo.

Huevos
Pone 2 ó 3 huevos. Grisáceo claro recubierto de material carcáreo.



Más información:
Payne (1997). Fitzgerald et al. (2011)

Depredadores
De adultos: *Accipiter bicolor, Bubo virginianus* (Di Giacomo 2005h)

Otros
Bodrati en Salvador y Bodrati (2013a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Dorsal castaña. Cola muy larga, escalonada con lunares blancos en la parte ventral.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Piaya cayana macroura Gambell, 1849 en Misiones, Corrientes, Entre Ríos, este de Formosa y de Chaco, norte y este de Santa Fe, este de Córdoba y noreste de Buenos Aires, y *Piaya cayana mogenseni* J. L. Peters, 1926 en Tucumán, Santiago del Estero, norte de Córdoba, Catamarca, Salta y Jujuy.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Catorce subespecies. Gran variedad de ambientes en un extenso rango de distribución desde Méjico a Uruguay y Argentina. Comprende: Méjico, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Piaya cayana macroura Gambell, 1849

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (1997, 2006b); Carman (1980); Darrieu y Camperi (2001a); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Klimaitis (1987); Mérida y Bodtati (2006); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pugnali y Chamorro (2008)

Chaco
Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004); Salvador y Bodrati (2013a)
Observaciones: De la Peña (Antequera, dpto. San Fernando, 25-11-1972)

Córdoba
Citas: Michelutti en Nores (1996); Nores et al. (1983); Nores e Yzurieta (1980b); Yzurieta (1995)

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b); Esteban (1953); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Observaciones: De la Peña (Mburucuyá, dpto. Mburucuyá, 19-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Baliño y Biole (1984); Beltzer et al. (2006); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Raffo et al. (2008); Ronchi Virgolini et al. (2008); Straneck (1990c); Zapata (1975, 1977)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c, 1993b); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995)

Misiones
Citas: Bodrati (2006b); Bodrati et al. (2010b); Camperi y Darrieu 2000 (2001b); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Hartert y Venturi (1909); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014); Pereyra (1950, 1951); White (1882)

Observaciones: De la Peña (Cataratas del Iguazú, dpto. Iguazú, 06-02-1973)

Santa Fe
Citas: De la Peña et al. (2003); De la Peña (2011f)

Piaya cayana mogenseni J. L. Peters, 1926

Catamarca
Citas: Carma (2009)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Fiora (1933) Malizia et al. (2005); Moschione y Segovia (2005)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Camperi (1988, 1990); Coconier et al. (2007); Di Giacomo y López Lanús (2000); Fiora (1933); Moschione et al. (2013)

Observaciones: De la Peña (San Ramón de la Nueva Orán, dpto. Orán, 02-02-1977)

Santiago del Estero
Citas: Nores e Yzurieta (1982a); Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (1998); Echevarría et al. (2008ª); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Navarro y Marigliano (2006); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Aráoz (2014); Vides Almonacid (1993)

CUCLILLO CANELA *Coccyzus melacoryphus* Vieillot, 1817

Otros nombres: Col-col. Cuclillo común. Cuclillo de pico negro. Horco paloma. Pavita de monte. Tuyá-cué. Urraca chica.

DESCRIPCIÓN
Largo: 28 cm.
Peso: Di Giacomo (2005h): N= 1 42,3 g; Salvador (2014a): N= 4 (M) X= 51,0 g (Rango 48,5 a 52,8); N= 3 (H) X= 53,1 g (Rango 51,8 a 54,3); N= 2 (?) 53 y 54 g; Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 (?) 61 g
Coloración. Pico negro. Círculo ocular oliva-naranja. Patas grises. Iris pardo oscuro.
Cabeza gris plomiza. Banda auricular negra. Dorso gris pardusco. Ventral ocrácea.
Alas grises parduscas.
Cola con las plumas centrales grises parduscas, laterales negras con puntas blancas. Ventralmente es negra con grandes manchas blancas.

COMPORTAMIENTO
Se desplaza solitario en la parte media de los árboles.

Alimentación
Friedmann (1927).**Insectos:** Coleoptera. Lepidoptera (orugas).
Zotta (1934). **Insectos:** Langosta voladora (*Schistocerca paranensis*).
Pereyra (1937b). **Insectos:** Mariposas. Orugas vellosas. **Frutos**.
Moschione (1987). **Insectos:** Homóptero(Cercopidae*, Cephisus siccifolius*)(larva). Lepidóptero(Hemileucidae*, Hylesis nigricans*) (oruga).
Klimaitis (1993). **Insectos:** Oruga verdosa (Lepidóptero).
Ordano et al. (1999). **Insectos:** Ortópteros.
Bodrati y Haene (2008). *Allophylus edulis* (fruto)
Beltzer y Quiroga (2008). **Insectos:** Coleoptera (Carabidae, Curculionidae, Lampyridae, Coccinellidae, Elateridae,Staphylinidae). Hemiptera (Belostomatidae: *Belostoma micantulum*, *Belostomaelongatum*). (Pentotamidae: *Nezara viridula*). Lepidoptera (Hemileucidae: *Hylesia nigricans*).Odonata (Zigoptera). Orthoptera (Pauliniidae: *Marellia* sp*., Cornops aquaticum*). (Acridiidae: *Dichroplus compersus*). (Gryllidae: *Gryllusdomesticus*). **Arácnidos:** Araneae. **Semillas:** Leguminosae.
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Fruto:** *Morus alba.*
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Hemiptera (Pentatomidae). Lepidoptera (orugas, orugas velludas, polillas).Orthoptera (Acridiidae, Tettigonidae). Homoptera (Cicadidae).
De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). Oruga peluda negra.
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Voces
Straneck (*in litt*.). La voz es una sucesión de 6 a 8 notas: Cou.cou.cou.cou.cou.cou.cou. Otra voz es un áspero y rápido charcharchaochurchurr y también Cherrrrooouuuu.

HÁBITAT
Montes, bosques, sabanas, matorrales.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Tucumán, Formosa, Misiones, Chaco, La Pampa, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N

Sostenido en arbustos o en árboles, enredaderas, matorrales. A baja y mediana Altura.
Oculto, expuesto o semiexpuesto. Poco elaborado. Plataforma de palitos con y sin espinas o tallos de yuyos en la base. Internamente nervaduras de hojas, líquenes.



Girard (InstitutoMiguel Lillo). Simoca, dpto. Simoca, Tucumán, 09-02-1925, 2 nidos con 2 y 3 huevos; 31-01-1928, 2 nidos con 2 y 3 huevos.
Salvador, Narosky y Fraga (*in litt*.). Villa Ángela, dpto. Mayor Luis Jorge Fontana, Chaco, 15-12-1982, un nido en un *Schinus* sp., a 1,7 m de altura, con 2 huevos, Santa Sylvina, dpto. Fray Justo Santa María de Oro, Chaco, 17-12-1982, un nido en un *Prosopis* sp., a 1,2 m de altura, con 2 huevos.
Salvador (*in litt*.). Villa Rumipal, dpto. Calamuchita, Córdoba, 16-12-1989, un nido en un *Geoffroea decorticans*, a 1,4 m de altura, con 4 huevos incubados.

Embalse Río Tercero, dpto. Calamuchita, Córdoba, 07-02-1991, un nido en un *Geoffroea decorticans* a 1,7 m de altura, con 3 huevos incubados.
Barrow (1884). Entre Ríos, se hallaron nidos en noviembre y febrero, ponen 3 huevos.
Holland (1892). Estancia Espartillo, Buenos Aires, crían en noviembre, el nido es simple, ponen 3 huevos.
Goodall (1923). Estancia Los Alfalfares, Arias, dpto. Marcos Juárez, Córdoba, 3 nidos hallados en 1907, nidos simple que recuerda al de las palomas, con 2 y 3 huevos.
Dabbene (1926). Los Talas, pdo. Berisso, Buenos Aires, 12 de diciembre, nido con 2 pichones.
Friedmann (1927). Río Gastona, dpto. Simoca, Tucumán, 15-12-1923, nido con 4 huevos. Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, 16-01-1924, nido con 5 huevos.
Smyth (1928). Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, 16-01-1924, huevos.
Pereyra (1933b). Arroyo Correa, Delta, Buenos Aires, 18-12-1932, nido con 4 huevos.
Pereyra (1937b). Conhelo, dpto. Conhelo, La Pampa, a fines de diciembre se encuentran nidos con huevos y pichones, en caldenes, ponen 4 huevos.
Pereyra (1938b). Anida en los bosques ribereños, Buenos Aires.
Hudson (1974). El nido es una estructura frágil, pone 3 ó 4 huevos.
Babarskas et al. (2003). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, un nido en noviembre y otro con huevos en diciembre.
Di Giacomo (2005h), Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, anida entre octubre y enero. Se localizaron 15 nidos, desde 1,30 a 3,5 m del suelo.
Salvador (2011). Dpto. Gral. San Martín, Córdoba, se localizaron 19 nidos, a una altura que varió de 1,1 a 3,8 m del suelo. Pone de noviembre a febrero, 2 ó 4 huevos por nido.
Salvador y Bodrati (2011). San Pedro, dpto. San Pedro, Misiones, 03-11-2009, nido con 2 huevos propios y 3 de *Molothrus bonariensis.*
De la Peña (2013c). Se hallaron en total 28 nidos: entre el 11-12-1976 y 08-11-2012 en Esperanza 20 nidos, Humboldt, dpto. Las Colonias, Santa Fe, el 01-12-1976, nido con un huevo y un pichón, Villa Roda, dpto. La Capital, Santa Fe, 3 nidos: 26-11-1991, nido con 3 huevos, 29-01-1997 con 3 huevos y el 08-11-2012, 2 huevos, Colastiné, dpto. La Capital, Santa Fe, 09-02-1996, nido con 2 huevos, El Laurel, dpto. Garay, Santa Fe, 02-01-1991 nido con 3 huevos, Santa Fe, dpto. La Capital, el 27-01-1990, nido con un huevo, Grutly, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 05-01-1991 nido con 6 huevos. Medidas de nidos: diámetro total: de 11 a 15 cm, alto: de 4 a 8 cm y profundidad: de 0,5 a 1 cm.
Nido más bajo: 1,00 m, más alto: 4,00 m.
Segura et al (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 2 nidos.
Schaaf et al. (2015b). Estancia Santo Domingo, cercana a Río Ceballos, dpto. Colón, Córdoba, nidos el 14-01-2013 y 02-02-2013, con 2 huevos cada uno.

Huevos
Pone 3, a veces hasta 4 ó 6 huevos.
Elípticos, algunos ovoidales. De color verde.

Medidas
Salvador, Narosky y Fraga (*in litt*.): 29,2 a 32,8 x 22,2 a 24,9 X= 31,1 x 23,5 (N= 7)
Hartert y Venturi (1909): 27 a 31,5 x 21 a 24
Goodall (1923): 29,5 x 26,0
Smyth (1928): 29,5 a 31 x 22,5 a 25
Pereyra (1933b): 32,5 x 24
Pereyra (1937b): 30,5 x 24,5
Di Giacomo (2005h): 24,5 a 30,4 x 21,5 a 23,2 X= 28,6 x 22,2 (N= 13)
Salvador (2011): 28,1 a 32,8 x 21,4 a 24,9 X= 30,1 x 22,9 (N= 42)
De la Peña (2013c): 26,8 a 31,4 x 22 a 24,6 X= 29,8 x 23 (N= 18)



Pesos
Salvador, Narosky y Fraga (*in litt*.): 8,2 a 9,2 X= 8,6 (N= 4)
Di Giacomo (2005h): 6,6 a 8,4 X= 7,3 (N= 13)
Salvador (2011): 7,1 a11 X= 9,2 (N= 31)
De la Peña (2013c): 7,2 a 8,9 X= 8,1 (N= 10)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,467 a 0,661 X= 0,561 (N= 16)

PICHONES
Descripción
Salvador (2011). Nacen con los ojos entreabiertos. Piel negruzca, están cubiertos por un plumón, tipo cerda, de color blanco con base canela, en el dorso, alas, cabeza y flancos. Pico gris, comisuras cremas, interior de la boca rojo pálido con papilas blancas. Patas gris oscuras.
De la Peña (2013c). Nacen con los ojos semiabiertos. Pico y patas grises. Interior de la cavidad bucal rosado con tres puntos blancos en el paladar y uno en la lengua.
4 días. Ojos abiertos marrones.
Lados del pecho y garganta, con vainas rígidas, blanquecinas. Dorsalmente blanquecinas.
Vainas de las alas oscuras.
Las materias fecales son líquidas, oscuras.
5 días. Pico gris. Comisura clara. Patas plomizas. Piel gris oscura, más clara ventralmente.
Tres puntos blancos en el paladar, dos del lado interno de la fosa y dos grandes externos y dos medialunas grandes en la base. Uno en la parte superior de la base de la lengua. Esta con punta negra.
Ventralmente y flancos, plumas blanquecinas. Cola con las plumas externas blanquecinas. Cañones grisáceos y láminas grises en la parte dorsal. El plumón que queda es blanco.
Alas, cañones oscuros en la mitad basal y grises en el resto.

MEDIDAS Y PESOS

Días de vida	Medidas								
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola	Peso
				Vaina o cañón	Lámina	Vaina o cañón	Lámina		
1	0,6-0,9	1,2-1,3	1,6-2,1						5,5-12,0
2	0,6-0,9	1,3-1,4	2,0-2,3						9,0-15,0
3	0,7-1,0	1,5-1,6	2,2-2,5	0,7	0,2	0,4	0,2		14,7-19,7
4	0,8-1,0	1,6-1,7	2,4-2,6	0,8-2,0	0,3	0,6	0,2	1,5	16,0-19,4
5	0,9-1,0	1,7-1,9	2,6-2,7	1,0-2,5	0,5	0,8	0,3	1,8	19,6-22,0

Peso al nacer
Salvador (2011): 6,0 a 9,1 X= 7,4 (N= 7)

Generalidades
Salvador (2011a). El período de incubación es de 12 a 14 días y la permanencia de los pichones en el nido de 9 a 11 días.
De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido, 6-8 días. Pone los huevos en días corridos. Período de incubación, es de 14 días, pero en un nido demoró de 20-21 días, desconociéndose los motivos. Permanencia de los pichones en el nido, 13-15 días. Si los pichones son molestados, a los 8-9 días se desplazan por las ramas.

Más información:
De la Peña (2013c). Damon (2012). Schaaf et al. (2015b)

Depredadores
De adultos: *Glaucidium brasilianum* (Carrera et al. 2008)

Otros
Antoniazzi et al. (2011), Salvador (2011a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*


Esperanza. Santa Fe. 03-01-2005


Esperanza. Santa Fe. 20-02-2007


Esperanza. Santa Fe. 21-12-2004


Esperanza. Santa Fe. 11-12-1977

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pico y banda auricular negros. Ventral ocre amarillenta. Cola larga con lunares blancos.
Se parece al Cuclillo de pico amarillo pero carece de rojizo en las alas y ventralmente es ocráceo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Coccyzus melacoryphus Vieillot, 1817 desde el norte del país hasta Mendoza, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro y este de Chubut. Accidental en las Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Presenta un amplio rango de distribución que va desde el norte de Sud América hasta Uruguay y Argentina. Comprende: Trinidad y Tobago, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b Cueto y López de Casenave (2000); Dabbene (1918b); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis (1975b, 1993); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Lucero et al. (2011); Mérida y Bodtati (2006); Narosky y Di Giacomo (1993); Olrog (1979); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1933b); Pugnali y Chamorro (2008); Roesler (2001a); Salvador y Di Giacomo (2014); Soave et al. (1999); White (1882)

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009)

Chaco
Citas: Contreras et al. (1990b); Chatellenaz (2005a); Moschione y Bishels (2004)

Chubut
Citas: Kovacs et al. (2005); Navas (1994)

Córdoba
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Castellanos (1932); Dardanelli et al. (2006); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Salvador (1983a, 2011a); Salvador y Bodrati (2013a); Schaaf et al. (2015b); Sferco y Nores (2003); Straneck (1990d); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Morteros, dpto. San Justo, 11-12-1990)

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Ordano et al. (1999)

Observaciones: De la Peña (Bonpland, dpto. Paso de los libres, 11-12-2002)



Entre Ríos
Citas: Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Zapata (1975, 1977)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c);Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009) Chebez et al. (1998); Malizia et al. (2005); Moschione y Segovia (2005)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Bruno et al. (2007); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Pereyra (1937b); Siegenthaler (1984, 2004); Tejerina et al. (2006); Zotta (1937)

La Rioja
Citas: Capurro y Bucher (1986); Giacomelli (1923); Koslowsky (1895b)

Mendoza
Citas: Blendinger (2005); Ferrer et al. (2013b); Lucero (2013f); Sosa (2009b)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014); Salvador y Bodrati (2011)

Neuquén
Citas: Giai en Contreras (1977b); Matarasso (2007)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Nores (1986b)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007) ; Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b)

Observaciones: De la Peña (Tartagal, dpto. Gral. José de San Martín, 01-02-1977)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i); Nores y Salvador (1996)

San Luis
Citas: Casares (1944b); Masramón (1983); Nellar Romanella (1993)

Santa Fe
Citas: Beltzer y Quiroga (2008); De la Peña (1983e, 2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009); Wilson (1926)

Santiago del Estero
Citas: Codesido y Bilenca (2000); Esteban (1953); López de Casenave et al. (1998); Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Antelo et al. (2013); Brandán (2005); Brandán y Navarro (2009); Echevarría et al. (2007, 2011b); Fanjul (2010); Lucero (1983); Navarro et al. (2007, 2011); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz y Aráoz (2014); Vides Almonacid (1993)

Islas Malvinas.
Citas: Bennett (1937); Woods (2006)

CUCLILLO DE PICO AMARILLO *Coccyzus americanus* (Linnaeus, 1758)

Otros nombres: Ahogado. Cuclillo de alas rojizas. Cuclillo pico amarillo.Tuyá-pucá.

DESCRIPCIÓN
Largo: 28-30 cm.
Peso: Haverschmidt (1968): (M) de 37 a 47 g; N= 1 (H) 59 g.
Coloración. Mandíbula amarilla. Maxilar superior negro. Anillo ocular amarillo. Patas grises. Iris pardo.
Dorso gris pardusco. Ventral blanca grisácea con tono ocre en el abdomen.
Primarias y secundarias pardas grisáceas con canela en las barbas internas.
Las plumas centrales de la cola son pardas, las externas negras con puntas blancas. Ventralmente es negra con grandes lunares blancos.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Zotta (1934). Oruga. Lepidóptera (*Hylesia nigricans*).
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

HÁBITAT
Bosques, sabanas, montes.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pico amarillo y negro. Anillo ocular amarillo. Rojizo en las alas. Cola larga con grandes manchas blancas. Diferenciarlo del Cuclillo de ojos colorados, del Cuclillo ceniciento y del Cuclillo canela.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Coccyzus americanus (Linnaeus, 1758) migratorio de Norteamérica. Llega hasta Catamarca, La Rioja, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Accidental en las Islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en Canadá, estado Unidos, Méjico e Islas del Caribe. Durante el invierno boreal migra a Sud América hasta Uruguay y Argentina.



CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Darrieu y Camperi (2001a); Klimaitis (1975b); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Narosky y Di Giacomo (1993); Morici (2012b); Pereyra (1938b); Pugnali y Chamorro (2008)

Catamarca
Citas**:** Carma (2009)

Chaco
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004)

Córdoba
Citas: Miatello et al. (2003); Nores et al. (1983); Nores (1996); Yzurieta (1995)

Corrientes
Citas:Contreras (1981b); Giraudo et al. (2006)

Entre Rios
Citas: Fernández Guaraz (2013)

Formosa
Citas: Contreras (1987c);Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Laubmann (1930)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Moschione y Segovia (2005)

La Rioja
Citas: Giacomelli (1907, 1923)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b); Chebez (1996a)

Salta
Citas: Coconier et al. (2007); Esteban (1953); Moschione et al. (2013)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2011f); De la Peña et al. (2003b); Giai (1950)

Santiago del Estero
Citas: López de Casenave et al. (1998); Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán (2005); Brandán y Navarro (2009); Echevarría et al. (1998, 2011b);Echevarría (2001); Echevarría y Chani (1999, 2000, 2006); Lucero (1983); Lucero et al. (2002, 2005); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Aráoz (2014); Vides Almonacid (1991, 1993)

Islas Malvinas
Citas:Woods (2006)

CUCLILLO CENICIENTO *Coccyzus euleri* Cabanis, 1873

Otros nombres: Cuclillo chico. Cuclillo gris grande.

DESCRIPCIÓN
Largo: 24-28 cm.
Peso: Haverschmidt (1968): N= 1 (M) 45 g; N= 1 (H) 48 g.
Coloración. Mandíbula amarilla. Maxilar negro. Anillo periocular gris oscuro o rojizo. Patas grises. Iris pardo. Parte dorsal y alas grises parduscas. Garganta y superior del pecho grisáceos. Resto de la zona ventral blanquecino.
Cola parda con las plumas externas negras con puntas blancas.

HÁBITAT
Selvas, bosques de transición.



NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Más información:
Payne (1997)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pico amarillo y negro. Gris pardusco, ventral blanquecina. Plumas externas de la cola negras.
Se diferencia del Cuclillo de pico amarillo por ser más pequeño y carecer del rojizo en las alas y del Cuclillo de ojos colorados por ser de menor tamaño, más gris en el pecho, más oscuro en la parte dorsal y tener la cola más corta y diferente color de pico.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Coccyzus euleri Cabanis, 1873 observado en Misiones, Formosa, Chaco y Santiago del Estero.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. En Sud América desde el norte, por el centro y este hasta norte de Argentina.
Comprende: Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Chaco
Citas: Bodrati (2005c)

Formosa
Citas: Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h)

Misiones
Citas: Bodrati (2005c); Bodrati et al. (2010b); Chebez (1996a); Olrog (1979c); Partridge (1961b); Saibene et al. (1996)

Santiago del Estero
Citas: Caziani (1987)

CUCLILLO DE OJOS COLORADOS *Coccyzus erythropthalmus* (A. Wilson, 1811)

Otros nombres: Cuclillo de cola listada. Cuclillo de pico negro. Cuclillo ojo colorado.

DESCRIPCIÓN
Largo: 28-30 cm.
Coloración. Pico negro. Anillo periocular rojo. Patas grises parduscas. Iris pardo.
La parte dorsal y las alas son pardas. Ventral grisácea.
Cola parda con una banda subterminal oscura y punta blanca en las plumas más externas. Ventralmente es grisácea con lunares blancos.



HÁBITAT
Bosques, selvas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pico negro. Anillo ocular rojo. Pardo en la zona dorsal, blanquecino en la ventral. Cola larga, con lunares blancos ventralmente.
Se parece al Cuclillo pico amarillo pero difieren en el color del pico y en el anillo ocular. Además no tiene canela en las alas y los lunares de la cola son menores.
Del Cuclillo chico se diferencia por ser de mayor tamaño, cola más larga y por tener la parte dorsal más parda.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Coccyzus erythropthalmus (A. Wilson, 1811) migratotio de Norteamérica.
Observado en Misiones, Salta y Jujuy.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Nidifica en Canadá y Estado Unidos. En el invierno boreal migra a Sud América llegando hasta Bolivia y norte de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009);Gerow en Olrog (1979)

Misiones
Citas: Chebez (1996a); Partridge (1961)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

Subfamilia: Crotophaginae

ANÓ GRANDE *Crotophaga major* J. F. Gmelin, 1788

Otros nombres: Anó-chiriri. Anó-guasú. Anó Paraná. Gran aní. Pirincho negro grande.

DESCRIPCIÓN
Largo: 45 cm.
Peso: Contreras (1979f): N= 1 (M) 179 g.
Coloración. Pico negro con elevación filosa en la base del maxilar superior. Patas negras. Iris blanco.
Negro con reflejos azulados y plumas orilladas de verde bronceado metálico.
Cola azul purpúrea.

COMPORTAMIENTO
Anda en grupos en árboles bajos o en matorrales.

Alimentación
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Anfibios:** pequeñas ranas. **Insectos:** Odonata (libélulas).
Di Giacomo (2005h). Culebra.

Voces
Straneck (*in litt*.). La voz es un fuerte Cora...córa..crrón. Lo hacen dos o más individuos y finaliza con un sostenido y prolongado Shrrrrrrr, susurrante y soplado, similar a un fuerte hervor de aceite.

HÁBITAT
Selvas en galería, vegetación arbustiva marginal de lagunas, esteros y ríos.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Formosa, Chaco, Misiones.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N

Sostenido en árboles. Alto.
Expuesto. Elaborado. Semiesfera construida con palitos finos, líquenes o claveles del aire, tallos, fibras de hojas de palmeras. En el interior hojas. Agregan hojas durante la postura e incubación.



Uranga M. (com. pers.). Capioví, dpto. Lib. Gral. San Martín, Misiones, 15-10-2001, nido sin postura, en un árbol a 6,00 del suelo; Gral. Vedia, dpto. Bermejo, Chaco, 12-12-2009, nido en un Guayacán, a 4,00 m del suelo, 2 huevos. Este nido mide: diámetro total: 30 cm, diámetro interno: 15 cm, alto: 16 cm y profundidad: 7 cm.
Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, anida entre noviembre y febrero. Se localizaron 11 nidos en árboles altos o en palmeras. En general ocultos o disimulados por el follaje o por enredaderas, entre los 6 y los 8,50 m del suelo. Un caso a 2,50 m del suelo. El número de huevos en los nidos varió entre 4 y 10.

Huevos
Varía entre 4 y 10. Celeste verdoso recubiertos por una espesa capa calcárea blanco y lisa, que en algunos casos cubre casi toda la superficie.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 38 x 28
Di Giacomo (2005h): 38,0 a 44,3 x 33,0 a 37,5 X= 42,5 x 35,7 (N= 21)

Pesos
Di Giacomo (2005h): 20,5 a 31,6 X= 27,8 (N= 21)



Gral. Vedia. Chaco, 12-12-2009 Foto: Máximo Uranga

PICHONES

Observaciones

Salvador (inéd.). Bañado ex aeropuerto, Parque Nacional Iguazú, dpto. Iguazú, Misiones, 19-12-1988, dosadultos alimentando un pichón.

Generalidades

Di Giacomo (2005h). La permanencia de los pichones en el nido es de 12 ó 13 días. Un mismo sitio o sus cercanías pueden ser utilizados en distintas temporadas.

De la Peña (2013c). El 11-12-2002 en Paso de los Libres, dpto. Paso de los Libres, Corrientes, cuatro ejemplares en un cortejo. Enfrentaban los picos y emitían un canto muy prolongado, semejante a un murmullo de agua que corre entre piedras. Dura 3-4 minutos, paran bruscamente y continúan.

Por momentos parecían las voces que hacen las garzas en las colonias. Se corrían entre las ramas de los árboles.

Otros

Bodrati en Salvador y Bodrati (2013a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*

Más información:

Riehl (2010)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Negro con la cola azulada, muy larga. Pico negro con elevación en la parte superior.

Se parece al Anó chico, pero es de mayor tamaño.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Crotophaga major J. F. Gmelin, 1788 en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, San Juan, San Luis, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y noreste de Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Extensa área de distribución en Panamá y Sud América, desde el norte hasta Argentina. Comprende: Panamá, Trinidad y Tobago, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, norte de Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS



Buenos Aires
Citas: Argerich (2010); Hartert y Venturi (1909); Pugnali y Chamorro (2008)

Catamarca
Citas: Carma (2009)

Chaco
Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Salvador y Bodrati (2013a)

Corrientes
Citas: Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Observaciones: De la Peña (Paso de los Libres, dpto. Paso de los Libres, 11-12-2002)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); Milat et al. (1985)

Formosa
Citas: Contreras (1987c);Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Grant (1911); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Narosky y Martelli (1995); Pujalte et al. (1995)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012)

La Pampa
Citas: Pereyra (1933b, 1937b)

La Rioja
Citas: Giacomelli (1923)

Misiones
Citas: Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); De la Peña (2013c); Giraudo et al. (1993); Hartert y Venturi (1909); Krauczuk (2005, 2009);Martínez Gamba (2014); Straneck (1990h)

Observaciones: De la Peña (Cataratas del Iguazú, dpto. Iguazú, 22-09-1971)

Salta
Citas: Coconier et al. (2007); Höy (1969a); Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Lucero (2012h, 2013i)

San Luis
Citas: Masramón (1983)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2011f)

Santiago del Estero
Citas: Ménéguaux (1925)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Lucero (1983); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Ruiz (2011)

ANÓ CHICO *Crotophaga ani* Linnaeus, 1758

Otros nombres: Aní. Anó. Chasca negra. Pirincho negro común. Urraca negra. Viuda.

DESCRIPCIÓN
Largo: 33-35cm.
Peso: Fiora (1933): N= 2 X= 127 g (Rango 120 a 129); Contreras (1979f): N= 2 (M) 93,0 y 120,0 g, N= 1 (H) 85,5 g; Contino (1980): 110,0 g; Di Giacomo (2005h): N= 4 X= 89 g (Rango 86 a 95); Salvador (2014a): N= 3 (M) X= 106,2 g (Rango 98,8 a 113,9). N= 1 (H) 98,0 g; Salvador y Di Giacomo (2014): N= 2 (?) 97 y 109 g, N= 13 X= 78, 5 g (Rango 66 a 104)
Coloración. Pico negro con elevación superior filosa. Patas negras. Iris pardo oscuro.
Negro con reflejos violáceos. Plumas de la cabeza, cuello, manto y pecho, orilladas de verde bronceado.

COMPORTAMIENTO
Anda en pareja o en grupos.

Alimentación
Friedmann (1927). Coleoptera.
Contino (1980). Insectos.
Klimaitis (1993). Saltamontes (Tettigonidae).
Di Giacomo (2005h). **Insectos:** Ortópteros. Orugas de lepidópteros. Saltamontes (Tettigonidae). Termitas aladas.
De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). Langosta(*Stagmatotera hyaloptera*).
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). Orthoptera (no determinada)
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Cucurlionidae, Elateridae, Sacarabaeidae). Coleoptera (no determinado). Hemiptera (Pentatomidae). Hemiptera (no determinado). Mantodea (Mantidae). Orthoptera (Acridiidae, Tettigonidae). **Anfibios:** Leptodactylidae (*Leptodactylus* sp.).
De la Peña (2011a). Mamboretá (*Stagmatotera hyaloptera*)
Salvador (2013e). Hormigas Isaú (*Atta vollenweideri*).
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Voces
Straneck (*in litt*.). La vocalización es muy variada. En vuelo emite un Kioic..kioic..kioeic..

HÁBITAT
Matorrales, arbustos, cerca de cursos acuáticos.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Tucumán, Formosa, Salta, Misiones, Córdoba, Santa Fe.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N	N							N	N

Sostenido en ramas de arbustos o de árboles, a veces cubiertos por enredaderas o por follaje denso, o en matorrales. A baja y mediana Altura.
Expuesto o semioculto. Elaborado. Tazón de tallos de yuyos o de enredaderas. Internamente hojas o pajitas.



M. Nores (*in litt*.) halló en Villa del Totoral, dpto. Totoral, Córdoba, un nido con un huevo, el 14-12-1977.
Salvador (*in litt*.). Jardín América, dpto. San Ignacio, Misiones, 21-12-1988, nido en un arbusto a 1, 7 m de altura, a 10 m de un arroyo, con 7 huevos muy incubados.
Smyth (1928). Manchalá, dpto. Leales, Tucumán, 22-01-1923, huevos.
Contino (1980). Nido con forma de copa, pone 4 a 5 huevos.
Biancucci (1995). Jesús María, dpto. Colón, Córdoba, en diciembre de 1990, nido a 4,5 m de altura en un tala.
Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, anida entre noviembre y abril. Se observaron más de 30 nidos, ubicados entre 1 y 3 m del suelo. La postura varió de 3 a 6 huevos, aunque en nidos comunales fue de 10 a 18 huevos.
Salvador (2011). Dpto. Gral. San Martín, Córdoba, se localizaron 2 nidos, uno a una altura de 1,6 y el otro a 2,1 m del suelo. Uno en noviembre y el otro en febrero, uno con 3 y el otro con 4 huevos.
De la Peña (2013c). Empalme San Carlos, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 26-02-1978, nido con 4 pichones, Pichanal, dpto. Orán, Salta, 2 nidos el 12-12-1979, uno con 2 y otro con 3 huevos, Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 03-01-1991, nido con 5 huevos, Colastiné, dpto. La Capital, Santa Fe, 2 nidos el 09-02-1996, uno con 2 pichones y el otro con 3, Villa Roda, dpto. La Capital, Santa Fe, 4 nidos: el 11-03-1996, con 3 huevos, 20-03-1996, con 3 huevos, 20-01-1997, en construcción y el 20-01-2003, 5 pichones. Los nidos miden: diámetro total: de 15 a 30 cm, diámetro interno: 9 a 15 cm, alto: de 6 a 15 cm, profundidad: de 3 a 7 cm. Nido más bajo: 1,40 m del suelo, nido más alto: 4,00 m.
Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos “Pablo Girard”, dos nidos con 6 huevos cada uno.

Huevos
Pone hasta 13 ó más, generalmente 5 ó 6 huevos.
Elípticos. Color de base celeste, recubiertos de material calcáreo blanco.



Medidas
Hartert y Venturi (1909): 30 a 32 x 22 a 23,5
Smyth (1928): 33 a 35 x 23,5 a 26
Di Giacomo (2005h): 28,0 a 37,2 x 21,5 a 28,0 X= 31,5 x 23,4 (N= 91)
Salvador (2011): 32,9 a 34,6 x 23,7 a 24,9 X= 34,1 x 24,1 (N= 7
De la Peña (2013c): 30,7 a 33,3 x 23,4 a 25,8 X= 32,2 x 24,9 (N= 10)

Pesos
Di Giacomo (2005h): 8,0 a 14,5 X= 9,4 (N= 91)
Salvador (2011): 9,6 a 11 X= 9,9 (N= 7)
De la Peña (2013c): 11 a 11,7 X= 11,3 (N= 5)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,872 a 1,100 X= 1,014 (N= 10)

PICHONES

Descripción

De la Peña (2013c). Nacen con los ojos cerrados. Piel negra. Cubierto de plumón negro.
3días. Abre los ojos.

Generalidades

Di Giacomo (2005h). En algunos nidos la postura fue en días sucesivos, pero en otros se registraron intervalos de hasta tres días. El período de incubación es de 14 ó 15 días. Los pichones permanecen en el nido 10 ó 12 días. Las cáscaras de los huevos eclosionados quedan en el nido. Un mismo sitio fue utilizado durante al menos tres temporadas seguidas.
De la Peña (2013c). Período de incubación de 13 días. Permanencia de los pichones en el nido 11 días. Si se los molesta se desplazan por las ramas. Para pedir la comida, los pichones aletean y emiten un chillido. El adulto se va hasta 50 m. del lugar donde están los juveniles. Busca entre los yuyos, trae langostas y mamboretá. Se los da y el joven los traga enteros.

Observaciones

Bianchini y Arenas (*in litt*.). Ruta Nac. 81. Cercano a Dragones. Departamento. Gral. José de San Martín. Salta, 18-03-2014, pareja con 3 o 4 juveniles (volantones).

Más información:
De la Peña (2013c)

Otros

Giai (1952-1953). Un ejemplar con Albinismo.
Di Giacomo (2005h). Un ejemplar con Albinismo parcial, (manchas blancas en las alas)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Negro con cola larga. Notable elevación en el pico.
Se diferencia del Anó pico surcado, por ser de mayor tamaño, tener la cola más larga, porque su pico no es surcado y carece de reflejos morados en las alas y en la cola.
Diferenciarlo además del Anó grande.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

*Crotophaga an i*Linnaeus, 1758 desde el norte del país hasta San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe y noreste de Buenos Aires.



Ruta Nac. 81. Cercano a Dragones. Salta. 18-03-2014



Foto:pi Cynthia Arenas (juveniles)



Empalme San Carlos. Santa Fe. 26-02-1978



Esperanza. Santa Fe. 03-01-1991



Villa Roda. Santa Fe.12-12-2015



Saladillo.Santa Fe. 14-01-2016

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Muy amplio rango de distribución desde Estados Unidos, Méjico, Costa Rica, continuando en Sudamérica hasta Uruguay y Argentina. También en islas del Caribe.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS



Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Barbetti et al. (1985); Bodrati (2001); Bodrati et al. (2006b); Darrieu y Camperi (2001a); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis (1975b, 1993); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Morici (2013); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pugnali y Chamorro (2008); Roda y Danti (2015)

Catamarca

Observaciones: De la Peña (San Fernando del Valle de Catamarca, dpto. Capital, 13-03-1981)

Chaco
Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Bodrati y Salvador (2015a); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004) ; Salvador y Di Giacomo (2014)

Observaciones: De la Peña (Resistencia, dpto. San Fernando, 05-10-1972)

Córdoba
Citas: Biancucci (1995); Cobos et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores y Yzurieta (1980b); Salvador (2013e); Yzurieta (1995)

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Ordano et al. (2008)

Observaciones: De la Peña (Corrientes, dpto. Capital, 27-08-1987)

Entre Ríos
Citas: Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi et al. (2003); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c);Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Giai (1952-1953); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995); Wetmore (1926)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Chebez et al. (1998); Fiora (1933) Moschione y Segovia (2005);

La Rioja
Citas: Giacomelli (1923); Hayward (1967)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b); Bodrati y Salvador (2015a); Camperi y Darrieu 2000 (2001b); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Hartert y Venturi (1909); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014); Straneck (1990h)

Observaciones: De la Peña (Cataratas del Iguazú, dpto. Iguazú, 06-02-1976)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); De la Peña (2013c); Echevarría et al. (2014); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b) White (1882)
Observaciones: De la Peña (San Ramón de la Nueva Orán, dpto. Orán, 01-02-1977)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Haene (1987); Lucero (2013i)

San Luis
Citas: Blendinger en Nellar Romanella (1993); Nores y Yzurieta (1981)

Santa Fe
Citas: Beltzer et al. (2009); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009); Rossetti y Giraudo (2003)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Observaciones: De la Peña (Pinto, dpto. Aguirre, 06-02-1983)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996, 2000); Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán (2005); Brandán y Navarro (2009); Echevarría et al. (2011b); Lucero (1983); Lucero et al. (2002); Navarro et al. (2000);Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Aráoz (2014); Vides Almonacid (1993)

Observaciones: De la Peña (San Miguel de Tucumán, dpto. La Capital, 08-12-1977)

ANÓ DE PICO SURCADO *Crotophaga sulcirostris* Swainson, 1827

Otros nombres: Anó pico surcado. Pirincho negro dentado. Pirincho negro de pico dentado.

DESCRIPCIÓN
Largo: 30-32 cm.
Coloración. Pico negro con elevación superior y surcos en los costados. Patas negras. Iris pardo.
Negro con las plumas orilladas de verde bronceado. Reflejos morados en las alas y en las plumas centrales de la cola.

HÁBITAT
Selva en galería, matorrales, orillas de selvas, arboledas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Payne (1997)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Negro con cola larga. Elevación en el pico, surcado a los costados.
Diferenciarlo del Anó chico.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Crotophaga sulcirostris sulcirostris Swainson, 1827 en el norte de Salta.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Amplio rango de distribución desde el sur de Texas, Estados Unidos, Centro América: Méjico, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. En el norte de Sud américa y por el oeste: Trinidad y Tobago, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, norte de Chile, extremo noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Crotophaga sulcirostris sulcirostris Swainson, 1827

Salta
Citas: Di Giacomo et al. (1998b); Moschione et al. (2013); Zotta (1937b)

PIRINCHO *Guira guira* (J. F. Gmelin, 1788)

Otros nombres: Andirá. Chasca. Chasquita. Chasquito. Chicharrera. Chiluca. Cuclillo rubio. Guira. Kirirú. Machila. Machilo. Macho-bocha. Macho macho. Pájaro loco. Pararí. Pilincho. Pinchirraca. Piojosa. Pirchirraca. Pirigüá. Pirinche. Pirí-pirí. Piriré. Pirireguá. Pirirí. Piririguá. Piririta. Pirrincha. Quililo. Rubiala. Rubia loca. Sereré. Seresche. Urraca. Zirrino.

DESCRIPCIÓN
Largo: 40 cm.
Peso: Fiora (1933): N= 5 X= 114 g (Rango 100 a 127); Contreras (1979f): N= 1 (M) 125,5 g, N= 1 (H) 182,0 g; Contino (1980): 125,0 g; Camperi (1992c): N= 2 (M) 180 y 200 g; Camperi y Darrieu (2005): N= 4 X= 159,2 g (Rango 136,8 a 175,5), N= 3 (H) X= 144,6 g (Rango 141,5 a 148,1); Di Giacomo (2005h): N= 7 X= 131,1 g (Rango 120 a 140); Darrieu et al. (2010): N= 53 (M) X: 152,7 g (Rango: 125 a 190); N= 39 (H) X: 148,9 g (Rango: 117 a 210); Salvador (2014a): N= 11 (M) X= 144,9 g (Rango 131 a 159). N= 8 (H) X= 164,7 g (Rango 159 a 171). N= 4 (?) 152 g (Rango 138 a 159); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 2 (?) 150 y 120 g
Coloración. Pico amarillo. Patas grises azulinas. Iris naranja.
Cabeza ocre rojiza con los mástiles de las plumas pardos oscuros. Dorso pardo oscuro con los mástiles de las plumas blanquecinos. Lomo y rabadilla blancos. Ventral ocrácea con los mástiles de las plumas de la garganta y del pecho pardos oscuros.
Alas pardas y canelas.
Cola ocre amarillenta en la base, las plumas centrales pardas oscuras y las restantes negras con ancha punta blanca.

COMPORTAMIENTO
Forma bandadas, es bullanguero y de vuelo lento. Reposa entreabriendo las alas y colocando el dorso hacia el sol. Terrícola y arborícola.
Se lo observó comiendo pichones de aves, anfibios, insectos. (De la Peña, 2001)

Alimentación
Marelli (1919). Langostas. Mosquitas (*Schistocerca paranensis*).
Zotta (1940). **Insectos:** Hemípteros (Pentatomidae).Lepidóptero (larva) (*Colias lesbia*). Ortópteros (Acrididae, Gryllidae) (*Elaechlora trilineata*). **Otros:** Huesos. Huevos (cáscaras).
Pereyra, C. B. (1927). **Aves:** *Passer domesticus* y *Tyrannus savana* (Pichónes). Anfibios: Rana del zarzal (*Hyla*) Pichones de gorrion,
Aravena (1928). **Insectos:** Coleópteros (Carábido, Curculiónido, Elatérido).**Arácnidos.**
Pereyra, C. B. de. (1935). **Aves:** Pichones de picaflor.
Zotta (1934). **Insectos:** Coleópteros (Carabidae, Scarabaeidae) (Cerambycidae, Chrysomelidae). Hemípteros. Mosquitas (*Schistocerca paranensis*). Ortóptero (Tucura, Locustidae, Acrididae). **Reptiles:** Culebra.
Liebermann (1935). Langostas.
Pereyra (1927d). **Anfibios:** Rana (*Hyla sp.*). **Aves:** *Tyrannus savana* (Pichón). **Reptiles**.
Contino (1980). Insectos.
Salvador (1984). **Anfibios:** (ranas, sapos). **Aves:** (pichones), huevos. **Roedores. Reptiles:** Víboras ciegas (*Amphisbaena* sp.). **Insectos:** Hemípteros (*Edessa ruffomarginata*) (*Pachullis argentino*). (Tucura). Lepidóptero (larva) (*Colias lesbia*).

Beltzer (1995).**Arácnidos. Insectos:**Coleópteros (Curculionidae, Dytiscidae, *Magadytes* sp.) (Coccinelidae, Elateridae, Cerambicidae) (Hydrophilidae). Noteridae, (*Suphis* sp*., Hydrocanthus* sp.) (Carabidae, *Diloboderus abderus*). Hemípteros (Pentatomidae, *Nezara viridula*)(*Piezodorus guilidini*) (Reduvidae, Belostomatidae, *Belostoma sp.*). Homópteros. Hymenópteros. Ortóptero (Paulinidae, *Marelia acuminata, Paulinia sp.*) (Acrididae, Leptismidae, *Cornops aquaticus*). Lepidópteros. **Anfibios:** *Hyla pulchela*, *Leptadactylus* sp.**Crustáceos. Moluscos.**
Haro (1998). **Insectos:** Coleoptera (Carabidae, Curculionidae: *Gonipterus*sp, Scarabaeidae). Diptera (Tachinidae). Hemiptera (Coreidae, Pentatomidae, Reduviidae). Homoptera (Cercopidae). Lepidoptera (larvas). Orthoptera (Acridiidae: *Dichrolopus elegantes, Rhammatocerus pictus*). (Mantidae). (Tettigonidae). **Reptiles:** Teiidae (*Pantodactylus schreibersi*). **Mamíferos:** Cricetidae: *Calomys* sp.
De la Peña (2001d). **Aves:** Pichón de *Fluvicola albiventer.* **Anfibios:** Rana.
Di Giacomo (2005h). **Insectos:** Termitas aladas.
Soave et al. (2008). **Anfibios:** Amphibia (Leptodactylidae: *Leptodactylus latinasus, Leptodactylus sp.*). Bufonidae (*Rhinella fernandezae, Rhinellaarenarum*). (Hylidae: *Hypsiboas pulchellus, Hypsioboas sp*.) **Arácnidos:** Arachnida (Araneida: Lycisidae, Tetragnathidae, Salticidae). (Opilionida: Gonyleptidae: *Acanthopachylus aculeatus*). (Escoepionida: Escorpionidae). (Acarina). **Insectos:** Blattodea. Clitellata (Lumbricidae) Coleoptera (Carabidae: *Scarites melanarius, Scarites anthracinus, Trirammatus striatululus, Aspidoglosa intermedia*, *Apenes aenea, Scarites* sp*., Colossoma* sp.). (Curculionidae: *Calendra* sp., Driophthorinae, Calendrinae). (Scarabaeidae: *Dyscinetus* sp*., Lygirus* sp*., Stenocrates* sp., Dinastinae). (Tenebrionidae). (Aphodiidae). (Coccinellidae: *Cyclonedasanguinea*). (Elateridae). (Dytiscidae). (Chrysomelidae). Hydrophilidae). Dermestidae: *Dermestes* sp.). Hemiptera (Pentatomidae: *Nesara viridula, Edessa* sp.). (Coreidae: *Corecoris sp*.). (Belostomatidae: *Belostoma* sp.). (Cicadidae). (Membracidae)Hymenoptera (Vespidae). (Apidae:*Bombus atratus*). (Formicidae:*Solenopsis* sp., *Acromyrmex* sp., *Mycocepurus* sp., Atta sp.*)* Orthoptera (Acridiidae: *Dichoplus* sp*., Allotruxalis* sp., Acridinae, Comphocorinae). (Gryllidae). (Proscopidae). (Tettigonidae). (Grillotalpidae). Trichoptera. Lepidoptera (Saturnidae: *Hylesia nigricans,* Hemileucinae). (Noctuidae). (Sphigidae). (Arctiidae). Mantodea (Mantidae). Odonata (Aeshnidae: *Aeshna* sp.). (Anisoptera). Diptera (Tabanidae). (Tachinidae). Stratyomyidae) (Muscidae: *Stomoxys calcitrans*). **Reptiles:** (Angüidae: *Ophiodes vertebrales*). (Colubridae: *Liophis poecilogyrus*). **Crustáceos: (**Isopoda). **Aves.**
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Anélidos:** (Oligoquetos). **Arácnidos:** (arañas). (Buthidae: *Tityus trivittatus*). **Insectos:** Coleoptera (Carabidae, Chrysomelidae, Elateridae, Scarabaeidae: larvas y adultos, Tenebrionidae: larvas). Dermaptera. Hemiptera (Coreidae, Pentatomidae). Homoptera (Cicadidae). Lepidoptera (orugas y crisálidas). Mantodea (Mantidae). Orthoptera (Acridiidae, Gryllidae, Tettigonidae). **Moluscos:** (Bulimulidae: *Bulimulussporadicus, Bulimulus apodemetes*). **Mamíferos:** Cricetidae: *Calomys* sp*.* **Crustáceos:** (Isópodos terrestres). **Aves:** Passeriformes (huevos y pichones). **Reptiles:** Teiidae (*Teius*sp.). **Moluscos:** Gastropoda (Veronicellidae). (Planorbidae). **Anfibios:** Bufonidae: *Bufo* sp.
De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). Caracol (chico, alargado). Insectos. Víboras ciegas (*Amphisbaena* sp.)
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Aves:** *Passer domesticus* (huevos y pichones) *Tyrannus savana* (huevos y pichones)
De la Peña (2011a). **Insectos:** Mantidea (*Stagmatoptera hyaloptera*). Langostas. **Aves:**Pichónesde *Passer domesticus, Tyrannus savana* .**Reptiles:** Culebra.
Salvador (2013e). **Insectos:** Hormigas Isaú (*Atta vollenweideri*).
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto es una sucesión de voces con modulación de frecuencia descendente: Kiei..kiei...kiee..kiorr..lior.kior.kior.. La voz de alarma es un estridente kirrrrrrrr y en vuelo emite un ieo..ieo..ieo... de poco alcance.

HÁBITAT
Sabanas, montes, praderas, áreas rurales y urbanas, parques, arboledas.

NIDIFICACIÓN

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N							N	N	N

Se localizaron nidos en Tucumán, Salta, Chaco, Formosa, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe.

Sostenido en ramas de arbustos o de árboles, a veces cubiertos por enredaderas, en matorrales, juncales, espadañales, recipientes, molinos, construcciones. A baja y mediana altura y alto.
Expuesto. Elaborado. Tazón de palitos, tallos de yuyos o de enredaderas, raíces. Internamente, hojas, pajitas, hilos, flores.

Salvador, Narosky y Fraga (*in litt*.). Villa Ángela, dpto. Mayor Luis Jorge Fontana, Chaco, 1-12-1982, un nido en un *Prosopis* sp., a 2,5 m de altura con 3 huevos frescos. Tafí del Valle, dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 07-12-1987, un nido en una mata de *Bacharis* sp., a 2,2 m de altura, con 7 huevos incubados.
Salvador (*in litt*.). Morrison, dpto. Unión, Córdoba, 2 nidos, 31-12-1982, un nido en un *Melia azedarach*, a 3 m de altura, con 5 huevos. 07-11-1983, un nido en un *Geoffroea decorticans*, a 2,7 m de altura, con 4 huevos y 6 pichones de 24-48 hs. Villa Rumipal, dpto. Calamuchita, Córdoba, 16-12-1989, un nido en un *Prosopis nigra*, a 3,5 m de altura, con 8 huevos. Ongamira, dpto. Punilla, Córdoba, 22-11-2005, un nido en un *Schinus molle*, a 3,5 m de altura, con 9 huevos incubados.
Withington (1888). Lomas de Zamora, pdo. Lomas de Zamora, Buenos Aires, son polígamos, se encuentran hasta 20 huevos en un nido.
Holland (1892). Estancia Espartillo, Buenos Aires, crían en diciembre, nidos en árboles a distintas alturas, ponen 4 huevos, se encuentran huevos en el suelo.
Hartert y Venturi (1909). Nidos con 5 a 21 huevos.
Serié y Smyth (1923). Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, nido con hasta 19 huevos.
Serié (1923a). Cacharí, pdo. Azul, Buenos Aires, 2 huevos en un nido de Chimango (*Milvago chimango*) que contenía 2 huevos propios.
Serié (1923d). P. Girard, en Río Colorado, Tucumán, el 5 de diciembre encontró un nido de *Phytotoma rutila* con la hembra que empollaba dos huevos propios y uno de *Guira guira*.
Goodall (1923). Estancia Los Alfalfares, Arias, dpto. Marcos Juárez, Córdoba, 3 nidos hallados en octubre y diciembre de 1907, con 9, 11 y 20 huevos respectivamente.
Daguerre (1924a). Provincia de Buenos Aires, ponen muchos huevos en un nido. En tres ocasiones observó nidos con 8 huevos cada uno.
Smyth (1928). Cacharí, pdo. Azul, Buenos Aires, 29-10-1920; 06-11-1921 y Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, 16-10-1925, huevos.
Hudson (1974). El nido es una estructura tosca, por lo general en árbol espinoso.
Zapata y Cabrera (1969). Establecimiento El Tuyú, pdo. Gral. Lavalle, Buenos Aires, un huevo en el suelo.
Azategui (1975). Santa Isabel, dpto. Calamuchita, Córdoba, 25-03-1973, nido con un huevo.
Wilson (1977). Mercedes, dpto. Mercedes, Corrientes, nidifica en Eucaliptos.
Contino (1980). Se encuentran nidos.



Salvador (1981b). Villa María, dpto. Gral. San Martín, Córdoba, nido a 3,3 m del suelo en una Acacia blanca (*Robinia pseudoacacia*). Entre los días 3 y 10 de enero de 1981, 25 huevos fueron puestos en el nido, por 4 ó 5 hembras.
Martella et al. (1985). Arroyito, dpto. San Justo, Córdoba, se hallaron 2 nidos dentro de nidos abandonados de Cotorras, las cámaras fueron forradas con hojas de eucaliptos.
Brocca (1997). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, un nido.
Jenny (1997). Wildermuth, dpto. San Martín, Santa Fe, el 20-12-1996, un nido de Tero (*Vanellus chilensis*) con 4 huevos propios, tenía uno de *Guira guira*.
Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, anida entre octubre y marzo. Se localizaron 20 nidos ubicados entre 1,7 a 3,0 m del suelo, con algunos casos a 5-6 m de altura. El número de huevos por nido varió entre 6 y 19.
Salvador (2011a). Dpto. Gral. San Martín, Córdoba, se localizaron 59 nidos, a una altura que varió de 1,1 a 6,5 m del suelo. Pone de octubre a marzo, 4 ó 28 huevos por nido.
De la Peña (2013c). Se hallaron 43 nidos, de los cuales 32 en Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, uno en Pichanal, dpto. Orán, Salta, el 12-12-1979, con 3 huevos. El nido de Esperanza, del 31-12-1993, tenía 1 huevo y 2 de *Molothrus bonariensis*. Otro de Esperanza, del 20-12-1976, contenía 30 huevos.
Medidas: diámetro total: de 15 a 40 cm, diámetro interno: 14 a 20 cm, alto: de 14 a 20 cm, profundidad: de 10 a 15 cm. Nido más bajo: 1,00 m. Nido más alto: 8,00 m.
Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos "Pablo Girard", 4 nidos con 6, 6, 10 y 10 huevos cada uno.
Segura et al (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos "Ronald Runnacles", 7 nidos.

Huevos
Pone hasta 30, generalmente 10 ó 12 huevos.
Elípticos, algunos ovoidales. Color de base celeste, recubiertos por líneas y manchas blancas de material calcáreo.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 38 a 43 x 28 a 33
Serié y Smyth (1923): 39 a 44 x 28 a 34
Smyth (1928): 36,5 a 42 x 28 a 32
Zapata y Cabrera (1969): 39 x 31,3
Salvador (1981): 36,7 a 44,2 x 31,3 a 33,1 X= 41,9 x 32,1 (N= 25)
Di Giacomo (2005h): 36,4 a 44,1 x 26,8 a 36,6 X= 40,2 x 30,5 (N= 68)
Salvador (2011a): 36,7 a 44,8 x 28,8 a 33,9 X= 41,6 x 31,7 (N= 122)
De la Peña (2013c): 39,7 a 46 x 28,7 a 33 X= 41,5 x 31 (N= 28)



Pesos
Di Giacomo (2005h): 15,5 a 23,5 X= 19,7 (N= 68)
Salvador (2011a): 19,5 a 26,5 X=23,2 (N= 84)
De la Peña (2013c): 19,7 a 22,4 X= 20,8 (N= 6)
De la Peña (2013c): cáscaras 1,60 a 2,01 X= 1,85 (N= 28)

PICHONES
Descripción
Salvador (1981b). Los pichones nacen con los ojos abiertos, de color pardo oscuro. Piel negruzca con tinte violáceo y el cuerpo cubierto de canutos que parecen cerdas, de color blanco crema. La piel que rodea a los ojos es verdosa. Las patas de color gris oscuro. El pico anaranjado pálido, con una raya longitudinal negra en

el culmen y dos en el maxilar inferior. El interior de la boca es rojo escarlata o rojo fuerte, con papilas blancas.
Tienen un desarrollo rápido y a partir de os 7-8 días de nacidos comienzan a cubrirse de plumas. Cuando tienen 10 días y son molestados, abandonan el nido trepando por las ramas ayudándose con las alas y el pico.
De la Peña (2013c). Nacen con los ojos abiertos. El pico es anaranjado con una línea negra longitudinal en el culmen. Ventralmente las ramas de la mandíbula, son oscuras.
El paladar es rojo, con papilas blancas. La piel es oscura. Alrededor de los ojos es verdosa. Plumón blanco crema, alargado semejando pelos. Patas gris oscuro.
2 días. Ojos marrones. La cavidad bucal, lengua y paladar, rojizos.
La lengua tiene en la base una medialuna blanca, lo mismo que la punta. Por detrás de ésta una banda transversal negra. A los costados, sobre la mucosa, dos manchas blancas.
El paladar tiene una medialuna blanca con una línea del mismo color hacia la fosa palatina. A los lados de la fosa palatina, presenta dos círculos incompletos grandes (parecen signos de pregunta). blancos.
Plumón, tipo filoplumas, blanco, por todas las zonas pteridas.
Emiten un grito fuerte y tiran picotazos.
5 días. Cola con cañones largos. Aparecen las láminas. En la cola las tres plumas externas blancas, las dos centrales oscuras. En el resto del cuerpo cañones oscuros con punta blanca.
El nido tiene olor por las materias fecales.
7 días. Las plumas de las alas y de la cola son oscuras. A los lados del pecho las láminas son blanco amarillentas. La cola mide 5 cm. Si son molestados se van del nido.
8 días de edad. Pueden estar fuera del nido.
10 días de edad. Pueden estar fuera del nido o esconderse en él al ver extraños. Trepan por las ramas ayudándose con el pico y las alas. Cola larga. Colores como en adulto.

Peso al nacer
Salvador (2011): 17 a 21 X= 19,2 (N= 14)

Observaciones
De la Peña (2013c). Un nido en Esperanza, el 12-01-1999, tenía 10 pichones.

Generalidades
Azategui (1975). El período de incubación es de 14 días. Los pichones permanecen en el nido 9 días.
Salvador (1981b). El período de incubación es de 15 días. Los pichones entre los 15 y 16 días abandonaron el nido.
Di Giacomo (2005h). El período de incubación es de 15 días. La permanencia de los pichones en el nido es de 9 a 13 días.
De la Peña (2013c). Pone en días alternos. Período de incubación 15 días. Permanencia de los pichones en el nido 12-13 días.
Durante la incubación agregan materiales al nido, principalmente hojas o tallos frescos.
El nido del 06-02-1992, en Humboldt, estaba asentado sobre un rollo de cables. Entre otros elementos ocupó tallos de Cardo y una raíz de 1,35 m. de larga.
El nido del 18-11-1995, en Esperanza, fue construido dentro de un tarro, colocado en un Paraíso.
El 13-01-2001, en Esperanza, se encontró un huevo sobre una plataforma de palitos y algunas pajas, semioculto por una enredadera, a 2,30 m. del suelo.
Se suelen encontrar huevos en el suelo, donde están los nidos.
El nido tiene olor fuerte por las materias fecales.
Los pichones emiten un grito fuerte y tiran picotazos. Tienen ectoparásitos (piojos).
Los adultos emiten gritos de alarma y se acercan al observador.
Traen como alimentos a los pichones, ranitas, culebras, pichones de otras aves.

Los adultos en la época de cría, depredan sobre otras aves. Se los observó tomando pichones de Viudita blanca (*Fluvicola albiventer*). Tijereta (*Tyrannus savana*) y Gorrión (*Passer domesticus*).

Más información:
Salvador (1981). De la Peña (2013c). Darrieu et al. (2010)

Depredadores
De adultos: *Accipiters striatus* (Seipke y Cabanne 2008), *Tyto alba* (Massoia 1988k), *Bubovirginianus* (Di Giacomo 2005h), *Glaucidium brasilianum* (Carrera et al. 2008), *Caracara plancus* (Vargas et al. 2007), *Falco femoralis* (Salvador 2012h); de pichones: *Spiziapteryx circumcincta* (Martella y Bucher 1984)

Otros
Antoniazzi et al. (2011); Bodrati en Salvador y Bodrati (2013a). Salvador (2011a).Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*
De la Peña (2013c). Anfitrión de *Molothrus bonariensis*.



Esperanza. Santa Fe. 01-01-2008. 2 días de edad


Esperanza. Santa Fe. 03-03-1971. Nido con 21 huevos


Esperanza. Santa Fe. 05-03-2005. 1 día de edad



Esperanza. Santa Fe. 24-09-2006



Humboldt. Santa Fe. 06-02-1992. Nido en tirante de galpón



Esperanza.Santa Fe.31-12-1993 Nido con huevos de *Molothrus bonariensis*.



Esperanza. Santa Fe. 05-03-2015. Juvenil



Esperanza. Santa Fe. 15-07-2007



Esperanza. Santa Fe.15-01-2016





Esperanza. Santa Fe.10-01-2016 Saladillo. Santa Fe. 14-01-2016

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Copete. Manto y cubiertas alares estriadas de blanco. Cola larga con ancha banda negra y punta blanca. Lomo y rabadilla blancos. El canto.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Guira guira (J. F. Gmelin, 1788) desde el norte del país hasta Chubut.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Su área de distribución abarca desde el noreste de Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Argentina hasta Chubut.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Aravena (1928); Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Camperi (1992c); Castro y Cicchino (1992); Codesido et al. (2011); Dabbene (1918b, 1923f); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Grant (1911); Hartert y Venturi (1909); Isacch y Martínez (2001); Klimaitis (1975b); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Leveau y Leveau (2004, 2011b); Lucero et al. (2011); Marelli (1933); Mérida y Bodtati (2006); Montaldo y Claver (1986); Morici (2012b); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pereyra, C. B. de. (1927); Pugnali y Chamorro (2008); Renard (1920); Salvador y Di Giacomo (2014); Soave et al. (1999); White (1882); Zapata (1998); Zapata y Cabrera (1969); Zuberbhüler (1971)

Observaciones: De la Peña (Claromecó, pdo. Tres Arroyos, 07-02-1976)

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009)

Observaciones: De la Peña (Santa María, dpto. Santa María, 08-02-1977)

Chaco
Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004); Salvador y Bodrati (2013a)

Observaciones: De la Peña (Resistencia, dpto. San Fernando, 27-08-1987)



Chubut
Citas: Harris (2008); Kovacs et al. (2005); Nores y Yzurieta (1981); Sainz-Trápaga (2014)

Observaciones: De la Peña (Gaiman, dpto. Gaiman, 30-11-2000)

Córdoba
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Brandolín et al. (2007); Haro y Gutierrez (1992); Haro (1998); Heredia (2006); Nores et al. (1983); Nores (1996); Partridge (1953c.); Salvador (1981a, 1983, 2013e); Salvador y Bodrati (2013a); Sferco y Nores (2003); Straneck (1990b); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (La Falda, dpto. Punilla, 19-01-2000)

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Marelli (1918); Ordano et al. (2008); Wilson (1977)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Baliño y Biole (1984); Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); Canavelli et al. (2004); Davis (1940b); De la Peña (2012b); Hartert y Venturi (1909); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2002); Muzzachiodi et al. (2003); Navas (1982); Peltzer (1998); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Zapata (1975, 1977)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c);Contreras et al. (2014); Davis (1940b); Di Giacomo (2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995); Wetmore (1926b)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Chebez et al. (1998); Fiora (1933) Moschione y Segovia (2005);

Observaciones: De la Peña (San Salvador de Jujuy, dpto. Capital, 10-02-1983)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Bruno et al. (2007); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Siegenthaler et al. (1990); Siegenthaler (1984, 2004); Tejerina et al. (2006); Wetmore (1926b)

Observaciones: De la Peña (La Adela, dpto. Caleucaleu, 05-02-1976)

La Rioja
Citas: Capurro y Bucher (1986); Giacomelli (1923); Hayward (1967); Koslowsky (1895b)

Mendoza
Citas: Calí et al. (2008); Contreras (1979g); Contreras y Fernández (1980); Darrieu (2014); Gómez (2006); Gosse (1899); Lucero (2013f); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (2005);Steullet y Deautier (1945)

Observaciones: De la Peña (Tupungato, dpto. Tupungato, 12-01-1982)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b); Bodrati y Salvador (2015a); Camperi y Darrieu 2000 (2001b); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014)

Observaciones: De la Peña (Cataratas del Iguazú, dpto. Iguazú, 2-10-1981)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Gazari (1967); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Navas (1978); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Camperi y Darrieu (2005); Gazari (1967); Gelain (2010); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Pérez y Petracci (1998)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); De la Peña (2013c) ; Echevarría et al. (2014); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b)

Observaciones: De la Peña (Salta, dpto. La Capital, 30-01-1977)

San Juan
Citas: Camperi y Darrieu (2004); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Gelain (2014a); Lucero (2013f, 2013i); Ortiz y Murúa (1994)

Observaciones: De la Peña (Matagusanos, dpto. Ullún, 15-01-1982)

San Luis
Citas: Casares (1944b); Masramón (1983); Nellar Romanella (1993); Partridge (1953c)

Observaciones: De la Peña (Merlo, dpto. Junín, 19-11-1997)

Santa Fe
Citas: Beltzer (1986, 1995); Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2001d, 2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d);Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009); Rossetti y Giraudo (2003); Wilson (1926)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Observaciones: De la Peña (Selva, dpto. Selva, 29-01-1977)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996); Antelo y Brandán (2000, 2006, 2013); Antelo et al. (2013); Brandán et al. (2006); Brandán (2005); Brandán y Antelo (2000, 2009); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (1998, 2007a); Capllonch y Aráoz (2007); Echevarría et al. (1998, 2007, 2008c, 2011b); Echevarría y Chani (1999, 2000, 2006); Fanjul (2010); Handford (1983); Hartert y Venturi (1909); Juri (2007); Juri y Chani (2005); Lucero (1983); Lucero et al. (2002); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz y Aráoz (2014); Vides Almonacid (1993)

Observaciones: De la Peña (San Miguel de Tucumán, dpto. Capital, 30-01-1977)

Subfamilia: Neomorphinae

CRESPÍN *Tapera naevia* (Linnaeus, 1766)

Otros nombres: Chochi. Choschín. Crispín. Yasy.

DESCRIPCIÓN
Largo: 26-29 cm.
Peso: Contreras (1979f): N= 1 (M) 44,0 g; Contreras (1983a) N= 1 (M) 52,2 g; Di Giacomo (2005h): N= 1 56,0 g; Salvador (2014a): N= 3 (M) X= 52,4 g (Rango 51,3 a 53,2); N= 1 (H) 56,5 g; Fiora (1933): N= 13 X= 50 g;
Coloración. Mandíbula amarillenta. Maxilar superior negro. Patas grises parduscas. Iris pardo.
Cabeza parda con las plumas ribeteadas de castaño formando un copete. Cejas blanquecinas. Línea malar oscura. Parte dorsal gris pardusca con grandes estrías pardas oscuras. Supracaudales largas hasta la mitad de la cola pardas oscuras orilladas de gris. Ventral blanca ocrácea.
Alas grises parduscas. Cubiertas grises parduscas con manchas oscuras y canelas.
Cola larga, escalonada, parda grisácea con punta y márgenes ocráceos.

COMPORTAMIENTO
Anda solitario. Se oculta en el follaje de las plantas. El canto se escucha tanto de día como de noche.
Alimentación
Friedmann (1927). Coleoptera. Lepidoptera (larvas).
Klimaitis (1993). Insectos (Tettigonidae).
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Chrysomelidae, Curculionidae, Elateridae). Hemiptera (Cicadidae, Pentatomidae). Lepidoptera (orugas). Mantodea (Mantidae). Orthoptera (Acridiidae, Gryllidae, Tettigonidae).

Voces La voz es un silbido bisilábico: Fie fii...fie fii...fie fii...
Straneck (*in litt*.).

HÁBITAT
Sabanas, montes, arboledas, selvas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos parasitados y/o pichones en Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Misiones, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N							N	N	N	N

Especie parásita.

Mogensen (1927). Observó un pichón en un nido de *Phacellodomus rufifrons* y una pareja de *Phacellodomus ruber* alimentando a un pichón.
Smyth (1928). Monteagudo, dpto. Simoca, Tucumán, 14-01-1923, huevo.
Pereyra (1938). Manchalá, dpto. Leales, Tucumán, P. Girard el 11 de noviembre localizó un huevo en un nido de *Synallaxis frontalis.*
Giai (1950). Noroeste de Santa Fe, en 1937, un pichón en nido de *Schoeniophylax phryganophila*



Höy (1968c). Salta, diciembre y enero parasitando a *Synallaxis frontalis.*
Contino (1980). No construye nido, pone un huevo por nido.
Salvador (1982). Villa María, dpto. Gral. San Martín, Córdoba, en la temporada 1980-81 se localizaron 8 nidos parasitados, 4 con huevos y 4 con pichones (11-11-1980, 04-01-1981, 04-01-1981, 11-01-1981, 24-01-1981, 02-02-1981, 02-02-1981, 10-02-1981) y 2 nidos parasitados, con un huevo (10-12-1980 y 11-12-1980) en Mar Chiquita, dpto. San Justo, Córdoba. Las especies parasitadas fueron: *Synallaxis albescens, Synallaxis frontalis y Schoeniophylax phryganophila*. Las posturas ocurrieron desde el 11 de noviembre al 10 de febrero.
Pautasso (2002). Reserva "El Pozo", dpto. La Capital, Santa Fe, 2 nidos parasitados: el 18-11-1999, un huevo en nido de *Synallaxis albescens* y el 20-12-1999, un pichón en nido de *Phacellodomus striaticollis.*
Babarskas et al. (2003). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, A. Bodrati observó un pichón alimentado por un adulto de Curutié rojizo (*Certhiaxis cinnamomea*) en enero de 2000.
Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, se registraron posturas entre noviembre y febrero. Las especies parasitadas fueron el Curutié rojizo (*Certhiaxis cinnamomea*) y el Pijuí de frente gris (*Synallaxis frontalis*).
Salvador (2011a). Dpto. Gral. San Martín, Córdoba, se localizaron 21 nidos parasitados. Pone de noviembre a febrero, un solo huevo por nido, solamente uno tenía dos. Las especies parasitadas fueron *Synallaxis albescens, Synallaxis frontalis y Schoeniophylax phryganophila.*
Salvador (2013a). Gral. San Martín, Córdoba, un pichón en un nido de Espinero chico (*Phacellodomus sibiletrix*).
De la Peña (2013c). Desde el 29-11-1976 hasta 06-02-2004, se encontraron 15 nidos parasitados, 11 nidos en Esperanza, 1 en Manucho, dpto. La Capital, Santa Fe y 3 en Monte Vera, dpto. La Capital, Santa Fe. Las especies parasitadas fueron 8: *Synallaxis frontalis, Synallaxis albescens, Synallaxis spixi, Phacellodomus striaticollis, Schoeniophylax phryganophila, Leptasthenura platensis, Certhiaxis cinnamomea, Asthenes baeri.* Tres nidos tenían 2 huevos de la especie parásita, los restantes uno.
Bodrati y Salvador (2015b). Parque Nacional Chaco, dpto. Sargento Cabral, Chaco, 27-11-1998, un pichón en un nido de *Cranioleuca pyrrhophia* y el 23-10-1997, un pichón en un nido de *Tolmomyias sulphurescens*. Parque Provincial Cruce Caballero, dpto. San Pedro, Misiones, 14-11-2011, un pichón en un nido de *Synallaxis ruficapilla*.
Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos "Pablo Girard", 4 huevos.

Huevos
Pone 1 ó 2 huevos por nido parasitado.
Elípticos, algunos ovoidales o cilíndricos. Blancos.



Medidas
Smyth (1928): 21,5 x 16
Pereyra (1938b): 21 x 16
Contino (1980): 20 x 15
Salvador (1982): 21, 4 a 22,8 x 15,8 a 17,1 X= 22,0 x 16,5 (N= 5)
Di Giacomo (2005h): 19,4 a 22,5 x 15,3 a 17,1 X= 21,0 x 16,1 (N= 16)
Salvador (2011a): 21,1 a 22,9 x 15,8 a 17,4 X= 21,8 x 16,6 (N= 18)
De la Peña (2013c). 18,2 a 24,3 x 12,8 a 17,9 X= 21,4 x 15,6 (N= 14)

Pesos
Di Giacomo (2005h): 2,3 a 3,2 X= 2,6 (N= 16)

Salvador (2011a): 3,0 a 3,8 X= 3,4 (N= 11)
De la Peña (2013c): 1,8 a 2,8 X= 2,16 (N= 3)
De la Peña (2013c): cáscaras 1,97 a 2,68 X= 0,205 (N= 14)

PICHONES

Descripción

Salvador (1982). Nacen desnudos y con los ojos cerrados. Piel rosada. Pico crema amarillento, parte interna de la boca amarilla-anaranjada. Al 5º día comienza a abrir los ojos. Tiene canutos en la cabeza, en el cuello, en el dorso, alas y costados del pecho. El 8º día ojos abiertos, pardo oscuros. Plumitas en el dorso, cabeza, alas y parte del pecho. El día 12º prácticamente todo el cuerpo cubierto de plumas. La cabeza, cuello dorsal, alas, dorso y cola están cubiertos de plumas pardo oscuras con la punta acanelada. La garganta, cuello ventral y parte superior del pecho están cubiertas de plumas acaneladas, con una barra transversal pardo oscura. Las plumas de la zona ventral son amarillentas.
De la Peña (2013c). Nacen implumes. Ojos cerrados. Piel rosada. Cavidad bucal, paladar y lengua, naranja-amarillentos.
1 día. Implume. Ojos cerrados. Tira la cabeza hacia atrás.
3 días. Materias fecales líquidas, de color marrón.
5 días. Escasas vainas (sin plumón). Apenas se notan las vainas de las plumas de la cola.
Vivaracho. Eleva el cuello y la cabeza. Eriza las plumas de la cabeza y dorso.
Materias fecales líquidas, marrones (como los pichones de *Coccyzus melacoryphus*)
6 días. Abre los ojos marrones. Tira picotazos.
8 días. Plumitas en la cabeza y dorsalmente canelas. Lados del pecho acanelado.
Flancos blanquecinos. Aparecen las láminas en las plumas primarias. Las láminas de las secundarias son más grandes.
12 días. Grita fuerte. El plumaje se parece al del adulto.
13 días. Comisura amarillenta. Mandíbula clara. Maxilar oscuro.
Plumas malares oscuras. Garganta acanelada.
15-16 días. Dejan el nido.

MEDIDAS

Días de vida	Medidas						
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias	Cola
				Vaina o cañón	Lámina	Lámina	Total
1	0,3	0,7-1,1	1,1-1,6				
3	0,5	1,1-1,4	1,5-2,0				
5				0,3			0,2
6	0,6	1,7	2,0	0,5			0,3
8				1,0	0,1-0,2	0,3-0,4	0,7
10				1,2	0,5		2,0
12				1,4	1,1		2,0
13							3,0

Observaciones

Hartert y Venturi (1909). Dos pichones en nido de *Certhiaxis cinnamomea*.
López Lanús (1997). Parque Nacional Pilcomayo, dpto. Pilcomayo, Formosa, 09-02-1992, pichón en nido de *Certhiaxis cinnamomea.*

Generalidades

Salvador (1982). El período de incubación es de 15-16 días. Los pichones abandonan el nido a los 16-18 días.
Di Giacomo (2005h). El período de incubación es de 15 ó 16 días. El pichón permanece en el nido entre 16 y 18 días.

De la Peña (2013c). Período de incubación15-16 días. Permanencia de los pichones en el nido 16-17 días. En dos nidos estudiados, Curutié colorado (*Certhiaxis cinnamomea*) y Chotoy (*Schoeniophylax prhyganophila*) dejaron el nido por la boca de entrada. Esta medía unos 4 cm. de diámetro.

Más información:
Salvador (1982). De la Peña (2013c). Lowther (2010)

Otros
Antoniazzi et al. (2011); Bodrati en Salvador y Bodrati (2013a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*


Esperanza. Santa Fe. 05-01-2003. Pichón de 10 días


Esperanza. Santa Fe. 15-01-2012


Esperanza. Santa Fe. 30-01-2006. Pichón de 10 días.


Esperanza. Santa Fe. 24-11-2015

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Copete. Cejas blanquecinas. Cubiertas alares con manchas oscuras y canelas. Cola larga. El canto.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Tapera naevia naevia (Linnaeus, 1766) desde el norte del país hasta Mendoza, La Pampa y Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Extenso rango de distribución desde el sur de Méjico hasta Argentina. Comprende: Méjico, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Tapera naevia naevia (Linnaeus, 1766)

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Darrieu y Camperi (2001a); Dean (1971); Klimaitis (1975, 1975b); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Bodrati et al. (2006b); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Soave et al. (1999)

Catamarca
Citas: Alabarce et al. (1990); Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009)

Observaciones: De la Peña (San Fernando del Valle de Catamarca, dpto. Capital, 13-03-1981)

Chaco
Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Bodrati y Salvador (2015b); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004); Salvador y Bodrati (2013a)

Córdoba
Citas: Castellanos (1932); Dardanelli et al. (2006); Heredia (2006); Nores et al. (1983); Nores (1996); Salvador (1982, 1983, 2013d); Sferco y Nores (2003); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Morteros, dpto. San Justo, 02-11-1990)

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b, 1983a); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Ordano et al. (2008)

Observaciones: De la Peña (Mburucuyá, dpto. Mburucuyá 19-09-1979)



Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Baliño y Biole (1984); Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2002); Muzzachiodi et al. (2003); Raffo et al. (2008); Straneck (1990c); Zapata (1975, 1977)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c);Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Fiora (1933) Malizia et al. (2005); Moschione y Segovia (2005)

La Pampa
Citas: Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Tejerina et al. (2006)

La Rioja
Citas: Capurro y Bucher (1986); Harward (1967)

Mendoza
Citas: Lucero (2013f); Mezquida (2001b)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b); Bodrati y Salvador (2015b); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Giai (1950); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Höy (1968); Malizia et al. (2005); Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Haene (1994); Lucero (2013f, 2013i)

San Luis
Citas: Masramón (1983); Nellar Romanella (1993)

Observaciones: De la Peña (Merlo, dpto. Junín, 19-11-1997)

Santa Fe
Citas: Beltzer (1986c); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009); Rossetti y Giraudo (2003)

Santiago del Estero
Citas: Codesido y Bilenca (2000); Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas:Alabarce y Antelo (2000); Antelo y Brandán Fernández (2013); Antelo et al. (2013); Brandán y Navarro (2009); Fanjul (2010); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Mogensen (1927); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz y Aráoz (2014); Vides Almonacid (1993)

YASIYATERÉ GRANDE *Dromococcyx phasianellus* (Spix, 1824)

Otros nombres: Cuclillo faisán. Cuco faisán. Yasiyateré faisán.

DESCRIPCIÓN
Largo: 35-36 cm.
Coloración. Mandíbula grisácea, maxilar superior pardo. Anillo ocular amarillo-verdoso. Patas pardo-grisáceas. Iris pardo.

Corona y cresta castañas. Línea posocular blanquecina. Parte dorsal parda oscura con reflejos purpúreos, con las plumas orilladas de ocre. Garganta, cuello y pecho ocráceos moteados de pardo oscuro. Resto de la zona ventral blanco.
Alas pardas con lunares blancos en las primarias. Cubiertas alares y secundarias pardas orilladas de ocráceo.
Supracaudales pardas con ápice blanco, muy largas.
Cola parda oscura con ápice y margen blancos. Ventralmente es parda grisácea con manchas blancas.



COMPORTAMIENTO
Anda solitario por el suelo o en la parte baja de la vegetación.

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto se parece al del Crespín pero completado con un trino final: Fie fii prrrrí fie fii prrrrí.

HÁBITAT
Selvas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Ihering (1924). Payne (1997). Sick (1953). Lowther (2010)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Copete castaño. Línea ocular blanquecina. Cuello y pecho con puntos oscuros. Cola larga, ancha y escalonada. Ventralmente, la cola con manchas blancas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Dromococcyx phasianellus (Spix, 1824) en Misiones y este de Formosa.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Extensa área de distribución en Centro América y Sud América, llegando hasta el noreste de Argentina. Comprende: Méjico, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Formosa
Citas: Contreras et al. (2014); Gorleri et al. (2011)

Misiones
Citas: Bertoni (1913); Bodrati et al. (2010b); Chebez (1992e, 1994, 1996a); Dabbene (1910); Navas y Bó (1993)

YASIYATERÉ CHICO *Dromococcyx pavoninus* Pelzel, 1870

Otros nombres: Cuclillo pavón. Cuco pavón. Yasiyateré pavón.



DESCRIPCIÓN
Largo: 25-28 cm.
Coloración. Mandíbula amarillenta, maxilar superior pardo. Patas grises. Iris pardo.
Corona y copete, pardos. Línea postocular ocrácea. Parte dorsal parda oscura, con las plumas orilladas de blanco. Garganta blanquecina. Cuello y pecho grises con tinte ocráceo. Resto de la parte ventral blanco.
Alas pardas con mancha blanca en la barba interna de las primarias y ápice blanco. Cubiertas alares pardas oscuras orilladas de blanquecino.
Cola parda con punta blanca. Ventralmente es parda grisácea con lunares blancos.

COMPORTAMIENTO

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto es parecido al del Crespín, pero con tres notas más al final: Fie fii fififi...fie fii fififi.

HÁBITAT
Selvas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Neunteufel (1951). Payne (1997). Lowther (2009)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Copete castaño. Línea ocular ocrácea. Cuello y pecho uniformes. Cola larga, ventralmente tiene manchas blancas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Dromococcyx pavoninus Pelzel, 1870 en Misiones y Corrientes.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Se encuentra en Sud América con varias poblaciones separadas que comprenden: Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Corrientes
Citas: Darrieu y Martínez (1984); Giraudo et al. (2006)

Misiones
Citas: Bertoni (1913); Bodrati et al. (2010b); Contreras et al. (1994b); Chebez (1992, 1996a); Dabbene (1910); Giai (1950, 1951); Krauczuk (2009);Martínez Gamba (2014); Navas y Bó (1993); Straneck (1990h)

ORDEN: STRIGIFORMES

LECHUZA DE CAMPANARIO

FAMILIA: TYTONIDAE

Aves de hábitos nocturnos.

El pico es curvo, ganchudo. Se alimentan de reptiles, roedores, pequeños mamíferos e insectos.

Las patas son largas, cubiertas de plumas hasta los dedos. La uña del dedo medio tiene un borde que semeja un peine.

Frecuentan principalmente construcciones en áreas rurales y poblaciones humanas.

Se alimenta de ratones, ratas, lauchas, anfibios, aves, murciélagos.

Frecuentan principalmente construcciones en áreas rurales, huecos en árboles y poblaciones humanas.

LECHUZA DE CAMPANARIO *Tyto alba* (Scopoli, 1769)

Otros nombres: Búho. Búho blanco. Búho de los graneros. Búho dormilón. Búho fantasma. Campanario. Col-col. Dormilón. Lechuza. Lechuza blanca. Lechuza bodeguera. Lechuza común. Lechuza de galpón. Lechuza de iglesia. Lechuza de las torres. Lechuza de los campanarios. Lechuza del galpón. Lechuza pericotera. Lechuzón. Lechuzón blanco. Lechuzón de las parvas. Lechuzón de los galpones. Lechuzón de pozo. Lechuzón galponero. Pericote. Pericotera. Rata. Suindá. Suindará.

DESCRIPCIÓN
Largo: 45 cm.
Peso: Contreras (1975): N= 2 (?) 275 y 341 g; Contino (1980): 320,0 g; Salvador (1988): N= 1 (?) 360,0 g; Christie et al. (2004): N=1 (H) 275 g; Salvador (2014a): N= 5 (M) X= 327,8 g (Rango 318 a 341); N= 7 (H) X= 374,1 g (Rango 338 a 418)
Coloración. Tarsos emplumados. Iris pardo.
Dorso gris ocráceo, moteado de blanco. Cara blanca con margen oscuro en la parte inferior y ocre intenso en la superior. Castaño alrededor de los ojos. Garganta blanca. Ventral ocrácea blanquecina con motas pardas. Las alas y la cola son color ocre intenso con bandas y salpicaduras pardas oscuras. Cubiertas alares igual al dorso.
La cola es como la parte dorsal, pero con barras angostas oscuras.
Se conoce una fase rojiza.

COMPORTAMIENTO
Es de hábitos nocturnos. Puede andar solitaria o en pareja. Durante el día permanece inmóvil en lugares sombríos. Al ser molestada balancea el cuerpo lateralmente o realiza movimientos con la cabeza inclinándola hacia abajo.

Alimentación
Zotta (1934). Roedores.
Humphrey et al. (1970). Coleópteros.
Contino (1980). Murciélagos, marmosas. Aves.

Justo y De Santis (1982). **Mamíferos:** *Akodon azarae, Thylamys pusilla, Graomys griseoflavus, Eligmodontia typus, Calomys* sp*., Reithrodon auritus.***Aves:***Zonotrichia capensis, Sicalis flaveola, Pseudoleistes* sp*.*
Massoia (1983). **Mamíferos:** *Scapteromys aquaticus, Olygoryzomys flavescens, Deltamys kempi, Marmosa agilis, Oligoryzomys delticola, Holochilus brasiliensis, Akodon azarae, Oxymycterus rufus, Molossus major, Tadarida brasiliensis, Bibimys torresi, Cavia aperea, Lutreolina crassicaudata, Calomys* sp*., Cabreramys temchuki, Mus musculus, Bibimys* sp*., Rattus rattus.* **Aves:***Nothura maculosa*, otras no determinadas.
Montalvo et al. (1985). **Mamíferos:** Akodon molinae, *Graomys griseoflavus, Galea musteloides, Eligmodontia typus, Ctenomys* sp*., Reithrodon auritus, Thylamys pusilla, Tadarida brasiliensis, Microcavia australis*. **Aves:** no determinadas.
Massoia y Vetrano (1988a). **Mamíferos:***Akodon molinae, Graomys griseoflavus, Eligmodontia typus, Ctenomys mendocinus, Calomys musculinus, Reithrodon auritus, Thylamys* sp*., Rattus rattus,* Olygoryzomys longicaudatus*, Mus sp.***Insectos:** Acridiidae (*Dichroplus* sp.). Batrachia, Blattidae, Gryllidae, Mantidae, Rutilidae(*Pelidnora* sp.). Scarabaeidae, (*Scaptophilu*s sp.). (*Botrymus* sp.). (*Ligyrus* sp.).Cicadidae,Carabidae, Coccinellidae (*Coccinella ancoralis*). Coleoptera. **Arácnidos.**
Massoia y Vetrano (1988b). **Mamíferos:** *Akodon azarae,* Akodon molinae, *Reithrodon auritus, Olygoryzomys flavescens, Mus sp., Calomys sp.* **Insectos:** Orthoptera (Acridiidae). Coleoptera (Curculionidae). Homoptera (Cicadidae). Orthoptera (Phasmidae) (Proscopidae). **Moluscos**:Gasteropoda. **Aves:** no determinadas.
Massoia (1988b). **Mamíferos:** *Akodon cursor, Euryzygomatomys spinosus, Calomys tener, Cavia aperea, Nectomys squamipes, Necromys* sp*., Monodelphis sorex, Micoureus paraguayanus, Holochilus brasiliensis, Sooretamys angouya, Rattus rattus, Olygoryzomys nigripes, Olygoryzomys flavescens, Oxymycterus misionalis,Thaptomys nigrita*. **Insectos:** Scarabaeidae, Proscopidae, Elateridae (*Pyroporus* sp.). Coleoptera. **Aves:** indeterminadas. **Anfibios:** indeterminados.
Massoia et al. (1988c). **Mamíferos:** *Necromys temchuki, Olygoryzomys nigripes, Rattus rattus, Akodon cursor, Olygoryzomys flavescens, Mus musculus, Cryptonanus chacoensis, Holochilus brasiliensis, Calomys laucha.*
Massoia (1988f). **Mamíferos:** *Calomys callosus, Calomys musculinus, Galea musteloides, Graomys griseoflavus, Holochilus chacarius, Necromys lactens, Necromys temchuki, Rattus* sp*., Thylamys* sp*., Olygoryzomys* sp *.***Aves:** indeterminadas.
Massoia (1988g). **Mamíferos:** *Akodon azarae, Holochilus brasiliensis, Rattus norvegicus, Reithrodon auritus, Calomys musculinus, Cavia aperea, Ctenomys talarum, Mus musculus,Olygoryzomys flavescens, Lepus europaeus.***Aves:** indeterminadas.
Massoia (1988k). **Mamíferos:** *Akodon azarae, Holochilus brasiliensis, Felis catus, Cavia aperea, Calomys musculinus,Rattus rattus, Olygoryzomys flavescens.* **Aves:** *Columbina picui, Guira guira, Zenaida auriculata.* **Anfibios:***Leptodactylus* sp.
Massoia & Pardiñas (1988d). **Mamíferos:** *Akodon molinae,Calomys musculinus, Ctenomys talarum, Eligmodontia typus, Galea musteloides, Graomys griseoflavus, Thylamys* sp.**Aves:** indeterminadas.
Massoia et al. (1988a). **Mamíferos:** *Calomys callosus, Eumops bonariensis, Holochilus brasiliensis, Molossus ater, Necromys temchuki, Olygoryzomys flavescens, Oxymycterus rufus, Scapteromys aquaticus, Thylamys sp.* **Aves:** indeterminadas.
Massoia (1989). **Mamíferos:** *Akodon azarae,Molossus molossus, Lutreolina crassicaudata*, *Lasiurus* sp*., Holochilus brasiliensis, Cavia aperea, Calomys* sp*., Rattus rattus, Olygoryzomys flavescens.* **Aves:** *Columba livia, otras no determinadas.*
De Santis y Pagnoni (1989). **Mamíferos:** *Eligmodontia typus, Graomys griseoflavus, Reithrodon auritus, Akodon molinae, Akodon iniscatus,Akodon nucus, Microcavia australi, Ctenomys* sp*.,Thylamys pusilla, Marmosa pusilla.* **Aves:**Mimidae, Emberizidae, Icteridae, Tyrannidae, Furnariidae. **Reptiles:** Iguanidae.
Massoia et al. (1989b). **Mamíferos:** *Akodon cursor*, *Calomys laucha, Holochilus brasiliensis, Eumops bonariensis, Diaemus youngii, Cavia aperea, Euryzygomatomys spinosus, Olygoryzomys* sp*., Monodelphis sp., Necromys temchuki,Molossus ater*, *Lasiurus borealis, Sooretamys angouya, Rattus rattus, Thylamys* sp*.* **Aves:** Passeriformes no determinados.
Massoia et al. (1989a). **Mamíferos:** *Akodon cursor,Holochilus brasiliensis, Euryzygomatomys spinosus, Cavia aperea, Lasiurus borealis,Lutreolina crassicaudata,Molossus ater, Necromys temchuki, Micoureus*

paraguayanus, Olygoryzomys chacoensis, Nectomys squamipes,Nyctinomops laticaudatus, Olygoryzomys flavescens, Olygoryzomys nigripes, Rattus rattus, Sylvilagus brasiliensis, Sooretamys angouya, Thylamys sp.
Massoia et al. (1989c). **Mamíferos:** *Akodon cursor, Lutreolina crassicaudata, Lasiurus borealis, Holochilus brasiliensis, Cryptonanus chacoensis, Cavia aperea, Necromys temchuki, Myotis nigricans, Mus musculus, Monodelphis sorex, Molossus molossus, Molossus ater, Olygoryzomys nigripes, Oxymycterus misionalis, Olygoryzomys flavescens, Nectomys squamipes, Sturnira lilium, Rattus rattus.*
Massoia et al. (1989d). **Mamíferos:** *Olygoryzomys flavescens, Olygoryzomys nigripes, Holochilus brasiliensis, Akodon azarae, Cryptonanus chacoensis, Scapteromys aquaticus, Deltamys kempi, Bibimys torresi, Oxymycterus rufus, Dasypterus ega, Eumops bonariensis, Rattus rattus.*
Massoia y Pardiñas (1989). **Mamíferos:** *Akodon azarae*, *Olygoryzomys flavescens, Calomis laucha, Calomys musculinus, Hilochilus brasiliensis, Tadarida brasiliensis, Lutreolina crassicaudata, Cavia aperea.* Anfibios y aves no determinadas.
Massoia (1990b). **Mamíferos:** *Akodon azarae, Reithrodon auritus, Oxymycterus rufus, Olygoryzomys flavescens, Holochilus brasiliensis, Ctenomys talarum, Cavia aperea, Calomys laucha.***Aves:** Furnariidae.
Massoia et al. (1990). **Mamíferos:** *Akodon azarae, Lutreolina crassicaudata, Holochilus brasiliensis, Eumops perotis, Cryptonanus chacoensis, Cavia aperea, Calomys callosus, Rattus rattus, Oxymycterus rufus, Olygoryzomys flavescens, Necromys temchuki, Molossus molossus, Molossus ater, Scapteromys aquaticus, Rattus* sp. **Anfibios y aves:** no determinados.
Nores y Gutiérrez (1990). **Mamíferos:** Akodon sp., *Microcavia australis.*
Morici (1990a). **Aves:** *Agelaioides badius, Annumbius annumbi, Carduelis magellanica,Columbina picui, Mimus saturninus, Sicalis flaveola, Sturnella superciliaris, Troglodytes aedon, Zenaida auriculata, Zonotrichia capensis, Columba livia.*
Morici (1990b). **Aves:** *Nothura maculosa, Sicalis flaveola, Agelaioides badius, Carduelis magellanica, Zonotrichia capensis, Molothrus rufoaxillaris.*
Bellocq (1990). **Mamíferos:** *Akodon azarae, Rattus sp., Olygoryzomys flavescens, Cavia aperea, Calomys laucha, Calomys musculinus, Reithrodon* sp. **Reptiles. Aves. Insectos.**
Noriega et al. (1990). **Aves:** *Agriornis microptera, Diuca diuca, Geositta cunicularia, Mimus patagonicus,Molothrus bonariensis, Zonotrichia capensis, Phrygilus gayi, Phrygilus fruticeti.*
Tiranti (1992). **Mamíferos:** *Akodon azarae,Akodon molinae,Eptesicus furinalis, Eligmodontia typus, Ctenomys* sp*., Calomys* sp.*,Teius oculatus, Olygoryzomys flavescens, Graomys griseoflavus, Galea musteloides, Reithrodon auritus, Thylamys pusilla*. Aves. Reptiles. Insectos.
Noriega et al. (1993).**Aves:** *Zonotrichia capensis, Diuca diuca, Phrygilus fruticeti, Mimus patagonicus, Cinclodes fuscus, Synallaxis albescens, Leptasthenura* sp*., Zenaida auriculata, Upucerthia dumetaria,Progne elegans, Pseudoseisura lophotes.*
De Santis et al. (1993). **Mamíferos:** *Abrothrix olivaceusChelemys macronyx, Reithrodon auritus, Olygoryzomys longicaudatus, Mus musculus, Geoxus valdivianus, Eligmodontia typus.* **Aves:** *Sturnella loyca, Zonotrichia capensis.*
Massoia et al. (1994c). **Mamíferos:***Akodon azarae, Akodon molinae, Holochilus brasiliensis, Histiotus montanus, Galea musteloides, Didelphis albiventris, Ctenomys* sp*., Calomys musculinus, Necromys benefactus, Mus musculus, Monodelphis dimidiata, Lepus europaeus, Lagostomus maximus, Thylamys* sp*., Tadarida brasiliensis, Rattus rattus, Phyllotis xanthopygus, Oxymycterus rufus, Olygoryzomys flavescens.*
Massoia et al. (1997c). **Mamíferos:***Akodon molinae, Calomys* sp*., Ctenomys talarum, Chlamyphorus truncatus, Eligmodontia typus, Olygoryzomys* sp.,*Lepus europaeus*, *Graomys griseoflavus, Rattus rattus, Thylamys* sp*.* **Anfibios:** indeterminados.
Diéguez y Corbella (1997). **Aves:** *Patagioenas picazuro, Pitangus sulphuratus, Sicalis flaveola, Zonotrichia capensis.*
Diéguez y Méndez (1997). **Aves:** *Molotrhus bonariensis*, *Progne* sp., *Columba* sp., Emberizidae, Furnariidae.
Travaini et al. (1997). **Mamíferos:** *Akodon* sp*., Euneomys* sp*., Eligmodontia typus, Chelemys macronyx, Ctenomys haigi, Calomys musculinus, Microcavia australis, Loxodontomys micropus, Irenomys tarsalis, Geoxus valdivianus, Galea musteloides, Reithrodon auritus, Thylamys pusilla, Phyllotis xanthopygus, Olygoryzomys longicaudatus, Oryctolagus cuniculus.* Aves. Anfibios. Insectos.

Pardiñas y Galliari (1998). **Mamíferos:** *Notiomys edwardsii*
Massoia et al. (1999b). **Mamíferos:** *Akodon azarae, Holochilus chacarius, Chrotopterus auritus, Cryptonanus chacoensis, Cavia aperea, Calomys callosus, Bibimys chacoensis, Scapteromys aquaticus, Pseudoryzomys simplex, Olygoryzomys fornesi.* **Aves:** no determinadas.
Massoia et al. (1999a). **Mamíferos:** *Graomys griseoflavus, Olygoryzomys chacoensis, Calomys musculinus, Thylamys elegans, Akodon varius, Necromys* sp., *Galea musteloides, Eligmodontia typus, Ctenomys sp.*
Pillado y Trejo (2000). **Mamíferos:***Abrothrix longipilis,Abrothrix olivaceus, Phyllotis xanthopygus, Reithrodon auritus, Lepus europaeus, Irenomys tarsalis, Euneomys chinchilloides, Eligmodontia morgani, Ctenomys haigi, Loxodontomys micropus, Oligoryzomys longicaudus.* **Insectos:** Coleopteros.
De la Peña (2001). **Mamíferos:** Laucha. **Aves:** *Pitangus sulphuratus*
Teta y Andrade (2002). **Mamíferos:** *Abrothrix longipilis,Abrothrix olivaceus, Notiomys edwardsii, Microcavia australis, Histiotus montanus, Euneomys chinchilloides, Eligmodontia* sp.*, Chelemys macronyx, Ctenomys* sp.*, Lestodelphys halli, Phyllotis xanthopygus, Reithrodon auritus.*
Trejo y Ojeda (2004). **Mamíferos:** *Abrothrix longipilis, Akodon olivaceus, Chelemysmacronyx, Eligmodontia morgani, Euneomys* sp., Geoxus valdivianus, Lexodontomys micropus, Oligoryzomys longicaudus, *Phyllotis xanthopygus, Reithrodon auritus.* **Aves***: Aphrastura spinicauda*.
Christie et al. (2004)Roedores
Trejo y Lambertucci (2007). **Mamíferos:** *Lestodelphys halli,Thylamys sp., Dromiciops gliroides, Histiotus montanus, Tadarida brasiliensis, Abrothrix longipilis, Abrothrix olivaceus, Akodon sp., Akodon iniscatus, Akodon molinae, Chelemys macronyx, Geoxus valdivianus, Notiomys edwardsii, Calomys musculinus, Eligmodontia sp.,Euneomys sp., Graomys griseoflavus, Irenomys tarsalis, Loxodontomys micropus, Phyllotis xanthopygus, Reithrodon auritus, Oligoryzomys longicaudatus, Galea musteloides,Microcavia australis, Ctenomys sp., Lepus europeaus, Oryctolagus cuniculus.* **Aves:** Columbidae, Mimidae, Emberizidae, Icteridae, Tyrannidae, Furnariidae. Reptiles. Anfibios. Insectos.
Fernández et al. (2009).**Mamíferos:** *Calomys* cf. *C. laucha-C. musculinus, Holochilus brasiliensis, Oligoryzomys flavescens, Akodon azarae, Rattus rattus, Mus musculus.* **Aves:** *Zonotrichia capensis, Sicalis* sp., *Molothrus bonariensis,* Charadriidae indeterminados. **Anfibios:** *Leptodactylus ocellatus, Leptodactylus* cf. *L. latinasus, Hypsiboas pulchellus.* **Insectos:** Coleoptera, *Heterogomphus pauson, Cyclocephala* sp., *Nezada viridula.*
Gómez et al. (2012). Mamíferos: *Thylamys* sp., *Akodon caenosus, Akodon dolores, Akodon simulator, Akodon spegazzinii, Calomys* cf. *C. fecundus/venustus, Calomys* cf. *C.laucha/musculinus, Graomys centralis, Holochilus chacarius, Necromys lasiurus, Oligoryzomys* cf. *O. flavescens, Oligoryzomys* sp., *Rattus* sp., *Ctenomys* sp., *Galea leucoblephara, Microcavia australis.*
Nanni et al. (2012). **Mamíferos:** *Akodon dolores, Necromys lasiurus, Oligoryzomys* sp., *Oligoryzomys* cf. *O.flavescens, Calomys* cf. *C.laucha/musculinus, Calomys* cf. *C.fecundus/venustus, Graomys chacoensis, Ctenomys* sp., *Galea leucoblephara, Thylamys* sp.**Aves. Insectos:**Hemiptera. Coleoptera. Hymenoptera.
Solaro et al. (2012). **Mamíferos:** *Oligoryzomys flavescens, Calomys* sp., *Eligmodontia* sp., *Ctenomys* sp. (juveniles).*Ctenomys* sp. (adultos).*Akodon azarae, Akodon molinae, Necromys benefactus, Graomys griseoflavus, Reithrodon auritus, Thylamys* sp. **Aves:** *Molothrus* sp. **Insectos:** Mantidae. Scarabaeidae.
Torregiani et al. (2015). **Mamíferos:** *Cavia aperea, Akodon azarae, Oligoryzomys flavescens, Rattus* spp. **Aves:** Icteridae.

Más información:
Amela García et al. (1990), Bellocq and Kravetz (1994), De Santis et al. (1983, 1991), García Esponda et al. (1998), Leveau et al. (2006), Leveau y Leveau (2004), Massoia (1979, 1987, 1990b), Massoia et al. (1989e), Massoia y Fornés (1966), Massoia y Pardiñas (1988d, 1989), Pardiñas et al. (2005a, 2005b), Quintana (2015), Romano et al. (2002), Sahores y Trejo (2004), Soncini et al. (1985), Sosa et al. (1993), Trejo et al. (2005a), Tiranti (1994).

Voces
Straneck (*in litt*.). La voz es un fuerte chistido: Tchshhht, que repite esporádicamente. En el período de reproducción suele repetir un agudo Clicliclicli.

HÁBITAT
Arboledas, palmares, áreas urbanas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Misiones, Santiago del Estero, San Luis, Mendoza, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Neuquén, Chubut.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

En huecos en edificios (cumbreras, cielorrasos), plataformas, oquedades, grietas, cajones, tarros, caños, muebles abandonados, huecos en árboles o sobre el piso de torres, balcones, galpones, en silos (sobre comida de animales o granos). Barrancas.
Oculto. Poco elaborado o rudimentario. Plataforma de palitos. También huevos puestos directamente sobre ladrillos y tierra.

Sainz-Trápaga (*in litt.*). Puerto Madryn, dpto. Biedma, Chubut, 30-12-2014, nido en una cueva sobre un cañadón que baja a la costa, a 100 m del agua en pleamar. Altura 4 m. Pichones.
Salvador y Salvador (en prep.). Dpto. San Martín, Córdoba, se hallaron 10 nidos, posturas entre febrero y noviembre, ubicados en huecos en barrancas sobre el Río Tercero, sobre tirantes en galpones, entre fardos de alfalfa o en casas abandonadas, entre 3 y 6,5 m de altura (X= 4,1). Ponen de 3 a 6 huevos (X= 4,6).
Salvador (*in litt*.). Sachayoj, dpto. Alberdi, Santiago del Estero, 25-04-1996, nido en un hueco en un viejo pozo de agua, a un metro por debajo del nivel del suelo, con 4 huevos.
Pereyra (1931a). San Rafael, dpto. San Rafael, Mendoza, abril, 2 pichones nacidos en un hueco en una bodega.
Pereyra (1937b). Nidos en mayo y en julio en Mendoza y en Buenos Aires.
Contreras (1977b). Valle del río Collón Curá, Neuquén, nidifica entre octubre y noviembre.
Fraga (1984c). Estancia La Candelaria, pdo. Lobos, Buenos Aires, 4 nidos: 25-02-1973, dentro de una torre en la casa, nido con 9 huevos; 01-06-1973, cavidad natural en la parte superior de una palmera, 4 pichones; 24-05-1976, en el mismo lugar del primer nido, 4 huevos y el 14-05-1979, en el mismo lugar del segundo nido, 3 pichones.
Fraga (1984c). Pronunciamiento, dpto. Uruguay, Entre Ríos, (Narosky y Zelich, com. pers.). 03-08-1969, nido con 5 pichones, otro en octubre con huevos y otro en diciembre con pichones.
Nores y Gutiérrez (1986). 6 km al suroeste de la ciudad de Córdoba, observaciones de nidos en los años 1981-82-83-84-85, realiza dos períodos de nidificación en el año, uno en otoño y otro en primavera. Estudiaron 7 nidos, 6 en galpones y uno en una palmera. Las posturas variaron de 2 a 6 huevos. Fechas de postura en marzo-abril y octubre-noviembre.
Nores y Gutiérrez (1986). En el Río Segundo, Córdoba, M. Nores y D. Yzurieta, observaron el 26-11-1975, entre 8 y 10 nidos.
Nellar Ramonella (1993). Nidifica en barrancas y edificios.
Bellocq y Kravetz (1993). Diego Gaynor, pdo. San Andrés de Giles, Buenos Aires, 1985 y 1986, nidos en un tanque de un molino en desuso. En 1987 a 1989, 5 nidos en nidos artificiales.
Tallade et al. (1998). Reserva Parque Luro, dpto. Toay, La Pampa, diciembre 1997 a julio 1998, nido en una casilla rural abandonada.
Maceda et al. (2001). Reserva Provincial Parque Luro, dpto. Toay, La Pampa, nidifica.



Babarskas et al. (2003). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, un nido con huevos en abril y otro con pichones en marzo.
Cockle et al. (2011). San Pedro-Tobuna, dpto. San Pedro, Misiones, agosto a diciembre de 2006-2008, nido en hueco de árbol.
De la Peña (2013c). Desde el 05-07-1970 a 20-06-13 se localizaron 17 nidos. El 06-02-2010, en Humboldt, dpto. Las Colonias, Santa Fe, un nido con 11 huevos, en un silo con alimentos para gallinas. El diámetro de los nidos es de 15 a 22 cm. Nido más bajo a 0,60 cm y el más alto a 20 m.
Segura et al (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos "Ronald Runnacles", 2 nidos.

HUEVOS
Pone 4 ó 5 huevos. A veces más. Un nido con 11.
Ovoidales. De color blanquecino o grisáceo.

Medidas
Salvador y Salvador (en prep.): 38,6 a 45,4 x 31,8 a 34,1 X= 42,36 x 32,98 (N= 21)
Salvador (*in litt*.): 38,6 a 39,6 x 32,6 a 33,2 X= 38,98 x 33,10 (N= 4)
De la Peña (2013c): 39,2 a 41,5 x 29 a 33,2 X= 40,2 x 31,3 (N= 10)

Pesos
Salvador y Salvador (en prep.): 22 a 25,5 gr X= 23,2 (N= 18)
Salvador (*in litt*.): 21 a 22 gr X= 21,5 (N= 4)
De la Peña (2013c): 22,2 a 23,2 X= 22,7 (N= 4)
De la Peña (2013c): cáscaras 1,250 a 2,040 X= 1,300 (N= 10)

PICHONES
Descripción
Nores y Gutiérrez (1986). Los pichones nacen con los ojos cerrados. Piel rosada. Al final de la segunda semana comienza a marcarse el disco facial, formado por plumas blancas que se disponen de una manera más compacta. En la tercera semana el pico y las garras se endurecen y la piel del rostro presenta un color violáceo oscuro alrededor de los ojos. El disco facial está marcado pero aún incompleto y hacia el final de la tercera semana aparecen plumas color canela, ubicadas detrás de las blancas. El cuerpo está totalmente cubierto por un largo y espeso plumón. En la cuarta semana, el disco facial se completa y las plumas canela se hacen más evidentes. Poco a poco va desapareciendo el plumón, quedando en la novena semana en la cabeza y en la parte ventral y las remeras están muy desarrolladas. En la décima semana de vida hay una pérdida total del plumón. En la onceava semana, el plumaje es similar al del adulto. En las semanas 12-14 abandonan definitivamente el nido.
De la Peña (2013c). Nacen con el cuerpo cubierto de plumón blanco.

Generalidades
Nores y Gutiérrez (1986). El período de incubación es de 32 a 34 días. Los pichones permanecen en el nido entre 60 y 68 días.
Fraga (1984c). Pone los huevos en días alternos.

Más información:
Nores y Gutiérrez (1986). Bellocq y Kravetz (1993). De la Peña (2013c)

Depredadores
De adultos: *Bubo magellanicus* (Miatello et al. 1999), *Caracara plancus* (Vargas et al. 2007), (Idoeta y Roesler 2012)



Colonia Belgrano. Santa Fe. 23-07-2007



Esperanza. Santa Fe. 15-04-2013



Esperanza. Santa Fe. 14-04-2008
Ubicación de nido en silo



Esperanza. Santa Fe. 31-03-2008



Humboldt. Santa Fe. 06-02-2010. Incubando



Humboldt. Santa Fe. 06-02-2010 Ubicación de nido en silo



Esperanza. Santa Fe. 31-03-2008. Egagrópilas



Esperanza. Santa Fe. 09-04-2008



Humboldt. Santa Fe. 16-03-2010. Incubando 11 huevos

Otros

Chiale y Pagano (2014). Un ejemplar con Leucismo parcial.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño grande. Nocturna. Chillido fuerte. Ventral blanca. Discos faciales blancos que semejan un corazón. Patas largas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Tyto alba tuidara (J. E. Gray, 1829) en todo el país, incluso islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Veintiocho subespecies. En todo el mundo. Nidifica en muchas islas y en los 5 continentes.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS



Tyto alba tuidara (J. E. Gray, 1829)

Buenos Aires
Citas: Amela García et al. (1990); Babarskas et al. (2003); Bellocq (1990, 1993); Bellocq y Kravetz (1983, 1994); Bodrati et al. (2006b); Castro y Cicchino (1992); Cavicchia y García (2012); Chiale y Pagano (2014); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Diéguez y Méndez (1997); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fernández et al. (2009); Fiameni (1994); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis (1975b); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Leveau et al. (2004, 2006); Lucero (1982); Lucero et al. (2011); Marelli (1933); Massoia (1988g, 1988k, 1989, 1990b); Massoia y Pardiñas (1989); Massoia et al. (1994c, 1989d); Mérida y Bodtati (2006); Morici (1990a, 2012); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Straneck (1990b); Torregiani et al. (2015); Zapata (1998)

Catamarca
Citas: Carma (2009)

Chaco
Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Contreras et al. (1990b); Chatellenaz (2005a); Massoia et al. (1995, 1999b); Moschione y Bishels (2004)

Chubut
Citas: De Santis et al. (1991, 1993); De Santis y Pagnoni (1989); García Esponda et al. (1998); Sainz-Trápaga (2014);
Teta y Andrade (2002); Vidoz (1995)

Córdoba
Citas: Baldo y Ordano (1993); Castellanos (1932); De la Peña (2013c); Diéguez y Corbella (1997); Haro y Gutierrez (1992); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Salvador (1983a); Sferco y Nores (2003); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Morteros, dpto. San Justo, 15-11-1990)

Corrientes
Citas: Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b); Fraga (2001b);Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Massoia et al. (1988a, 1990); Morici (1990); Pardiñas et al. (2005)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Massoia (1983);Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923)

Formosa
Citas: Contreras (1987c);Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); López Lanús (1997); Massoia et al. (1997b)

Jujuy
Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Salvador (1988); Moschione y Segovia (2005)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); De Santi et al. (1983, 1988); Fracassi et al. (2004); Gorordo et al. **(**2005**);** Justo y De Santis (1982); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Massoia (1988a); Massoia et al. (1997); Massoia y Vetrano (1988b); Montalvo et al. (1985); Navas y Bó (1986); Noriega et al. (1993); Pereyra (1937b); Siegenthaler (2004); Siegenthaler et al. (1990); Solaro et al. (2012); Sosa y Sarasola (1998); Sosa et al. (1993); Tallade et al. (1998b, 1998a); Tejerina et al. (2006); Tiranti (1992, 1993, 1994)

La Rioja
Citas: Giacomelli (1923); Massoia et al. (1999a)

Mendoza
Citas: Contreras (1979g); Contreras y Fernández (1980); Darrieu (2014); Dieguez (1999); Lucero (2013f); Marone (1992a); Massoia et al. (1989b, 1996, 1997c, 1997a); Olivera et al. (2009); Pereyra (1927e, 1931a); Sanzín (1918); Roig (1965); Sosa (1995d, 2005); Wetmore (1926)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b); Chebez (1996a); Cockle et al. (2008); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Krauczuk (2009); Martínez Gamba (2014); Massoia et al. (1988c, 1988e, 1989, 1989a, 1989b, 1989c); Massoia (1983, 1988b, 1988e); White (1882)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Contreras (1975, 1977b); Chehebar et al. (1992); Christie et al. (1988); De Valle et al. (1989); Doering (1881); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Massoia et al. (1988c); Pereyra (1945); Trejo y Lambertucci (2007); Veiga et al. (2005); Veiga y Dupuy (2009); Wetmore (1926b)

Observaciones: De la Peña (La Rinconada, dpto. Huiliches, 27-01-1976)

Río Negro
Citas: Andrade et al. (2004); Camperi (1998); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Daciuk (1977); Gelain (2001, 2010, 2012b); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Hecker y Vidoz (1998); Llanos et al. (2011); Massoia y Vetrano (1988a); Massoia y Pardiñas (1988e); Massoia y Lartigau (1995); Paz (1997b); Pérez y Petracci (1998); Piacentini et al. (2003); Trejo et al. (2005a); Trejo y Ojeda (2002, 2004); Trejo y Seijas (2003); Trejo y Grigera (1998); Trejo y Lambertucci (2007)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Gómez et al. (2012); Hartert y Venturi (1909); Massoia (1988f); Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Gelain (2014a); Lucero (2013f, 2013i)

San Luis
Citas: Masramón (1983); Massoia y Pardiñas (1988d); Nellar Romanella (1993)

Santa Cruz
Citas: Darrieu et al. (2008); De Lucca y Saggese (1992); Imberti (2005e); Massoia y Pardiñas (1994); Scott y Sharpe (1915)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2001d, 2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Massoia et al. (1995a); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009); Wilson (1926)

Santiago del Estero
Citas: Gómez et al. (2012); Massoia (1987); Nanni et al. (2012); Nores et al. (1991)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Humphrey et al. (1970)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Blendinger et al. (2004); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (1998, 2007a); Capllonch y Aráoz (2007); Echevarría et al. (2011b); Gianini (2000); Gómez et al. (2012); Lucero (1983); Lucero et al. (2002); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Capllonch (2007); Ortiz y Aráoz (2014); Soncini et al. (1985) Vides Almonacid (1993)

Islas Malvinas
Citas: Woods (2006)

Océano atlántico sur
Citas: Santillán et al. (2011)

LECHUZAS Y LECHUZONES

FAMILIA: STRIGIDAE

Aves rapaces, generalmente de hábitos nocturnos.

La cabeza es grande. Los ojos son grandes y están dirigidos hacia adelante. El cuello tiene una gran movilidad, lo que les permite tener un gran campo visual.

Algunas especies presentan plumas alargadas en la cabeza ("orejas").

El pico es corto, curvo y filoso, semioculto por filoplumas.

Las patas son fuertes, con los tarsos y los dedos cubiertos generalmente de plumas. Las uñas son filosas. El dedo externo es reversible.

Las alas son anchas y redondeadas.

Carecen de buche. Los ciegos son largos y anchos. En los posaderos se localizan los materiales no digeridos (pelos, huesos) en forma de bolos (egagrópilas).

Nidifican en huecos, en nidos abandonados por otras aves, en cuevas en el suelo con un túnel que lleva a la cámara, en grutas, en plataformas, o sobre nidos abandonados de águilas o de Carancho o sobre nidos en actividad de Cotorra. Algunas especies ocupan nidos abandonados de Carpinteros o de Horneros y en en huecos naturales. También entre ramas secas en cañas, tacuaras o entre matas pastos y ramas en arboledas.

Ponen de 3 a 6 huevos blancos.

Los pichones nacen cubiertos de plumón, blanquecino, crema, castaño rojizo o crema rojizo. Permanecen varios días en el nido.

Se alimentan de aves, mamíferos, insectos, peces, reptiles.

Frecuentan bosques, selvas, áreas rurales, sabanas, plantaciones, parques, arboledas, palmares, serranías, montañas, estepas, praderas.

ALILICUCU COMÚN *Megascops choliba* (Vieillot, 1817)

Otros nombres: Achuita. Alilicuco. Araracucú. Búho chico. Caburé real. Col-col chico. Corujae. Choliba. Lechucita común. Lechucita orejuda. Ñacurutú. Ñacurutú-i. Ñacurutucito. Surumucuco. Tamborcito.

DESCRIPCIÓN
Largo: 20-23 cm. (macho), 24 cm. (hembra).
Peso: Fiora (1933): N= 4 X= 152 g (Rango 120 a 169); Contreras (1983a) N= 1 (M) X= 131,09 g; N= 2 (H) 122,3 y 131,85 g; Salvador (1988): N= 1 (H) 135,0 g, N= 1 (M) 115,0 g; Camperi (1992a): N= 1 (M) 135,8 g; Di Giacomo (2005h): N= 3 X= 132,0 g (Rango 126,0 a 138,0); Salvador (2014a): N= 1 (H) 122,5 g; Salvador y Di Giacomo (2014): **N=** 5 X= 111, 4 g (Rango108 a 116)
Coloración. Pico verdoso-grisáceo o con punta gris. Patas grises parduscas. Iris amarillo.

Parte dorsal parda con rayas oscuras y puntos blancos y ocres. Cara gris. "Orejas"cortas. Garganta y superior del pecho grise con barras transversales oscuras. Resto de la zona ventral blanquecino, con rayas gruesas verticales y finas transversales pardas oscuras. Línea blanca a los lados del dorso superior.
Alas y cola ocres con bandas pardas y blanquecinas.
Fase rojiza. Color general castaña rayada de pardo oscuro en el dorso. Cara castaña y blanquecina con franja parda oscura a los costados. Cuello y zona superior del pecho castaños claros rayados de pardo oscuro. Abdomen blanquecino con rayas verticales y transversales pardas oscuras. Banda blanca a los lados del dorso superior.
Alas y cola castañas con bandas pardas oscuras.

COMPORTAMIENTO
De hábitos crepusculares y nocturnos.

Alimentación
Contino (1980). **Mamíferos:** Murciélagos. Roedores (indeterminados). **Aves:**indeterminadas. **Insectos.**
Gallardo y Gallardo (1984).**Insectos:** Mariposas crepusculares. *Diloboderus abderus.*
Carman (1987c). **Insectos:**Grillos(*Gryllus argentinus*). Ortoptera (Tettigonidae).
Klimaitis (1993). **Insectos :**Coleópteros. **Mamíferos:** Laucha.
Morici y Massoia (1998). **Mamíferos:***Akodon azarae, Calomys laucha, Eumops bonariensis.* **Insectos:** Coleóptero (Scarabaeidae). Manthidae, Ortoptera (Coccinellidae) (Acridiidae). **Aves:** *Zonotrichia capensis.*
De la Peña (2001d). **Insectos:** Mariposa nocturna(*Erubus* sp.).
Di Giacomo (2005h). **Insectos:** Coleópteros. Polillas.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Elateridae, Scarabaeidae). Lepidoptera (polillas). Orthoptera (Gryllidae).
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:**Lepidoptera (Sphingidae)
De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). **Aves:***Colombina picui*.

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto es un Juurrrrr kú...JuurrrrKukú.

HÁBITAT
Bosques, selvas en galería, montes, sabanas, parques, plantaciones, áreas suburbanas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Misiones, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
							N	N	N	N	N

En huecos naturales en árboles, huecos en paredes o en nidos de *Colaptes melanochloros* y de *Colaptes campestris.*
También nidos de otras aves.
Oculto. Rudimentario.

Hartert y Venturi (1909). Nido en huecos en árboles en Chaco.
Girard (1933). Nidifica en huecos en Tucumán y en Santiago del Estero.
Pereyra (1938b). Zona ribereña del noreste de Buenos Aires, anida en huecos en los árboles o en nidos viejos.



Salvador (1990). Información obtenida por el autor en las colecciones del Instituto Miguel Lillo y en las fichas de su colección oológica. M. Lillo, Leales, dpto. Leales, Tucumán, 22-03-1922, 4 huevos.

Nores y Nores (1994). Córdoba, nido en uno de Cacholote castaño (*Pseudoseisura lophotes*)
Maceda et al. (2001). Reserva Provincial Parque Luro, dpto. Toay, La Pampa, nidifica.
Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, anida entre octubre y noviembre. Se localizaron 6 nidos en huecos, desde 1,7 a 4 m del suelo.
Cockle et al. (2011). San Pedro-Tobuna, dpto. San Pedro, Misiones, agosto a diciembre de 2006-2008, nidos en huecos de árboles.
Salvador (2012c). Dpto. Gral San Martín, Córdoba, entre 1979 y 2005, se hallaron 3 nidos, uno en nido abandonado de Cotorra (*Myiopsitta monacha*), otro en uno abandonado de Carpintero (*Colaptes* sp.) y el otro en un hueco natural de un Sauce criollo.
De la Peña (2013c). Entre el 15-11-1971 y 25-10-2110 se localizaron 12 nidos, ubicados en huecos en árboles, en nido de *Colaptes melanochloros* y de *Colaptes campestris,* uno el 27-10-1999, con 2 pichones, en un nido de Benteveo *Pitangus sulphuratus.* Nido más bajo a 1,60 m, nido más alto a 4,50 m.

Huevos
Pone 3 ó 4 huevos. Ovoidales. Blancos.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 34 a 36 x 28 a 29
Girard (1933): 36 a 37 x 27 a 30
Pereyra (1938b): 35 x 28
Di Giacomo (2005h): 34,4 a 35,8 x 29,6 a 30,5 X= 34,9 x 29,9 (N= 4)
De la Peña (2013c): 33,3 x 27,4 (N= 1)

Pesos
Di Giacomo (2005h): 15,5 a 16,8 X= 16,3 (N= 4)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,9 (N= 1)

PICHONES
Descripción
De la Peña (2013c). Pico y patas grises. Cuerpo cubierto de plumón blanquecino.
A los pocos días, dorsalmente rayado de pardo oscuro. Ventralmente gris con rayas transversales pardo oscuro.

Observaciones
Klimaitis(1975). Berisso, pdo. Berisso, Buenos Aires, 2 pichones en un hueco en un sauce.

Generalidades
De la Peña (2013c). Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, el 05-11-1989 se encontró un pichón chico en el suelo. Aparentemente caído de un nido después de una tormenta, el 10-11-1990, una pareja estaba en un Ombú con 2 juveniles, 17-12-2001, pareja con 2 juveniles, 11-11-2004, pareja con 3 juveniles, 05-11-2008, pareja con 2 juveniles, 12-10-2012, pichón caído en el suelo. Un adulto en un árbol próximo, 05-12-2012, pichón caído en el suelo. Dos adultos en un árbol próximo. El 13-12-1991, en Malabrigo, dpto. Gral.

Obligado, Santa Fe, adulto con 3 juveniles, 13-12-1991, Villa Ocampo, dpto. Gral. Obligado, Santa Fe, adulto con 2 juveniles.
Un nido el 27-10-1999 en Rincón Potrero, dpto. La Capital, Santa Fe, la pareja alimentaba a los pichones con Mariposas nocturnas y grillos. Un nido el 15-11-2008 en Elisa, dpto. Las Colonias, Santa Fe, un adulto llevó a los pichones una Torcacita común (*Columbina picui*).



Cayastá. Santa Fe. 25-10-2010



Esperanza. Santa Fe. 12-10-2012. Pichón



Esperanza. Santa Fe. 18-09-2007



Cayastá. Santa Fe. 02-11-2010. Incubando



Cayastá. Santa Fe. 02-11-2010



Esperanza. Santa Fe. 18-09-2007



Esperanza. Santa Fe. 30-06-2007


Más información:
De la Peña (2013c)

Depredadores
De adultos: *Rupornis magnirostris* (Di Giacomo 2005h)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. “Penachos auriculares” cortos. Línea blanca a los lados del lomo. Discos faciales claros orillados por una línea negra notable. Ventral con gruesas rayas verticales oscuras cortadas por otras finas. Diferenciarlo del Alilicucu grande.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Megascops choliba wetmorei (Brodkorb, 1937) desde el norte del país hasta Mendoza, La Pampa y Río Negro y *Megascops choliba uruguaiensis* (Hekstra, 1982) en el noreste.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Nueve subespecies. Su área de distribución es amplia y se extiende desde el sur de Centro América hasta Argentina. Comprende: Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina.



CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Megascops choliba wetmorei (Brodkorb, 1937)

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Cavicchia y García (2012); Darrieu y Camperi (2001a); Gallardo y Gallardo (1984); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis (1975b, 1993); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Mérida y Bodtati (2006); Morici (2012b); Morici y Massoia (1998); Narosky y

Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Roda y Danti (2015)

Catamarca
Citas: Carma (2009); Torres et al. (2006)

Chaco
Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Contreras et al. (1990b); Chatellenaz (2005a); Moschione y Bishels (2004)

Córdoba
Citas: De la Peña (2013c); Haro y Gutierrez (1992); Heredia (2006); Miatello et al. (2003); Nores et al. (1983); Nores (1996); Salvador (2012c); Sferco y Nores (2003); White (1883b); Yzurieta (1995)

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b, 1983a); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Baliño y Biole (1984); Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); Camperi (1992a); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi et al. (2003); Navas (1982); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Straneck (1990c); Zapata (1975, 1977)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c, 1993b); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h) ; Laubmann (1930); López Lanús (1997); Pujalte et al. (1995)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Fiora (1933); Moschione y Segovia (2005)

La Pampa
Citas: Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Maceda (1989); Tejerina et al. (2006)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Giacomelli (1923); Hayward (1967)

Mendoza
Citas: Roig (1965)

Misiones
Citas: Bodrati y Areta (2010); Bodrati et al. (2010b); Camperi y Darrieu 2000 (2001b); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Cockle et al. (2008); Giai (1950); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Matarasso (2007)

Río Negro
Citas: Acerbo (2000); Gelain (2010); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Pérez et al. (2006); Piacentini y Acerbo (1998)

Salta
Citas: Alabarce y Lucero (1977); Babarskas et al. (1995); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013); Salvador y Di Giacomo (2014)

San Juan
Citas: Fava et al. (2013); Gelain y Pereyra Lobos (2011b)

San Luis
Citas: Casares (1944b); Masramón (1983); Nellar Romanella (1993)

Santa Fe
Citas: Beltzer (1986c); De la Peña (2001d, 2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); Hartert y Venturi (1909);López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Blendinger et al. (2004);Brandán y Navarro (2009); Capllonch (1998); Gianini (2000);Girard (1933); Handford (1983); Lucero (1983); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Capllonch (2007); Ortiz y Aráoz (2014); Vides Almonacid (1993)

Megacops choliba uruguaiensis (Hekstra, 1982)

D.G. En el noreste.

ALILICUCU YUNGUEÑO *Megascops hoyi* (C. König & Straneck, 1989)

DESCRIPCIÓN
Largo: 24 cm
Peso: König y Straneck (1989): N= 1 (M) 115 g;Marks et al. (1999): 115-145 g
Coloración. Pico amarillo verdoso.Tarsos emplumados, grises parduscos. Iris pardo amarillento.
Cabeza y dorso castaños, con estrías negras en la cabeza y pardo oscuro en la zona dorsal. Pecho castaño con estrías oscuras. Abdomen con barras y estrías castañas. Alas pardo oscuro con barras castañas. Cola castaña barreada de pardo oscuro.


COMPORTAMIENTO

Alimentación
Ortiz et al. (2009). **Anfibios:***Hypsiboas andinus.* **Insectos:** langostas (*Neoconocephalus* sp.)

HÁBITAT
Selvas y bosques montanos (Yungas) entre 1000 y 2800 metros de altura.
NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Marks et al. (1999)

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Megascops hoyi (C. König & Straneck, 1989) en Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Sur de Bolivia y noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca
Citas: Ortiz et al. (2009); Fontanarrosa et al. (2009)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009) Camperi et al. (2012); Chebez et al. (1998); König y Straneck 1989; Moschione y Segovia (2005); Veiga et al. (2014)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995) (*Otus guatemalae*); Chebez et al (1998); Coconier et al. (2007); Fontanarrosa et al. (2009);König y Straneck 1989; Moschione et al. (2013); Straneck (1990f)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch y Aráoz (2007); Fontanarrosa et al. (2008); König y Straneck 1989; Moschione (2005); Ortiz et al. (2009, 2011); Ortiz y Capllonch (2007); Ortiz y Ferro (2005); Ortiz y Aráoz (2014); Terán y Ortiz (2005)

ALILICUCU GRANDE *Megascops atricapilla* (Temminck, 1822)

Otros nombres: Búho chico de corona negra. Lechucita colorada.

DESCRIPCIÓN
Largo: 23-24 cm.
Peso: Belton (1984): N= 7 (M) X: 170 g (Rango: 155 a 194); N= 8 (H) X: 189,5 g (Rango: 174 a 211); Marks et al. (1999): 115-140 g
Coloración. Iris pardo amarillento.
Cabeza y dorso castaños, con estrías negras en la cabeza y pardas oscuras en la zona dorsal. Pecho castaño con estrías oscuras. Abdomen con barras y estrías castañas.
Alas pardas oscuras con barras castañas. Cola castaña barreada de pardo oscuro.


COMPORTAMIENTO
Es de hábitos nocturnos.

Voces
Straneck (*in litt*.). Su canto es un prolongado Juurrrrrrrr que comienza con una ligera modulación de frecuencia ascendente y luego descendente.

HÁBITAT
Bosques y selvas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Marks et al. (1999)



IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. “Plumas auriculares” cortas. Coloración general rojiza con grueso jaspeado oscuro ventralmente.
Se parece a la fase rojiza del Alilicucu común pero es de mayor tamaño. Con la fase normal difiere en la coloración y en el tamaño.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Megascops atricapilla en Misiones y norte de Corrientes.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Especie selvática de la Selva Atlántica en sureste de Brasil, sureste de Paraguay y extremo noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Corrientes
Citas: Capllonch et al. (2005)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Chebez (1996a); Giai (1950); Olrog (1985); Straneck (1990h)

ALILICUCU OREJUDO *Megascops sanctaecatarinae* (Salvin, 1897)

DESCRIPCIÓN
Largo: 24-27 cm
Peso: Marks et al. (1999): Macho: 115-194g; Hembra: 174-211 g
Coloración. Iris amarillento.
Cabeza y dorso castaños, con estrías negras en la cabeza y pardo oscuro en la zona dorsal. Pecho castaño con estrías oscuras. Abdomen con barras y estrías castañas. Alas pardo oscuro con barras castañas. Cola castaña barreada de pardo oscuro.



NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Marks et al. (1999)

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Megascops sanctaecatarinae (Salvin, 1897) en Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Comprende desde Santa Catarina, Brasil hacia el sur hasta el norte de Uruguay y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b). Dos pieles en el MACN de W. H. Partridge (Bodrati *in litt*. 2012)

LECHUZÓN MOCHO GRANDE *Pulsatrix perspicillata* (Latham, 1790)

Otros nombres: Lechuzón. Lechuzón de anteojos grandes. Lechuzón grande de collar. Mocho malteiro. Urucureá grande.

DESCRIPCIÓN
Largo: 45-52 cm.
Peso: Contino (1980): 720 g; Belton (1984): N= 1 (M) 1075 g; N= 1 (H) 1250 g.
Coloración. Pico crema amarillento. Tarsos y dedos emplumados. Iris amarillento.
Cabeza y dorso pardos. Cejas blancas. Collar blanquecino. Superior del pecho pardo, inferior y abdomen ocráceos.
Alas y cola pardas oscuras con tenues barras más claras.

COMPORTAMIENTO
Es de hábitos nocturnos.

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto es una sucesión de 5 a 7 sílabas: Puhpuhpuhpuhpuh golpedas y emitidas rápidamente con modulación de amplitud descendente.

HÁBITAT
Bosques, arboledas, selvas hasta los 2000 m de altura.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Salta.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
											N

Salvador (1990). Información obtenida por el autor en las colecciones del Instituto Miguel Lillo y en las fichas de su colección oológica. S. Pierotti, Río del Valle, Salta, 12-12-1955, un pichón.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Notables cejas y collar blancos que contrastan con ancha banda pectoral parda. Diferenciarlo del Lechuzón mocho chico.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Pulsatrix perspicillata perspicillata (Latham, 1790) en este de Formosa y Chaco; *Pulsatrix perspicillata boliviana* L. Kelso, 1933 en Jujuy, Salta, Tucumán y noroeste de Catamarca y *Pulsatrix perspicillata pulsatrix* (Wied-Neuwied, 1820) en Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Seis subespecies. Desde Méjico al norte de Argentina. Comprende: Méjico, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS



Pulsatrix perspicillata perspicillata (Latham, 1790)

Chaco
Citas: Chatellenaz (2005a); Chebez et al. (1999)

Formosa
Citas: Contreras et al. (2014); Ramírez Llorens y Bellocq (2007); White (2001b)

Pulsatrix perspicillata boliviana L. Kelso, 1933

Catamarca
Observaciones: Salvador, S. (La Merced, dpto. Paclín, Julio de 1999, Balcozna de Afuera, dpto. Paclín, Mayo de 2005)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Chebez et al. (1998); Moschione y Segovia (2005); Olrog (1985)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Camperi (1990); Coconier et al. (2007); Moschione y Segovia (2004); Moschione et al. (2013); Olrog (1985)

Tucumán
Citas: Brandán y Navarro (2009); Lucero (1983); Olrog (1985)

Pulsatrix perspicillata pulsatrix (Wied-Neuwied, 1820)

Misiones
Citas: Chebez (1996a); König y Weick (2008)

LECHUZÓN MOCHO CHICO *Pulsatrix koeniswaldiana* (M. Bertoni y W. Bertoni, 1901)

Otros nombres: Lechuza anteojuda. Lechuzón chico de collar. Lechuzón de anteojos. Lechuzón de dedos emplumados. Lechuzón de dedos desnudos. Lechuzón del alto Paraná. Lechuzón pardo menor. Urucureá chico.

DESCRIPCIÓN
Largo: 38-44 cm.
Peso: Willis y Oniki (2002): N= 1 (H) 550 g
Coloración. Pico grisáceo-amarillento. Dedos grises. Iris pardo.
Dorso pardo oscuro. Cara parda y blanquecina con cejas color ocre intenso. Garganta parda oscura.
Semicollar blanco en el cuello. Pecho pardo con tono ocre. Resto de la parte ventral ocre.
Alas pardas con finas bandas más claras. Cola parda con punta y finas bandas blancas.

COMPORTAMIENTO
Es de hábitos nocturnos. Se alimenta de mamíferos, aves, insectos.



Voces
Straneck (*in litt*.). El canto es una sucesión de 4 a 6 sílabas: Hu.hu.hu.hu..
También emite esporádicamente un fuerte y sonoro Jurrrrr.

HÁBITAT
Bosques y selvas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Marks et al. (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Notable ceja ocre. Semicollar blanco en el cuello y ancha banda parda-ocre en el pecho.
Se diferencia del Lechuzón mocho grande por el color de la ceja, de la cola y por el tamaño.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Pulsatrix koeniswaldiana (M. Bertoni y W. Bertoni, 1901) en Misiones y Corrientes.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Selva Atlántica o Paranaense en el este de Paraguay, extremo noreste de Argentina y sureste de Brasil (Espírito Santo a Santa Catarina)

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Corrientes
Citas: Contreras (1981b)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b); Chebez (1994); Chebez y Rolón (1989); Contreras et al. (1994b); Giraudo et al. (1993); Köning en Mazar Barnett y Pearman (2001); Kraciuk (2006); Olrog (1974, 1985); Partridge (1954); Pereyra (1950); Saibene et al (1996)

ÑACURUTÚ *Bubo virginianus* (J. F. Gmelin, 1788)

Otros nombres: Búho. Búho cornudo. Búho de orejas. Búho grande. Búho virginiano. Lechuza de la sierra. Lechuzón grande. Ñucu. Quitilipe. Quitilipi. Titilipe. Virginia.

DESCRIPCIÓN
Largo: 51 cm. (macho). 60 cm. (hembra).
Peso: Marks et al. (1999): (Macho): 680-1450 g, (Hembra): 1000-2500 g; Di Giacomo (2005): N= 1 (?) 990 g

Coloración. Pico gris. Iris amarillo.
Plumas alargadas, grandes en la cabeza (“auriculares”). Corona, cuello posterior, dorso superior ocres manchados de pardo oscuro. Resto de la parte dorsal y cubiertas alares pardos y ocres, vermiculados de blanquecino. Cara ocre blanquecina con banda oscura a los lados. Inferior de la garganta blanco. Resto de la zona ventral blanquecino ondulado de pardo oscuro.
Alas y cola ocres oscuras con bandas pardas.

COMPORTAMIENTO
Durante el día está posado en la parte media y alta de los árboles.

Alimentación
Massoia (1988a). **Mamíferos:** *Akodon molinae,Calomys musculinus, Ctenomys* sp.*, Eligmodontia typus, Graomys griseoflavus, Lagostomus maximus, Microcavia australis, Reithrodon auritus.* Aves. Reptiles. Insectos.
De la Peña (2001d). Ratón.
Di Giacomo (2005h). **Mamíferos:** *Akodon azarae,Calomys callosus*, *Cryptomanus chacoensis,Eumops perotis,Graomys griseoflavus, Holochilus chacarius, Holochilus brasiliensis*,*Necromys temchuki*, *Oecomys* sp.*, Oligoryzomys fornesi, Pseudoryzomys simplex, Thylamys pusillus.* **Aves:** *Aramus guarauna Guira guira Jacana jacana Nothura maculosa Ortalis canicollis Piaya cayana Rhynchotus rufescens***Insectos**: Coleópteros.
Teta et al. (2006). **Mamíferos:** *Akodon azarae, Bibimys torresi,Cryptomanus chacoensis,Deltamis kempi, Lasiurus* sp.*, Olygoryzomys flavescens, Olygoryzomys nigripes, Oxymycterus rufus, Rattus rattus, Scapteromys aquaticus,***Amphibia. Aves.**

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto es un potente y grave Hu.Hu..HUUhh.

HÁBITAT
Bosques, montes, sabanas, arboledas en praderas, estepas, palmares, montañas, Planraciones, selvas ribereñas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Tucumán, Formosa, La Pampa, Córdoba, Santa Fe.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
					N	N	N	N			

Construye el nido en grutas, huecos en árboles, en el suelo, sobre nidos abandonados de águilas o de Carancho o sobre nidos en actividad de Cotorra.
Plataforma de palitos. Puede colocar alguna paja o plumas.



Girard (1933). En Tucumán, para criar se instala en nidos viejos de águilas.
Pereyra (1937). Telén, dpto. Loventué, La Pampa, un nido con huevos.
Salvador (1990). Información obtenida por el autor en las colecciones del Instituto Miguel Lillo y en las fichas de su colección oológica. P. Girard, Simoca, dpto. Simoca, Tucumán, 05-07-1933, 2 huevos, Manchalá, dpto. Leales, Tucumán, 27-09-1944, un pichón; J. Esteban, Monte Lindo, dpto. Formosa, Formosa, 29-11-1944, un pichón.
Miatello et al. (2003). Cerro Colorado, dpto. Tulumba, Córdoba, 26-11-1984, nido; 08-12-1992, nido con 2 pichones.
Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, anida desde fines de junio a setiembre. Se localizaron 6 nidos, ubicados entre 6 y 13 m de altura.
De la Peña (2013c). 20-07-1978, Cayastacito, dpto. San Justo, Santa Fe, nido en *Eucaliptus*, a 15,00 m de altura, construido sobre nido de Cotorra,

Myiopsitta monachus en actividad contenía 2 huevos, 20-10-1986, Saladero Cabal, dpto. Garay, Santa Fe, nido en *Eucaliptus*, a 10,00 m de altura, construido sobre nido de Cotorra, *Myiopsitta monachus* en actividad con un pichón, 29-09-1989, Calchaquí, dpto. Vera, Santa Fe, en Quebracho colorado, a 14,00 m, no observado, 10-08-2001, La Camila, dpto. San Justo, Santa Fe,construido sobre nido de Cotorra, *Myiopsitta monachus* en actividad, a 15,00 m del suelo, con 2 pichones, 15-07-1991, Calchaquí, construido en uno abandonado de Carancho, *Caracara plancus*, a 11 m, contenía 3 huevos.

Huevos
Pone 2 ó 3 huevos. Elípticos, algunos ovoidales. Blancos.

Medidas
Girard (1933): 57 a 61 x 49 a 53
Di Giacomo (2005h): 52,4 a 55,4 x 42,7 a 49,5 X= 53,9 x 45,4 (M= 6)
De la Peña (2013c): 54 a 59,8 x 45 a 46,6 X= 56,6 x 45,6 (N= 5)

Pesos
Di Giacomo (2005h): 52,0 a 73,0 X= 59,8 (N= 6)
De la Peña (2013c): 57,8 a 63,2 X= 60,2 (N= 3)
De la Peña (2013c): cáscaras 4,8 a 5,8 X= 5,35 (N= 5)


Calchaquí. Santa Fe. 15-07-1991


Colonia Belgrano. Santa Fe. 23-06-2007


Esperanza. Santa Fe. 22-06-1999


Esperanza. Santa Fe. 22-06-1999

PICHONES

Observaciones

Girard (1933). Tucumán, 1930, nido con 2 pichones.
De la Peña (2013c). El 27-10-1972, en Cayastacito, un adulto con 2 juveniles.

Generalidades

Di Giacomo (2005h). El período de incubación es de 31 ó 32 días. Los pichones permanecen en el nido entre 50 y 53 días.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño grande. “penachos auriculares” grandes. Semicollar blanco en la parte superior del pecho y barrado por debajo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Bubo virginianus nacurutu (Vieillot, 1817) desde el norte del país hasta San Luis, La Pampa y Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Doce subespecies. Se distribuye por toda América desde Canadá a la Patagonia Argentina a excepción de la Amazonia.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Bubo virginianus nacurutu (Vieillot, 1817)

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Cavicchia y García (2012); Darrieu y Camperi (2001a); GORA (1991); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Teta et al. (2006); Zapata (1998)

Chaco

Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004)

Córdoba

Citas: Castellanos (1932); Heredia (2006); Miatello et al. (1991, 1994, 2003);Nores (1996); Salvador y Salvador (2012); White (1883a); Yzurieta (1995)

Corrientes

Citas: Chatellenaz et al. (2010); Chatellenaz (2004); Contreras (1981b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)



Entre Ríos

Citas: Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009)

Formosa

Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c);Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Pujalte et al. (1995)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009)

La Pampa
Citas: De la Peña y Tittarelli (2011); Massoia (1988a); Pereyra (1937b); Siegenthaler (2004)

La Rioja
Citas: Chebez (2005b)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Capurro y Bucher (1988); Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i)

San Luis
Citas: Nellar Romanella (1993)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2001d, 2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Rodríguez Graves et al. (2009); Straneck (1990e)

Santiago del Estero
Citas: Ménéguax (1925); Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Girard (1933); Lucero (1983); Ortiz y Capllonch (2007)

TUCÚQUERE *Bubo magellanicus* (Lesson, 1828)

Otros nombres: Búho. Ñacurutú magellánico. Ñacurutú magallánico. Tucúcaro.

DESCRIPCIÓN
Largo: 45-50 cm.
Peso: Contreras (1975): N= 4 X= 788,7 g (Rango 654 a 898); Christie et al. (2004): N= 4 (3 H y 1 M) X= 760 g (Rango 640 a 890)
Coloración. Similar a *Bubo virginianus* pero de menor tamaño.

COMPORTAMIENTO
Se alimenta de mamíferos (conejos, liebres, ratones). aves, reptiles, invertebrados.

Alimentación
Massoia (1983). **Mamíferos:** *Abrothrix* sp*., Eligmodontia typus, Phyllotis darwini, Reithrodon auritus, Ctenomys* sp*.,*
Loxodontomys micropus, Notiomys macronnyx.
Massoia (1988j). **Mamíferos:** *Eligmodontia typus,Calomys musculinus, Chelemys macronyx, Reithrodon auritus.*
Massoia y Pardiñas (1988e). **Mamíferos:** *Ctenomys* sp*., Eligmodontia typus,Galea musteloides, Lestodelphys halli, Phyllotis xanthopygus, Reithrodon auritus.*
Massoia y Pardiñas (1988c). **Mamíferos:** *Abrothrix longipilis, Akodon iniscatus, Akodon neocenus, Calomys musculinus, Conepatus* sp*., Chelemys macronyx, Eligmodontia typus, Euneomys chinchilloides, Lepus europaeus, Lestodelphys halli, Olygoryzomys longicaudatus, Phyllotis xanthopygus, Reithrodon auritus, Zaedyus pichy.*

Massoia y Pardiñas (1988b). **Mamíferos:** *Eligmodontia typus, Reithrodon auritus, Ctenomys mendocinus, Calomys* sp.*, Akodon* sp.*, Olygoryzomys longicaudatus, Abrothrix olivaceus, Lagidium viscacia, Phyllotis xanthopygus.*
Massoia et al. (1991). **Mamíferos:** *Akodon* sp.*, Abrothrix longipili, Abrothrix olivaceus, Ctenomys* sp.*, Eligmodontia typus, Euneomys chinchilloides, Geoxus valdivianus, Irenomys tarsalis, Loxodontomys micropus, Octodon bridgesi, Olygoryzomys longicaudatus, Phyllotis xanthopygus, Reithrodon auritus.*
Heinonen Fortabat y Haene (1994). Mamíferos: *Abrothrix olivaceus*.
Massoia (1994). Mamíferos: *Phyllotis* sp.*, Thylamys* sp.*, Calomys* sp.*, Octodontomys gliroides, Eligmodontia* sp.*, Galea musteloides, Lagidium viscacia.*
Massoia et al. (1994b). **Mamíferos:** *Ctenomys* sp.*, Euneomys chinchilloides, Phyllotis xanthopygus, Eligmodontia typus, Abrothrix longipilis, Abrothrix olivaceus,Chelemys macronyx, Lepus europaeus.*
Massoia et al. (1994a). **Mamíferos:** *Euneomys chinchilloides, Phyllotis xanthopygus, Abrothrix longipilis, Eligmodontia typus, Abrothrix olivaceus, Reithrodon auritus, Ctenomys* sp.*, Loxodontomys micropus, Microcavia australis, Calomys* sp.*, Calictis cuja, Olygoryzomys longicaudatus, Histiotus montanus.*
Massoia y Pastore (1997b). **Mamíferos:** *Reithrodon auritus, Ctenomys* sp.*, Lepus europaeus, Eligmodontia typus, Olygoryzomys longicaudatus, Phyllotis xanthopygus, Abrothrix olivaceus, Abrothrix longipilis, Geoxus valdivianus, Euneomys chinchilloides.*
Donázar et al. (1997). **Mamíferos:** *Akodon* sp., *Calomys musculinus, Ctenomys haigi, Chelemys macronyx, Eligmodontia typus, Euneomys* sp., *Galea musteloides, Geoxus valdivianus, Lepus europaeus,Olygoryzomys longicaudatus, Microcavia australis, Oryctolagus cuniculus, Phyllotis xanthopygus, Rattus norvergicus,Reithrodon auritus, Thylamys pusilla.* **Aves:** *Anas* sp.*, Callipepla californica, Caprimulgus longirostris, Falco sparverius, Milvago chimango, Sturnella loyca, Vanellus chilensis, Zenaida auriculata.* Crustáceos. Arácnidos. Coleópteros. Serpientes. Iguanidae.
Trejo and Grigera (1998). **Mamíferos:** *Abrothrix olivaceus*.
Miatello et al. (1999). **Mamíferos:** *Conepatus* sp.,*Galea* sp., *Ctenomys* sp., *Lepus europaeus, Oxymycterus* sp.*, Phyllotis* sp.*, Thylamys* sp. **Aves:** *Anas* sp.*,Theristicus sp., Tyto alba, Vanellus chilensis.*
Teta et al. (2001). **Mamíferos:** *Abrothrix longipilis, Abrothrix olivaceus, Akodon neocenus, Calomys musculinus, Ctenomys haigi, Ctenomys* sp.*, Eligmodontia morgani, Eligmodontia typus, Euneomys chinchilloides, Galea musteloides, Geoxus valdivianus, Irenomys tarsalis, Lagidium viscacia, Lepus europaeus, Lestodelphys halli, Loxodontomys micropus, Octodon bridgesi, Microcavia australis, Lyncodon patagonicus, Olygoryzomys longicaudatus, Oryctolagus cuniculus, Microcavia australis, Phyllotis xanthopygus, Rattus norvergicus, Reithrodon* auritus. **Aves:** *Anas* sp.*, Anthus sp., Callipepla californica, Caprimulgus longirostris, Milvago chimango, Falco sparverius, Sicalis luteola, Sturnella loyca, Tachycineta leucopyga, Troglodytes aedon, Vanellus chilensis, Zenaida auriculata,Zonotrichia capensis*. Crustáceos. Arácnidos. Scorpiones.**Reptiles:** *Liolaemus* sp.*,* Iguanidae.
Galende y Trejo (2003). **Mamíferos:** *Abrothrix olivaceus, Ctenomys haigi, Eligmodontia morgani, Lagidium viscacia,Lepus europaeus*, *Loxodontomys micropus, Phyllotis xanthopygus, Reithrodon auritus.* Coleópteros*.* Scorpiones.
Christie et al. (2004). Mamíferos. Aves.
Trejo et al. (2005). **Mamíferos:** *Lepus europaeus, Abrothrix longipilis, Abrothrix xanthorhinus, Chelemys macronyx, Geoxus valdivianus, Olygoryzomys longicaudatus, Eligmodontia morgani, Euneomys* sp.*, Irenomys tarsalis, Loxodontomys micropus, Phyllotis xanthopygus, Reithrodon auritus,Ctenomys haigi.* **Aves:** *Callipepla californica, Chloephaga* sp.*, Phytotoma rara, Vanellus chilensis, Zenaida auriculata, Upucerthia dumetaria, Elaenia albiceps, Turdus falcklandii, Phrygilus* sp.*, Diuca diuca.* **Insectos:** Carabidae. Coleópteros. Curculionidae. Tenebrionidae. **Arácnidos.**
Nabte et al. (2006). **Mamíferos:** *Akodon iniscatus, Lestodelphys halli, Phyllotis xanthopygus*. **Crustáceos:** (*Aegla* sp.) **Insectos:** Coleópteros (Carabidae, Scarabaeidae). (Tenebrionidae, Curculionidae). **Arácnidos:** Scorpiones. **Reptiles. Aves.**

Voces
Straneck (*in litt*.). Vocalización diferente a *Bubo virginianus.*

HÁBITAT
Bosques, estepas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos y/o pichones en Córdoba, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N



Construye el nido en el suelo al reparo de matas, huecos en los árboles, sobre nidos abandonados de águilas u otras rapaces, en acantilados o en árboles.
Plataforma de palitos. Puede colocar alguna paja o plumas.

Sainz-Trápaga (*in litt.*). El Doradillo, Pto Madryn, dpto. Biedma, Chubut, 20-12-2014, pichón.
Contreras (1977b). Valle del río Collón Curá, Neuquén, nidifica entre noviembre y diciembre.
Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba, nidifica en la zona.
Albrieu et al (2004). Estuario del río Gallegos, dpto. Güer Aike, Santa Cruz, nidifica en primavera, en nido poco elaborado, en general en el suelo, al reparo de matas. Ocasionalmente reacondiciona nidos abandonados de otras rapaces, en árboles o en acantilados.
Christie et al. (2004). Noroeste patagónico, nidifica en huecos en los árboles, en bardas rocosas o en depresiones en el suelo. Pichones en diciembre.
Imberti (2005e). Parque Nacional los Glaciares, dpto. Lago Argentino, Santa Cruz, nidifica entre setiembre, octubre, noviembre y diciembre. Nidifica en el suelo, protegido por alguna mata o en nidos abandonados de otras rapaces, en acantilados o árboles.

Huevos
Pone 2 ó 3 huevos. Elípticos, algunos ovoidales. Blancos.

Anónimo (1933): 3 huevos colectados en Viamonte, dpto. Río Grande, Tierra del Fuego, por T. L. y G. P. Bridges y P. W. Reynolds, en el Museo Nacional de Historia Natural.

PICHONES
Observaciones
Salvador y Salvador (2012). Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba, 21-10-1999, un pichón entre unas matas de pastos.




El Doradillo. Pto Madryn. Chubut. 20-12-2014 Foto: Santiago Sainz-Trápaga

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. “Penachos auriculares” grandes.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Bubo magellanicus (Lesson, 1828) entre los 2000 y los 3000 m de altura por la cordillera, desde Jujuy hasta Mendoza y desde Neuquén y Río Negro por el llano hasta Tierra del Fuego. También sierras de Córdoba. Citado para las islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Por los Andes entre 2000 y 3000 metros de altura en Perú, Bolivia y Argentina hasta Tierra del Fuego e Islas del Cabo de Hornos.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca
Citas: Carma (2009)

Observaciones: De la Peña (El Alamito, dpto. Andalgalá, 17-12-1999)



Córdoba
Citas: Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Ordano (1996)

Observaciones: Salvador, S. (Pampa de Achala)

Chubut
Citas: Harris (2008); Massoia y Pardiñas (1988a); Olrog (1979a); Sainz-Trápaga (2014); Vidoz (1995)

Jujuy
Citas: Budin (1931);Chebez et al. (1998); Massoia (1994); Moschione y Segovia (2005)

Mendoza
Citas: Calí et al. (2008); Contreras (1979g); Contreras y Fernández (1980); Darrieu (2014); Gosee (1899);Lucero (2013f); Massoia et al. (1994); Olivera et al. (2009); Pereyra (1942a); Reed (1916); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (1995d, 2005); Wolffhuegel (1929)

Neuquén
Citas: Contreras (1975, 1977b); Chehebar et al. (1992); Christie et al. (2004); Daciuk (1968); Del Valle et al. (1989); Donázar et al. (1997); Fiori y Zalba (1999); Gorgoglione (2005); Massoia (1988j); Massoia y Pastore (1997b); Massoia y Pardiñas (1988, 1988c); Massoia et al. (1991a); Matarasso (2007); Navas (1978); Pereyra (1945); Steullet y Deautier (1945); Veiga et al. (2005); Yepes (1939)

Río Negro
Citas: Camperi (1998); Canevari et al. (1991); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Contreras (1975); Daciuk (1977); Gelain (1984a., 2001, 2010); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Grigera y Rubulis (1985); Llanos et al. (2011); Massoia (1983); Massoia y Pardiñas (1988e, 1988b); Paz Barreto (1997b); Piacentini et al. (2003); Trejo et al. (2001, 2005, 2005a); Trejo y Ojeda (2002)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

Observaciones: De la Peña (Valle Encantado, dpto. Chicoana,05-12-1977)

San Juan
Citas: Camperi y Darrieu (2004)

Santa Cruz
Citas: Albrieu et al. (2004); Darrieu et al. (2008); De Lucca y Saggese (1992); Imberti (2005e); Massoia y Pardiñas (1994); Massoia et al. (1994a); Oustalet (1891); Peri (2013); Scott y Sharpe (1915); Serié (1926)

Tierra del Fuego
Citas: Castellanos (1937); Clark (1986); Earnshaw (1973); Humphrey et al. (1970); Olrog (1948, 1950); Reynolds (1934); Ripley (1950)

Islas Malvinas
Citas: Woods (2006)

LECHUZA LISTADA *Strix hylophila* Temminck, 1825

Otros nombres: Lechucita de cuerpo rayado. Lechuza. Lechuza rayada. Suindá-caaguí.

DESCRIPCIÓN
Largo: 34-35 cm.
Peso: Belton (1984): N= 2 (M) 285 y 320 g; N= 1 (H) 395 g; Contreras et al. (1994): N= 1 (H) 290 g; Marks et al. (1999): (Macho): 285-340 g, (Hembra): 345-395 g
Coloración. Pico gris con punta amarilla. Dedos amarillentos. Iris pardusco.
Cabeza y partes dorsales castañas barradas de pardo oscuro. Collar blanco. Ventral castaña y blanquecina barrada de pardo oscuro.
Alas castañas con anchas barras pardas oscuras. Cola parda oscura con barras castañas y punta ocrácea.

COMPORTAMIENTO
Es de hábitos nocturnos.



Voces
Straneck (*in litt*.). El canto es potente y ásper: Burrr...de una sola sílaba. Otra voz es una sucesión de cortos Burrrburrrburrrburrrburrrburrr de 6 a 10 sílabas repetidas rápidamente, con una curva de amplitud ascendente y luego descendente.

HÁBITAT
Bosques y selvas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Marks et al. (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño de mediano a grande. Collar blanco. Dorso, alas y cola muy barrados de castaño y pardo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Strix hylophila Temminck, 1825 en el norte de Corrientes y Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Endemica de la Selva Atlántica en sureste de Brasil, este de Paraguay y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Corrientes
Citas: Contreras y Contreras (1984)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b); Bodrati y Cockle (2006a, 2006b); Contreras et al. (1994b); Chebez (1996a); Giai (1950, 1951); Giraudo et al. (1993); Olrog (1985); Straneck (1990g)

LECHUZA CHAQUEÑA *Strix chacoensis* Cherrie y Reichenberger, 1921

DESCRIPCIÓN
Largo: 33-38 cm.
Peso: Kratter et al. (1993): N= 1 (M) 350 g; N= 1 (H) 375 g; Marks et al. (1999): (Macho): 360-435 g, (Hembra): 420-500 g
Coloración. Pico amarillento. Tarsos y dedos ocráceos. Iris pardo.
Disco facial blanco con la orilla del anillo oscura. Corona blanca con banda central parda.
Dorso pardo barrado y punteado de blanco. Ventral blanquecina densamente barrada de pardo.
Alas y cola muy barradas de rojizo.
El juvenil es pálido, difusamente barrado.

COMPORTAMIENTO
Es de hábitos crepusculares y nocturnos.

Alimentación
Kratter et al. (1993). Arañas. Escorpiones. Ciempiés. Escarabajos. Ofidios (*Leptotyphlops* sp.)

Contino (1980). Aves. Insectos. Murciélagos.
Pereyra Lobos et al. (200b). Roedores. Escorpiones. Coleópteros. Aves. Reptiles.

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto es un áspero y grave Burrr...Burrr...

HÁBITAT
Sabanas, montes, áreas de cactáceas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Mendoza, La Pampa.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N


Nidifica en huecos, o sobre plataformas de nidos abandonados de otras especies.

Pereyra (1937b). Conhelo, dpto. Conhelo, La Pampa, noviembre de 1931, criaron en un viejo nido de Accipitridae, en un caldén, con 3 pichones. En diciembre de 1933, en el mismo lugar, pichones.
Contino (1980). Nidifica en huecos en los árboles.
Pereyra Lobos y Jara (2013b). Reserva de la Biósfera Ñacuñán, dpto. Santa Rosa, Mendoza, 29-09-2012, nido sobre una estructura de palitos en un árbol a 5,20 m de altura, contenía 2 pichones.

Huevos
Pone 2 ó 3 huevos. Blancos.

Más información:
Santander et al. (2013)





IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Disco facial blanco.Ventral barrada de blanco y pardo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Strix chacoensis Cherrie y Reichenberger, 1921 desde Formosa, Salta y Jujuy por el centro-oeste del país hasta Mendoza y La Pampa.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Endémica de la región del Chaco de sur de Bolivia (Santa Cruz). Suroeste de Paraguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009)

Chaco
Citas: Bodrati (2005); Moschione y Bishels (2004)
Córdoba
Citas: Heredia (2006); Nores et al. (1983); Nores (1996); Sferco y Nores (2003); Yzurieta (1995)

Corrientes
Observaciones: Bodrati, A. (*in litt*. 2012)

Formosa
Citas: Contreras (1987c);Contreras et al. (2014); Gorleri et al. (2011); Vandecaveye et al. (2015)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Moschione y Segovia (2005)

La Pampa
Citas: Chebez et al. (1998); Dabbene (1926); Darrieu et al. (2011b); Pereyra (1927e, 1931a); Siegenthaler (2004)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Giacomelli (1923); Hayward (1967)

Mendoza
Citas: Contreras y Fernández (1980); Pereyra Lobos et al. (2008b); Pereyra Lobos y Jara (2013b); Sosa (2009)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Coconier et al. (2007); Dabbene (1926d); Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Fava et al. (2013a); Gelain y Pereyra Lobos (2011b)
San Luis
Citas: Masramón (1983); Nellar Romanella (1993)

Santa Fe
Citas: Giai (1950); Martinez Achenbach (1957); Pautasso (2002a)

Santiago del Estero
Citas: Dabbene (1926d); Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Brandán y Navarro (2009); Lucero (1983); Ortiz y Capllonch (2007)

LECHUZA BATARAZ *Strix rufipes* King, 1827

Otros nombres: Chucho. Chuncho. Colcón. Col-col. Cuscungo. Lechuza. Lechuza de monte. Lechuza rojiza. Tecolote.

DESCRIPCIÓN
Largo: 33-38 cm.
Peso: Contreras (1975): N= 4 (?) X: 368,5 g (Rango: 345 a 390); Christie et al. (2004): N= 6 (H) X: 375 g (Rango: 280 a 430); N= 1 (?) 400 g.
Coloración. Pico amarillento. Iris pardo.

Coloración general parda barrada de blanco con tono canela, más notori en la zona ventral. Lorum y collar blancos. Disco facial canela.
Alas pardas oscuras barradas de canela. Cola parda oscura con barras canelas, punta ocrácea.

COMPORTAMIENTO
Es de hábitos nocturnos.

Alimentación
Martínez (1993). **Mamíferos:** *Akodon longipilis, Akodon olivaceus, Aulicomys micropus, Dromiciops australis, Irenomys tarsalis, Phyllotis darwini, Rattus rattus.* **Insectos:** Acridiidae. Blattidae. Carabidae. Cerambycidae . Curculionidae. Lucanidae. Scarabaeidae. Silphidae. Stenopelmatidae. **Aves:** *Aphrastura spinicauda*, Furnariidae. **Anfibios:** Leptodactylidae.
Díaz (1999). **Mamíferos:** *Abrocoma bennetti, Akodon olivaceus, Octodon lunatus, Oryctolagus cuniculus, Oryzomys longicaudatus, Rattus norvegicus, Rattus rattus, Thylamis elegans.* **Insectos:** Cerambycidae (*Acanthinodea cummingii*). Gryllacridiidae. Scarabaeidae. **Arácnidos:** Scorpionidae. **Reptiles:** Squamata.
Udrizar Sautrhier et al. (2005). **Mamíferos:** *Abrothrix olivaceus, Akodon longipilis, Chelemys macronyx, Geoxus valdivianus, Irenomys tarsalis, Loxodontomys micropus, Oryzomys longicaudatus.*
Christie et al. (2004). Anfibio(*Pleurodema thaul*). Arácnidos. Insectos. Frutos.

Voces
Straneck (*in litt*.).
El canto se oye como una serie de Juou...juo...juo...jol...col...col...jol...juou..

HÁBITAT
Bosques y arboledas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Chubut, Río Negro.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N								N	N		

Nidifica en huecos en árboles.

Salvador (1990). Información obtenida por el autor en las colecciones del Instituto Miguel Lillo y en las fichas de su colección oológica. A. Kovacs, El Bolsón, dpto. Bariloche, Río Negro, 15-01-1962, un pichón.
Wallace (2010). Parque Nacional Lago Puelo, dpto. Cushamen, Chubut, nido en octubre con 2 pichones en un hueco en un Cohihue, a 5,9 m de altura.
Beaudoin y Ojeda (2011). Lago Mascardi, dpto. Bariloche, Río Negro, 4 nidos en huecos en árboles (*Nothofagus*)



Huevos
Pone 2 ó 3 huevos blancos.

Medidas
Goodall et al. (1951): 41,9 a 43 x 31,5 a 31

PICHONES

Peso

Wallace (2010): 325 g



IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño grande. Abundantes rayas pardas y blancas-canela. Semicollar blanco. Alas con barras anchas pardas y canelas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Strix rufipes rufipes King, 1827 por el oeste, desde Mendoza y Neuquén hasta Santa Cruz y Tierra del Fuego. También Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies. Bosque araucano de Chile y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Chubut

Citas: Straneck y Vidoz (1995); Vidoz (1995); Wallace (2010.)

Neuquén

Citas: Christie et al. (1988); Contreras (1975); Dabbene (1926d); Daciuk (1978); Del Valle et al. (1989); Girini et al. (2016); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Pereyra (1945); Veiga et al. (2005)

Río Negro

Citas: Beaudoin y Ojeda (2011); Camperi (1998); Contreras (1975); Contreras et al. (1980b); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Daciuck (1977); Gelain (2001); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Hecker y Vidoz (1998); Paz Barreto (1997b); Trejo y Ojeda (2002); Trejo y Seijas (2003); Trejo et al. (2011)

Santa Cruz

Citas: Burmeister (1890); Imberti (2005e); Darrieu et al. (2008); Peri (2013); Scott y Sharpe (1915)

Tierra del Fuego

Citas: Clark (1986); Johansen (1966); Schalow (1898)

Islas Malvinas

Citas: Wace (1921)

LECHUZA ESTRIADA *Ciccaba virgata* (Cassin, 1849)

Otros nombres: Kavuré guasú. Lechucita de dedos desnudos. Lechuza de cola larga. Lechuza moteada. Suindá kaaguí.

DESCRIPCIÓN

Largo: 29-35 cm.

Peso: Marks et al. (1999): 175-320 g

Coloración. Pico amarillento grisáceo. Dedos grises amarillentos. Iris pardo.

Cejas ocráceas. Cara y parte dorsal pardas oscuras finamente barradas de castaño. Ventral ocrácea jaspeada de canela. Muslos y plumas de los tarsos canelas.

Alas barradas de canela y pardo oscuro. Cola parda oscura con barras finas canelas y punta ocrácea



COMPORTAMIENTO
Es de hábitos nocturnos. Se alimenta de insectos (escarabajos, langostas). pequeños mamíferos (murciélagos). reptiles, anfibios, aves.

HÁBITAT
Bosques y selvas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Marks et al. (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño mediano a grande. Ceja ocrácea. Disco facial oscuro. Ventral jaspeada de ocráceo y canela.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Ciccaba virgata borrelliana (W. Bertoni, 1901) en Misiones, Corrientes y Chaco.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Siete subespecies. Su distribución abarca Centro América y Sud América hasta noreste de Argentina. Comprende: Méjico, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Ciccaba virgata borreliana (W. Bertoni, 1901)

Chaco
Citas: Bodrati et al. (2012c); Cowper Coles et al. (2012b)

Corrientes
Citas: Roesler en Bodrati et al. (2012c)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b); Chebez (1994, 1996a, 2009); Olrog (1985); Partridge (1954); Straneck (1990h)

LECHUZA NEGRA *Ciccaba huhula* (Daudin, 1800)

DESCRIPCIÓN
Largo: 35-40 cm.
Peso: Contino (1980): ? 500 g; Willis y Oniki (2002): N= 1 (H) 470 g.
Coloración. Pico y dedos naranjas-amarillentos. Iris naranja a pardo.
Cabeza y parte ventral negras barradas de blanco. Partes dorsales y alas pardo oscuro barradas de blanco. Cola negra con cuatro barras finas y punta blanca.

COMPORTAMIENTO
Es de hábitos nocturnos.

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto es un potente y grave HOUuuu...emitido esporádicamente. También hace una sucesión de Hu.hu.hu.huHou, con ligera modulación de amplitud ascendente.

HÁBITAT
Bosques y selvas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Misiones.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	

Plataforma de palitos y epífitas.



Bodrati y Cockle (2013). Parque Provincial Cruce Caballero, dpto. San Pedro, Misiones, nido en una horqueta de un Anchico (*Parapiptadenia rigida*) a 12,5 m de altura, protegido por epífitas y tres ramas verticales grandes. En Octubre-noviembre de 2010 tenía un pichón y en setiembre-noviembre de 2012 un huevo.


Huevos
Pone 1 ó 2 huevos. Blancos.

Medidas
Bodrati y Cockle (2013): 47,2 x 39,4

Peso
Bodrati y Cockle (2013): 23,4

Más información:
Bodrati y Cockle (2013)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Toda negra con barras blancas.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Ciccaba huhula huhula (Daudin, 1800) en Salta y Jujuy, y *Ciccaba huhula albomarginata* (Spix, 1824) en Corrientes y Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Presenta dos poblaciones bien separadas, una en el norte de Sudamérica, que comprende: Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina. La otra población se encuentra en la Selva Atlántica en el sureste deBrasil, este de Paraguay y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Ciccaba huhula huhula (Daudin, 1800)

Jujuy
Citas:Olrog (1985)

Salta
Citas: Coconier et al. (2007) ; Moschione et al. (2013)

Ciccaba huhula albomarginata (Spix, 1824)

Corrientes
Citas: Contreras (1981b)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b); Bodrati y Cockle (2013); Chebez (1996a); Olrog (1985); Partridge (1956); Straneck (1990h)

Subfamilia: Surniinae

CABURÉ YUNGUEÑO *Glaucidium bolivianum* C. König, 1991

DESCRIPCIÓN
Largo: 16 cm.
Peso: Marks et al. (1999): 55 g
Coloración. Iris amarillo.
Coloración general rojiza canela con manchitas blanquecinas redondeadas en la cabeza. Puntos ocráceos en el dorso. Dos puntos oscuros en la parte posterior de la cabeza. Corta ceja blanquecina. Cola con cuatro bandas oscuras.

COMPORTAMIENTO
Es de hábitos diurnos y nocturnos.

HÁBITAT
Bosques y selvas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Marks et al. (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Rojizo con manchitas redondas en la cabeza.
Se parece al Caburé chico pero tienen diferente canto.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Glaucidium bolivianum C. König, 1991 en Jujuy, Salta y Tucumán.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Yungas (nuboselva) de Perú, Bolivia y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009) Chebez et al. (1998); Fiora (1933); Moschione y Segovia (2005); Straneck et al. (1987b) (jardini)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

Tucumán
Citas: Brandán y Navarro (2009)

Observaciones: Capllonch, P. (Sierra de San Javier)

CABURÉ CHICO *Glaucidium brasilianum* (J. F. Gmelin, 1788)

Otros nombres: Caburé. Caburé-í. Chuncho. Lechucita. Lechucita chica. Lechuza enana. Llamador de pajaritos. Rey de los pajaritos. Rey de los pájaros.

DESCRIPCIÓN
Largo: 17 cm. (macho), 18,5 cm. (hembra).
Peso: Marks et al. (1999): (M) 46-78 g, (H) 64-90 g; Salvador (2014a): N= 1 (M) 58,4 g; N= 1 (H) 63,8 g; N= 2 (?) 53,0 y 62,5 g;
Coloración. Pico y dedos verde-amarillentos. Iris amarillo.
Cabeza parda con estrías ocráceas. Fina ceja blanquecina. Parte dorsal parda oscura. En la parte posterior del cuello tiene manchitas blancas y negras. Ventral blanca jaspeada de pardo oscuro.
Alas pardas con motas blancas ocráceas. Cubiertas alares con motas blancas. Cola parda oscura con cinco, a veces seis, barras angostas blancas (en realidad con dos motas blancas, una en cada lámina de la pluma).
La forma rufa o herrumbrosa tiene coloración general rojiza, las estrías de la cabeza más largas, cola con varias barras pardas oscuras y rojizas alternadas, a veces poco notables.

COMPORTAMIENTO
Es de hábitos diurnos y nocturnos. Solitario.

Alimentación
Pereyra C. B. (1927).**Aves:** *Columbina picui, Furnarius rufus, Sicalis* sp.*, Zonotrichia capensis.*
Contino (1980). Aves.
De la Peña (2001d). **Mamíferos:** Laucha. **Aves:** *Polioptila dumicola.*
Di Giacomo (2005h). **Aves:** *Parula pitiayumi*, *Thraupis sayaca.*
Carrera et al. (2008). **Aves:***Caprimulgus parvulus, Coccyzus melacoryphus, Columbina picui, Coryphospinguscucullatus,Guira guira, Nystalus maculatus, Saltator aurantirostris, Turdus amaurochalinus, Vireo olivaceus, Zonotrichia capensis, Furnariidae.* **Mamíferos:** *Galea musteloides, Graomys griseoflavus, Molossus molosus, Thylamys pusillus.* **Reptiles:** *Polychrus acutirostris, Teius tejoi, Tropidurus spinolosus.***Insectos:** Coleoptera (Cerambycidae: Lamiinae, Scarabaeidae: *Coelosis bicornis*, *Megathopa* sp.*, Epichalcoplethissanctijacobi*. Lepidoptera Odonata. *Quesada gigas.*
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Aves:** *Synallaxis* sp.**Insectos:** Coleoptera (Cerambycidae, Scarabaeidae). Orthoptera (Acrididae).

Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Aves:***Thraupis bonariensis, Troglodytes aedon.*

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto es una sucesión de suaves y silbadas notas, Jüjüjüjüjüjüjüjüjüjü, que suele combinar con un agudo juitjuitjuitjuit.chierchierchier.

HÁBITAT
Sabanas, montes, bosques, arboledas.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Tucumán, Formosa, Chaco, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires,

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	



Construye el nido en nidos abandonados de Carpinteros o en huecos naturales. También en nidos de Hornero (*Furnarius rufus*)
Oculto. Rudimentario.

Pereyra (1938b). Cría en nidos deHornero (*Furnarius rufus*).
Plotnick (1956a). José C. Paz, pdo. José C. Paz, Buenos Aires, nido en uno de Hornero (*Furnarius rufus*). el 27-10-1952, tenía 4 huevos.
Salvador (1990). Información obtenida por el autor en las colecciones del Instituto Miguel Lillo y en las fichas de su colección oológica. M. Lillo, Tucumán, 17-11-1917, un huevo.
Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba, nidifica en la zona.
Babarskas et al. (2003). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, A. Bodrati localizó un nido en uno de *Colaptes sp.,* un adulto acarreaba insectos.
Cabrera et al. (2008). Impenetrable, Chaco, 2004-2006, 2 nidos en huecos en quebrachos.
Cockle et al. (2011). San Pedro-Tobuna, dpto. San Pedro, Misiones, agosto a diciembre de 2006-2008, nidos en huecos de árboles.
Salvador (2012c). Dpto. Gral San Martín, Córdoba, entre 1979 y 2005, se halló un nido en uno abandonado de Carpintero (*Colaptes* sp.). Otro nido en Ascohinga, dpto. Colón, estaba en uno abandonado de Carpintero del cardón (*Melanerpes cactorum*)
De la Peña (2013c). La Camila, dpto. San Justo, Santa Fe, 17-10-1989, un nido en uno de *Colaptes melanochloros*, a 2,0 m del suelo, 4 huevos, Villa Georgina, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 21-10-1999, nido en un hueco en un tronco, a 0,60 m de altura, 4 pichones y un huevo, 14-11-2006, Providencia, dpto. Las Colonias, Santa Fe, nido en un hueco, en Paraíso a 3,50 m del suelo, 4 pichones.

Huevos
Pone 5 huevos. Elípticos. Blancos.

Medidas
Salvador (1990): Miguel Lillo: 26,4 x 20,2
De la Peña (2013c): 28,2 a 29 x 24,1 a 24,6 X= 28,4 x 24,3 (N= 4)

Peso
De la Peña (2013c): cáscaras 0,80 X= 0,80 (N= 4)

PICHONES

Descripción

De la Peña (2013c). Cuerpo cubierto de plumón blanquecino, hasta los 9-10 días. Luego comienza a notarse un jaspeado pardo en ventral y pardo más uniforme dorsalmente.
A los 20 días las alas son pardas con manchas blanquecinas en las cubiertas.
Los pichones a los 28-30 días dejan el nido.

Observaciones

Pereyra (1938b). Escobar, pdo. Escobar, Buenos Aires, pichones en un nido de Hornero.
Di Giacomo (2005h) , Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, S. Krapovickas y A. Yanosky (com. pers.) en diciembre de 1994, hallaron un pichón no volador, en el interior de un bosque.

Depredadores

De adultos: *Leopardus geoffroyi* (Santillán et al. 2014)

Más información: Larsen (2012)



La Camila. Santa Fe. 17-10-1998



Santa Catalina. Córdoba. 20-07-2007



Santa Catalina. Córdoba. 20-07-2007



Villa Georgina. Santa Fe. 18-11-1999. 28 días



Villa Georgina. Santa Fe. 05-12-1999. 45 días de edad

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Pequeño. Movimientos "acompasados" de la cola. Ventral jaspeada. Puntos blancos en las alas. Mancha blanca y negra en la parte posterior del cuello (no siempre bien visible)

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Glaucidium brasilianum brasilianum (J. F. Gmelin, 1788) (por el noreste), Misones, Corrientes y Entre Ríos; *Glaucidium brasilianum pallens* Brodkorb, 1988, Formosa, Chaco y Santa Fe; *Glaucidium brasilianum stranecki* Könimg & Wink, 1995, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa y *Glaucidium brasilianum tucumanum* Chapman, 1927, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Doce subespecies. Muy extenso rango de distribución que va desde el sur de Estados Unidos al norte y centro de Argentina. En gran variedad de habitats. Comprende: Estados Unidos, Méjico, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina.



CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Subespecies consideradas por algunos autores:

Glaucidium brasilianum brasilianum (J. F. Gmelin, 1788

Corrientes

Citas: Azpiroz et al. (2013); Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi et al. (2003); Serié y Smyth (1923)

Misiones
Citas: Bodrati y Areta (2010); Bodrati et al. (2010b); Chebez (1996a); Cockle et al. (2008); Giai (1950); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2009); Martínez Gamba (2014); Straneck (1990h)

Glaucidium brasilianum pallens Brodkor*d*, 1938

Chaco
Citas: Carrera et al. (2008); Contreras et al. (1990b); Chatellenaz (2005a); Moschione y Bishels (2004)
Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c, 1993b); Di Giacomo (2005h); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2001d, 2011f, 2013c); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Rodríguez Graves et al. (2009)

Glaucidium brasilianum stranecki Köning & Wink, 1995

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Cavicchia y García (2012); Darrieu y Camperi (2001a); Maceda (1988); Montaldo y Claver (1986); Morici (2012b, 2014); Moschione (1989); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra, C. B. de. (1927); Pugnali y Chamorro (2008)

Córdoba
Citas: Haro y Gutierrez (1992); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Pereyra (1923a); Salvador (1983a, 2012c); Sferco y Nores (2003); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Santa Catalina, dpto. Totoral, Córdoba, 21-07-2007)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Siegenthaler (2004); Tejerina et al. (2006)

Glaucidium brasilianum tucumanum Chapman, 1927

Catamarca
Citas: Carma (2009)

Jujuy
Citas: Fiora (1933); Straneck et al. (1987)

La Rioja
Citas: Hayward (1967)

Mendoza
Citas: Blendinger (2005)

Salta
Citas: Alabarce y Lucero (1977); Capurro y Bucher (1988); Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013i, 2013f)

San Luis
Citas: Bó (1965b); Maceda et al. (2001); Masramón (1983); Nellar Romanella (1993)

Santiago del Estero
Citas: López de Casenave et al. (1998); Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Blendinger et al. (2004) (*tucumanun*); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007); Capllonch y Aráoz (2007); Echevarría et al. (2007, 2011b); Esteban (1953) (*tucumanun*); Hartert y Venturi (1909); Juri (2007); Köning (1991) (*tucumanun*); Lucero (1983); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Capllonch (2007); Ortiz y Aráoz (2014); Vides Almonacid (1993)

Los límites de distribución del Caburé y Caburé austral no están bien definidos.

CABURÉ AUSTRAL *Glaucidium nana* (King, 1827)



Zona rural Trelew. Chubut. 12-07-2014
Foto: Santiago Sainz-Trápaga

DESCRIPCIÓN
Largo: 17 cm. (macho), 18,5 cm. (hembra).
Peso: Humphrey et al. (1970): N= 2 (M) 71,7 y 71,7g; N= 2 (H) 61,2 y 82,2 g; Navas y Bó (1986): N= 1 (M) 73,2 g; N= 1 (H) 107 g; Camperi (1992a): N= 1 (M) 68,3 g; Marks et al. (1999): (M) 55-75 g, (H) 70-100 g; Christie et al. (2004): N= 1 (H) 79g, N= 1 (M) 58 g; Salvador (2014a): N= 1 (M) 79,7 g; N= 1 (?) 84,5 g
Coloración. Tarsos crema-amarillentos. Iris amarillo.
Cabeza parda con estrías ocráceas. Fina ceja blanquecina. Parte dorsal pardo oscuro. En la parte posterior del cuello manchitas blancas y negras. Ventral blanco jaspeado de pardo oscuro. Alas pardas con motas

blanco ocráceas. Cubiertas alares con motas blancas.
Cola parda oscura con cinco, a veces seis, barras angostas blancas (en realidad con dos motas blancas, una en cada lámina de la pluma).

Forma rufa o herrumbrosa

Coloración general rojiza, las estrías de la cabeza más largas, cola con varias barras pardas oscuras y rojizas alternadas, a veces poco notables.

HÁBITAT

Bosque araucano. En la migración otros ambientes.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Santa Cruz

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	

Nidifica en huecos.



Imberti (2005e). Parque Nacional los Glaciares, dpto. Lago Argentino, Santa Cruz, nidifica en octubre-noviembre.
Santillán et al. (2010). Monumento Natural Bosque Petrificado, dpto. Deseado, Santa Cruz, 2000-2006 varios nidos en huecos.

Huevos

Pone 3-4 huevos. Blancos.

Medidas

Hartert y Venturi (1909): 28 x 21,5 a 23
Santillán et al. (2010): 30,2 a 31,5 x 25,1 a 26,8 X= 30,6 x 25,8 (N= 8)

Peso

Santillán et al. (2010): 4 a 6 X= 4,8

Más información:
Santillán et al. (2010). Norambuena (2013)

Depredadores

De adultos: *Buteo albigula* (Trejo et al. 2006b)

Otros

Comisso (2012). Un ejemplar con Leucismo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Glaucidium nana (King, 1827) por el oeste de Neuquén, de Río Negro, de Chubut, oeste y este de Santa Cruz y en Tierra del Fuego.
Parte de la población en invierno migra al norte.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Chile y Argenina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS



Buenos Aires
Citas: Camperi (1992c); D´Orbigny (1835/44); Darrieu y Camperi (2001a); Hudson (1872); Morici (2014); Moschione (1989); Narosky y Di Giacomo (1993); Pereyra (1927d, 1938b); Steullet y Deutier (1945)

Chubut
Citas: Camperi (1998); Daciuk (1977); Sainz-Trápaga (2014)

Córdoba
Citas: Castellanos (1932); Hartert y Venturi (1909); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983);
Nores (1996); Pereyra (1923a); White (1883b); Yzurieta (1995)

Entre Ríos
Citas: Camperi (1992a)

Formosa
Citas: Contreras et al. (2014)

La Pampa
Citas: Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Navas y Bó (1986); Tejerina et al. (2006)

La Rioja
Citas: Giacomelli (1923)

Mendoza
Citas: López de Casenave (2001); Roig (1965)

Neuquén
Citas: Castellanos (1932); Contreras (1976, 1977b); Christie et al. (1988); Christie et al. (2004); Gorgoglione (2005); Johnson (1967); Matarasso (2007); Navas (1978); Pereyra (1945); Peters (1923b); Steullet y Deautier (1945); Veiga et al. (2005)

Observaciones: De la Peña (Parque Lanín, dpto. Huiliches, 27-01-76)

Río Negro
Citas: Camperi (1998); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Daciuk (1977); Gelain (2001, 2010, 2012b);
Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Grigera y Rubulis (1985); Hecker y Vidoz (1998); Pérez y Petracci (1998); Llanos et al. (2011)

San Luis
Citas: Nellar Romanella (1993)

Santa Cruz
Citas: Darrieu et al. (2008); Imberti (2005e); Köning, (1991); Peri (2013); Santillán et al. (2010); Scott y Sharpe (1915)

San Luis
Citas: Bó (1965b); Masramón (1983)

Santa Fe
Citas: Giai (1950)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Tierra del Fuego
Citas: Castellanos (1937); Chebez y Bosso (1992); Clark (1986; Humphrey et al. (1970); Olrog (1948, 1950); Reynolds (1934)

LECHUCITA VIZCACHERA *Athene cunicularia* (Molina, 1782)

Otros nombres: Caruja. Catelalac. Lechucita. Lechucita de campo. Lechucita de las cuevas. Lechucita pampa. Lechuza. Lechuza chica. Lechuza de campo. Lechuza de las cuevas. Lechuza de las vizcacheras. Lechuza de rozado. Lechuza pampa. Pejpirá. Pezpira. Urucureá.

DESCRIPCIÓN
Largo: 19-26 cm.
Peso: Fiora (1933): N= 8 X= 200 g (Rango 160 a 220); Contreras (1979f): N= 1 (M) 122,0 g, N= 1 (H) 168,0 g; Contino (1980): 170 g; Camperi (1992a): N= 1 (M) 59,4 g, N= 2 (H) 164,9 y 178,4 g; Camperi (1992c): N= 1 (H) 200,0 g; Navas y Bó (2001): N= 1 (H) X= 185,9 g; Camperi y Darrieu (2005): N= 1 191,1 g; Salvador (2014a): N= 4 (M) X= 201 g (Rango 188 a 212); N= 6 (H) X= 191,2 g (Rango 158 a 211)
Coloración. Pico crema. Patas largas con plumas blancas o beige. Iris amarillo.
Parte dorsal parda con lunares blanquecinos y algunos canelas. Cara y garganta blancas. Cuello y pecho blanquecinos con barras pardas y ocres. Abdomen blanco.
Alas pardas con lunares blanquecinos. Cola parda con barras blanquecinas.

COMPORTAMIENTO
De hábitos diurnos y nocturnos. Se alimenta de insectos, pequeños mamíferos, anfibios, reptiles.

Alimentación
Cunningham (1871). Roedores.
Crawshay (1907). Insectos.
Mata (1927). **Mamíferos:** Ratones. **Anfibios:** *Bufo marinus, Hyla pulchela.* **Insectos:** Coleópteros (*Phanaeus splendidulus*) (*Gromphas lacordairei*) (*Dyscinetus rugifrons*) (*Acaptophilus dasypleurus*) (*Cyclocephala signaticollis*) (*Anysodactilus cupripennis,* Langosta voladora (*Schistocerca paranensis*). Scarabaeidae (*Phileurus vervex*). **Reptíles.**
Aravena (1928). **Anfibios:** *Bufo arenarum, Leptodactylus* sp. Insectos: Lepidópteros, Coleópteros (*Phanaeus splendidulus*) (*Gromphas lacordairei*) (*Dyscinetus rugifrons*) (*Acaptophilus dasypleurus*) (*Cyclocephala signaticollis*) (*Anysodactilus cupripennis*). Langosta voladora (*Schistocerca paranensis*). Ortóptero (*Cephalochaema calamus*). Scarabaeidae. Tucura. Tenebriónido. Arácnidos. Huesos. Vegetales.
Zotta (1934).**Insectos:** Coleóptero (Scabaeidae, *Phanaeus* sp.)
Liebermann (1935). **Insectos:** Acrididae.
Zotta (1940c).**Insectos:** Coleópteros (Scarabidae)
Olrog (1956a). Insectos (Coleópteros).
Pearson et al. (1968). **Mamíferos:***Ctenomys talarum*.
Massoia (1983). Mamíferos: *Calomys* sp.

Bellocq y Kravetz (1983).**Mamíferos:** *Akodon azarae, Calomys musculinus, Calomys laucha, Olygoryzomys flavescens.*
Salvador (1984a). Ratones
Bellocq (1987c). **Mamíferos:** *Akodon azarae,Calomys musculinus, Calomys laucha, Mus musculinus, Olygoryzomys flavescens.*
Bellocq y Kravetz (1994). **Mamíferos:** *Akodon azarae,Calomys musculinus, Calomys laucha, Mus musculinus, Olygoryzomys flavescens*.
Diéguez (1997b). **Aves:** *Sturnella loyca*.
Bellocq (1997b). **Mamíferos:** *Calomys musculinus, Calomys laucha*, *Olygoryzomys flavescens.*
Tiranti et al. (1998).**Mamíferos:** *Thylamys pusillus,Eptesicus furinalis, Tadarida brasiliensis,*Reithrodon auritus,Akodon molinae, Akodon azarae, Ctenomys sp., Calomys sp., *Eligmodontia typus.* **Reptiles:** *Leptotyphlop*s sp. Sauria. **Anfibios:** *Bufo arenarum*. **Aves:** Passeriformes. **Insectos:** Coleópteros. **Arácnidos. Moluscos:** Gasteropodos.
Abril et al. (1998).**Mamíferos:** Muridae, Cavidae. **Insectos:** Coleópteros (Tenebrionidae, Curculionidae, Bruchidae). **Arácnidos:** (Chelicerata, Araneae). Escorpiones (Chelicerata, Scorpionida). Aves. Reptiles.
Mero y Serracín (1998). **Insectos:** Coleópteros. Roedores (Ratones de campo).
Andrade et al. (2004).**Mamíferos:** *Abrothrix olivaceus,Ctenomys* sp., *Eligmodontia* sp*., Lepus europaeus, Euneomys chinchilloides,Reithrodon auritus.***Reptiles:** Liolaemini, Leiosaurae. **Aves:** no identificadas.
Pessino et al. (2005). **Mamíferos:** *Ctenomys* sp., *Eptesicus furinalis.* **Insectos.**
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). Anfibios: *Bufo arenarum, Leptodactylus* sp. **Arácnidos:** Arañas.
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Aves:***Passer domesticus*. **Insectos:**Isoptera (termitas aladas)
De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). Laucha.
Solaro et al. (2012). **Mamíferos:** *Galea musteloides, Oligoryzomys flavescens, Calomys* sp., *Eligmodontia* sp., *Ctenomys* sp. (juveniles). *Ctenomys* sp. (adultos). *Akodon azarae, Akodon molinae, Thylamys* sp.**Reptiles:***Teius oculatus.* **Anfibios:***Bufo* sp.**Aves:**Passeriformes. **Insectos:** Acrididae. Gryllidae. Mantidae. Carabidae. Scarabaeidae. Cerambycidae. Curculionidae. Tenebrionidae. Coleoptera no identificado. Formicidae. **Aracnidos:**Arachnida. Scorpionida. Bothriuridae. Araneae.
Salvador (2013e). **Insectos:** Hormigas Isaú (*Atta vollenweideri*)
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Voces
Straneck (*in litt*.). Emite una voz de alarma áspera: Chieee...chichichi, repetida tanto de día como de noche. Otro canto escuchado generalmente en horas nocturnas es un suave Ju juHUUuuu.ju juHUUuuu.

HÁBITAT
Estepas, praderas, sabanas, áreas rurales y periurbanas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos y/o juveniles en Jujuy, Tucumán, Formosa, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N

Nidifica en cuevas en el suelo. Raro posturas fuera de ellas.
Expuesto. Elaborado. Las cuevas tienen un túnel que lleva a la cámara. Ésta es un poco más ancha. Los huevos son puestos sobre la tierra o sobre pocos pastos.
Alrededor de la boca de entrada puede colocar materias fecales de animales y otros elementos.



Salvador y Salvador (en prep.). Dpto. San Martín, Córdoba, 4 nidos, posturas en octubre y noviembre, uno de los nidos estaba en una barranca, ponen 4 huevos.
Salvador (*in litt*.). Parque Nacional El Palmar, dpto. Colón, Entre Ríos, 14-11-1984, un nido en una pequeña barranca a 0,40 m de altura, con 4 huevos incubados.
De la Peña (inéd.). Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 06-11-2014, nido en el interior de una columna de la luz, de cemento que estaba en el suelo. Materias fecales de equinos en el interior y en la boca de entrada.
Serié y Smyth (1923). Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, pone de 5 a 8 huevos.
Smyth (1927). Cacharí, pdo. Azul, Buenos Aires, 11-10-1920 y 14-11-1921, Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, 03-12-1925, nidos.
Bellocq (1993). Diego Gaynor, pdo. San Andrés de Giles, Buenos Aires, nidos con posturas entre octubre y noviembre. El 29-11-1988, se encontró un nido superficial a nivel del piso. Tenía 3 huevos ubicados en una depresión a modo de plato hondo.
Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba, nidifica en la zona.
De la Peña (2013c). Ataliva, dpto. Castellanos, Santa Fe, 18-10-1970, 2 nidos, con 1 huevo y 4 huevos, Sarmiento, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 20-10-1979, 3 huevos, Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 30-10-1995, nido en el suelo (no en cueva) en un campo. Completó 4 huevos, pero fue abandono luego de grandes lluvias, Fortín Chilca, dpto. Vera, Santa Fe, 04-02-1997, nido en un hormiguero (tacurú). La boca de entrada estaba a 40 cm. del suelo.
Medidas: largo del túnel: de 1,20 a 1,50 m, diámetro: de 18 a 20 cm.
Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos “Pablo Girard”, 3 nidos con 4, 4 y 2 huevos cada uno.
Segura et al (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 2 nidos.

Huevos
Pone de 4 a 6 huevos. Ovoidales o elípticos. Blancos.

Medidas
Salvador (*in litt*.): 35,8 a 37,1 x 29,2 a 29,6 X= 36,7 x 29,1 (N= 4)
Salvador y Salvador (en prep.): 34,7 a 37,8 x 26,3 a 29,8 X= 36,3 x 28,5 (N= 12)
Hartert y Venturi (1909): 31 a 37 x 26 a 28
Serié y Smyth (1923): 33 a 37 x 27 a 29
Smyth (1927): 33 a 38 x 26 a 28
Zapata y Cabrera (1969): 34,2 x 28,4
De la Peña (2013c): 33,5 a 35,5 x 27,4 a 28,8 X= 34,3 x 28 (N= 8)

Peso
Salvador y Salvador (en prep.): 14 a 17,5 X= 15,4 (N= 12)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,930 a 1,014 X= 0,947 (N= 8)

PICHONES
Descripción
De la Peña (2013c). Nacen cubiertos de plumón blanquecino.

Peso al nacer
Bellocq (1993): 9, 5

Observaciones

De la Peña (inéd.). Monte Vera, dpto. La Capital, Santa Fe, 03-12-2015, adultos con 3 pichones; Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 07-12-2015, adultos con un pichón.

Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, pichones en noviembre y diciembre.

De la Peña (2013c). Esperanza, 28-11-2003, varias parejas con pichones: dos con 3 y otra con 4; 05-12-2005, varias parejas con pichones: cinco con 3 y otra con 4 pichones, 16-11-2012. Rincón de Ávila, dpto. La capital, Santa Fe, pareja con 5 pichones.

Salvador (2015). Aparzo, dpto. Humahuaca, Jujuy, 22-02-1995, nido en una barranca de tierra a 20 cm del suelo, 4 pichones.

Handford (1983). Tafí del Valle, dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 22-11-1973, adulto con 3 juveniles.

Generalidades

Bellocq (1993). El periodo de incubación duró aproximadamente 27 días. Alcanzan la edad de volar entre los 40 y 50 días.



Esperanza. Santa Fe. 19-12-2008. Albino



Esperanza. Santa Fe. 02-05-2008



Esperanza. Santa Fe. 11-11-2014
Ubicación nido en columna de cemento



Esperanza. Santa Fe. 11-11-2014
Entrando al nido



Fortín Chilcas. Santa Fe. 04-02-1997. Nido en tacurú



Esperanza. Santa Fe. 30-10-1995. Nido fuera de la cueva



Esperanza. Santa Fe. 10-12-2008

Más información:
Bellocq (1993)

Depredadores
De adultos: *Caracara plancus* (Vargas et al. 2007), (Idoeta y Roesler 2012)

Otros
Urcola (2011). Dos ejemplares Albinos.
Pereyra (1937c)**.** Un ejemplar con Leucismo parcial.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. Garganta y abdomen blancos. Pecho con barras pardas. Alas y parte dorsal con muchos lunares blancos. Grito fuerte.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Athene cunicularia juninensis (Berlepsch y Stolzmann, 1902) en el altiplano de Jujuy y Salta; *Athene cunicularia cunicularia* (Molina, 1782)en noreste de Corrientes y Misiones y *Athene cunicularia partridgei* Olrog, 1976 desde el norte del país, excepto el norte de Misiones y el altiplano, de Jujuy y Salta hasta Santa Cruz. Citada para las islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Diecinueve subespecies. Muy extenso rango de distribución por toda América. En Estados Unidos y Canadá residen únicamente en la primavera-verano boreal migrando luego. Se halla ausente en Centro América y en Amazonia.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Athene cunicularia juninensis (Berlepsch y Stolzmann, 1902)

Jujuy
Citas: Salvador (2015)

Observaciones: De la Peña (Abra Pampa, dpto. Cochinoca, 22-02-1979)

Athene cunicularia cunicularia (Molina, 1782)

Corrientes
Citas: Contreras (1977, 1981b)

Misiones
Citas: Chebez (1996a); Krauczuk (2009); Navas y Bó (1993)

Athene cunicularia partridgei Olrog, 1976

Buenos Aires
Citas: Aravena (1928); Babarskas et al. (2003); Bellocq (1987c, 1993); Bellocq y Kravetz (1983, 1994); Bodrati et al. (2006b); Camperi (1992c); Castro y Cicchino (1992); Cavalli et al (2013); Cavicchia y García (2012); Codesido et al. (2011, 2013); Dabbene (1918b); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Grant (1911); Hartert y Venturi (1909) ; Klimaitis (1975b); Leveau y Leveau (2011b); Lucero et al. (2011); Marelli (1933); Morici (2012b); Moschione (1989); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Renard (1920); Sánchez et al. (2008); White (1882); Zapata (1998); Zuberbhüler (1971)

Observaciones: De la Peña (Bahía Blanca, pdo. Bahía Blanca 05-02-1976)

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009); Contreras (1977); White (1882)

Observaciones: De la Peña (El Alto, dpto. El Alto, 29-01-1977)

Chaco
Citas: Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004)

Chubut
Citas: Bo (1958); Harris (2008); Massoia et al. (1988); Navas y Bó (1997a); Sainz-Trápaga (2014)

Córdoba
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Castellanos (1932); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983);Nores (1996); Olrog (1979a);Partridge (1953c); Salvador (1983, 2013e); Sferco y Nores (2003); Straneck (1990b); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Miramar, dpto. San Justo, 28-02-1976)

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Marelli (1918)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Baliño y Biole (1984); Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); Camperi (1992a); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b); López-Lanús et al. (2013c); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi et al. (2003); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Zapata (1975, 1977)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c);Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); López Lanús (1997); Pujalte et al. (1995)

Jujuy
Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Chebez et al. (1998); Fiora (1933) Moschione y Segovia (2005)

Observaciones: De la Peña (Jujuy, dpto. Capital, 05-02-1977)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Bruno et al. (2007); Callicó Fortunato et al. (2008); Chebez et al. (1998); Contreras (1977); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Di Giacomo et al. (2005); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Mero y Serracín (1998); Olrog (1979a);Pessino et al. (2005); Siegenthaler (1984, 2004); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2005, 2006); Tejerina y Montalvo (2005); Tirante et al. (1998); Villareal et al. (2005); Wetmore (1926b)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Capurro y Bucher (1986); Giacomelli (1923); Hayward (1967); Koslowsky (1895b)

Mendoza
Citas: Blendinger y Alvarez (2002); Calí et al. (2008); Contreras (1977, 1979g); Contreras y Fernández (1980); Darrieu (2014); Gómez (2006); López de Casenave y Marone (1996); Lucero (2013f); Marone (1992); Mezquida y Marone (2002); Navas y Bó (2001); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (1995d, 2005); Steullet y Deautier (1945);

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014);

White (1882)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Contreras (1977b); Fiori y Zalba (1999); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Navas y Bó (1997a); Pereyra (1945); Veiga et al. (2005); Wetmore (1926b); Yepes (1939)

Río Negro
Citas: Andrade et al. (2004); Camperi y Darrieu (2005); Castello et al. (1982); Gelain (2012b); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Paz Barreto (1997b); Peters (1923b); Piacentini et al. (2003)

Observaciones: De la Peña (Viedma, dpto. A. Alsina, 03-11-1979)

Salta
Citas: Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Echevarría et al. (2014); Hartert y Venturi (1909); Höy (1969a); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b)
San Juan
Citas: Acosta y Murúa (2001); Camperi y Darrieu (2004); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Gelain (2014a); Lucero (2013f, 2013i); Navas y Bó (2001); Ortiz y Murúa (1994)

Observaciones: De la Peña (Talacasto, dpto. Ullún, 15-01-1982)

San Luis
Citas: Casares (1944b); Masramón (1983); Nellar Romanella (1993)

Observaciones: De la Peña (Mercedes, dpto. Gral. Pedernera, 13-10-2004)

Santa Cruz
Citas: Darrieu et al. (2008); Navas y Bó (1997); Scott y Sharpe (1915)

Santa Fe
Citas: Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009); Wilson (1926)

Santiago del Estero
Citas: Massoia (1987); Nores et al. (1991)

Observaciones: De la Peña (Santiago del Estero, dpto. Capital, 29-01-1977)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Blendinger et al. (2004); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007); Capllonch y Aráoz (2007); Capllonch et al. (2011b); Echevarría (2001); Echevarría y Chani (1999, 2000, 2006); Echevarría et al. (1998, 2008c); Handford (1983); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Navarro et al. (2000) ;
Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Capllonch (2007); Ortiz y Aráoz (2014); Vides Almonacid (1993)

Islas Malvinas
Citas: Woods (2006)

LECHUCITA CANELA *Aegolius harrisii* (Cassin, 1849)

Otros nombres: Kavuré. Lechucita. Lechucita acanelada. Lechucita caburé.

DESCRIPCIÓN
Largo: 20-22 cm.
Peso: Marks et al. (1999): 104-150 g
Coloración. Pico grisáceo amarillento. Tarsos emplumados crema amarillentos. Dedos amarillentos. Iris gris amarillento.
Alrededor de los ojos negro. Superior del pico y cejas canelas. Cabeza parda oscura. Cara canela circundada por una línea negra. Partes ventrales canelas, más claras en el abdomen. Dorso pardo con banda canela en el manto. Dorso inferior castaño.
Alas pardas con lunares blancos. Cubiertas alares castañas con lunares blancos. Cola negra con tres hileras de lunares blancos.



COMPORTAMIENTO
Voces
Straneck (*in litt*.). Su canto es un suave y prolongado jurrrrrr con tenues modulaciones de amplitud, dando la impresión de que se aleja y se acerca.

HÁBITAT
Bosques y selvas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Salta.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
				N						N	

Nidifica en huecos naturales en árboles o en nidos de Carpinteros.

Rodríguez (2013). Camino de Cornisa, ruta Nacional 9, Salta, Claus König (com. pers. 2013) encontró una familia con 3 pichones, que recién habían salido del nido. Este era una cavidad en el tronco de un árbol a 4 m del suelo. A mediados de noviembre de 1995, la misma cavidad estaba ocupada por una hembra.
Rodríguez (2013). Valle al este de la ciudad de Salta, 27-05-2012, nido en una cavidad realizada por Carpintero lomo blanco (*Campephilus laucopogon*). a unos 4 m del suelo.

Más información:
Studer y Teixeira (1994)



IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pequeño tamaño. Zona ventral color canela intenso. Ceja canela. Alas y cola con muchos lunares blancos.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Aegolius harrisii iheringi (Sharpe, 1899) en Misiones y Corrientes y *Aegolius harrisii dabbene* Olrog, 1979 en Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Poblaciones separadas. Por un lado en la Selva Atlántica de sureste de Brasil, este de Paraguay, Bolivia y noreste de Argentina. Por otra parte con poblaciones separadas localmente en los Andes de Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia y noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Aegolius harrisii iheringi (Sharpe, 1899)

Corrientes
Citas: Pereyra (1950)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b); Bodrati y Cockle (2006); Chebez (1996a); Dabbene (1913,1914); Navas y Bó (1991a); Saibene et al. (1996); Stranck en Olrog (1985)

Aegolius harrisii dabbenei Olrog, 1979

Catamarca
Citas: Barrionuevo et al. (2008); Carma (2009); Fontanarrosa et al. (2009)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Di Giacomo et al. (1995); Moschione y Segovia (2005); Olrog (1979)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Barrionuevo et al. (2008); Coconier et al. (2007); Fontanarrosa et al. (2009); Moschione et al. (2013); Olrog (1985); Rodríguez (2012b, 2013)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Barrionuevo et al. (2008); Blendinger et al. (2004); Blendinger (1998); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (1998); Dabbene (1926a); Fontanarrosa et al. (2009); Gianini (2000);
Lillo (1902); Lucero (1983); Olrog (1979); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Capllonch (2007); Ortiz y Aráoz (2014)

Subfamilia: Asioninae

LECHUZÓN OREJUDO *Pseudoscops clamator* (Vieillot, 1808)

Otros nombres: Búho de orejas. Búho de los pantanos. Búho orejudo. Búho real. Lechuzón de cuernos. Lechuzón de las islas. Lechuzón de los pantanos. Lechuzón de monte. Lechuzón de orejas. Lechuzón de orejas largas. Ñacurutú. Ñacurutú de monte. Ñacurutú-í.

DESCRIPCIÓN
Largo: 30-38 cm.
Peso: Contino (1980): 480 g; Salvador (1988): N= 1 (M) 485 g; Salvador (2014a): N= 1 (H) 468 g;
Coloración. Pico gris. Iris pardo.
Penachos auriculares largos, negros. Corona, cuello posterior y dorso superior ocres con listado grueso de pardo oscuro. Resto de la zona dorsal ocre listado y salpicado intenso de pardo oscuro. Cara blanquecina. Mejillas castañas. Alrededor de los ojos oscuro. Bordea toda la cara una línea oscura, con castaño en la garganta. Pecho blanquecino y ocráceo con grandes listones pardos oscuros.

Alas y cola ocres con bandas pardas oscuras.

COMPORTAMIENTO

Alimentación

Contino (1980). Ratones.

Massoia (1988h).**Mamíferos:** *Akodon azarae, Oligoryzomys flavescens, Reithrodon auritus, Cavia aperea, Calomysmusculinus, Lepus capensis, Eumops bonariensis, Lasiurus berealis, Lutreolina crassicaudata*. **Aves:** Icteteridae.

Klimaitis (1993). **Aves:** Passeriformes.

Martínez et al. (1996a). **Mamíferos:** *Calomys* sp.*Holochilus brasiliensis*, *Reithrodon auritus.* **Aves:** *Carduelis magellanica.*

Martínez et al. (1998). **Mamíferos:** *Rattus* sp. **Aves:** *Zenaida auriculata*, *Zonotrichia capensis.*

Isacch et al. (2000).**Mamíferos:** *Akodon azarae, Calomys musculinus*, *Oligoryzomys flavescens, Rattus* sp.

Aves: *Zonotrichia capensis.*

Di Giacomo (2005h). **Mamíferos:** *Akodon azarae*, *Calomys callosus,Graomys griseoflavus, Holochilus brasiliensis, Holochilus chacarius,Necromys temchuki*, *Oligoryzomys fornesi, Pseudoryzomys simplex, Oecomys* sp.

Pautasso (2006a).**Mamíferos:** *Akodon azarae, Holochilus chacarius, Lutreolina crassicaudata*, *Oligoryzomys flavescens.*

Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Mamíferos:** *Cricetidae.*

Torregiani et al. (2015). **Mamíferos:** *Cavia aperea, Akodon azarae, Oligoryzomys flavescens, Mus musculus, Rattus* spp. **Aves:** Columbidae, Icteridae, Emberizidae, Tyrannidae, Ploceidae. **Anfibio.**



HÁBITAT

Sabanas, pajonales, praderas, áreas rurales, arboledas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Formosa, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	N	N	N	N	N	N	N	N	N		

En el suelo, entre pastos. También entre ramas secas en cañas, tacuaras o entre pastos y ramas en arboledas o debajo de matas de *Cortaderiaselloana* y matas de *Stipa* sp. .

Oculto o semiexpuesto. Rudimentario. Depresión con pastos en la base.

Pereyra (1931a). En el delta anida en el invierno, pone 3 ó 4 huevos.

Pereyra (1938b). Zona ribereña del noreste de Buenos Aires, nidifica en los pajonales, pone 3 huevos.

Wilson (1977). Mercedes, dpto. Mercedes, Corrientes, nidifica en Eucaliptos, sobre un nido de *Anumbius annumbi*.

Fraga (1984). Estancia La Candelaria, pdo. Lobos, Buenos Aires, 20-10-1973, un pichón en el suelo. El 30-07-1978, 3 pichones

Blendinger et al. (1987). Bernal, pdo. Quilmes, Buenos Aires, 25-05-1986, nido en la trifurcación del tronco de un Sauce a 43 cm del agua. Tenía un huevo. El 17 de agosto, dos parejas con pichones. Reserva Costanera Sur, Capital Federal, D. Gallegos Luque (com. pers.) localizó el 29 de mayo un nido con 3 pichones.

Klimaitis y Moschione (1987). Nidifica en el suelo, entre pajonales o zarzamoral.

Martínez et al. (1996a). Reserva Municipal Laguna de los Padres, pdo. Gral. Pueyrredón, Buenos Aires, 14-09-1991, nido con 3 pichones
López Lanús (1997). Parque Nacional Pilcomayo, dpto. Pilcomayo, Formosa, julio de 1988, dos pichones en pastizal, observados por H. Rodríguez Moulín.
Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba, nidifica en la zona.
Pautasso y De la Peña (2001). Rincón Potrero, dpto. La Capial, Santa Fe, el 16-03-2000, A. Pautasso localizó un nido con 5 huevos; De la Peña, localizó 4 nidos: el 20-04-1998 y 21-04-1998, en Isla Verde, dpto. Marcos Juárez, Córdoba, con 2 pichones cada uno y en Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, el 01-08-1998 y 19-06-1999, con un pichón cada uno.
Babarskas et al. (2003). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, nido en agosto de 2002, observado por M. Zanello y L. Juber.
Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, nido con 2 pichones, en setiembre de 1996.
Tittarelli y Villareal (2009a). Reserva Provincial Paqrue Luro, dpto. Toay, La Pampa, agosto de 2004, nido en el suelo con tres volantones.
De la Peña (2013c). Esperanza, 3 nidos: 18-07-1983, un huevo, 19-06-1984, 2 huevos y 16-06-2002, 2 huevos. Medidas: diámetro total: de 19 a 22 cm, profundidad: de 3 a 10 cm.
Salvador y Salvador (en prep.). Dpto. San Martín, Córdoba, se hallaron 3 nidos, uno en febrero y 2 en abril, bajo matas de *Cortaderiaselloana* y matas de *Stipa* sp., postura 4 huevos.

Huevos
Pone hasta 5 huevos. Ovoidales. Blancos.

Medidas
Salvador y Salvador (en prep.): 43,6 a 46,1 x 34,9 a 37,2 X= 44,74 x 36,43 (N= 8)
Blendinger et al. (1987): 46,9 x 40,6
De la Peña (2013c): 43,9 a 47,8 x 38 a 38,7 X= 44,6 x 38,3 (N= 3)

Pesos
Salvador y Salvador (en prep.): 29 a 33 gr X: 31,4 (N= 8)
De la Peña (2013c): 41 (N= 1)
De la Peña (2013c): cáscaras 2,6 a 3,5 X= 2,90 (N= 3)

PICHONES
Descripción
Pereyra (1938b). Pichón de 45 días más o menos, tiene plumón crema rojizo con el disco facial castaño rojizo y el lado del pico blanco; cubiertas de las alas con algunas plumas muy sedosas y barras transvesales castaño claro; primarias y rectrices aun cortas son del color del adulto.
De la Peña (2013c). Plumón ocráceo amarillento. Disco facial castaño-rojizo. Al lado del pico blanco.
A medidas que se desarrollan las plumas son ocre amarillentas y las alas de ese color y barras pardas oscuras.

Observaciones
Pereyra (1931a). Isla en Escobar, pdo. Escobar, Buenos Aires, agosto de 1927, un pichón de un mes de edad.
Pereyra (1938b). Zona ribereña del noreste de Buenos Aires, pichones nacidos a fines de junio.

Más información:
Thurber et al. (2009)



Esperanza. Santa Fe. 01-07-1999. Juvenil




Esperanza. Santa Fe. 17-07-1983. Ubicación nido




Esperanza. Santa Fe. 19-06-1984



Esperanza. Santa Fe. 01-08-1998. Pichón



Esperanza. Santa Fe. 01-08-1998



Esperanza. Santa Fe. 25-10-1998



Esperanza. Santa Fe. 25-10-1998



Esperanza. Santa Fe. 01-07-1999. Juvenil

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño grande. “Penachos auriculares” largos. Mejillas castañas. Penachos, alrededor de los ojos y línea que bordea la cara negros. Ventral blanquecino con jaspeado grueso de oscuro. Alas barradas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Pseudoscops clamator midas (Schlegel, 1862) desde el norte del país hasta Córdoba, La Pampa y Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Cuatro subespecies. Ambientes abiertos con amplio rango de distribución que va desde Méjico al centro de Argentina y Uruguay, excluyendo la Amazonia. Comprende: Méjico, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Pseudoscops clamator midas (Schlegel, 1862)

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Blendinger et al. (1987); Bodrati et al. (2006b); Cavicchia y García (2012); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré (2006); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fraga (1984); Isacch et al. (2000); Klimaitis (1975b, 1993); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Leveau y Leveau (2001); Martinez et al. (1996, 1998); Massoia (1988h); Mérida y Bodtati (2006); Morici (2012b); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1927d, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Roesler (2003b); Soave et al. (1999); Torregiani et al. (2015)



Chaco

Citas: Contreras et al. (1990b)

Córdoba

Citas: Brandolín et al. (2007); Cobos et al. (1999); De la Peña (2013c); Esteban (1953); Heredia (2006); Miatello et al. (1991, 1994); Nores et al. (1983); Nores (1996); Salvador (1983a); Yzurieta (1995)

Corrientes
Citas: Wilson (1977)

Entre Ríos
Citas: Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); Mancini (2011); Peltzer (1998); Raffo et al. (2008)

Formosa
Citas: Contreras (1987c);Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); López Lanús (1997); Pujalte et al. (1995)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Moschione y Segovia (2005); Salvador (1988)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Siegenthaler (2004); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006); Tittarelli y Villareal (2009)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b); Chebez (1996a); Contreras et al. (1994b); Dabbene (1910); Krauczuk (2005, 2009); Navas y Bó (1991a)

Rio negro
Citas: Llanos et al. (2011)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Moschione et al. (2013)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); Luna y Manassero (2008b); Pautasso (2006); Straneck (1990e)


Santiago del Estero
Citas: Moschione y Bishels (2005); Nores et al. (1991); Torres y Michelutti (2001a)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Gianini (2000); Lucero (1983); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Capllonch (2007); Ortiz y Aráoz (2014)

LECHUZÓN NEGRUZCO *Asio stygius* (Wagler, 1832)

Otros nombres: Lechuza negruzca. Mocho diablo. Ñacurutú-hú. Quitilipi.

DESCRIPCIÓN
Largo: 38-46 cm.
Peso: Salvador (1988): N= 1 (M) 525 g; Marks et al. (1999): 675 g
Coloración. Pico negro. Tarsos desnudos canelas. Iris amarillo-naranja.
Dorso pardo oscuro con manchas canelas en la nuca y en la espalda. Cara parda oscura. Región auricular moteada de ocráceo. “Penachos auriculares” negros. Ventral canela manchada de pardo.
Alas pardas con algunas manchas canelas. Cola parda con barras canelas y punta ocrácea.



COMPORTAMIENTO

Alimentación

Motta Junior (2006). **Mamíferos:** Chiroptera. Rodentia. **Aves:** Columbiformes. Cuculiformes. Gruiformes. Passeriformes. Piciformes. Tinamiformes. **Insectos:** Coleoptera. Orthoptera. **Anura.**

HÁBITAT

Sabanas, bosques, selvas.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Más información:
Esteves López et al. (2004). Arizmendi et al. (2010)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño grande. “Penachos auriculares” medianos. Parte dorsal parda oscura. Ventral jaspeada de pardo y canela. Tarsos canelas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Asio stygius stygius (Wagler, 1832) en Misiones y Corrientes y *Asio stygius barberoi* W. Bertoni, 1930 en Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Formosa y Santiago del Estero.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Seis subespecies. Amplio rango de distribución en el norte de Centro América e Islas del Caribe. En Sud América desde el norte, por el oeste hasta Argentina, excluyendo la Amazonia. Comprende: Cuba, Haití, República Dominicana, Méjico, Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Asio stygius stygius (Wagler, 1832)

Corrientes

Citas: Bodrati (2004d); Contreras (1981b)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b); Bodrati (2004d); Chebez (1994, 1996a, 2009); Chebez et al. (1998); Martínez Gamba (2014); Partridge (1954)

Asio stygius barberoi W. Bertoni, 1930

Chaco

Citas: Bodrati (2004d); Bodrati et al. (2006a); Chebez et al. (1999); Zotta (1944)

Formosa

Citas: Contreras (1987c);Contreras et al. (2014); López Lanús (1997)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009)

Salta
Citas: Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013); Olrog (1985); Salvador (1988)

Santiago del Estero
Citas: Moschione y Bishels (2005); Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Blendinger et al. (2004); Blendinger (1998); Brandán y Navarro (2009); Gianini (2000); Girard (1933); Hartert y Venturi (1909); Lillo (1902); Lucero (1983); Ortiz y Capllonch (2007); Ortiz y Aráoz (2014); Vides Almonacid (1993)

LECHUZÓN DEL CAMPO *Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763)

Otros nombres: Búho. Búho de campo. Búho del rastrojo. Búho de orejas cortas. Col-col grande. Lechuza. Lechuza campestre. Lechuza de las pajas. Lechuza de los campos. Lechuza pantanera. Lechuzón. Lechuzón campestre. Lechuzón de campo. Lechuzón de las pajas. Lechuzón de los pajonales. Lechuzón de los pastos. Lechuzón pajero. Nico. Quitilipi. Suindá.

DESCRIPCIÓN
Largo: 37-38 cm.
Peso: Contino (1980): 350 g; Salvador (2014a): N= 2 (M) 376,0 y 389,0 g; N= 4 (H) X= 405,7 g (Rango 392 a 416)
Coloración. Pico negro. Dedos blanquecinos. Iris amarillo.
Dorso ocre y pardo oscuro, con algunas manchas blanquecinas en mayor cantidad en las cubiertas alares. Cara blanquecina con oscuro alrededor de los ojos. Ventral blanquecina con tono ocráceo, jaspeada de pardo, más fino en la región abdominal.
Alas y cola ocres con tono canela claro, con franjas y puntillado pardos oscuros.

COMPORTAMIENTO
Es de hábitos diurnos, crepusculares y nocturnos. Se posa en el suelo o en postes. Vuela a baja altura sobre los campos.

Alimentación
Pozzi (1918). **Mamíferos:** *Ctenomys* sp.
Aravena (1928). **Mamíferos:** Ratas. Ratones. **Insectos:** Escarabideos (*Gromphas*).
Zotta (1932). **Mamíferos:** Roedores.
Zotta (1940).**Mamíferos:** *Mus musculus, Rattus rattus.*
Contino (1980). Aves. Mamíferos.
Handford (1983). **Mamíferos:** *Andinomys edax.*
Salvador (1984).**Mamíferos:** Roedores.
Rau et al. (1992).**Mamíferos:** *Phyllotis xanthopygus.*
Diéguez (1996a). **Aves:** *Agelaioides badius, Sicalis flaveola,Troglodytes aedon, Turdus rufiventris, Zenaida auriculata, Nothura maculosa.*
Cirignoli et al. (2001). **Mamíferos:** *Akodon albiventer, Auliscomys sublimis, Calomys lepidus, Cavia* sp*., Eligmodontia puerulus, Phyllotis* sp*. Thylamys* sp*.* **Insectos:** Coleopteros.**Aves**.
Christie et al. (2004). Roedores. Anfibios. Reptiles.
Maugeri (2006a). **Aves:** *Rallus maculatus*.

Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Mamíferos:** *Akodon* sp*., Calomys* sp*.,* Cricetidae *Mus musculus.* **Insectos:** Coleoptera (Scarabaeidae).

Voces
Straneck (*in litt*.). Emite varias voces, un agudo y áspero Kiec..kieec. ó Chaec..chaei..cheii.. entre otros.

HÁBITAT
Sabanas, pajonales, praderas, áreas rurales.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Tucumán, Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Río Negro.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N	N	N	N			N		N	N



En el suelo, entre pastos.
Oculto. Rudimentario. Ligera depresión con pastos en la base.

Whitington (1888). Lomas de Zamora, Buenos Aires, nidos entre los pastos, ponen 4 a 5 huevos.
Grant (1911). Provincia de Buenos Aires, nidos con huevos en diciembre y en enero, observados por Miss Runnacles.
Gibson (1919 y 1920). Provincia de Buenos Aires, nidos con huevos desde noviembre a febrero.
Peters (1923). Maquinchao, 25 de Mayo, Río Negro, diciembre de 1920, nido con pichones.
Pereyra (1931a). Las Marianas, pdo. Navarro, Buenos Aires, nido con 3 huevos a mediados de mayo. Zelaya, pdo. Pilar, Buenos Aires, 25-05-1930, en un alfalfar, nido con 6 huevos, el 14-04-1930, nido con 2 pichones y 2 huevvos.
Laterra (1977). Isla Nº 7, ciudad deportiva de Boca, Capital Federal, Buenos Aires, 02-11-1975, nido con 4 huevos.
Contreras (1977b). Valle del río Collón Curá, Neuquén, nidifica entre noviembre y enero.
Salvador (2012d). Se localizaron 14 nidos en Villa María, dpto. Gral. San Martín, uno en Morrison, dpto. Unión y oto en Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba. Los nidos son construidos en el suelo al abrigo de una mata, generalmente bien ocultos. Tiene forma circular, con un diámetro que varía entre los 16 y 19 cm y una profundidad de 3 a 4,5 cm, están forrados de gramíneas, tallos y en algunos casos plumas del mismo ave. Se localizaron 2 nidos en marzo, 7 en abril y 5 en mayo. Las posturas variaron de 3 a 6 huevos.
Ojeda et al (2013). Parque Municipal Llao Llao, dpto. Bariloche, Río Negro, 30-09-2011, nido con 3 huevos, localizado por R. Sage.
De la Peña (2013c). Galvez, dpto. San Jerónimo, Santa Fe, 29-04-1980, nido con un huevo, López, dpto. San Jerónimo, Santa Fe, 02-05-1980, un huevo, Wildermuth, dpto. San Martín, 05-05-1993, 3 huevos, Logroño, dpto. 9 de Julio, Santa Fe, 22-06-1999, 3 pichones. Medidas: diámetro total: de 16 a 22 cm.
Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos “Pablo Girard”, un nido con 4 huevos.
Segura et al (2014b). Gral. Lavalle y Tandil, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 5 nidos.

Huevos
Pone hasta 6 huevos. Ovoidales o elípticos. Blancos.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 41,5 x 33
Salvador (2012d): 40,6 a 46,1 x 32,2 a 37,2 X= 43,3 x 34,3 (N= 49)
Ojeda et al (2013): 42,0 a 43,2 x 33,3 a 34,8 X= 42,0 x 33,8 (N= 3=)
De la Peña (2013c): 43,2 a 47 x 35,6 a 38,2 X= 45,1 x 36,9 (N= 2)

Pesos
Salvador (2012d): 27,0 a 33,5 X= 31,6 (N= 26)
Ojeda et al (2013): 23 a 24 X= 23,6 (N= 3)
De la Peña (2013c): cáscaras 2,053 a 3,157 X= 2,605 (N= 2)

PICHONES
Descripción
Salvador (2012d). Los pichones nacen con los ojos cerrados, cubiertos, incluso los dedos y tarsos, de un sueva plumón color crema, con leve tinte acanelado en el dorso. Pico pardo oscuro, interior de la boca rosa. Salvador y Salvador (2012). Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba, 25-11-2002, nido bien oculto, al pie de una mata de *Festuca* sp., contenía 2 pichones.

Peso al nacer
Salvador (2012d): 20,5 a 26 X= 22,2 (N= 12)

Alimentación
Salvador (2012d). En el área central de Córdoba la alimentación de los pichones estuvo compuesta solo por pequeños roedores. En el nido de Pampa de Achala con dos pichones se hallaron restos de aves, como un adulto de Loica común (*Stunella loyca*) y una Cachirla (*Anthus* sp.)

Observaciones
Pereyra (1931a). Conhelo La Pampa, pichón en abril.

Motti (1941). Camino de Balcarce a Mar del Plata, Buenos Aires, nido con 2 pichones.

Generalidades
Salvador (2012d). Los huevos fueron puestos en días alternos. La incubación estuvo a cargo de la hembra. El período de incubación es de 27 a 28 días.


Esperanza. Santa Fe. 29-06-2011


Esperanza. Santa Fe. 29-06-2011



Wildermuth. Santa Fe. 05-05-1993



San Eduardo. Santa Fe. 01-07-92

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Cara blanquecina con negro alrededor de los ojos. Ventral jaspeada. Alas y cola con barras canelas y pardas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Asio flammeus suinda (Vieillot, 1817) en todo el país y *Asio flammeus sanfordi* Bang, 1919 en islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Diez subespecies.Amplia distribución cosmopolita. Norte América, Eurasia y pastizales de Sud América, hasta Tierra del Fuego. Islas del Caribe, Galápagos, Malvinas y muchas otras.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Asio flammeus suinda (Vieillot, 1817)

Buenos Aires
Citas: Aravena (1928); Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Cavicchia y García (2012); Codesido et al. (2011); Darrieu y Camperi (2001a); Diéguez (1996); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Gibson (1920); Hartert y Venturi (1909); Isacch y Martínez (2001); Klimaitis (1975b); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Marelli (1933); Mérida y Bodtati (2006); Morici (2012b); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1927d, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Renard (1920); White (1882); Zapata (1998); Zotta (1932)

Observaciones: De la Peña (Claromecó, pdo. Tres Arroyos, 11-02-1976)

Catamarca
Citas: Carma (2009)

Observaciones: De la Peña (San Fernando del Valle de Catamarca, dpto. Capital, 12-03-1981)

Chaco
Citas: Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b)



Chubut
Citas: Camperi (1998); Daciuk (1977); Harris (2008); Sainz-Trápaga (2014)

Córdoba
Citas: Haro y Gutierrez (1992); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Salvador (1981, 1983); Salvador y Salvador (2012); Yzurieta (1995)

Corrientes
Citas: Brandolín et al. (2007); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Baliño y Biole (1984); Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); De la Peña (2012b); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi et al. (2003); Navas (1982); Serié y Smyth (1923)

Formosa
Citas:Contreras (1987c);Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Wetmore (1926)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Cirignoli et al. (2001)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Bonkewitzz (1990); Bruno et al. (2007); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Pereyra (1931, 1937); Siegenthaler (1984); Tejerina et al. (2006)

La Rioja
Citas: Capurro y Bucher (1986); Giacomelli (1923)

Mendoza
Citas: Darrieu (2014); Marone (1992a);Roig (1965)

Misiones
Citas: Chebez (1996a); Contreras et al. (1994a)

Neuquén
Citas: Christie et al. (1988); Contreras (1977b); Gorgoglione (2005); ; Navas (1978); Steullet y Deautier (1945); Matarasso (2007); Sympson en Veiga et al. (2005); Veiga et al. (2005); Wetmore (1926b)

Río Negro
Citas: Camperi (1998); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Daciuck (1977); Gelain (2001, 2010, 2012b);
Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Ojeda et al. (2013); Piacentini et al. (2003)

Salta
Citas: Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i)

San Luis
Citas: Masramón (1983); Nellar Romanella (1993)

Santa Cruz
Citas: Imberti (2005e)

Observaciones: De la Peña (Puerto Deseado, dpto. Deseado, 07-11-1979)

Santa Fe
Citas: Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a); Wilson (1926)

Santiago del Estero
Citas: Menegaux (1925); Nores et al. (1991)

Tierra del Fuego
Citas: Blaauw (1912); Chebez y Gómez (1988); Clark (1984, 1986); Crawshay (1907); Cunningham (1871); Humphrey et al. (1970); Olrog (1948); Schalow (1898)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Blendinger et al. (2004); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007); Capllonch et al. (2011b); Handford (1983); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Ortiz y Capllonch (2007);Ortiz y Aráoz (2014); Vides Almonacid (1993)

Asio flammeus sanfordi Bang, 1919

Islas Malvinas
Citas: Olrog (1948); Wace (1921); Woods (1988, 2006)

ORDEN: CAPRIMULGIFORMES

URUTAÚES

FAMILIA: NYCTIBIIDAE

Aves de hábitos crepusculares y nocturnos. La cabeza y los ojos son grandes. La boca es ancha y el pico es chico y curvo.

Los tarsos son cortos. En la base de las patas presentan una almohadilla.

Durante el día están posados sobre troncos, adoptan una postura erguida, se confunden con el mismo. No se posan en el suelo.

Emiten voces muy sonoras, llamativas.

Anidan sobre los troncos, en postes, ramas, en montes. No ponen materiales.

El nido es expuesto y rudimentario.

La postura es de un huevo. Blanquecino con manchitas y pintas pardas y grises.

Los pichones nacen cubiertos de plumón y permanecen varios días en el nido.

Se alimentan de insectos que capturan en vuelo.

Frecuentan bosques, montes y selvas.

URUTAÚ COLUDO *Nyctibius aethereus* (Wied-Neuwied, 1820)

Otro nombre: Urutaú grande.

DESCRIPCIÓN
Largo: 46-58 cm.
Peso: Cohn-Haft (1999): 280-447 g
Coloración. Iris amarillo.
Pardo rojizo. Las plumas están "marmoladas" de negro. Puntos negros en las cubiertas alares y en la parte inferior del pecho.
Cola larga, ligeramente graduada con las plumas centrales puntiagudas.

COMPORTAMIENTO

Voces
Straneck (*in litt*.). La voz es un lastimero y resonante Uohúu que repite esporádicamente, con preferencia en noches de luna.

HÁBITAT
Selvas, selvas en galería. Ocasionalmente en áreas abiertas en orillas de selvas.

NIDIFICACIÓN



Se carece de datos.

Más información:
Cohn-Haft (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pardo rojizo. Cola larga.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Nyctibius aethereus aethereus (Wied-Neuwied, 1820) en Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Distribución separada, una localmente en Colombia, otra en Amazonia y la tercera en la Selva Atlántica en el sureste de Brasil, este de Paraguay y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Nyctibius aethereus aethereus (Wied-Neuwied, 1820)

Misiones
Citas: Bertoni (1913, 1939); Chebez (1996a); Mazar Barnett y Pearman (2001); Straneck y Johnson (1990); Straneck (1990h)

URUTAÚ COMÚN *Nyctibius griseus* (J. F. Gmelin, 1789)

Otros nombres: Bacuí. Cacuí. Cacuy. Guaimí-cué. Guaimingué. La vieja. Pacuí. Turay. Urutaú. Urutauguá. Vieja.

DESCRIPCIÓN
Largo: 33-38 cm.
Peso: Fiora (1933): N= 1 X= 180 g; Cohn-Haft (1999): 145-202 g
Coloración. Iris amarillo.
Coloración general grisácea manchada y estriada de negro, con canela en el pecho y en las cubiertas alares. Garganta blanquecina.
Alas pardas grisáceas con manchitas ocráceas en la lámina externa de las primarias. Borde anterior de las alas negro. Cola con bandas pardas y grises.

COMPORTAMIENTO
Se posa en el extremo de ramas verticales. Por su plumaje críptico es difícil de ver. Anda solitario.

Alimentación
Zotta (1932). **Insectos:** Coleópteros (Elateridae, Lamelicorneae, Carabidae) (Parandra).Hemípteros (Lepidópteros) (Colias).

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto es una potente sucesión de 5 a 8 lastimeras notas: Juoooo..juo..juo..ju..ju..jur con una marcada modulación de frecuencia descendente.

HÁBITAT
Sabanas, montes,capueras, orillas de selvas, palmares.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Misiones, Formosa, Santa Fe.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N										N

En postes, ramas, en montes.
Expuesto. Rudimentario.

Contino (1980). Pone un huevo en el extremo de una rama quebrada.
Saibene (1987). Parque Nacional Iguazú, dpto. Iguazú, Misiones, 14-12-1985, nido con un huevo, en el extremo de un tronco seco a 2,50 m del suelo.
Daher y Spagarino (2011). Parque Nacional Río Pilcomayo, dpto. Pilcomayo, Formosa, en enero de 2011, nido en una rama a 5 m de altura. El 11 de febrero se observó un pichón.
De la Peña (2013c). Jacinto Arauz, Dpto. Las Colonias, Santa Fe, 05-12-2007, nido a 1,50 m del suelo en Poste de alambrado, que cruza un monte, con un huevo (nido localizado junto a Víctor Merlino y Francisco Junkers). 29-12-2010, San Jerónimo del Sauce, dpto. Las Colonias, Santa Fe, nido a 1,70 m del suelo, en una rama rota de Chañar, en el interior de un monte ralo y el 15-01-2013, Jacinto Arauz, nido en el mismo poste del primer nido, con un pichón. .

Huevo
Pone 1 huevo.
Ovoidal. Blanquecino con manchitas y pintas pardas y grises, más concentradas en el polo mayor.

Medidas
Saibene (1987): 38,7 x 27,6
De la Peña (2013c): 39,0 x 27,5

PICHONES
Descripción
De la Peña (2013c). 1 día. Todo el cuerpo cubierto de plumón blanquecino. Patas grisáceas. Pico negro. Ojos amarillentos.
14 días. Está con la misma postura del adulto. La cabeza hacia arriba, con el lomo adosado a la parte ventral del que lo cuidaba. Plumaje blanquecino, notándose el raquis oscuro de las plumas, lo que le daba un aspecto jaspeado. Se notan bastante largas las vainas de las plumas alares.
Los ojos cerrados o entreabiertos.
20 días. Se notan las plumas de cobertura del ala, oscuras. De noche los ojos están abiertos.
25 días. Tiene las cubiertas alares oscuras. La cola de 3,4-4 cm. Dorsalmente más gris. Mástiles oscuros.
Plumas de las cejas ligeramente elevadas. Primarias oscuras.
El adulto más vivaracho. Ubicado al lado. Entreabre los ojos.
26 días. El pichón queda solo.



Todas las noches a la misma hora (20,40) cuando comenzaba a oscurecer un adulto alimentaba al pichón. El pichón aletea cuando ve al adulto.
30 días. Mueve la cabeza levemente al aproximarse una persona. Ojos entreabiertos. Amarillos.
Plumaje como adulto pero más claro. Cola de unos 7 cm.
39 días. Color claro. Cola de 10 cm. Dos líneas oscuras por debajo del pico. Algunas manchas en el pecho.
41 días. Deja el nido.

Observaciones
Contino (1980). Se encuentran pichones crecidos en el Chaco salteño en el mes de febrero.

Generalidades
Saibene (1987). La permanencia del pichón en el nido es de 52 días.
De la Peña (2013c). El poste tenía la superficie irregular, con un hueco de 1 a 2 cm. de diámetro x 5 cm. de largo y 5 cm. de profundidad.
El huevo estaba ubicado en forma transversal en la parte más angosta del hueco. Por lo tanto una parte quedaba sin tocar el poste.
El adulto que incubaba no cubría totalmente al huevo.
Se puede parar una persona al lado, a pocos centímetros sin que se inmuten, en el nido de J. Arauz, en el otro era más arisco y volaba al acercase una persona.


J. Arauz. Santa Fe. 07-01-2008


J. Arauz. Santa Fe. 15-01-2013


J. Arauz. Santa Fe. 02-01-2008


J. Arauz. Santa Fe. 02-01-2008. 20 días de edad



J. Arauz. Santa Fe. 12-12-2007



J. Arauz. Santa Fe. 17-12-2007. 4 días de edad



San Jerónimo del Sauce. Santa Fe.01-02-2011
Ubicación del nido



San Jerónimo del Sauce. Santa Fe. 20-01-2011. 14 día de edad



San Jerónimo del Sauce. Santa Fe. 29-12-2010



San Jerónimo del Sauce. Santa Fe. 29-12-2010



J. Arauz. Santa Fe. 15-01-2013



J. Arauz. Santa Fe. 07-01-2008. 25 días de edad



J. Arauz. Santa Fe. 12-12-2007



San Jerónimo del Sauce. Santa Fe. 20-01-2011. Ambiente



San Jerónimo del Sauce. Santa Fe. 29-12-2010



IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pardo grisáceo con manchas y estrías negras en el pecho. Negro en el borde de las alas. Alas y cola largas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Nyctibius griseus griseus (J. F. Gmelin, 1789) desde el norte del país hasta San Luis, centro de Santa Fe y norte de Entre Ríos.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Desde el sur de Centro América, norte y centro de Suamérica llegando hasta Argentina. Comprende: Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguayy Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Nyctibius griseus griseus (J. F. Gmelin, 1789)

Buenos Aires
Citas: Pereyra (1932a, 1938b)

Catamarca
Citas: Carma (2009); Straneck en Nores y Yzurieta (1981)

Chaco
Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004)

Córdoba
Citas: Ordano y Miatello (2001); Robledo en Yzurieta (1995)

Corrientes
Citas: Chatellenaz et al. (2010); Chatellenaz (2004); Contreras (1981b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Observaciones: De la Peña (Corrientes, dpto. Capital, 31-10-1991)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); Chebez et al. (1990); De la Peña (2012b); Marateo et al. (2009); Stranck enNores y Yzurieta (1981)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c);Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); López Lanús (1997)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Fiora (1933); Moschione y Segovia (2005); Zotta (1932)

La Rioja
Citas: Giacomelli (1923)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014); Saibene (1987); Straneck (1990h)

Observaciones: De la Peña (Santo Pipó, dpto. San Ignacio, 10-10-1981)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

San Luis
Citas: Nellar Romanella (1993)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2011b, 2011f, 2013c); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d)

Santiago del Estero
Citas: Ménégaux (1925); Nores et al. (1991); Serié (1935)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Lucero (1983); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Aráoz (2014); Vides Almonacid (1993)

ATAJACAMINOS

FAMILIA: CAPRIMULGIDAE

Algunas especies de esta familia son aves de hábitos crepusculares y otras de nocturnos. Tienen la boca grande con vibrisas a los lados. El pico es pequeño. Los ojos son grandes y reflejan la luz cuando son iluminados de noche. El cuello y las patas son cortos.

Las alas son largas. Algunas especies tienen plumas muy largas en la cola.

Varias especies se identifican por el canto.

No construyen nido. Depositan los huevos en el suelo o sobre ramas.

Ponen 1 ó 2 huevos.

Se alimentan de insectos que capturan en vuelo.

Frecuentan praderas, estepas, serranías, pastizales, áreas rurales, montes, bosques, selvas, orillas de bañados.

Subfamilia: Chordelinae

ÑACUNDÁ *Chordeiles nacunda* (Vieillot, 1817)

Otros Nombres: Bocón. Chotacabras. Dormilón de vientre blanco. Dormilón grande. Duerme-duerme. Gallina ciega. Pájaro ateí. Perezoso. Tarpuí. Tucutucu.

DESCRIPCIÓN
Largo: 27,5-32 cm.
Peso: Salvador (1988): N= 1 (M) 160,0 g; Salvador (2014a): N= 3 (M) X= 188,0 g (Rango 182 a 193); N= 3 (H) X= 173,3 g (Rango 169 a 178)
Cleere (1999): (M) 142-188 g, (H) 124-170 g.
Coloración. Pico pardo. Patas y dedos grises parduscos. Iris pardo.
Parte dorsal parda profusamente punteada y vermiculada de ocráceo y canela y manchas negras. Garganta blanca; por debajo semicollar canela. Pecho pardo moteado de blanquecino. Resto de la parte ventral blanco.
Alas negras con franja en diagonal blanca. Cola como el dorso, con bandas oscuras en las plumas centrales; las restantes con banda subterminal negra y ancha punta blanca.
La hembra carece de blanco en la punta de la cola.

COMPORTAMIENTO
De hábitos crepusculares y nocturnos. Puede andar solitario, en parejas o en pequeñas bandadas. Vuela sobre poblaciones, en grupos dispersos. Se posa en el suelo.

Alimentación
Zotta (1932). **Insectos:** Coleópteros (Scarabaeidae) (*Chalipus gagates*). Hemípteros. Lepidópteros.
Zotta (1934). **Insectos:** Coleópteros (Carabidae, Scarabaeidae). Himenópteros (*Nezara viridula*). Orthópteros. **Semillas.**

Beltzer et al. (1988). **Insectos:** Coleópteros(Cerambycidae, *Cyllene* sp.) (Elateridae, Dystiscidae, Lampiridae, *Photinus* sp.) (Carabidae, *Diloboderus abderus, Lygirus* sp.), Dermáptera(Forficulidae, *Doru lineari*), Hemípteros(Pentatomidae, *Nezara viridula, Piezodorus guidini*) (Belostomidae, *Belostoma micantulum*). Homópteros(Cicadidae, *Quesada gigas, Proarna rufo*). Lepidoptera(Noctuidae, *Faronia albilinea*). Odonata(Anisoptera). Orthoptera(Tettigonidae, *Gramadera clara*) (Acrididae, *Dichroplus conspersus*) (Grillidae, *Grillus* sp.).
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). **Insectos:** Coleoptera (Carabidae, Elateridae, Scarabaeidae). Hemiptera (Pentatomidae). Homoptera. Lepidoptera (polillas).
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Voces
Straneck (*in litt*.). La voz es un suave y gutural Jurrr...jourrrr...jourrrr.

HÁBITAT
Sabanas, bosques abiertos, praderas, áreas rurales, poblaciones.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Tucumán, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N								N	N	N



En el suelo, entre pastos.
Oculto. Rudimentario. Ligera depresión con pastos en la base.

Lillo (IML). Tucumán, 14 nov. 1922, 2 huevos.
Salvador y Salvador (en prep.). Dpto. San Martín, Córdoba, 3 nidos hallados en noviembre y diciembre, en áreas con poca vegetación, con 2 huevos o 2 pichones.
Barrows (1884). Entre Ríos, nidos con 2 huevos en noviembre.
Pereyra (1932a). Nidos desde noviembre a febrero. Zelaya, pdo. Pilar, Buenos Aires, nidos con huevos y con pichones.
Pereyra (1938b). Zona ribereña del noreste de Buenos Aires, nidifica desde noviembre a febrero.
De la Peña (2013c). Villa San José, dpto. Colón, Entre Ríos, 25-10-1976, 2 huevos; Progreso, Dpto. Las Colonias, Santa Fe, 28-10-1976, 2 huevos. Los nidos miden: diámetro total, de 16 a 22 cm.

Huevos
Pone 2 huevos.
Ovoidales o elípticos. De color ocre rosado, profusamente manchados e castaño claro. Cáscara brillante.



Medidas
Salvador y Salvador (en prep.): 0,881 a 1,152 X= 1,045 (N= 4)
Hartert y Venturi (1909): 35 a 35,5 x 25 a 25,5
Pereyra (1938b): 34 x 26
De la Peña (2013c): 35,4 a 38,4 x 25,7 a 26,8 X= 36,7 x 26 (N= 4)

Peso
De la Peña (2013c): cáscaras 0,881 a 1,152 X= 1,045 (N= 4)

PICHONES
Descripción
Pereyra (1938b). Los pichones nacen revestidos de un plumón crema oscuro.

Más información:
Pereyra (1932a). Shogren (2011)


Progreso. Santa Fe. 28-10-1976


Campo Andino. Santa Fe. 11-12-2007


Esperanza. Santa Fe. 13-11-2011. Juvenil

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Ventral blanca, excepto el pecho. Franja alar blanca.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Chordeiles nacunda nacunda (Vieillot, 1817) desde el norte del país hasta Santa Cruz.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies. Extenso rango de distribución por Sud América (excepto por el oeste), hasta Argentina. Comprende: Trinidad y Tobago, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina.



CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Chordeiles nacunda nacunda (Vieillot, 1817)

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Hartert y Venturi (1909); Isacch et al. (2006); Klimaitis (1975b); Marelli (1933); Mérida y Bodtati (2006); Morici (2012b); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1932a, 1938b); Roesler (2001a); Zotta (1932)

Catamarca
Citas: Carma (2009)

Chaco
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004)

Chubut
Citas: Bodrati (2005c)

Córdoba
Citas: Nores et al. (1983); Nores (1996); Salvador (1983a); Yzurieta (1995)

Corrientes
Citas: Chatellenaz et al. (2010); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Marelli (1918); Straneck (1990e)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (1988, 2006); De la Peña (2011f, 2013c); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013c);
Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi et al. (2003); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Zapata (1975)

Formosa
Citas: Bodrati y Areta (2010); Chebez et al. (1998); Contreras (1987c);Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Narosky y Martelli (1995); Pujalte et al. (1995); Wetmore (1926b)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Chebez et al. (1998); Salvador (1988)

La Pampa
Citas: De la Peña y Tittarelli (2011); Siegenthaler (2004)

Mendoza
Citas: Contreras (1979g); Contreras y Fernández (1980a); Reed (1916); Roig (1965)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005)

Neuquén
Citas: Matarasso (2007)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i)

Santa Cruz
Citas: Imberti (2001a)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009); Wilson (1926)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Ortiz y Aráoz (2014)

AÑAPERO CHICO *Chordeiles pusillus* Gould, 1861

DESCRIPCIÓN
Largo: 15-19 cm.
Peso: Krauczuk (2000): N= 1 (H) 33,4 g.
Coloración. Pico neguzco. Patas y dedos parduscos. Iris pardo.
Dorso pardo grisáceo vermiculado de negruzco y punteado de ocráceo.
Garganta blanca.
Pecho pardo grisáceo. Abdomen vermiculado de blanco y pardo oscuro.
Subcaudales blancas.
Alas pardas con franja blanca en las cuatro primarias externas. Las secundarias con puntas ocráceas.
Cubiertas alares pardas con puntos ocráceos. Cola parda oscura, las plumas centrales con franja grisácea y las otras ocráceas. Todas las plumas menos las centrales y los pares más externos, con punta blanca.
La hembra tiene la cola moteada de pardo.



HÁBITAT
Orillas de selvas, desmontes, sabanas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Misiones.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N		

Nido en el suelo.



Krauczuk (2000). Campo San Juan, Santa Ana, dpto. Candelaria, Misiones, 23-10-1995, nido en la parte alta de una loma, al borde de una saliente rocosa, a 100 m de la selva costera del río Paraná. Tenía un huevo.

Huevos
Pone 2 huevos.
Color crema, con pintas marrones de distintos tamaños y algunas pintas gris oliváceas.

Medidas
Krauczuk (2000): 27 x 20

Peso
Krauczuk (2000): 6



IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Garganta blanca. Franja blanca en las alas, visible cuando vuela.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Posible raza *Chordeiles pusillus pusillus* Gould, 1861 en Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Seis subespecies. Dos poblaciones bien separadas, una en el norte de Sud América, en Colombia, Venezuela, Guayanas y norte deBrasil. La otra población se localiza en el centro de Brasil, llegando al este de Bolivia y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Chordeiles pusillus pusillus Gould, 1861

Misiones
Citas: Krauczuk (1996, 2000, 2013)

AÑAPERO DE ALAS CORTAS *Chordeiles acutipennis* (Hermann, 1783)

Otros nombres: Añapero de alas finas.

DESCRIPCIÓN
Largo: 19-23 cm
Peso: Cleere (1999): (M) 34-62 g, (H) 34-64 g.

Coloración. Pico pardo. Patas y dedos grises parduscos. Iris pardo.
Parecido al Añapero boreal pero de menor tamaño. Ventralmente ocráceo barrado de pardo grisáceo. Banda blanca en la parte media de las primarias.



HÁBITAT
Sabanas, campos, desiertos, áreas suburbanas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.
Más información:
Cleere (1999)

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Chordeiles acutipennis acutipennis (Hermann, 1783) en Chaco, Formosa, Salta.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Siete subespecies. Desde el sur de Estados Unidos, América Central y Sudamérica hasta Perú, norte de Chile y Argentina.

Chaco
Citas: Bodrati y Areta (2010); Moschione y Bishels (2004)

Formosa
Citas: Bodrati y Areta (2010)

Salta
Citas: Bodrati y Areta (2010). Moschione et al. (2013)

AÑAPERO BOREAL *Chordeiles minor* (J. R. Forster, 1771)

Otro nombre: Añapero.

DESCRIPCIÓN
Largo: 22-25 cm.
Peso: Contreras (1983a) N= 1 (M) X= 67,5 g; N= 1 (H) 62,6 g; Salvador (2014a): N= 1 (M) 59,8 g
Coloración. Pico negruzcoo. Patas y dedos parduscos. Iris pardo.
Parte dorsal parda oscura estriada, manchada y punteada de canela y blanquecino. Garganta blanca. Pecho pardo oscuro moteado de canela, resto de la parte ventral blanquecino barrado de pardo oscuro.
Alas pardas con mancha blanca en mitad de las primarias. Cola parda con finas bandas blanquecinas.
La hembra tiene la garganta y bandas de la cola ocráceas.

COMPORTAMIENTO
De hábitos diurnos y crepusculares. Forma bandadas. Vuela relativamente alto y errático, seguido de cortos planeos. Se posa en las ramas de los árboles.

Alimentación
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). Coleoptera. Lepidoptera (polillas).

Voces
Straneck (*in litt*.). La voz es áspera, de una sola sílaba, emitida en vuelo, Biin o Bein.

HÁBITAT
Montes, áreas rurales, poblaciones, praderas, sabanas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Garganta y mancha ala blancas. Dorsal pardo, manchado de canela y blanquecino. Ventral barrada. Cola furcada.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Chordeiles minor minor (J. R. Forster, 1771) migratorio de Norteamérica llega hasta La Rioja, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, y *Chordeiles minor chapmani* Coues, 1888 llega hasta Santiago del Estero y Entre Ríos.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Nueve subespecies. Nidifica en Canadá y Estados Unidos. En invierno boreal migra a Sud América.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Chordeiles minor minor (J. R. Forster, 1771)

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Darrieu y Camperi (2001a); Delhey (1992); Fiameni (1987, 1994); Hartert y Venturi (1909); Maugeri (2002a); Mérida y Bodtati (2006);Narosky y Di Giacomo (1993); Pereyra (1938b); Pugnali y Chamorro (2008)

Chaco
Citas: Bodrati (2005); Bodrati y Pietrek (2000); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004)
Córdoba
Citas: Nores et al. (1983); Nores (1996); Salvador (1983a); Sferco y Nores (2003); Yzurieta (1995)

Corrientes
Citas: Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1983a); Giraudo et al. (2006)

Entre Ríos
Citas: Marateo et al. (2009)

Formosa
Citas: Bodrati y Areta (2010); Contreras (1987c);Contreras et al. (2014)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009)

La Pampa
Citas: De la Peña y Tittarelli (2011)

La Rioja
Citas: Nores y Salvador (1985)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b); Chebez (1996a); Krauczuk (2005, 2009)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

San Luis
Citas: Nellar Romanella (1993)

Santa Fe
Citas: De la Peña (1988c, 2011f); López-Lanús et al. (2013a); Manassero et al. (2006); Pautasso (2002)

Santiago del Estero
Citas: Oberholser en Steullet y Deautier (1935-1946)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Juri (2007); Juri y Chani (2005); Lucero (1983); Ortiz y Aráoz (2014)

Chordeiles minor chapmani Coues, 1888

Corrientes
Citas: Contreras (1981b)

Misiones
Citas: Navas y Bo (1988a)

Santiago del Estero
Citas: Oberholser en Steullet y Deautier (1935-1946)

AÑAPERO CASTAÑO *Lurocalis semitorquatus* (J. F. Gmelin, 1789)

Otros nombres: Atajacaminos castaño. Dormilón castaño. Dormilón de abdomen castaño. Dormilón de vientre castaño.

DESCRIPCIÓN
Largo: 25 (19-29) cm.
Peso: Cleere (1999): (M) 82-89 g, (H) 79-81 g.
Coloración. Pico negruzco. Patas y dedos grises parduscos. Iris pardo.
Coloración. Dorso pardo oscuro con pintas castañas en la cabeza, el resto moteado de blanquecino y castaño. Garganta blanca. Pecho pardo oscuro manchado de castaño y ocre, abdomen barrado de pardo oscuro.
Alas casi negras con pequeños anillos y lunares castaños. Escapulares blancas estriadas y manchadas de pardo oscuro. Cola parda oscura con barras grises y ocráceas.

COMPORTAMIENTO
Es de hábitos crepusculares. Se posa en las ramas de los árboles. Sobrevuela poblaciones. Canta sobrevolando la copa de los árboles selváticos y zonas abiertas cercanas a las selvas.

Voces
Straneck (*in litt*.). Su voz en un silbido Juit.jouit.. emitido esporádicamente.

HÁBITAT
Sabanas, pastizales, bosques y selvas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Misiones.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N											N



En ramas horizontales. Altos.
Straneck et al. (1987a). Parque Nacional Iguazú, dpto. Iguazú, Misiones, 06-12-1982, nido en una rama horizontal de una Mora blanca (*Alchornea iricurana*) a 10 m del suelo. El nido estaba en una rajadura cicatrizada en la corteza, de 20 cm de largo, 5 cm de ancho y 1 cm de profundidad. Tenía un huevo.
Straneck et al. (1987a). Puerto Iguazú, dpto. Iguazú, Misiones, Rumboll localizó en enero de 1984 un nido en una rama horizontal a 10 m del suelo y otro en Libertad, 30 km al sur del anterior a 18 m de altura. En ambos se sospecha que estaban con pichones.

Huevo
Pone 1 huevo.
Blanco opaco con manchas pardas y grises, más intensas en la zona ecuatorial y en uno de los polos.

Medidas
Straneck et al. (1987a): 37 x 25

Peso
Straneck et al. (1987a): 10,3

Más información:
Arizmendi et al. (2012)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Coloración oscura. Garganta blanca. Alas puntiagudas y largas que sobresalen de la cola estando plegadas, sin banda blanca. Cola corta.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Lurocalis semitorquatus nattereri (Temminck, 1822) en Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cinco subespecies. Se lo encuentra desde el sur de Méjico al norte de Argentina. Comprende: Méjico, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina,
Por lo menos las poblaciones más sureñas de *L. s. nattereri* se piensa que son migratorias hacia el norte, hasta Venezuela.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Lurocalis semitorquatus nattereri (Temminck, 1822)

Buenos Aires
Citas: Coconier (2005); Jaramillo (2000)

Chaco
Citas: Bodrati y Klavins (2004a)

Corrientes
Citas:Contreras (1981b)

Entre Ríos
Citas: Marateo et al. (2009)

Formosa
Citas:Contreras (1987c)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009)

Misiones
Citas: Bodrati y Areta (2010); Bodrati et al. (2010b); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014); Straneck et al. (1987a); Straneck (1990g)

Salta
Citas: Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

ATAJACAMINOS ÑAÑARCA *Systellura longirostris* (Bonaparte, 1825)

Otros nombres: Atajacaminos común. Bocón nocturno bigotudo. Dormilón común. Golondrina nocturna. Nictibio. Nocturno de collar. Pájaro bocón de la noche. Pájaro murciélago. Pastilla. Tarpuí. Zoncito.

DESCRIPCIÓN
Largo: 20-27 cm.
Peso: Camperi (1992a): N= 1 (M) 58,9 , N= 3 (H) X= 60,8 g (Rango 55,6 a 69,2); Salvador (2014a): N= 2 (M) 52,6 y 53,0 g; N= 2 (H) 57,3 y 58,2 g; Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 (M) 59 g
Coloración. Pico negruzco. Patas y dedos pardos. Iris pardo.
Dorso negro moteado de gris y canela. Semicollar nucal canela. Garganta parda oscura y ocrácea, finamente barrada de blanco ocráceo. En la parte superior del pecho banda blanca y canela. Abdomen ocráceo barrado de pardo oscuro.
Alas negras con mancha en diagonal blanca. Cubiertas moteadas de canela. Cola con las plumas centrales como el dorso, restantes negras con mancha basal y mitad terminal blanca, con borde canela puntillado de pardo. Ventralmente es blanca con ancha banda negra.
La hembra tiene banda alar fina, canela. Collar del pecho ocráceo. La cola ventralmente es barrada y no tiene blanco.

COMPORTAMIENTO
De hábitos crepusculares y nocturnos. Se posa en el suelo o en ramas bajas.

Alimentación
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). Coleoptera (Carabidae, Elateridae, Scarabaeidae, no identificado). Hemiptera. Homoptera (Cercopidae, Membracidae). Orthoptera (Gryllidae).

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto es un agudo y áspero silbido con modulación de amplitud ascendente y descendente: Fiiouhiii repetido frecuentemente.

HÁBITAT
Estepas, orillas de selvas, montes, sabanas, serranías, áreas rurales, arboledas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Neuquén, Río Negro. Chubut.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	N



En el suelo.
Expuesto. Rudimentario. Los huevos son puestos sobre la tierra.

M. Nores y D. Yzurieta (*in litt*.). Hallaron un nido en el Parque Nacional Laguna Blanca, Neuquén, con 2 pichones, el 25-01-1980.
Salvador (*in litt*.). Viedma, dpto. Adolfo Alsina, Río Negro, 24-11-1995, un nido en una pequeña depresión, con 2 huevos incubados, Caleta Valdés, dpto. Biedma, Península Valdés, Chubut, 27-11-1995, un nido en una pequeña depresión bajo un arbusto, con 2 huevos incubados.
Salvador y Salvador (en prep.). Dpto. San Martín, Córdoba, se hallaron dos nidos en noviembre y diciembre, uno entre matas de *Cynodon* sp. en un bosque ralo y el otro sobre hojas secas en una plantación de eucaliptos, ponen 2 huevos.
Pereyra (1932a). Conhelo, dpto. Conhelo, La Pampa, nidos con huevos.
Pereyra (1937b). Conhelo, dpto. Conhelo, La Pampa, ponen a principios de noviembre, en el suelo limpio debajo de caldenes, ponen 2 huevos.
Contreras (1977b). Valle del río Collón Curá, Neuquén, nidifica entre noviembre y enero.
Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba, nidifica en la zona.
De la Peña (2013c). Cayastacito, dpto. San Justo, Santa Fe, 25-10-1970, 2 pichones, Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 02-12-19771, un huevo.
Schaaf et al. (2015a). Río Ceballos, dpto. Colón, Córdoba, entre octubre de 2012 a enero de 2014, 14 nidos.

Huevos
Pone 2 huevos.
Ovoidales. De color ocre con pintitas grises y pardas claras.



Medidas
Salvador y Salvador (en prep.): 29,1 a 29,9 x 20,2 a 21,8 X= 29,57 x 21,12 (N= 4)
Salvador (*in litt*.): 28,8 a 29,8 x 20,3 a 22,1 X= 28,0 x 21,3 (N= 4)
Pereyra (1937b): 29,0 x 21,5
De la Peña (2013c): 27 x 19,5

Schaaf et al. (2015a): X= 25,6 x 19,8

Pesos
Salvador y Salvador (en prep.): 6,8 a 7,3 X= 7,1 (N= 4)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,351 (N= 1)
Schaaf et al. (2015a): X= 4,9

Más información**:**
Schaaf et al. (2015a)

Depredadores
De adultos: *Bubo magellanicus* (Donázar et al. 1997), (Teta et al. 2001), *Falco peregrinus* (Ellis et al. 2002)


Esperanza. Santa Fe. 02-12-1977


Esperanza. Santa Fe. 17-07-2007

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Alas negras con banda blanca y las cubiertas con puntos canelas. Cola negra con mancha blanca en el macho. Diferenciar a la hembra de las hembras del Atajacaminos colorado, del Curiango y del Atajacaminos chico.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Systellura longirostris atripunctatus (Chapman, 1923) entre los 3000 y los 4000 m de altura en Jujuy y Salta; *Systellura longirostris bifasciatus* Gould, 1837 entre los 1000 y los 2000 m de altura desde Salta y Tucumán, por el oeste hasta Neuquén, Río Negro y Chubut; *Systellura longirostris longirostris* Bonaparte, 1825 en las provincias del noreste, y *Systellura longirostris patagonicus* Olrog, 1962 desde Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa hasta Santa Cruz. En invierno migra al norte. Accidental en las Islas Malvinas.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Siete subespecies. Por todo el oeste de Sud América, en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina hasta Santa Cruz. Además este de Brasil y Uruguay. En invierno migran poblaciones sureñas a provincias del norte de Argentina, Paraguay y este de Bolivia.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Systellura longirostris atripunctatus (Chapman, 1923)

Jujuy
Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009) Chebez et al. (1998); Moschione y Segovia (2005)

Systellura longirostris bifasciatus Gould, 1837

Catamarca
Citas: Alabarce (1987a); Alabarce et al. (1990); Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009)

Observaciones: De la Peña (San Fernando del Valle de Catamarca, dpto. Capital, 12-03-1981)

Chaco
Citas: Contreras et al. (1990b) ¿?

Observaciones: Bodrati, A. (*in litt*. 2012)

Chubut
Citas: Camperi (1998); Harris (2008); Sainz-Trápaga (2014); Vidoz (1995)

Córdoba
Citas: Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Salvador (1983a); Sferco y Nores (2003); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Copina, dpto. Punilla, 25-11-1990)

Formosa
Citas: Conteras (1987b); Chebez et al. (1998); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h) ¿?

Jujuy
Citas: Colina (2015)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Pereyra (1927e, 1937); Siegenthaler (2004); Siegenthaler et al. (1990)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Capurro y Bucher (1986); Giacomelli (1923); Hayward (1967)

Mendoza
Citas: Blendinger y Alvarez (2002); Burmeister (1861);Calí et al. (2008); Contreras (1979g); Contreras y Fernández (1980); Darrieu (2014); Lucero (2013f); Marone (1992); Olivera et al. (2009); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (1995d, 2005); Wetmore (1926b); Wolffhuegel (1929)

Neuquén
Citas: Acerbo (2000); Contreras (1977b); Chehebar et al. (1992); Christie et al. (1988); Funes y Sheridan en Fiori y Zalba (1999); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Navas (1978);Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Camperi (1998); Chehebar y Ramilo (1992); Gelain (2001, 2010, 2012b); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Peters (1923b); Piacentini et al. (2003); Trejo y Seijas (2003)

Salta
Citas: Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007) ; Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Acosta y Murúa (2001); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i); Moschione y Banchs (1992)

Santiago del Estero
Citas: Capllonch et al. (2015)

Tucumán
Citas: Antelo (1999); Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch et al. (2015); Esteban (1953); Lucero (1983); Ortiz y Aráoz (2014); Vides Almonacid (1993)

¿?. Las poblaciones de Chaco y Formosa no están bien determinadas las subespecies presentes.

Systellura longirostris longirostris (Bonaparte, 1825)

Corrientes
Citas: Cano et al. (2010); Chatellenaz et al. (2010) (*)

Santa Fe
Citas: Giai (1950)

Systellura longirostris patagonicus Olrog, 1962

Buenos Aires
Citas: Carrizo et al. (2001); Darrieu y Camperi (2001a); Fiameni (1994); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Salvador y Di Giacomo (2014); Zapata (1998)

Córdoba
Citas: Nores et al. (1983); Nores (1996); Schaaf et al. (2015a)

Chaco
Citas: Chatellenaz (2005a); Moschione y Bishels (2004)
Corrientes
Citas:Contreras (1981b); López-Lanús et al. (2013b)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Baliño y Biole (1984); Beltzer et al. (2006); Camperi (1992a.); Marateo et al. (2009)

Formosa
Citas: Contreras (1987c)

La Pampa
Citas: Bruno et al. (2007); Pereyra (1923a, 1927e)

Neuquén
Citas: Christie et al. (2004); Contreras (1977b)

San Luis
Citas: Nellar Romanella (1993)

Río Negro
Citas: Christie et al. (2004); Gelain (2010); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Grigera y Rubulis (1985); Hecker y Vidoz (1998)

Santa Cruz
Citas: Darrieu et al. (2008); De Lucca y Saggese (1992); Imberti (2005e); Olrog (1962); Zapata (1969)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2011f, 2013c)

Santiago del Estero
Citas: Capllonch et al. (2015); Ménégaux (1925); Nores et al. (1991)

Islas Malvinas
Citas:Woods (2006)

CURIANGO *Nyctidromus albicollis* (J. F. Gmelin, 1789)

Otros nombres: Acuraná. Atajacaminos de collar blanco. Cuieyo. Curiau. Dormilón de collar blanco. Ibiyáu. Pauraque.

DESCRIPCIÓN

Largo: 22-30 cm.

Peso: Cleere (1999): (M) 44-87 g (H) 43-90 g.

Coloración. Pico negruzco. Patas y dedos grises. Iris pardo.

Cabeza puntillada de gris con notables manchas negras, principalmente en la corona.. Lados de la cara y cuello castaños moteados de pardo oscuro. Dorso gris ocráceo vermiculado de pardo.

Escapulares grisáceas con tono ocráceo y manchas pardas oscuras ribeteadas de canela y algunas plumas con tono castaño. En la parte superior del pecho semicollar blanco, resto de la zona ventral ocráceo vermiculado de pardo oscuro.

Alas pardas oscuras con mancha en diagonal blanca. Plumas externas de la cola negras con banda interna blanca, las siguientes enteramente blancas con punta parda y las centrales como el dorso. Ventralmente es blanca y parda.

La hembra ventralmente es ocrácea barrada de pardo claro. Mancha ocrácea canela en el ala. Cola como el dorso, ventralmente es barrada.

COMPORTAMIENTO

Es de hábitos crepusculares y nocturnos. Anda solitario o en pareja.

Se posa en el suelo. Entre la vegetación o en zonas abiertas.

Voces

Straneck (*in litt*.). El canto está formado por 4 sílabas emitidas rápidamente en modulación ascendente de frecuencia y luego marcadamente descendente hacia el final. Es un silbido: Juhihahou.. repetido esporádicamente.

HÁBITAT

Sabanas, orillas de selvas, capueras.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Chaco, Misiones.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	



En el suelo.
Expuesto. Rudimentario. Puede colocar hojas en la base.

Bodrati (2004b). Parque Nacional Chaco, dptos. Sargento Cabral y Presidencia de la Plaza, Chaco, dos nidos: 30-10-1997, 2 huevos y el 24-11-1998 con 2 huevos.
De la Peña (2013c). Capioví, dpto. Lib. Gral. San Martín, Misiones, 15-10-2001, nido localizado por Máximo Uranga, en una plantación de *Eucaliptus*. Con 2 huevos.

Huevos
Pone 2 huevos.
Elípticos. De color crema rosado con manchas grises y pardas rojizas. Cáscara brillante.

Medidas
Bodrati (2004b). 32,2 a 32,6 x 22,1 a 22,5 X= 32,4 x 22,3 (N= 4)
De la Peña (2013c): 31 a 32 x 23 X= 31,5 x 23 (N= 2)

PICHONES
Descripción
Bodrati (2004b). Los pichones están cubiertos de un profuso plumón de color salmón oscuro con la punta negra. Presentan manchas parduscas poco conspicuas, concentradas en la parte superior de la cabeza y el lomo.



Capioví. Misiones. 15-10-2001

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO



Tamaño grande. Notables manchas negras en la corona. Manchas pardas oscuras ribeteadas de canela en las escapulares. Cola relativamente larga, con las plumas externas blancas, en el macho. Notable banda alar blanca, visible en vuelo.
Diferenciar a la hembra de las hembras del Atajacaminos ñañarca y del Atajacaminos colorado. Ver parte ventral de las colas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Nyctidromus albicollis derbyanus Gould, 1838 en Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Formosa, Chaco y noroeste de Santa Fe.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Siete subespecies. Su amplio rango de distribución abarca desde Texas, Estados Unidos hacia el sur hasta Argentina. Comprende: Estados Unidos, Méjico, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Nyctidromus albicollis derbyanus Gould, 1838

Chaco
Citas: Bodrati (2004b)

Corrientes
Citas: Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Entre Ríos
Citas: Marateo et al. (2009)

Formosa
Citas: Contreras (1987c);Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Nores (1992), Nores y Yzurieta (1986)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Chebez (1996a); Contreras et al. (1994b); De la Peña (2013c); Giai (1950); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009);Martínez Gamba (2014); Straneck (1990e)

Salta
Citas: Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

Santa Fe
Citas: Giai (1950); Manassero y Luna (2009b); Pautasso (2002a)

ATAJACAMINOS DE ALAS NEGRAS *Eleothreptus anomalus* (Gould, 1838)

Otros nombres: Atajacaminos alas negras. Atajacaminos de los pantanos. Atajacaminos pantanero. Dormilón de los pantanos. Dormiloncito. Tapita. Zoncito.

DESCRIPCIÓN
Largo: 18-20 cm.
Peso: Cleere (1999): (M) 43,5 g.
Coloración. Pico pardo oscuro. Patas y dedos parduscos. Iris pardo.
Coloración general grisácea manchada de negro. Cuello rojizo. Ventral parda ocrácea.
Cobijas y secundarias (éstas son muy cortas) pardas grisáceas manchadas de negro. Primarias curvadas, negras con punta blanca. Cola corta parda ocrácea barrada de negruzco. Punta blanquecina.
Hembra similar pero con manchas rojizas en el ala y sin punta blanca. Las remeras secundarias son de largo normal.



COMPORTAMIENTO

Alimentación
Pereyra (1939). Coleópteros. Hormigas. Lepidópteros.

HÁBITAT
Orillas de bañados, esteros y lagunas. Sabanas, palmares, pastizales húmedos.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Santa Fe, Santiago del Estero, Corrientes.

.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	

En el suelo. Expuesto. Rudimentario.

Hartert y Venturi (1909). Nido en Ocampo, dpto. Gral. Obligado, Santa Fe.
Pereyra (1950a). Colonia Dora, dpto. Avellaneda, Santiago del Estero, mediados de noviembre, un huevo colectado por J. Abalos.

Huevo
Cremoso claro, cubierto de manchitas pardo y otras más pálidas



Medidas
Hartert y Venturi (1909): 26,5 a 29,8 x 20,6 a 21,4
Pereyra (1950a): 30 x 20

Observaciones
Krauczuk (2013). Rincón Ombú, dpto. Ituzaingó, Corrientes, volantón en el nido.

Depredación
Fariña et al. (2014). De adulto por Lechucita vizcachera (*Athene cunicularia)*

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pequeño tamaño. Cola corta. Grisáceo manchado de negro. Primarias negras. Punta de las alas blancas, visible en vuelo, en el macho.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Eleothreptus anomalus (Gould, 1838) en Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Su área de distribución comprende el sureste de Brasil, este de Paraguay norte de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Durnford (1878); Holmberg (1939); Isacch et al. (2006); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1938b); Short (1975)

Chaco
Citas: Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Olrog (1979); Short (1975); Lynch Arribalzaga (1920)

Córdoba
Citas: Miatello et al. (1991, 1994); Straneck y Viñas (1994)

Corrientes
Citas: Chatellenaz et al. (2010); Chebez (1996a); Darrieu y Martínez (1984); Fariña et al. (2014); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2003b)

Entre Ríos
Citas: Nores y Yzurieta (1981); Pearman y Abadie (1995a)

Formosa
Citas: Bodrati y Areta (2010); Chebez (2009); Contreras (1987c);Contreras et al. (2014); López Lanús (1997); Moschione y San Cristóbal en Collar et al (1992); Paerman y Casañas en Di Giacomo (2005h); Olrog (1979)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009)

Misiones
Citas: Bodrati (2005d); Chebez (1996a)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2011f); Giai (1950); Hartert y Venturi (1909); Luna et al. (2011); Olrog (1979); Pereyra (1939); Short (1975)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991); Nores y Yzurieta (1981); Pereyra (1950a); Straneck y Viñas (1994)

ATAJACAMINOS LIRA *Uropsalis lyra* (Bonaparte, 1850)



Otro nombre: Dormilón lira.

DESCRIPCIÓN
Largo: 80 cm. (macho), 25 cm. (hembra).
Peso: Cleere (1999): (M) 68,5 g, (H) 74-79 g.
Coloración. Pico negruzco. Patas y dedos parduscos. Iris pardo.
Cabeza gris moteada de negro. Collar rojizo sobre el cuello. Dorsal rojiza manchado de negro. Ventral ocrácea moteada de negro.
Alas negras con barras rojizas. Cola rojiza con barras negras; las plumas externas son muy largas (66 cm.) y negras, y disminuye al ancho de ese color hasta llegar a la punta blanca.
La hembra tiene corona negra con puntos rojizos. Primarias negras con manchas rojizas en las barbas externas. Cola negruzca con barras rojas. No tiene plumas alargadas.

COMPORTAMIENTO
Es de hábitos nocturnos. Se posa en ramas bajas.

HÁBITAT
Orillas de áreas selváticas de montañas (nuboselva).

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Colina et al. (2015); Greeny y Wetherwax (2005)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Coloración oscura. El macho tiene dos plumas muy largas en la cola. Collar rojizo sobre el cuello.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Uropsalis lyra argentina Olrog, 1975 en Jujuy.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Por el oeste de Sud América en la cordillera hasta 3000 metros, en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Uropsalis lyra argentina Olrog, 1975

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Chebez (2009); Colina et al. (2015); Mazar Barnet et al. (1998c); Olrog (1975a)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

ATAJACAMINOS CHICO *Setopagis parvula* Gould, 1837

Otro nombre: Cuchigüigüi. Dormilón. Dormilón chico. Dormiloncito. Golondrina nocturna. Ñañarca. Tarpuí chico. Tres-cuatro-cueros.

DESCRIPCIÓN
Largo: 19-21 cm.
Peso: Contreras (1979f): N= 1 (H) 34,0 g; Salvador (2014a): N= (M) X= 36,3 g (Rango 34,1 a 37,8); N= 6 (H) X= 33,3 g (Rango 31,8 a 36,6)
Coloración. Pico negruzco. Patas y dedos pardos o grises oliváceos. Iris pardo.
Cabeza puntillada de gris con franja central desde la frente a la nuca negra. Semicollar nucal canela puntillado de gris y negro. Resto de la zona dorsal pardo grisáceo puntillado de blanquecino.
Garganta blanca. Pecho pardo grisáceo moteado de blanquecino. Abdomen ocráceo barrado de pardo con tono castaño.
Alas pardas con lunares y banda blancos. Escapulares negras con margen ocráceo. Cola parda grisácea manchada de canela y con la punta blanca. Ventralmente gran mancha blanca en el extremo.
La hembra tiene la garganta ocrácea y mancha alar canela. Sin blanco en la cola.

COMPORTAMIENTO
Se posa en el suelo o en ramas bajas.

Alimentación
Zotta (1934). Coleóptero (Scarabaeidae, Chrysomelidae). Ortópteros. Semillas.
Alabarce (1987a). Coleóptero (Scarabaeidae, Carabidae). Himenópteros. Homópteros. Lepidópteros. Odonata.
Klimaitis (1993). Coleóptero (Scarabaeidae).
Ordano et al. (1999). Coleóptero (Scarabaeidae, Coccinellidae). Ortópteros.
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). Coleoptera (Carabidae, Chrysomelidae, Elateridae, Meloidae, Prionidae, Scarabaeidae). Ephemeroptera. Hemiptera (Pentatomidae, Reduviidae). Homoptera (Cercopidae, Membracidae). Lepidoptera (polillas). Orthoptera (Tettigonidae).
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto es un ascendente Churiii.glugluglugluglu.. repetido frecuentemente.

HÁBITAT
Palmares, bosques, montes, sabanas, arboledas, áreas rurales, sembrados.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Tucumán, Formosa, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	N

En el suelo.
Expuesto. Rudimentario. Los huevos son puestos sobre la tierra.

Lillo (Instituto Miguel Lillo). Tucumán, 25-11-1927, 2 huevos.



Girard (Instituto Miguel Lillo). Manchalá, dpto. Leales, Tucumán, 17-12-1933, 2 huevos.
Smyth (1928). Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, 27-11-1925 y 26-10-1926, huevos.
Pereyra (1932a). Tigre, pdo. Tigre, Buenos Aires, nidos en diciembre y pichones en enero.
Pereyra (1935a). Isla del río Luján, Buenos Aires, nido con huevos.
Pereyra (1938b). Zona ribereña del noreste de Buenos Aires, nidifica en diciembre y enero. En una isla del Tigre y Zelaya, nidos en el suelo con huevos.
Klimaitis (1975c). Berisso, pdo. Berisso, Buenos Aires, noviembre de 1972, nido con huevos.
Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, nido con 2 huevos, el 09-12-1998.
Salvador y Bodrati (2013). En la provincia de Córdoba entre 1980 y 2005 se hallaron 12 nidos, 8 en Villa María, dpto. Gral. San Martín, 3 en Miramar, dpto. San Justo y uno en Ballesteros, dpto. Unión. En la provincia del Chaco se hallaron 4 nidos en el Parque Nacional Chaco, dptos. Sargento Cabral y Presidencia de la Plaza.
De la Peña (2013c). Cayastá, dpto. Garay, Santa Fe, 25-11-1978, nido con 2 huevos, Esperanza, 14-12-1990, 2 huevos, Villa Guillermina, dpto. Gral. Obligado, Santa Fe, 28-11-1995, 2 huevos.
Schaaf et al. (2015a). Río Ceballos, dpto. Colón, Córdoba, entre octubre de 2012 a enero de 2014, 17 nidos.
Segura et al (2014b). Daireaux, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 2 nidos.

Huevo
Pone 2 huevos.
Elípticos. De color ocre con pintas grises o sin ellas.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 25 a 28 x 19 a 20
Smyth (1928): 24, 5 a 26 x 19 a 20
Di Giacomo (2005h): 25,5 x 18,6 y 27,0 x 18,6
Salvador y Bodrati (2013): 25,6 a 28,3 x 18,7 a 20,1 X= 27,0 x 19,3 (N= 14)
De la Peña (2013c): 25,5 a 26,9 x 19,7 a 20,8 X= 26,1 x 20,3 (N= 4)
Schaaf et al. (2015a): X= 26,7 x 19,9

Pesos
Di Giacomo (2005h): 4,7 y 5,1
Salvador y Bodrati (2013): 5,3 a 6,2 X= 5,7 (N= 12)
De la Peña (2013c): 5,5 X= 5,5 (N= 2)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,400 a 0,474 X= 0,419 (N= 4)
Schaaf et al. (2015a): X= 5,24



PICHONES
Descripción
Salvador y Bodrati (2013). Los pichones nacen con los ojos abiertos. Están cubiertos de denso plumón, en la región dorsal color crema y canela grisáceo claro, con abundantes manchas pardas y pardo oscuras, y color crema en la regio ventral. Pico y patas son de color pardo oscuras.

Peso al nacer
Salvador y Bodrati (2013): 4,3 a 4,8 X= 4,5 (N= 6)

Generalidades
Salvador y Bodrati (2013). El período de incubación es de 17-18 días. La incubación estuvo a cargo de ambos miembros de la pareja.

Más información:
Salvador y Bodrati (2013). Schaaf et al. (2015a)

Depredadores
De adultos: *Glaucidium brasilianum* (Carrera et al. 2008)


Esperanza. Santa Fe. 14-12-1990


Cayastá. Santa Fe. 25-11-1978


Cayastá. Santa Fe. 25-11-1978


Esperanza. Santa Fe. 01-12-1990

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño chico. Garganta, lunares en las cubiertas alares y banda en las alas blancos, ocráceos en la hembra. La hembra se parece a la hembra del Atajacaminos ñañarca, pero es de menor tamaño.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Setopagis parvula parvula Gould, 1837 desde el norte del país hasta Catamarca, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies**.** Este de Perú, Brasil (al sur de Amazonia), Bolivia, Paraguay, norte de Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Setopagis parvula parvula Gould, 1837

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Gavio (1939); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis (1975a, 1975b, 1993); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Mérida y Bodtati (2006); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1937b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008)

Catamarca
Citas: Alabarce et al. (1990); Alabarce (1987a); Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009)

Chaco
Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Contreras et al. (1990b); Chatellenaz (2005a); Moschione y Bishels (2004); Ordano et al. (1999); Salvador y Bodrati (2013b)

Córdoba
Citas: Haro y Gutierrez (1992); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Salvador (1983a); Salvador y Bodrati (2013b); Schaaf et al. (2015a); Sferco y Nores (2003); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Morteros, dpto. San Justo, 02-11-1990)

Corrientes
Citas: Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Baliño y Biole (1984); Beltzer et al. (2006); De la Peña (2012b); Hartert y Venturi (1909); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi et al. (2003); Peltzer (1998); Raffo et al. (2008); Straneck (1990b)

Formosa
Citas: Bodrati y Areta (2010); Chebez et al. (1998); Contreras (1987c, 1993b); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Narosky y Martelli (1995)



Jujuy
Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009) Camperi et al. (2012); Chebez et al. (1998); Moschione y Segovia (2005)

La Pampa
Citas: Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011)

La Rioja
Citas: Giacomelli (1923)

Misiones

Citas: Bodrati et al. (2010b); Chebez (1996a); Contreras et al. (1994b); Krauczuk (2009)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Esteban (1953); Moschione et al. (2013)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009); Salvador y Bodrati (2013b); Wilson (1926)

Santiago del Estero
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); López de Casenave et al. (1998); Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Ortiz y Aráoz (2014);Vides Almonacid (1993)

ATAJACAMINOS DE CEJAS BLANCAS *Hydropsalis maculicaudus* (Lawrence, 1862)

DESCRIPCIÓN
Largo: 19,5-22 cm
Coloración. Pico negruzco. Patas y dedos grisáceos. Iris pardo.
Corona y cara negruzcas, largas cejas blanquecinas. Semicollar nucal rojizo- canela. Dorsalemente pardo oscuro con manchas bien visibles en las alas. Garganta pardo claro, pecho oscuro manchado de pardo. Cola corta y cuadrada, las timoneras laterales barradas con banda subapical negruzca y ápice blanco. Cola ventral negro pardusca con tres pares de manchas blancas difíciles de ver, a no ser en vuelo. La hembra tiene la cola totalmente barrada, sin blanco.
HÁBITAT
Sabanas, orillas de bosques y selvas.



NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Cleere (1999)

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Hydropsalis maculicaudus (Lawrence, 1862) en Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Distribución discontinua desde el sur de Méjico por Centro América y Sudamérica hasta Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Misiones
Citas: Bodrati y Areta (2010)

ATAJACAMINOS TIJERA COMÚN *Hydropsalis torquata* (J. F. Gmelin, 1789)

Otros nombres: Ataja-camino. Atajacaminos coludo chico. Atajacaminos tijereta. Ateí-yetapá. Chumuluco. Chumulucuco. Dormilón. Dormilón cola de tijera. Dormilón coludo. Dormilón de cola larga. Ibiyaú cola de tixera. Ñañarca. Yanarca.

DESCRIPCIÓN

Largo: 50 cm. (macho). 30 cm. (hembra).

Peso: Fiora (1933): N= 7 X= 47 g (Rango 45 a 49); Camperi (1992a): N= 2 (M) 63,8 y 76,4 g, N= 1 (H) 60,2 g; Navas y Bó (2001): N= 1 (H) 51,3 g; Salvador (2014a): N= 4 (M) X= 65,1 g; (Rango 62,5 a 68,2). N= 4 (H) X= 57,9 g (Rango 53,2 a 62,8)

Coloración. Pico pardusco con punta negra. Patas y dedos parduscos. Iris pardo.

Dorso pardo grisáceo moteado de blanquecino. En la cabeza tiene manchas negras. Ventralmente es blanquecino con manchas canelas en la garganta y barras pardas oscuras. En el abdomen son más gruesas. Alas pardas con barras ocráceas. Cola grisácea con barras pardas oscuras. Dos plumas externas alargadas pardas oscuras y blancas.

La hembra tiene en general tonos más ocráceos, es ventralmente más barrada.

Carece de las plumas alargadas de la cola.

COMPORTAMIENTO

Es de hábitos crepusculares y nocturnos. Se posa generalmente en el suelo, a veces en ramas bajas. Anda solitario o en pareja. Tiene un vuelo errático. La hembra realiza ceremonias de distracción cuando está en el nido. Aparenta estar herida y agranda la zona gular.

Alimentación

Alabarce (1987a). Insectos

Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). Coleoptera (Cermbycidae, Elateridae, Scarabaeidae, no identificado). Ephemeroptera. Hemiptera (Belostomatidae, Pentatomidae). Diptera. Lepidoptera (polillas). Orthoptera (Gryllidae).



Voces

Straneck (*in litt*.). El canto es un agudo y corto silbo, repetido insistentemente: Zip...zip...zip...zip..

HÁBITAT

Bosques, sabanas, montes, arboledas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Salta, Tucumán, Mendoza, Catamarca, Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N

En el suelo, en praderas o claros en montes.

Expuesto. Rudimentario. Los huevos puestos sobre la tierra o sobre hojas.

Girard (Instituto Miguel Lillo). Simoca, dpto. Simoca, Tucumán, 20-12-1929, 2 huevos.
Lillo (Instituto Miguel Lillo). Tucumán, 16-12-1932, 2 huevos.
Salvador, Nores e Yzurieta (*in litt*.). Miramar, dpto. San Justo, Córdoba, en una plantación de eucaliptos, 10-12-1980, un nido en una mata de *Cynodon* sp., con 2 huevos, 11-12-1980, 2 nidos, uno con 2 huevos incubados y otro con un pichón recién nacido y un huevo.
Salvador y Nores (*in litt*.). Huaycama, dpto. Ambato, Catamarca, 31-10-1985, un nido entre hojarascas, con 2 huevos.
Salvador y Salvador (en prep.). Dpto. San Martín, Córdoba, 7 nidos hallados entre noviembre y febrero, en bosques ralos, plantaciones de eucaliptos y costas del Río Tercero, ponen 2 huevos.
Holland (1897). Estancia Santa Elena, Buenos Aires, un nido hallado a fines de noviembre, en el suelo desnudo, en una arboleda de sauces, con 2 huevos.
Hartert y Venturi (1909). Nido en Ocampo, dpto. Gral. Obligado, Santa Fe, con 2 huevos.
Pereyra (1932a). Conhelo, dpto. Conhelo, La Pampa, nidos en noviembre.
Pereyra (1937b). Recao Chico, dpto. Conhelo, La Pampa, se hallaron nidos con huevos y pichones, en bosques de caldenes, a orilla de caminos, ponen 2 huevos.
Mezquida y Marone (2001). Reserva de Ñacuñán, Mendoza, nidifica.
Pautasso y Cazenave (2002). Reserva "El Pozo", dpto. La Capital, Santa Fe, 2 nidos, el 02-11-1999 y el 02-12-1999, con 2 huevos cada uno y Colastiné Norte, dpto. La Capital, Santa Fe, 05-11-1999 con 2 huevos y 03-12-1999 con 2 pichones.
Rodríguez (2012b). Dpto. La Caldera, Salta, 08-10-2011, nido con dos huevos.
De la Peña (2013c). 7 nidos en Esperanza, desde el 24-11-1977 a 22-11-2003, pone de setiembre a diciembre, Cayastá, dpto. Garay, Santa Fe, 04-12-1988, 2 huevos y 14-10-1986, 2 pichones, Morteros, dpto. San Justo, Córdoba, 04-10-1989, 2 huevos, Colastiné, dpto. La Capital, Santa Fe, 11-12-2002, 2 huevos.

Huevos
Pone 2 huevos.
Ovoidales o elípticos. De color ocre o crema con pintas y finas líneas grises y pardas.

Medidas
Salvador y Salvador (en prep.): 27,6 a 28,7 x 20,1 a 21,5 X= 28,21 x 20,64 (N= 10)
Salvador, Nores e Yzurieta (*in litt*.): 28,3 a 28,6 x 20,5 x 21, 0 X= 28,4 x 29,7 (N= 3)
Salvador y Nores (*in litt*.): 28,1 a 28,6 x 20,3 a 20,4 X= 18,3 x 20,1 (N= 2)
Hartert y Venturi (1909): 27,5 a 30 x 21 a 22,5
Pereyra (1937b): 32,0 x 22,5
Pautasso y Cazenave (2002): 27,4 a 28,9 x 20,7 a 22,1 X= 27,9 x 21,0 (N= 6)
De la Peña (2013c): 29,2 a 30,4 x 20,8 a 21,4 X= 29,6 x 21 (N= 4)



Peso
Salvador y Salvador (en prep.): 6,4 a 7,0 X= 6,7 (N= 8)
Salvador y Nores (*in litt*.): 6,5 y 6,6
De la Peña (2013c): cáscaras 0,543 a 0,568 X= 0,552 (N= 4)

PICHONES
Descripción
Pautasso y Cazenave (2002). Pico negro, interior de la boca y paladar de color rosa, iris pardo oscuro y las patas negruzcas. Cuerpo cubierto de plumón pardo acanelado con sectores grisáceos y negruzcos. A los 4 días de vida vainas en primarias y secundarias, pardo canela
De la Peña (2013c). Nace con los ojos abiertos. Pico negro. Cavidad bucal rosada. Plumón por todo el cuerpo pardo grisáceo, jaspeado de pardo oscuro. Ventralmente pardo.
1 día. Largo de la cabeza, 2 cm. Largo del cuerpo, 4,9 cm. Dedos, 1 cm. Patas pardo oscuro. Pían.

4 días. Aparecen los cañones de las plumas primarias y secundarias.
6 días. Largo de la cabeza, 2,8 cm. Largo del cuerpo, 6,6 cm.
Ojos marrones. Patas grises. Gritan. Se van del nido caminando con las alas hacia arriba.
8 días. Coloración de adulto.
12-13 días. Dejan el nido.

MEDIDAS

Dias de vida	Medidas							
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola
				Vaina o cañón	Lámina	Vaina o cañón	Lámina	
1	0,7	0,9						
6	1,4	1,8	2,5	1,7	0,3	1,5	0,15	0,4

Generalidades
De la Peña (2013c). Período de incubación18-19 días. Permanencia de los pichones en el nido 12-13 días.
Los pichones tienen un desarrollo rápido. Al segundo día si son molestados se corren por el suelo.
La hembra, como aptitud de agresividad, vuela cerca y abre las alas y la boca. Emite un grito ronco, áspero.
Se puede posar en troncos o ramas bajas, mueve la cabeza hacia arriba y abajo y realiza movimientos acompasados de la cola.

Más información:
Pautasso y Cazenave (2002). De la Peña (2013c)


Colastiné. Santa Fe. 11-11-1999. Hembra


Esperanza. Santa Fe. 26-10-2005


Colastiné. Santa Fe. 26-11-1999


Esperanza. Santa Fe. 26-10-2005



Esperanza. Santa Fe. 31-10-2001



Esperanza. Santa Fe. 12-19-2001

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Tamaño grande. Barras ocráceas en las alas. Cola gris con barras pardas oscuras. El macho tiene dos plumas muy largas en la cola. La hembra es ventralmente más barrada.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Hydropsalis torquata furcifera (Vieillot, 1817) desde el norte del país hasta Mendoza, Neuquén, La Pampa y Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies. Extensa área de distribución desde el centro y sur de Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Hydropsalis torquata furcifera (Vieillot, 1817)

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Dabbene (1918b); Darrieu y Camperi (2001a); Holland (1896); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Mérida y Bodtati (2006); Narosky et al. (1990); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano y Mérida (2009); Pugnali y Chamorro (2008); Roda y Danti (2015); Rodríguez Goñi (1984); Zapata (1998)

Catamarca

Citas: Alabarce (1987a); Alabarce et al. (1990); Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009)

Chaco

Citas: Contreras et al. (1990b); Chatellenaz (2005a); Moschione y Bishels (2004)

Córdoba

Citas: De la Peña (2013c); Haro y Gutierrez (1992); Heredia (2006); Nores et al. (1983); Nores (1996); Salvador (1983a); Sferco y Nores (2003); Yzurieta (1995)

Corrientes

Citas: Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005a); Capllonch et al. (2015); Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)



Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Baliño y Biole (1984); Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); Capllonch et al. (2015); Camperi (1992a); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi et al. (2003); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Straneck (1990c); Zapata (1975, 1977)

Formosa
Citas: Capllonch et al. (2015); Chebez et al. (1998); Contreras (1987c); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Grant (1911c); López Lanús (1997)

Jujuy
Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009); Fiora (1933)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Chebez et al. (1998); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Pereyra (1927e, 1937); Siegenthaler et al. (1990); Tejerina et al. (2006); Wetmore (1926b)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Capurro y Bucher (1986); Giacomelli (1923); Hayward (1967)

Mendoza
Citas: Contreras (1979g); Contreras y Fernández (1980); Darrieu (2014); Lucero (2013f); Marone (1992); Mezquida y Marone (2001); Reed (1916); Roig (1965); Sanzín (1918); Wetmore (1926b)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Contreras et al. (1994a); Krauczuk (2005, 2009); Navas y Bó (1991a); Zotta (1939)

Neuquén
Citas: Matarasso (2007)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Höy (1987a); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b)

San Juan
Citas: Camperi y Darrieu (2004); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i); Moschione y Banchs (1992); Navas y Bó (2001)

San Luis
Citas: Masramón (1983); Nellar Romanella (1993)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2011f, 2013c); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); Hartert y Venturi (1909); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Rodríguez Graves et al. (2009); Wilson (1926)

Santigo del Estero
Citas: Capllonch et al. (2015); Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996); Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch et al. (2015); Hartert y Venturi (1909); Lucero, M. M. (1983); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Aráoz (2014); Vides Almonacid (1993)

ATAJACAMINOS COLUDO *Macropsalis forcipata* (Nitzsch, 1840)

Otros nombres: Atajacaminos coludo grande. Dormilón tijereta.
DESCRIPCIÓN
Largo: 76 cm. (macho), 34 cm. (hembra)
Coloración. Pico negruzco. Patas y dedos pardos. Iris pardo.
Ocráceo manchado de negro. Cabeza parda oscura. Collar rojizo sobre el cuello. Garganta blanca.
Plumas externas de la cola alargadas (62 cm) negras, con la lámina interna y la punta blancas.
La hembra tiene cola corta, gris con plumas externas ocráceas manchadas de negro.

COMPORTAMIENTO
Es de hábitos crepusculares. Vuela a baja altura. Se posa en las ramas de los árboles.

Alimentación

HÁBITAT
Selvas abiertas, bosques, sabanas, capueras.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.
Más información:
Moraes y Krul (1995). Pichorín (2002a)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Coloración oscura con collar rojizo y garganta blanca. El macho tiene dos plumas muy largas en la cola.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Macropsalis forcipata (Nitzsch, 1840) en Misiones y Corrientes.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Área de distribución restringida al sureste de Brasil y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Corrientes
Citas: Chatellenaz et al. (2012); Heredia y de la Fourniere (2008)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b); Bodrati y Cockle (2012); Chebez (1996a); Foster en Chebez (2009); Krauczuk y Castía (2009); Nores e Yzurieta (1982); Olrog (1973a)

ATAJACAMINOS OCELADO *Nyctiphrynus ocellatus* (Tschudi, 1844)



Otros nombres: Dormilón ocelado. Dormilón querebebé. Querebebé. Zoncito.
DESCRIPCIÓN
Largo: 20-21 cm.
Peso: Cleere (1999): (M) 35-43 g, (H) 29-44 g.
Coloración. Pico negruzco. Patas y dedos pardos. Iris pardo.
Coloración. Coloración general parda rojiza, finamente vermiculada de negro. Cabeza grisácea con manchas negras. Garganta blanca. Pecho grisáceo oscuro. Puntos blancos en el vientre y en las cubiertas alares. Puntos negros en las alas y en las escapulares. Cola con franjas negras y plumas externas con punta blanca.

COMPORTAMIENTO
Se posa en ramas de árboles o en cañaverales.

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto es una repetición de un lastimero Wierrrr....wierrr....wierrrr... comparable con un maullido de gato.

HÁBITAT
Selvas.
NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Misiones.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	

En el suelo, sobre lecho de hojas.

Bodrati y Baigorria (2013). Parque Provincial Cruce Caballero, dpto. San Pedro, Misiones, 21-10-2010 y 05-11-2012, nidos con 2 huevos cada uno. Bio Reserva Karadya, dpto. Gral. Belgrano, Misiones, 05-11-2011, nido con un huevo.

Huevos
Pone 1 ó 2 huevos. Blancuzcos rosados o salmón tenue con manchas castañas.

Medidas
Bodrati y Baigorria (2013): 26,9 a 28,3 x 18,6 a 18,8 X= 27,6 x 18,7 (N= 4)
PICHONES
Descripción
Bodrati y Baigorria (2013). Pico pardo. Paladar rosado intenso. Patas rosadas y parduzcas. Plumón natal canela suave.

Generalidades
Bodrati y Baigorria (2013). Período de incubación, 17-18 días.

Más información:
Bodrati y Baigorria (2013). Krauczuk (2013)



IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Coloración parda rojiza con la garganta blanca. Puntos blancos en el vientre y en las cubiertas alares.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Nyctiphrynus ocellatus ocellatus (Tschudi, 1844) en Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Se encuentra en Centro y Sud América con poblaciones separadas. Comprende: Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina.

Nyctiphrynus ocellatus ocellatus (Tschudi, 1844)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b); Chebez (1996a); Martínez Gamba (2014); Saibene et al. (1996); Straneck (1990h)

ATAJACAMINOS OSCURO *Antrostomus sericocaudatus* Cassin, 1849

Otros nombres: Atajacaminos ahumado. Dormilón rojizo de cola listada.

DESCRIPCIÓN
Largo: 24-30 cm.
Peso: Cleere (1999): (M) 24-30 g, (H) 62-83 g
Coloración. Pico negruzcoo. Patas y dedos pardo oscuro. Iris pardo.
Coloración general parda oscura, moteada de ocráceo. Collar ocráceo. Franja nucal castaña. Garganta y pecho con puntos claros. Resto de la parte ventral barrado.
Primarias pardas oscuras con manchas rojizas en la lámina externa. Cola redondeada con franjas angostas castañas. Las plumas más externas con banda diagonal blanca. Punta blanca en el macho, rojiza en la hembra.



COMPORTAMIENTO
Se posa a mediana altura en las ramas de los árboles o en cañaverales.

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto es una rápida repetición de 5 sílabas: Jiujuiojuiouu con dos picos de amplitud ascendente y dos de descendente.

HÁBITAT
Selvas, capueras.
NIDIFICACIÓN

MESES DE NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	

Misiones.

Ligera depresión en el suelo, cubierta con hojas.

Partridge (1956). Arroyo Uruguaí, km 30. dpto. Iguazú, Misiones, 15-11-1953, dos nidos.
Chebez et al. (1988b). Bernardo de Irigoyen, dpto. Belgrano, Misiones, el 17-11-1986 se localizó un nido en el suelo, en inmediaciones de un cañaveral y a 10 m de una picada. Estaba en una depresión del suelo de 15 cm de diámetro, cubierta de hojas secas. Tenía 2 huevos.

Huevos
Pone 2 huevos. Blancos.

Medidas
Chebez et al. (1988b): 32 x 19

PICHONES
Observaciones
Chebez et al. (1988b). Dos pichones colectados por Partridge el 30-10-1953 en el Arroyo Uruguaí, km 30, dpto. Iguazú, Misiones, presentan un plumón amarillento.



IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Coloración general parda. Cola con franjas castañas y punta blanca en el macho. Rojiza en la hembra. Sin manchas alares.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Antrostomus sericocaudatus sericocaudatus Cassin, 1849 en Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Una en Amazonia en Perú, noroeste de Bolivia y norte de Brasil y otra en la Selva Atlántica en el sureste de Brasil, este de Paraguay y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Antrostomus sericocaudatus sericocaudatus Cassin, 1849

Misiones
Citas: Bertoni (1919); Bodrati et al. (2010b); Chebez (1996a); Chebez et al. (1988b); Contreras et al. (1994b); Partridge (1956a); Hardy y Straneck (1989); Straneck (1990h)

ATAJACAMINOS COLORADO *Antrostomus rufus* (Boddaert, 1783)

Otros nombres: Cacuí. Dormilón rojizo. Dormilón rubio. Pitanguá. Tarpuí. Tarpuí rubio.

DESCRIPCIÓN
Largo: 25-31 cm.

Peso: Cleere (1999): (M) 88 g, (H) 89-98 g.
Coloración. Pico negruzco. Patas y dedos pardos. Iris pardo.
Coloración. Cabeza con fino puntillado castaño y ocráceo con estrías negras. Dorso pardo oscuro finamente puntillado de canela y ocráceo. Garganta parda oscura barrada de castaño y con un fino collar blanco. Resto de la zona ventral pardo oscuro puntillado de castaño y ocráceo.
Alas negras con lunares y manchitas castañas. Cola como el dorso, con la mitad terminal de las plumas externas blanca con borde canela. Ventralmente, la mitad terminal con gran mancha canela clara.
La hembra tiene el collar ocráceo y la cola sin blanco.

COMPORTAMIENTO
Se posa en el suelo y en las ramas de los árboles.

Alimentación
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto está compuesto por 4 sílabas Chiuc.chuc.chuc.chiurrrr, es repetido insistentemente.

HÁBITAT
Selvas, bosques y selvas semiabiertas.
NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Jujuy, Salta, Catamarca, Chaco, Santa Fe.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	N								N	N	

Ligera depresión en el suelo.

Hartert y Venturi (1909). Ocampo, Dpto. Gral. Obligado, Santa Fe, 16-11-1905, nido con 2 huevos.
Di Giacomo y López Lanús (1998). Aguas Negras, Parque Nacional Calilegua, dpto. Ledesma, Jujuy, el 01-11-1991, nido con 2 huevos y el 03-11-1990, A. Caradonna, localizó un nido con 2 huevos.
Salvador y Salvador, en De la Peña (2010b). Libertador General San Martín, dpto. Ledesma, Jujuy, el 26-11-1992, nido con 2 huevos, estaba en un área de selva, en un lugar sombrío, leve depresión entre hojarascas, el mismo día, otro nido con un huevo y un pichón y el 27-11-1992, nido con 2 pichones de unas 48 horas de edad.
Salvador et al. (2014). Parque Nacional Calilegua, dpto. Ledesma, Jujuy, 07-11-1991, nido con 2 huevos, 09-11-1991, un pichón; Parque Nacional Chaco, dptos. Sargento Cabral y Presidencia de la Plaza, Chaco, 24-10-1997, 2 huevos; Embarcación, dpto. Gral. San Martín, Salta, 08-11-2004, 2 huevos; Balcosna, dpto. Paclín, Catamarca, 15-02-2008, 2 pichones.



Huevos
Pone 2 huevos. Blancos con leve tinte rosado, con manchas, puntos y líneas castañas y grises violáceas.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 33 a 33,7 x 24
Di Giacomo y López Lanús (1998): 32,5 x 24,2 y 32,4 x 24,1

Salvador et al. (2014): 31,8 a 33,6 x 22,6 a 23,9 X= 32,8 x 23,5 (N= 7) (*saltarius*)
Salvador et al. (2014): 32,7 x 23,9 y 32,3 x 24,2 (*rutilus*)

Pesos
Di Giacomo y López Lanús (1998): 10,0 y 10,2
Salvador et al. (2014): 9,7 a 10,1 X= 9,9 (N= 4) (saltarius)

PICHONES
Descripción
Di Giacomo y López Lanús (1998). Los pichones están cubiertos con denso plumón canela intenso, más oscuro en la cabeza y lomo.
Salvador et al. (2014). Ojos semiabiertos, de color pardo oscuro. Cubiertos por denso plumón canela con tinte castaño, amarillento sobre la cabeza. Pico pardo claro. Interior de la boca rosado. Patas crema con tinte rosado.

Más información:
Salvador et al. (2014)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Coloración general rojiza. Collar angosto y plumas externas de la cola blancos en el macho, ocráceos en la hembra.
Diferenciar a la hembra de la hembra de Atajacaminos ñañarca y de la del Curiango.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Antrostomus rufus rutilus Burmeister, 1856 Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, noreste de Santa Fe y de Córdoba, y *Antrostomus rufus saltarius*(Olrog, 1979) en el norte de Salta.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cinco subespecies. Extenso territorio de distribución geográfica en el sur de Centro América, norte de Sudamérica y en el este, al este de los Andes, hasta Argentina. Comprende: Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Antrostomus rufus rutilus Burmeister, 1856



Catamarca
Citas: Salvador et al. (2014)

Córdoba
Citas: Cobos et al. (1999)

Chaco
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004); Salvador et al. (2014)

Corrientes
Citas: Chatellenaz et al. (2010); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006)

Formosa
Citas: Bodrati y Areta (2010); Contreras (1987c);Contreras et al. (2014)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Di Giacomo y López Lanús (1998); Moschione y Segovia (2005); Salvador et al. (2014); Straneck (1990f)
Misiones
Citas: Bodrati y Areta (2010); Bodrati et al. (2010b); Chebez (1996a); Krauczuk (2005, 2009); Militello y Chebez (2009)

Salta
Citas: Camperi (1990); Moschione et al. (2013); Salvador et al. (2014)

Santa Fe
Citas: De la Peña (1996b); Hartert y Venturi (1909); Manassero et al. (2006)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Gianini (2000); Lucero (1983); Navarro et al. (2000); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Aráoz (2014)

Observaciones: De la Peña (Horco Molle, dpto. Capital, 12-05-1987)

Antrostomus rufus saltarius (Olrog, 1979)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Coconier et al. (2007)

ORDEN: APODIFORMES

VENCEJOS

FAMILIA: APODIDAE

Los Vencejos son aves de distribución casi mundial, pero son más abundantes en los climas cálidos.

Son aves de alas largas y estrechas. Sobrepasan la punta de la cola cuando están plegadas.

Los mástiles de las rectrices (siempre en número de 10) son rígidos y en los géneros.

Chaetura y *Streptoprocne* están más o menos desprovistos de barbas en la extremidad.

Las patas son cortas. El género *Aeronautes* tiene 2 falanges en el primer dedo (hallux) y 3 en los demás. Además, en algunas especies el hallux está situado lateralmente (en lugar de posteriormente) y puede ser dirigido hacia adelante (pies pamprodáctilos). El tarso es corto, a veces emplumado, así como los dedos.

El pico es corto, arqueado (parecido al de las Golondrinas).

Andan solitarios, pero en general en grupos o bandadas de pocos a muchos ejemplares.

Son de vuelo rápido y pasan gran parte del día volando. Se posan colgándose con las uñas en las paredes rocosas o en huecos en los árboles.

Emiten gritos chillones. Se parecen a las golondrinas, pero a diferencia de éstas no se posan en árboles, alambres o edificios.

Nidifican en huecos en los árboles, grietas o cuevas en rocas, barrancas, o en salientes (repisas) en laderas rocosas o debajo de caídas de agua (cataratas).

Las especies de los géneros *Chaetura* y *Cypseloides* son difíciles de diferenciar en las observaciones de campo.

Nidifican en huecos en los árboles, grietas o cuevas en rocas, barrancas, o en salientes (repisas) en laderas rocosas o debajo de caídas de agua (cataratas).

Los nidos están en general en lugares inaccesibles. Emplean en la construcción, tierra en la base, fibras vegetales, musgos, helechos y líquenes.

Ponen 1 ó 2 huevos blancos.

Se alimentan de insectos que capturan en vuelo.

Frecuentan bosques, selvas, praderas y montañas.

VENCEJO NEGRUZCO *Cypseloides rothschildi* Zimmer, 1945

Otros nombres: Vencejo pardo. Vencejo pardusco.

DESCRIPCIÓN
Largo: 15 cm.
Coloración. Enteramente pardo.

HÁBITAT
Sabanas, montes, bosques y yungas hasta los 2000 m de altura.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Tucumán, Catamarca.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N											N

En paredes rocosas. Altos.
Expuesto. Elaborado. Forma de cono. Construido con musgos y tierra.



Lillo (Instituto Miguel Lillo). Taficillo, dpto. Tafí Viejo, Tucumán, 25-01-1911, nido con un huevo.
Dabbene (1918b). Tucumán, P. Girard localizó nidos contra las paredes verticales de los cerros.
Smyth (1928). Taficillo, 20-12-1915 y Tafí Viejo, 15-12-1923, dpto. Tafí Viejo, Tucumán, un huevo en cada lugar.
De la Peña (2013c). Río Las Cañas, dpto. Andalgalá, Catamarca, 04-12-2002, nido en una pared rocosa, a 15,00 m de altura.

Huevo
Pone 1 huevo. Ovoidal. Blanco.

Medidas
Dabbene (1918b): 24 a 26 x 17 a 19
Smyth (1928): 26, 5 a 28,5 x 18,5

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Coloración general parda.
Diferencialo del Vencejo de cascada y del Vencejo ahumado chico.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Cypseloides rothschildi Zimmer, 1945 en Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Chaco y Córdoba.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Noroeste de Argentina y sur de Bolivia.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca
Citas: Carma (2009); De la Peña (2013c); Ferrari et al. (2004b); Moschione (2005pp); Nores e Yzurieta (1982a)

Chaco
Citas: Moschione y Bishels (2004)

Córdoba
Citas: Miatello et al. (1991-1994)

Formosa
Citas: Nores et al. (1996)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Moschione y Segovia (2005)

La Rioja
Citas: Nores y Salvador (1985)

Salta
Citas: Coconier et al. (2007); Di Giacomo et al. (1998); Moschione et al. (2013)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Dabbene (1918g); Lucero (1983); Lucero e Izasa (2015); Navarro et al. (2007); Ortiz y Aráoz (2014)

VENCEJO AHUMADO CHICO *Cypseloides fumigatus* (Streubel, 1848)

Otros nombres: Vencejillo negro. Vencejo fuliginoso. Vencejo negruzco. Vencejo pardo chico.

DESCRIPCIÓN
Largo: 15 cm.
Peso: Chantler (1999): 44 g
Coloración. Tarsos y pico negros. Iris pardo.
Coloración general parda negruzca.
La cola es corta, cuadrada. Las alas son largas.



COMPORTAMIENTO
Anda en grupos de pocos ejemplares. Se asocia a *Chaetura* y *Streptoprocne* formando bandadas de hasta un centenar de individuos.

Alimentación
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

HÁBITAT
Frecuenta selvas entre los 700 y los 2100 m de altura.

NIDIFICACIÓN

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N										N	N



Se localizaron nidos en Misiones.

Pearman et al. (2010). varios nidos en Misiones: Salto Encantado, dpto. Cainguás, 01-12-2004, 13-11-2007 y 02-11-2009; Salto Krysiuk, dpto. Oberá, 11-01-2005; Reserva Natural Privada Valle de Cuña Pirú, dpto. Cainguás, 13-01-2005; Salto Golondrina, dpto. Guaraní, 19-11-2008. Los 8 nidos estaban desde 2,50 a 40 m del suelo. La mayoría de los nidos estaban expuestos al spray de las cascadas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Coloración oscura.
Diferenciarlo del Vencejo de cascada (es más pequeño, más oscuro y con la cola más larga) y del Vencejo negruzco.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Cypseloides fumigatus(Streubel, 1848) en Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Área de distribución circunscripta al este de Bolivia, Paraguay, sureste de Brasil y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Bodrati y Salvador (2015a); Chebez (1996a); Krauczuk y Baldo (2004); Pearman et al. (2010); Saibene et al. (1996)

VENCEJO DE CASCADA *Cypseloides senex* (Temminck, 1826)

Otros nombres: Golondrina del Iguazú. Golondrina murciélago grande. Mbiyuí-mbopí guazú. Vencejo ahumado grande. Vencejo de anteojos grande. Vencejo de las cataratas. Vencejo ligero. Vencejo pardo. Vencejo pardo grande.

DESCRIPCIÓN
Largo: 18 cm.
Peso: Chantler (1999): 60-98 g
Coloración. Pardo uniforme. La cabeza es más clara. Frente blanquecina. Cola cuadrada o ligeramente redondeada, corta.

COMPORTAMIENTO
Forma bandadas de muchos ejemplares. Se mete detrás de las cascadas.

Alimentación
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Voces
Straneck (*in litt*.). En vuelo emite un áspero y prolongado Chierrrrr...chierrrrrr...

HÁBITAT
Selvas, cataratas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Misiones.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N		



En repisas o salientes rocosas. Bajos, a mediana altura y altos.
Expuesto. Elaborado. Plataforma de tierra en la base, fibras vegetales, musgos y líquenes en el resto, con forma de cono truncado chato.

Salvador y Narosky (*in litt*.). Parque Nacional Iguazú, dpto. Iguazú, Misiones, 19-10-1984, Salto Dos Hermanas, en una pared de roca de unos 19 m de altura, con un alero natural, a alturas de entre 3 y 5 m, se observaron 5 nidos, todos apoyados en pequeñas repisas, con forma de cono truncado muy chato, hechos con líquenes, musgo y otros vegetales, al menos en 3 nidos había 2 huevos.
De la Peña (2013c). Cataratas del Iguazú, dpto. Iguazú, Misiones, 12-10-1981, 2 nidos a 2,30 m de altura, uno con un huevo y otro sin postura. Medidas: diámetro, de 8 a 12 cm, profundidad, 0,5 cm y alto, 3 cm.

Huevos
Pone 1 ó 2 huevos. Ovoidales. Blancos.



Cataratas del Iguazú. Misiones. 12-10-1981

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Grande. Coloración general parda, con la cabeza más clara.
Se diferencia del Vencejo negruzco por tener la cabeza más clara, ser de mayor tamaño y diferente distribución geográfica. Del Vencejo ahumado chico, por ser más grande, tener la cara más clara y la cola más corta.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Cypseloides senex (Temminck, 1826) en Misiones.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. En ríos cerca de cascadas en el este de Bolivia, centro y sur de Brasil, este de Paraguay ynoreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Bodrati y Salvador (2015a); Chebez (1996a); Dabbene (1917b); De la Peña (1982b, 2013c); Saibene et al. (1996)

Observaciones: De la Peña (Cataratas del Iguaú, dpto. Iguazú, 06-02-1973)

VENCEJO DE COLLAR *Streptoprocne zonaris* (Shaw, 1796)

Otros nombres: Aguacil. Chirrío. Golondrina collareja. Vencejo de collar blanco.

DESCRIPCIÓN
Largo: 22 cm.
Peso: Chantler (1999): 104 g
Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo.
Pardo oscuro con un collar blanco. La cola es ligeramente ahorquillada con los raquis sobresalientes.
El juvenil carece de collar o es reducido.

COMPORTAMIENTO
Anda en bandadas. Se posa en paredes rocosas, en grutas.

Alimentación
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). Efemeroptera.
Olson y Alvarenga (2006). Isoptera (Termitas).
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.


Voces
Straneck (*in litt*.). En vuelo emite una aguda y potente voz, Chiriii...chiriii....chiriii....

HÁBITAT
Praderas y montañas hasta los 3000 m de altura.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Tucumán, Mendoza, Córdoba.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N									N	N	N

Asentado en salientes rocosas o repisas, en grutas. Altos.
Expuesto. Elaborado. Plataforma de musgos, helechos y tierra. Perfil triangular.



Salvador y Fraga (*in litt*.). Mallín, dpto. Punilla, Córdoba, 07-11-1984, 3 nidos, 2 estaban en una caverna angosta de grandes rocas y de unos 15 m de altura, con un arroyo que cruza al fondo, ambos nidos estaban en una repisa de unos 14 cm de ancho, a 2 m uno del otro, tienen forma de cono truncado muy chato, elaborado de musgos verdes y húmedos, un nido medía 13 cm de diámetro externo, 10 cm de diámetro interno, 3,5 cm de alto y 2 cm de profundidad, ambos con 2 huevos incubados. El tercero estaba a 8 m de altura, en una grieta longitudinal de 2 m de largo, 12 cm de alto y 15 cm de profundidad, en una pared de roca en una garganta formada por un arroyo, con 2 huevos.
Dabbene (1918b). Tucumán, P. Girard localizó nidos contra las paredes verticales de los cerros.
Reed (1919). La Cueva, dpto. Las Heras, Mendoza, Da Forno, encontró varios nidos.
Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba, nidifica en grietas, paredones rocosos y detrás de cascadas.
Passeggi (2005). Tanti, dpto. Punilla, Córdoba, octubre de 2001 a marzo de 2002, 6 nidos.
De la Peña (2013c). Los Gigantes, dpto. Punilla, Córdoba, 28-11-1982, 2 nidos con 2 huevos cada uno. Medidas: ancho, 22 cm, alto externo, 8 a 9 cm, alto interno, 2 a 3 cm, profundidad, 2 a 3 cm.

Huevos
Pone 2 huevos. Ovoidales. Blancos.

Medidas
Dabbene (1918b): 39 x 24
De la Peña (2013c): 33,3 a 34 x 24,3 a 24,9 X= 33,6 x 24,6 (N= 2)

Pesos
De la Peña (2013c): 9,81 a 9,99 X= 9,90 (N= 2)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,701 a 0,775 X= 0,738 (N= 2)

Generalidades
Passeggi (2011). El período de incubación es de 22 días. (rango 20-25)

Más información:
Roper (2011)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Grande. Negro con collar blanco. Grito fuerte.
Diferenciarlo del Vencejo de nuca blanca. (es de mayor tamaño y el collar blanco es completo)

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Probablemente *Streptoprocne zonaris kuenzeli*Niethammer, 1953 desde Jujuy a Mendoza, San Luis y Córdoba. En invierno en llanuras de Santiago del Estero, Chaco, norte de Santa Fe y de Entre Ríos, y *Streptoprocne zonaris zonaris*(Shaw, 1796) en Misiones y Corrientes.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Nueve subespecies. Amplia distribución en Centro América, Islas del Caribe y Sud América (excluida la Amazonia), en general en ambiente montano, desde Méjico hasta Argentina.





Los Gigantes. Córdoba. 28-11-1982




Foto: Máximo Uranga

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Streptoprocne zonaris kuenzeli Niethammer, 1953

Catamarca
Citas: Carma (2009); Lucero e Izasa (2015)

Observaciones: De la Peña (Agua de las Palomas, dpto. Andalgalá, 11-03-1981)



Chaco
Citas: Contreras et al. (1990b)

Córdoba
Citas: Biancucci (1995); Castellanos (1932); De la Peña (1982b, 2013c); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Narosky (1976); Nores et al. (1983); Nores (1996); Nores et al. (1983); Passeggi (2011); Pergolani (1944b); Sferco y Nores (2003); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Santa Rosa de Calamuchita, dpro. Calamuchita, 18-01-1979)

Entre Ríos
Citas: Barrow (1884)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Chebez et al (2005); Malizia et al. (2005)

La Rioja
Citas: Bodrati y Ferrari (2014); Giacomelli (1923); Koslowsky (1895b)

Mendoza
Citas: Arámburu (1983); Diéguez y Reboledo (1997); Martínez et al. (1997a); Ordano y Bosisio (2001); Reed (1916, 1919); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (2005); Wetmore (1926b)

Misiones
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Chebez (1996a)

San Luis
Citas: De Lucca (1989); Di Giacomo et al. (2001); Masramón (1983); Nellar Romanella (1993)

Observaciones: De la Peña (Quebrada de Cautana, dpto. Junín, 19-11-1997)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

Observaciones: De la Peña (Alemania, dpto. Guachipas, 08-12-1977)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013f, 2013i)

Santa Fe
Citas: Giai (1950)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996); Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán (2005); Brandán et al. (2006);Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch et al. (2011b); Dabbene (1917b); Echevarría

et al. (1998); Gianini (2000); Handford (1983); Lucero (1983); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Aráoz (2014); Vides Almonacid (1993)

Streptoprocne zonaris zonaris (Shaw, 1796)

Corrientes
Citas: Contreras (1981b)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Chebez (1996); Dabbene (1918g); Krauczuck y Baldo (2004); Militello y Chebez (2009); Saibene et al. (1996)

VENCEJO DE NUCA BLANCA *Streptoprocne biscutata* (P. L. Sclater, 1866)

Otro nombre: Vencejo nuca blanca.

DESCRIPCIÓN
Largo: 20,5 cm
Peso: Chantler (1999): 85-100 g
Coloración. Tarsos y pico negros. Iris pardo.
Pardo oscuro con blanco en la nuca y en el pecho.
Cola cuadrada.

COMPORTAMIENTO
Alimentación
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

HÁBITAT
Selvas montañosas.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Más información:
Pichorim (2002b). Chantler (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Coloración oscura con blanco en la nuca y en el pecho.
Se diferencia del Vencejo de collar por ser de menor tamaño y tener el collar blanco interrumpido a los lados del cuello.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Streptoprocne biscutata biscutata (P. L. Sclater, 1866) en Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Su área de distribución se halla limitada a una franja del este de Brasil, adyacente de Paraguay y noreste de Argentina.



CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Streptoprocne biscutata biscutata (P.L. Sclater, 1866)

Misiones
Citas: Bodrati y Salvador (2015a); Chebez (1996a); Nores e Yzurieta (1985); Olrog (1979); Saibene et al (1996)

Subfamilia: Apodinae

VENCEJO CHICO *Chaetura cinereiventris* P. L. Sclater, 1862

Otros nombres: Vencejo ceniciento. Vencejo de panza gris. Vencejo de vientre gris.

DESCRIPCIÓN
Largo: 10,5-11 cm.
Peso: Chantler (1999): 19 g
Coloración. Corona, manto y alas azulados lustrosos. Parte inferior del lomo, rabadilla y supracaudales grises. Lorum y subcaudales negros. Garganta blanquecina. Ventral gris. Cola negra, corta, cuadrada, de la que sobresalen los mástiles.

COMPORTAMIENTO
Vuela en grupos sobre áreas abiertas de ríos y arroyos selváticos.

Alimentación
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

HÁBITAT
Selvas.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Más información:
Chantler (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Parte ventral y rabadilla grises. Resto negro.
Diferenciarlo del Vencejo de tormenta.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Chaetura cinereiventris cinereiventris P. L. Sclater, 1862 en Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Siete subespecies. Áreas separadas de distribución extensa en Centro América y Sudamérica. Comprende: Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina.



CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Chaetura cinereiventris cinereiventris P. L. Sclater, 1862

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Bodrati y Salvador (2015a); Chebez (1992a, 1996a); Giraudo et al. (1993); Martínez Gamba (2014); Partridge (1961b)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 24-09-1993)

VENCEJO DE TORMENTA *Chaetura meridionalis*Hellmayr, 1907

Otros nombres: Vencejo chico. Vencejo de cuello ceniciento. Vencejo de garganta blanca. Vencejo gargantiblanco. Vencejo menor. Vencejo oscuro chico.

DESCRIPCIÓN
Largo: 12-13,5 cm.
Peso: Chantler (1999): 21,5g
Coloración. Dorso y alas pardas oscuras. Rabadilla y supracaudales grises. Garganta blanquecina; el resto de la zona ventral pardusco. Cola cenicienta con los mástiles oscuros, es corta, cuadrada con las rectrices sobresalientes.

COMPORTAMIENTO
Alimentación
Bodrati y Salvador (2015a). Termitas.

Voces
Straneck (*in litt*.). En vuelo emite agudos tip..tip..tli..bip..tip..tlip..

HÁBITAT
Sabanas, bosques, selvas, quebradas y montes.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Más información:
Chantler (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Garganta clara que contrasta con el resto de la parte ventral, que es más oscura.
Se parece al Vencejo chico pero tiene el dorso pardo, no negro, y es más oscuro en la parte ventral.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Chaetura meridionalis Hellmayr, 1907 en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba, Formosa, Chaco, norte de Santa Fe, Corrientes, Misiones y Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Nidifica en Bolivia, centro y sur de Brasil, Paraguay y Argentina. Migra en el invierno austral a Panamá, Colombia, Venezuela, Guayana Francesa y Surinam.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Jaramillo (2000)

Catamarca
Citas: Carma (2009)

Chaco
Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Bodrati y Salvador (2015a); Chatellenaz (2005a); Chebez (1996a); Contreras et al. (1990b); Dabbene (1917b); Moschione y Bishels (2004)

Córdoba
Citas: Miatello et al. (1991, 1994); Nores (1996); Nores et al. (1983); Nores y Yzurieta (1981); Yzurieta (1995); Rumboll y Hilty en Jaramillo (2000)

Corrientes
Citas: Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b)


Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c, 1993b); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h) ; Esteban (1953); López Lanús (1997); Pujalte et al. (1995)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009) Chebez et al. (1998)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Bodrati y Salvador (2015a); Dabbene (1917b); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014); Navas y Bó (1988a); Straneck (1990g)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Coconier et al. (2007); Dabbene (1917b); Moschione et al. (2013)

Observaciones: De la Peña (Salta, dpto. La Capital, 08-12-1977)



Santa Fe
Citas: Hartert y Venturi (1909); Manassero et al. (2004); Manassero y Luna (2009b)

Santiago del Estero
Citas: Dabbene (1917b); Hartert y Venturi (1909); Nores et al. (1991); Salvador y Eroles (1994)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán et al. (2006); Brandán y Navarro (2009); Dabbene (1917b); Echevarría et al. (1998, 2008a); Lucero

(1983); Navarro et al. (2007) ; Ortiz y Aráoz (2014)

VENCEJO MONTAÑÉS *Aeronautes montivagus* (d'Orbigny y Lafresnaye, 1837)

DESCRIPCIÓN
Largo: 13 cm.
Peso: Chantler (1999): 20 g
Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo.
Dorso pardo negruzco brillante con reflejos verdosos. Garganta, pecho y flancos blancos. Alas y cola parduscas oscuras con punta blanca en las terciarias. Cola ligeramente furcada, con blanco en las rectrices externas y en la punta.

COMPORTAMIENTO
Anda en bandadas.

HÁBITAT
Frecuenta selvas en montañas, cerros boscosos, acantilados, poblaciones y áreas áridas, hasta los 2600 m de altura.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Chantler (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pardo negruzco con blanco en la garganta, pecho y flancos.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Aeronautes montivagus montivagus (d'Orbigny y Lafresnaye, 1837) en Jujuy y Salta.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Desde Venezuela, Guayanas y extremo norte de Brasil y por los Andes a altas elevaciones comprendiendo Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS


Aeronautes montivagus montivagus (d'Orbigny y Lafresnaye, 1837)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Mazar Barnett et al. (1998a); Moschione (1993)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

VENCEJO BLANCO *Aeronautes andecolus* (d'Orbigny y Lafresnaye, 1837)

Otros nombres: Golondrina de alas largas. Vencejo de alas largas. Vencejo serrano.



DESCRIPCIÓN
Largo: 13,5 -14 cm.
Peso: Fiora (1933): N= 1 X= 20 g; Navas y Bó (2001): N= 6 (M) X= 22,00 g (Rango 20,0 a 24,9); N= 1 (H) X= 22,0
Coloración. Dorso pardo. Rabadilla, lados del cuello y ventral, blancos. Alas y cola pardas.
La cola es larga, furcada.

Voces
Straneck (*in litt*.). En vuelo emite un agudo Tsirrr...tsirrr...trirrr.

HÁBITAT
Estepas, quebradas y montañas hasta los 3000 m de altura.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Córdoba, San Juan.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N									N	N

En huecos o grietas, en laderas de montañas. Altos.
Oculto. Rudimentario. Los huevos puestos sobre la piedra o sobre plumas.

Pereyra (1927e). Anida en las barrancas de piedra. En el rio Atuel, San Rafael, Mendoza.
Salvador y Salvador (1988). Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba, 08-01-1983, colonia con 15-20 nidos, en un paredón de piedra, con pichones, 17-12-1983 y 19-12-1987, de 30-35 nidos, en grietas de rocas, entre 12 y 20 m de altura, probablemente con huevos.
Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba, nidifica en grietas en paredones acantilados.
Salvador y Salvador (2012). Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba, en localizaron 5 colonias, en noviembre, diciembre y febrero. Todas en grietas delgadas y profundas, en grandes paredones de rocas, entre 12 y 20 m de altura. En ellas anidaban entre 15 y 35 parejas.
De la Peña (2013c). Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba, 05-12-1981, varios nidos en grietas en paredones, a 15-20 m de altura, Pampa de Achala, 27-11-1989, 18 m de altura, un huevo, Pampa de Achala, 25-11-1990, nidos a 18-50 m de altos, Huaco, dpto. Jachal, San Juan, 16-01-1982, nidos a 25 m de altura.

Huevos
Pone 1 ó 2 huevos. Ovoidales. Blancos.

Medida
De la Peña (2013c): 22,1 x 15

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Dorsal parda. Ventral y rabadilla blancas.
Cola larga, furcada.




Pampa de Achala. Córdoba. 27-11-1982. Nidos en grietas

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Aeronautes andecolus andecolus (d'Orbigny y Lafresnaye, 1837) por la Cordillera de los Andes y precordilleras desde Jujuy y Salta hasta Córdoba, San Luis, Neuquén, Chubut y Río Negro.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Tres subespecies. En la cordillera de los Andes y en la precordillera en Perú, Bolivia y Argentina. Además en Sierras Centrales de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Aeronautes andecolus andecolus (d'Orbigny y Lafresnaye, 1837)

Catamarca

Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009); Nores (1995)

Observaciones: De la Peña (El Alamito, dpto. Andalgalá, 17-12-1999)

Chubut

Citas: Straneck (1990d)

Observaciones : Sain-Trápaga (*in litt*. 2014)

Córdoba

Citas: De la Peña (1982, 2005); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1995, 1996); Salvador y Salvador (1988, 2012); Yzurieta (1995)


Jujuy

Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Chebez et al. (1998); Dabbene (1917b); Fiora (1933); Hartert y Venturi (1909)

La Rioja

Citas: Camperi et al. (2008); Giacomelli (1923); Hayward (1967); Koslowsky (1895b)

Mendoza
Citas: Calí et al. (2008); Contreras y Fernández (1980); Dabbene (1917b); Darrieu (2014); Lucero (2013f); Navas y Bó (2001); Pereyra (1927e, 1942a); Roig (1965); Sosa (2005); Wetmore (1926b)



Neuquén
Citas: Chebez et al. (1998); Funes en Fiori y Zalba (1999); Gorgoglione (1997); Matarasso (2007); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011); Seewald y Pérez (2009)

Salta
Citas: Coconier et al. (2007); Esteban (1953); Moschione et al. (2013); Nores (1995)

Observaciones: De la Peña (Cafayate, dpto. Cafayate, 07-02-1977)

San Juan
Citas: Acosta y Murúa (2001); De la Peña (1982b, 2013c); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Gelain (2014a); Lucero (2013f, 2013i); Moschione y Banchs (1992); Navas y Bó (2001); Nores (1995); Ortiz y Murúa (1994)

San Luis
Citas: Gil et al. (1995); Nellar Romanella (1993)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Antelo (2009); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (2007a); Capllonch et al. (2011b); Dabbene (1917b); Handford (1983); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Nores (1995)

COLIBRÍES Y PICAFLORES

FAMILIA: TROCHILIDAE

Aves pequeñas, de colores brillantes. Exclusivamente americanas, habitan desde Alaska a Tierra del Fuego.

Los colores estructurales, metálicos, de las plumas cambian según el ángulo de incidencia de la luz. Los machos en general tienen colores más llamativos que las hembras, y varias especies presentan crestas, plumas alargadas a los lados de la cabeza y cola larga.

Las patas son muy cortas, no pueden caminar. Son de vuelo ágil y lo realizan en todas las direcciones. El batimiento de las alas es muy rápido y producen un zumbido audible desde cierta distancia.

Pico largo y angosto, en algunas especies es curvo.

Los nidos pueden estar colgando o asentados en ramas, hojas, raíces, techos de grutas, hilos o alambres colgantes de construcciones. La hembra construye el nido, incuba y cría a los pichones.

Son aves muy agresivas, defienden tanto el territorio de alimentación como el de nidificación. Atacan a sus congéneres como a otras aves o a las personas.

Les gusta mojarse, ya sea en cascadas o en lluvias artificiales en parques y jardines.

Los nidos pueden estar colgando o asentados en ramas, hojas, raíces, techos de grutas, hilos o alambres colgantes de construcciones. La hembra construye el nido, incuba y cría a los pichones.

El nido tiene forma de tacita, cono invertido o cilíndricos.

Emplea en la construcción Externamente trocitos de hojas o de, musgos.

Emplean en la construcción musgos, líquenes, detritus, tallos, cortezas de árboles, hojas secas, liados con telas de arañas. Internamente tapizado con materia algodonosa, pelos, cerdas, lanas, materiales vegetales suaves.

Ponen 2 huevos blancos.

Los pichones nacen con los ojos cerrados y escaso plumón.

Son aves muy agresivas, defienden tanto el territorio de alimentación como el de nidificación. Atacan a sus congéneres como a otras aves o a las personas.

Se alimentan del néctar de las flores, de pequeños insectos, arácnidos e invertebrados.

Frecuentan bosques, selvas, sabanas, montañas, serranías, parques, jardines, áreas urbanas.

Subfamilia: Florisuginae

PICAFLOR NEGRO *Florisuga fusca* (Vieillot, 1817)

Otros nombres: Colibrí cola blanca. Picaflor blanquinegro.

DESCRIPCIÓN
Largo: 11-13 cm.
Peso: Schuchmann (1999): (M) 9 g, (H) 7 g
Coloración. Pico recto, negro.
Negro, excepto el lomo, supracaudales y cubiertas alares, que son verdes bronceadas. Flancos blanquecinos. Alas pardas verdosas. Las plumas centrales de la cola son negras, el resto blanco con punta negra.
Juvenil. Negro con ancha banda castaña a cada lado de la garganta. Plumas externas de la cola blancas.

COMPORTAMIENTO
Se alimenta de insectos y de néctar de flores.

HÁBITAT
Praderas arbustivas, matorrales, plantaciones, parques, orillas de selvas, capueras.
NIDIFICACIÓN
Se carece de datos
Más información:
Schuchmann (1999)
IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Negro con plumas blancas en la cola.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Florisuga fusca (Vieillot, 1817) en Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Su área de distribución es una estrecha franja boscosa en el sureste de Brasil, este de Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS



Buenos Aires
Citas: Fangauf en Narosky y Di Giacomo (1993); Narosky y Di Giacomo (1993); Restivo y Rego (2015); Savigny (2001c)

Corrientes
Citas: Chebez (1994)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); Chebez (1994); Narosky (1980); Raffo et al. (2008); Torrano (1987)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Bodrati y Klavins (2014); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1994, 1996a); Martínez Gamba (2014); Militello y Chebez (2009); Saibene et al. (1996)

Santa Fe
Citas: Giraudo et al. (2008)

ERMITAÑO CANELA *Phaethornis pretrei* (Lesson y Delattre, 1839)

Otros nombres: Ermitaño frentinegra. Picaflor cola blanca garganta negra. Picaflor ermitaño chico.

DESCRIPCIÓN
Largo: 14-15 cm.
Peso: Salvador (1988): N= 1 (M) 5,0 g; Salvador y Di Giacomo (2014): N= 14 X= 5,1 (Rango 4,5 a 5,8)
Coloración. Pico curvado. Mandíbula roja. Mide 3,3 cm.
Dorso verde bronceado más oscuro en la corona y rojizo en la rabadilla. Banda ocular oscura entre dos líneas blanquecinas amarillentas. Garganta ocrácea. Resto de la zona ventral ocráceo rojizo.
Alas pardas. Cola con las plumas centrales alargadas, con dos tercios verdes bronceados y el resto blanco. Las demás rectrices con un tercio en la base verde bronceado, seguido por una ancha banda negra y punta blanca.

COMPORTAMIENTO

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto está compuesto por 3 sílabas agudas y silbadas: Tsi.siepsiep..tsie.siepsiap.. tsiep.siapsiep, repetido insistentemente.
HÁBITAT
Orillas de selvas, selvas en galería, selvas, yungas, parques, entre los 400 y los 2100 m de altura.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Jujuy, Salta.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
							N	N			

El nido tenía forma más o menos cilíndrica. Construido con musgos, raicillas, tallos y algunas hojas secas liadas con telas de arañas. Internamente tapizado con materias algodonosas, inflorescencias.
Fraga et al. (1984). 15 km al oeste de Tartagal, en Sierra de Tartagal, dpto. Gral. San Martín, Salta, el 13-09-1983 se localizó un nido dentro de un caño de alcantarilla de chapa corrugada que atraviesa el camino. Colgaba de una raíz. Era una estructura cilíndrica de unos 15 cm de alto y 6 cm de diámetro. La cavidad o lecho tenía 3,5 cm de diámetro y 3 cm de profundidad. Construido con musgos, detritus, tallos y algunas hojas secas. Internamente tapizado con materia algodonosa de color ocre acanelado. Contenía 2 pichones.



Di Giacomo y López Lanús (1998). Aguas Negras, Parque Nacional Calilegua, dpto. Ledesma, Jujuy, setiembre de 1987, A. Caradonna, localizó un nido sin postura, debajo del alero en la ventana de una vivienda, a 1,20 m del suelo.
Di Giacomo y López Lanús (1998). Angosto del Río Pescado, Parque Nacional Baritú, dpto. San Victoria, Salta, dos nidos, uno el 16-08-1992 en construcción en unas raíces que colgaban entre piedras y el otro el 19-08-1992, con 2 huevos, colgaba de dos raíces en una pared rocosa. El nido tenía forma más o menos cilíndrica de unos 18 cm de altura. En el extremo superior, presenta una cavidad de 3,5 cm de profundidad, 6 cm de diámetro

externo y 3 cm en el interno. La parte superior revestida externamente con musgos verdes y raicillas muy finas, unidas con telarañas. El lecho acolchado con materiales de aspecto algodonoso e inflorescencias. El 23-08-1993 un nido sin postura colgaba de varias raíces que asomaban de una barranca a 60 cm del agua de un arroyo.

Huevos
Pone 2 huevos. Blancos.

Medidas
Di Giacomo y López Lanús (1998): 14,1 x 9,7 y 14,6 x 9,3

Pesos
Di Giacomo y López Lanús (1998): 0,7 y 0,7

PICHONES
Descripción
Fraga et al. (1984). Piel rosada, vainas de las plumas gris oscuro. Pico anaranjado
IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pico curvado. Mandíbula roja. Mancha oscura en la cara, bordeada por dos líneas claras. Plumas centrales de la cola alargadas. Ventral ocrácea rojiza.
Se diferencia del Ermitaño escamado por tener la mandíbula roja (no amarilla). la garganta sin negro y por ser ventralmente ocráceo rojizo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Phaethornis pretrei (Lesson y Delattre, 1839) en Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Corrientes y Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Su área de distribución comprende: este de Brasil, este de Bolivia, este de Paraguay y extremo Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Corrientes
Citas: Bernasconi (2014)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Di Giacomo y López Lanús (1998); Malizia et al. (2005); Moschione y Segovia (2005); Nores y Yzurieta (1981); Straneck (1990f)



Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Castelino y Moreyra (1989)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Camperi (1990); Coconier et al. (2007); Di Giacomo y López Lanús (1998); Fraga et al. (1984); Moschione et al. (2013); Salvador y Di Giacomo (2014)

Santiago del Estero
Citas: Caziani (1987)

ERMITAÑO ESCAMADO *Phaethornis eurynome* (Lesson, 1832)

Otros nombres: Ermitaño bayo. Ermitaño manchado. Mainumbí. Picaflor de cola blanca. Picaflor de pico curvo.

DESCRIPCIÓN
Largo: 14-16 cm.
Peso: Salvador y Di Giacomo (2014): N= 2 (?) 5,0 y 5,6 g
Coloración. Pico curvado, negro. Base de la mandíbula amarilla. Mide 3,8 cm.
Dorso verde. Corona más oscura. Rabadilla y supracaudales con tono amarillo rojizo. Cejas superciliares amarillas canelas. Franja ocular negra. Garganta con plumas negras orilladas de blanco. Banda blanquecina desde la base del pico a los lados de la garganta.
Ventral gris clara con tinte ocráceo en el abdomen. Subcaudales amarillas canelas claras.
Alas pardas. Cola verde con franja subterminal oscura y punta blanca, color que disminuye hacia las plumas externas. Plumas centrales alargadas, blancas.

COMPORTAMIENTO

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto está compuesto por 4 sílabas agudas y silbadas: Tiutitilti...tiutitilti... repetido insistentemente.

HÁBITAT
Estrato bajo (sotobosques) y medio, orillas y claros de selvas, entre los 100 y los 2200 m de altura.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.
Más información:
Schuchmann (1999)
IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pico largo, curvado. Mandíbula amarilla. Banda ocular oscura, bordeada por una línea superciliar y otra infraocular, claras. Las plumas centrales de la cola son largas, blancas.
Diferenciarlo del Ermitaño canela.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Phaethornis eurynome paraguayensis M. Bertoni y W. Bertoni, 1901 en Misiones.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Selva Atlántica en el sureste de Brasil, este de Paraguay y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Phaetornis eurynome paraguayensis M. Bertoni y W. Bertoni, 1901

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Chebez (1996a); Dabbene (1919a.); Giai (1950); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2009);Martínez Gamba (2014); Salvador y Di Giacomo (2014); Straneck (1990g)

Subfamilia: Trochilinae

COLIBRÍ CHICO *Colibri thalassinus* (Swaison, 1827)

Otro nombre: Picaflor de penacho azul.

DESCRIPCIÓN
Largo: 10,5-11,5 cm.
Peso: Schuchmann (1999): (M) 5-7 g, (H) 4-8 g
Coloración. Pico ligeramente curvado, negro.
Verde brillante. Garganta y pecho con puntos oscuros en las plumas dando un aspecto "escamado".
Región auricular violeta.
Alas pardas. Cola con las plumas centrales verdes, las laterales verdes azuladas. Banda subterminal negra.

HÁBITAT
Plantaciones, parques, bosques y selvas hasta los 3000 m de altura.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Schuchmann (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Verde con mancha violeta en la región auricular.
Se parece al Colibrí grande, pero es de menor tamaño.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Colibri thalassinus crissalis Todd, 1942 en Jujuy, Tucumán y Catamarca.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cuatro subespecies. Regiones montanas desde Méjico hasta Panamá y en Sud América por el oeste en la cordillera de los Andes entre 500 - 3000 metros de altura hasta Argentina. Comprende: Méjico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina.



CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Colibri thalassinus crissalis Todd, 1942

Catamarca
Citas: Bertelli et al. (1997)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Olrog (1963a)

COLIBRÍ GRANDE *Colibri coruscans* (Gould, 1846)

Otros nombres: Colibrí verde mayor. Picaflor de cara azul. Picaflor de mejillas azuladas. Picaflor de vientre azul. Picaflor vientriazul.

DESCRIPCIÓN
Largo: 13-14 cm.
Peso: Contreras y Fernandez (1978): N= 1 (H) 7,2 g; Salvador (1988): N= 1 (H) 8,0 g;Schuchmann (1999): (M) 7,7-8,5 g, (H) 6,7-4,3 g
Coloración. Pico ligeramente curvado, negro.
Verde brillante. Barbilla, garganta, auriculares y centro del abdomen azules purpúreos. Cuello anterior y pecho con plumas con el centro oscuro, dando el aspecto de "escamado".
Alas pardas. Plumas centrales de la cola verdes azuladas, laterales verdes. Banda subterminal azul

COMPORTAMIENTO
Durante el cortejo realiza vuelos verticales, de varios metros de altura, emitiendo chillidos y silbidos fuertes para luego posarse en el mismo lugar donde inició el vuelo.

Alimentación
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). Néctar de *Echinopsis atacamensis, Nicotinia glauca, Tristerix verticillatus.*
Fracchia y Aranda-Rickert (2015). Néctar de *Ligaria cuneifolia*.

HÁBITAT
Vegetación arbustiva en los cerros entre los 1500 y los 2000 m de altura, yungas, parques, jardines, plantaciones. También subpáramos y páramos entre los 1700 y los 4500 m

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Jujuy, Catamarca.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	N	N							N		



Adherido y semiapoyado a ramitas de arbustos o de árboles. A baja Altura Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita (semiesfera) de musgos y algunos líquenes.

Uranga (*in litt.*). Azul Pampa, dpto. Humahuaca, Jujuy, 12-02-2012, nido con 2 pichones.
Salvador y Narosky (1984). Coraya, dpto. Humahuaca, Jujuy, el 27-02-1983 se localizó un nido apoyado y adherido a una horqueta de un *Prosopis ferox* a 2,20 m del suelo. Tiene forma de semiesfera, construido con lana de oveja, por fuera cubierto de líquenes, unido con telas de araña. Mide 5 x 5,5 cm de diámetro externo, 4 cm en el interno, 3,5 cm de alto y 2 cm de profundidad. Tenía 2 pichones. El 02-03-1983 a 50 m del nido anterior se localizó otro en el mismo tipo de planta, a 3,40 m del suelo, sin postura.

De la Peña (2013c). Cuesta del Clavillo, dpto. Andalgalá, Catamarca, 18-10-1999, nido en arbusto a 1,80 m con 2 pichones. Medidas: diámetro total: 6 cm, diámetro interno: 4 cm, profundidad: 2 cm, alto: 4 cm. Salvador (2015). Azul Pampa, dpto. Humahuaca, Jujuy, 19-02-1995, nido con 2 pichones.



Cuesta del Clavillo. Catamarca. 18-12-1999

PICHONES
Salvador (2015). Pichones de uno o dos días de nacidos. Ojos cerrados, piel dorsal de color carne violácea oscura, plumón pardo acanelado, en la zona ventral la piel es de color carne naranja.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Verde con azul en la garganta, auriculares y abdomen. Cola con franja oscura subterminal.
Se parece al Colibrí chico, pero es de mayor tamaño.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Colibri coruscans coruscans (Gould, 1846) en Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Mendoza.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Su área de distribución se halla en Sud América en Venezuela, Guyana y n Brasil y luego por el oeste en los Andes en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, norte de Chile y noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS



Catamarca
Citas: Bertelli et al. (1997); Carma (2009); De la Peña (2001a); Nores (1995)

Jujuy
Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Hartert y Venturi (1909); Moschione y Segovia (2005); Salvador (1988, 2015); Salvador y Narosky (1984)

Observaciones: De la Peña (Humahuaca, dpto. Humahuaca, 23-02-1979)

La Rioja
Citas: Fracchia y Aranda-Rickert (2015); Nores (1995); Lucero e Izasa (2015)

Mendoza

Citas: Contreras y Fernández (1978); Gómez (2006)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013); Nores (1995)

Observaciones: De la Peña (Valle Encantado, 05-12-1977; 29-11-1978)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2013i)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch et al. (2011b); Handford (1983); Lucero (1983); Nores (1995); Olrog (1952); Ortiz y Aráoz (2014)

COLIBRÍ MEDIANO *Colibri serrirostris* (Vieillot, 1816)

Otros nombres: Colibrí de vientre verde. Picaflor de penacho purpúreo. Picaflor de vientre verde.

DESCRIPCIÓN
Largo: 12-13 cm.
Peso: Schuchmann (1999): (M) 5,6-6,8 g
Coloración. Pico ligeramente curvado, negro.
Verde. Auriculares azules púrpuras. Violeta debajo de las mejillas. Manchita blanca detrás de los ojos. Subcaudales blancas.
Alas pardas. Cola verde azulada con franja oscura subterminal.

HÁBITAT
Vegetación arbustiva, orillas de bosques y de selvas, sabanas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Schuchmann (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Mejillas y auriculares violetas. Subcaudales blancas. Banda oscura cerca de la punta de la cola.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Colibri serrirostris (Vieillot, 1816) en Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Córdoba, norte de Santa Fe, Corrientes y Misiones. Observado en Formosa.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Su área de distribución se halla en centro y sudoste de Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca

Citas: Carma (2009)

Córdoba
Citas: Miatello et al. (2003)

Corrientes
Citas: Contreras y Contreras (1984)

Formosa
Citas: Moschione en Contreras et al. (2014)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Moschione y Segovia (2005)

Misiones
Citas: Pugnali (2002a)

Salta
Citas: Höy (1969a); Moschione et al. (2013)

Santa Fe
Citas: Giai (1950)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Ortiz y Aráoz (2015); Pereyra (1927e)

PICAFLOR DE ANTIFAZ *Polytmus guainumbi* (Pallas, 1764)

Otros nombres: Picaflor de cola verde. Picaflor dorado.

DESCRIPCIÓN
Largo: 10-11 cm.
Peso: Short (1971): N= 1 (H) 6,4 g; Schuchmann (1999): (M) 4, 5 g, (H) 5 g
Coloración. Pico largo, ligeramente curvado, rojo con punta negra.
Macho. Dorso verde bronceado. Una línea ocrácea va por arriba y otra por debajo de los ojos. Banda auricular oscura. Ventral verde dorada. Centro del vientre blanco. Subcaudales blanquecinas.
Alas pardas. Cola verde con las barbas externas de las plumas exteriores blancas. Punta blanca.
Hembra. Partes dorsales semejantes al macho. Ventral ocrácea blanquecina con puntos verdes en la garganta y superior del pecho.

HÁBITAT
Orillas de selvas, sabanas, selva en galería, matorrales cerca de ríos, sotobosques en orillas de isletas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Schuchmann (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pico ligeramente curvo. Coloración general verde con líneas blancas en la cabeza. Cola ancha, verde con blanco en la punta y en las plumas externas. La hembra se parece a la del Picaflor lazulita, pero difieren en el color de la cola.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Polytmus guainumbi thaumantias (Linnaeus, 1766) en Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Santa Fe y Santigo del Estero.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Se conocen 3 poblaciones (subespecies). dos de ellas en el ***n*** de Sud América en Colombia, Venezuela, Guayanas y ***n*** Brasil. La tercera que es la que consideramos en el parrafo siguiente esta unida a las del norte por una estrecha franja costera en ***n*** Brasil.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Polytmus guainumbi thaumantias (Linnaeus, 1766)

Chaco
Citas: Bodrati (2005); Contreras et al. (1990b)

Corrientes
Citas: Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz et al. (2010); Chebez et al. (1998); Contreras (1981b); Esteban (1947); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2003b, 2006); López-Lanús et al. (2013b); Short (1971)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006); Rodriguez, L. en Chebez (2009); Rovira y Beltzer (1992)

Formosa
Citas: Contreras (1987c);López Lanús (1997)

Misiones
Citas: Bodrati y Klavins (2014); Saibene et al. (1996)

Santa Fe
Citas: Baldo et al. (1995); Luna y Manassero (2008a)

Santiago del Estero
Citas: Luna y Manassero (2008a)

PICAFLOR DE PECHO NARANJA *Chrysolampis mosquitus* (Linnaeus, 1758)

Otros nombres: Colibrí rubí. Picaflor rubí.
DESCRIPCIÓN
Largo: 8-9 cm.
Peso: Schuchmann (1999): 4-5 g
Coloración. Macho. Frente, corona y nuca rojas. Dorso pardo oliváceo oscuro. Cola castaño rojiza con puntas negras. Línea malar oscura. Garganta y parte superior del pecho, naranjas. Vientre y subcaudales pardas rojizas.

Hembra. Dorso verde cobrizo claro. Lados de la cabeza y parte ventral, grises. Plumas centrales de la cola verdes oliváceas, el resto grisáceo con banda subterminal negra, puntas blancas.



HÁBITAT
Vegetación arbustiva, selva en galería, sabanas, jardines, matorrales.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.
Más información:
Schuchmann (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho con corona roja y garganta y pecho naranjas. La hembra es confundible con la de otras especies.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Chrysolampis mosquitus (Linnaeus, 1758) observado en Puerto Iguazú (Misiones).

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Se distribuye en una amplia área de Sud América en la sabana que circunda Amazonia, en Colombia, Venezuela, Guayanas, Brasil, Bolivia, Paraguay, extremo Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Misiones
Citas: Chebez et al. (2004); Pugnali y Pearman (2001)

PICAFLOR DE VIENTRE NEGRO *Anthracothorax nigricollis* (Vieillot, 1817)

Otros nombres: Colibrí de cola violeta. Mainumbí. Picaflor de garganta negra. Picaflor vientre negro. Picaflor violeta.

DESCRIPCIÓN
Largo: 11-12 cm.
Peso: Schuchmann (1999): (M) 6,9 g, (H) 7,3 g
Coloración. Pico ligeramente curvado, negro.
Macho. Verde. Garganta, centro del pecho y vientre negros bordeados de azul.
Alas pardas. Cola con las plumas centrales verdes, las laterales púrpuras.
Hembra. Dorsal verde con tono azulado. Ventral blanca con banda longitudinal oscura desde la garganta al vientre. Rectrices centrales verdes, laterales rojizas en la base, franja subterminal negra y punta blanca.

HÁBITAT
Parques abiertos con arbustos y plantas ralas, plantaciones, orillas de selvas, bosques y selvas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Schuchmann (1999)



IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
El macho ventralmente es negro orillado de azul. La hembra es ventralmente blanca con franja longitudinal oscura.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Anthracothorax nigricollis (Vieillot, 1817) en Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco hasta el sureste de Entre Ríos. Observado en Salta.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Extensa área de distribución desde Panamá a Argentina. Comprende: Panamá, Trinidad y Tobago, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Chaco
Citas: Bertonatti y Heinonen Fortabat (1988); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Herrera (1988)

Corrientes
Citas: Chatellenaz et al. (2010); Esteban (1953); Giraudo et al. (2006)

Entre Ríos
Citas: Areta et al. (2004); Contreras (1981b); Marateo et al. (2009)

Formosa
Citas: Contreras (1987c);Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Narosky (1983); Narosky y Martelli (1995); Nores y Yzurieta (1981)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b); Chebez (1996a); Dabbene (1910a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Militello y Chebez (2009); Martínez Gamba (2014); Navas y Bó (1993); Pereyra (1950a)
Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

PICAFLOR RUBÍ *Sephanoides sephaniodes* (Lesson, 1827)

Otros nombres: Colibrí corona de fuego. Picaflor austral. Picaflor de cabeza granate. Picaflor de cabeza rubí. Picaflor de corona roja anaranjada. Picaflor galerita. Picaflor verde de corona roja. Pindá.

DESCRIPCIÓN
Largo: 10-11 cm.
Peso: Contreras (1975): N= 12 X= 5,5 g (Rango 4,4 a 6,3)
Coloración. Pico recto, negro.
Macho. Frente y corona rojas. Dorso verde bronceado. Manchita blanca detrás de los ojos. Ventral grisácea con pintas verdes bronceadas en la garganta y en el pecho.
Alas y cola verdes oscuras.
Hembra. Frente, corona y parte dorsal verdes. Menos manchada en la zona ventral que el macho

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Zotta (1934). Dípteros (Platypezidae).
Fraga et al. (1997). Néctar de *Asteranthera ovata, Berberis* sp., *Campsidium valdivianum, Dasyphyllum diacanthoides, Desfontainia spinosa, Embothrium coccineum, Escallonia rubra, Fucsia magellanica, Mitraria coccinea, Nicotiana glauca, Salix fragilis, Tristerix tetrandrus.*
Estades (2003). *Nothofagus dombeyi.*
Christie et al. (2004 Néctar). *Tristerix tetrandrus.* Insectos.
Devoto et al. (2006). *Embothrium coccineum.*
Lucero (2009). Néctar de *Nicotiana glauca.*

HÁBITAT
Matorrales húmedos, orillas de bosques, bosques abiertos, parques, jardines.
NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Río Negro, Neuquén, Chubut.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
										N	N



Asentado y adherido a ramas. A baja altura.
Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita. Emplea en la construcción musgos.

M. Rumboll (*in litt*.). Puerto Blest, dpto. Bariloche, Río Negro, 19-11-1977, nido con 2 huevos. Isla Victoria, dpto. Los Lagos, Neuquén, 19 -12-1977, nido con 2 huevos.
Salvador y Narosky (inéd.). Parque Nacional Los Alerces, dpto. Futaleufú, Chubut, 11-11-1986, nido en un cañaveral, adherido al nudo de una caña (*Chusquea* sp.), a 1,7 m de altura, con 2 huevos frescos.
Salvador y Salvador (en prep.). Puerto Manzano, dpto. Los Lagos, Neuquén, 03-12-1986, nido en una caña, a 2,1 m de altura, con 2 pichones.
Márquez (2001). Lago Queñi, Parque Nacional Lanín, dpto. Lacar, Neuquén, el 16-11-1997, se encontró un nido activo, aferrado a una caña colihue, a 1,70 m del suelo. Estaba construido con musgos. Contenía 2 huevos.
Christie et al. (2004). Noroeste patagónico, nidifica en árboles y arbustos.
De la Peña (2013c). San Carlos de Bariloche, dpto. Bariloche, Río Negro, 21-11-1998, en Caña Colihue, un nido a 1,60 m del suelo, 2 huevos. Medidas: diámetro total: 8 cm, diámetro interno: 5 cm, profundidad: 3,5 cm, alto: 7 cm.

Huevos
Pone 2 huevos. Elípticos. Blancos.

Medidas
De la Peña (2013c): 14 a 14,5 x 9 a 9,5 X= 14,2 x 9,2 (N= 2)

PICHONES
Descripción

Márquez (2001). A los 10 días de edad, tienen plumón colorido con líneas longitudinales negras y marrones, que tiende a tornarse con el tiempo marrón.



Generalidades
Márquez (2001). A los 22 días de nacer, los pichones abandonan el nido.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho rojo en la frente y en la corona. Pintas verdes en la parte ventral. Tener en cuenta el hábitat y la distribución geográfica.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Sephanoides sephaniodes (Lesson, 1827) por el oeste, desde San Juan y Mendoza a Tierra del Fuego. En invierno se desplaza hacia el este hasta Córdoba y Buenos Aires. Accidental en las islas Malvinas.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Centro y sur de Chile y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Dabbene (1910); Darrieu y Camperi (2001a); Delhey (1992); Fiameni (1987a, 1994) , Maugeri (2002a); Zotta (1934)

Chubut
Citas: Calvelo et al. (2006); Camperi (1998); Harris (2008); Kovacs et al. (2005); Pagnoni (2015); Vidoz (1995)

Córdoba
Citas: Micheluti en Yzurieta (1995); Straneck (1999a)

La Pampa
Citas: Serracín (1998)

Mendoza
Citas: Fontana (1918); Harper en Pereyra (1950a); Reed (1916); Roig (1965); Sosa (2005)

Neuquén
Citas: Calvelo et al. (2006); Contreras (1975); Christie et al. (1988, 2004); Daciuk (1978); Devoto et al. (2006); Fraga et al. (1997); Gorgoglione (2005); Márquez (2001); Matarasso (2007); Navas (1978); Pereyra (1945); Peters (1923b); Veiga et al. (2005)

Observaciones: De la Peña (Villa La Angostura, dpto. Los lagos, 30-01-1976)

Río Negro
Citas: Calvelo et al. (2006); Camperi (1998); Camperi y Darrieu (2005); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Contreras et al. (1980b); Daciuck (1977); De la Peña (2013c); Devoto et al. (2006); Fraga et al. (1997); Gelain (1984a, 2001, 2007b, 2010); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Grigera y Rubulis (1985); Hecker y Vidoz (1998); Llanos et al. (2011); Paz Barreto (1997b); Pérez et al. (2006); Peters (1923b)

Observaciones: De la Peña (San Carlos de Bariloche, doto. Bariloche, 31-01-1976)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2009, 2013i)

Santa Cruz
Citas: Darrieu et al. (2008); Imberti (2005e); Stone (1928)

Santa Fe
Citas: Giarduz (2008)

Tierra del Fuego
Citas: Clark (1986); Humphrey et al. (1970); Olrog (1948); Reynolds en Olrog (1948)

Islas Malvinas
Citas :Woods (2006)

COQUETA VERDE *Lophornis chalybeus* (Temminck, 1821)

Otros nombres: Coqueta abanico puntiblanco. Picaflor de abanico.

DESCRIPCIÓN
Largo: 8-8,5 cm.
Peso: Schuchmann (1999): (M) 3 g
Coloración. Pico recto, negro.
Macho. Frente verde. Cabeza oscura. Barbilla y línea hasta debajo de los ojos verdes oscuras. De las mejillas salen plumas alargadas verdes con punta blanca. Dorso verde. Banda blanca en la rabadilla. Garganta verde. Pecho y vientre grises violáceos. Flancos verdes.
Alas pardas verdosas. Cola verde purpúrea.
Hembra. Dorso verde. Banda en la rabadilla blanquecina. Garganta y barbillas blanquecinas. Resto de la zona ventral gris oscuro. Punta de las plumas externas de la cola gris.
Carece de plumas alargadas en las mejillas.

HÁBITAT
Vegetación arbustiva en praderas y sabanas, plantaciones, parques, orillas de selvas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Schuchmann (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho con “abanico” de plumas en los costados de la cabeza y del cuello. Hembra con blanco en la garganta y en las mejillas. Ambos con banda blanca en la rabadilla.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Lophornis chalybeus chalybeus (Temminck, 1821) observado en el este de Buenos Aires, centro de Santa Fe, Formosa y Misiones.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Presenta un área importante de distribución en en norte y en el oeste de de Sud América: Venezuela, Colombia , Ecuador, Perú, Bolivia y noroeste de Brasil. Tiene otra población en el sueeste de Brasil y áreas adyacentes de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Lophornis chalybeus chalybeus (Temminck, 1821)

Buenos Aires
Citas: Olrog (1972)

Entre Ríos
Citas: Marateo et al. (2009)

Formosa
Citas: Salvador y Salvador (1990)

Misiones
Citas: Heredia, J. en Chebez (2009); Nores e Yzurieta (1997); Salvador y Salvador (1990)

Santa Fe
Citas: De la Peña (1988c)

PICAFLOR YUNGUEÑO *Adelomyia melanogenys* (Fraser, 1840)

Otros nombres: Picaflor de garganta azul. Picaflor de garganta purpúrea. Picaflor de pecho purpúreo.

DESCRIPCIÓN
Largo: 8,5-9 cm.
Peso: Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 (?) 3,5 g
Coloración. Pico corto, negro.
Dorsal verde bronceada brillante. Costados de la cabeza oscuros. Línea posocular blanquecina. Ventral ocrácea con puntos verdes en la garganta. Flancos verdosos.
Alas pardas verdosas. Plumas centrales de la cola verdes oliváceas, restantes grises en la base, violetas oscuras hacia el extremo. Punta ocrácea blanquecina.

HÁBITAT
Matorrales húmedos en orillas de selvas y yungas, entre los 500 y los 3000 m de altura.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.
Más información:
Schuchmann (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pico corto. Ventral ocráceo con la garganta punteada de verde. Línea blanquecina y mancha oscura en los lados de la cabeza. Punta de la cola ocrácea.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Adelomyia melanogenys inornata (Gould, 1846) entre los 500 y los 3000 m de altura en Salta y Jujuy.



SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Siete subespecies. En la cordillera de los Andes en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Adelomyia melanogenys inornata (Gould, 1846)

Jujuy
Citas: Blendinger (1998); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Chebez et al. (1998); Miranda et al. (2010); Salvadori (1897)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Blendinger (1998); Camperi (1990); Giai (1947); Höy (1980b); Moschione et al. (2013); Navas (1968); Salvador y Di Giacomo (2014)


PICAFLOR COMETA *Sappho sparganurus* (Shaw, 1812)

Otros nombres: Colibrí de cola larga. Picaflor coludo. Picaflor coludo rojo. Picaflor cometa de cola roja. Picaflor de cola larga. Picaflor zumbón. Pindá. Pinuda. Quenti. Rundún. Rumdún coludo. Run run. Safo. Tuminico. Tumuñico.

DESCRIPCIÓN
Largo: 19-22 cm. (macho) ; 12-15 cm. (hembra)
Peso: Fiora (1933): N= 1 X= 5,5 g; Salvador (1988): N= 3 (M) X: 4,8 g (Rango: 4,2 a 5,2); N= 3 (H) X: 4,7 g (Rango: 4,2 a 5,0); Salvador (2014a): N= 1 (M) 4,6 g; N= 3 (H) X= 4,7 g (Rango 4,5 a 4,8); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 6 (M) X= 5,1 g (Rango 4,3 a 5,4); N= 5 (H) X= 4,8 g (Rango 4,4 a 5,0)
Coloración. Pico ligeramente curvado, negro.
Macho. Cabeza parda. Dorso rojizo. Garganta verde dorada brillante. Ventral verde. Subcaudales blancas. Alas pardas. Cola larga, roja anaranjada, con el extremo de las plumas negro.
Hembra. Dorso verde bronceado. Ventral gris blanquecina con pequeños puntos verdes. Cola corta, verde con las plumas externas blancas.

COMPORTAMIENTO
Alimentación
Castellanos (1920a). Agua azucarada.
Genise et al. (1993). Saviade *Aspidosperma quebracho-blanco, Prosopis flexuosa.*
Montaldo (1995a). Néctar de *Aloe arborescens, Aloe vera, Callandria tweediei, Chaenomeles lagenaria*, *Dicliptera scutellata, Dolichandra cynanchoides,Eriobotrya japonica, Erythrina crista-galli, Eucalyptus cinerea, Jasminummesnyi, Kalanchoe* sp*., Ligaria cuneifolia,Nicotiana glauca, Puya spathacea, Siphocampylus foliosus.*
Lucero (2009). Néctar de *Nicotiana glauca.*
De la Peña (2010d). Néctar de Cestrum parqui, *Dolichandra cynanchoides,Eucalyptus* sp.,*Lycium cestroides, Nicotiana glauca.*
De la Peña De la Peña y Salvador (2010). Néctar de *Jasminum mesnyi*.
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). Néctar de *Nicotiana glauca, Psittacanthus cuneifolicus*. Arácnidos (arañas). Coleoptera, Diptera (Culicidae)

Montaldo (2014). Néctar de Azafrán *Cnicothamnus lorentzii*
Fracchia y Aranda-Rickert (2015). Néctar de *Ligaria cuneifolia*.



Voces
Straneck (*in litt*.). El canto es un áspero y agudo Chechecheitchicheche...chechecheitchicheche..

HÁBITAT
Matorrales, bosques, quebradas, serranías y montañas hasta los 3000 m de altura, parques, jardines.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Córdoba, San Luis.

Colgante de ramas, helechos o raíces, en barrancas, salientes rocosas o grietas, en grutas, rocas o barrancas de tierra, o alambres. A mediana y baja altura o altos.
Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita o cono invertido. Emplea en la construcción musgos, fibras vegetales, líquenes, lanas y materiales vegetales suaves interna y externamente, liados con telas de arañas.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N							N	N	N	N

Rumboll (*in litt*.). La Cumbre, dpto. Punilla, Córdoba, 29-10-1972, nido colgando de un alambre del techo de un gallinero, con 2 huevos.
Straneck (*in litt*.). Cerro Áspero, dpto. Calamuchita, Córdoba, 27-11-1974, nido en una cantera abandonada, a 1,75 m de altura, con 2 pichones. Villa Gral. Belgrano, dpto. Calamuchita, Córdoba, 14-01-1977, nido en una barranca, a 2,5 m de altura, con 2 huevos.
Salvador y Salvador (en prep.). Valle Hermoso, dpto. Punilla, Córdoba, 16 nidos, entre setiembre y febrero, en aleros o concavidades de barrancas de tierra, colgando de raíces, enredaderas o claveles del aire, entre 1,8 y 4,5 m de altura, con 2 huevos o 2 pichones.
Hartert y Venturi (1909). Dinelli localizó un nido con 2 pichones.
Pozzi (1922). Tucumán, L. Dinelli, encontró en marzo, un nido, P. Girard, en el cerro de Tafí, en noviembre nido con huevos y E. Budin recogió varis nidos.
Pereyra (1938a). Capilla del Monte, cerro Uritorco, dpto. Punilla, Córdoba, 12 de enero nido sin postura.
Pereyra (1950a). Río Ceballos, dpto. Colón, Córdoba, nidifica en la zona.
Contino (1975). Sierras de Santa Bárbara, dpto. Santa Bárbara, Jujuy, los estudios se realizaron en noviembre de 1967, marzo y noviembre de 1968 y en marzo de 1969, se localizaron 21 nidos.
Contino (1980). Nidifica en la selva alrededor de los 2.000 m entre los meses de noviembre y febrero. Emplea musgos, líquenes y telas de arañas. Pone 2 huevos blancos.
Nellar Ramonella (1993). En San Luis nidifica en lugares ocultos y sombríos.
Miatello et al. (1999). Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba, nidifica en aleros de piedra, grutas en proximidades de arroyos, en las quebradas, hasta 1.990-2.000 m.
Salvador y Salvador (2012). Pampa de Achala, dpto. San Alberto, Córdoba, se hallaron 21 nidos entre 1986 y 2006.
De la Peña (2013c). Valle Encantado, dpto. Chicoana, Salta, 2 nidos, 06-12-1977 y 30-11-1978, ambos con 2 huevos, Copina, dpto. Punilla, Córdoba, 2 nidos, 14-11-1980 y 25-11-1990, ambos en construcción, Ascochinga (al oeste). dpto. Colón, Córdoba, 17-12-1981, 3 nidos, uno con un huevo y 2 con 2 huevos cada

uno, Aconquija, dpto. Andalgalá, Catamarca, 09-01-1999, nido con 2 huevos. Los nidos estaban atados a helechos colgantes o a raíces en barrancas, desde 1,60 a 5,0 m del suelo. Medidas: diámetro total, de 3,5 a 5 cm, diámetro interno, de 2,5 a 3 cm, profundidad, de 2,5 a 3,5 cm, alto, de 4,5 a 5 cm.

Huevos
Pone 2 huevos. Elípticos. Blancos.

Medidas
Pozzi (1922): 15 x 9 y 15 x 9,5
Contino (1975): 14 x 9
De la Peña (2013c): 13,8 a 15,3 x 8,9 a 9,5 X= 14,4 x 9,1 (N= 9)
Salvador y Salvador (2012): 13,7 a 14,8 x 9,0 a 9,8 X= 14,2 x 9,3 (N= 20)
Pesos
Contino (1975): 0,65
Salvador y Salvador (2012): 0,6 a 0,8 X= 0,7 (N= 16)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,028 a 0,036 X 0,030 (N= 9)

PICHONES
Descripción
Salvador y Salvador (2012). Los pichones al nacer tienen los ojos cerrados. La piel en la zona ventral está desnuda y es de color carne naranja, en el dorso es negruzco con algo de brillo y con plumón ralo de color acanelado o castaño lavado. Pico amarillento.
Cuatro pichones a punto de dejar el nido pesaban entre 4,2 y 4,4 gr.

Generalidades
Contino (1975). El período de incubación es de 19 a 20 días. Los pichones permanecen en el nido 31 a 32 días.

Más información:
Contino (1975)

Otros
Salvador en Salvador y Bodrati (2013a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*



Ascochinga. Córdoba. 14-11-2005



Jesús María. Córdoba. 01-06-2014



Jesús María. Córdoba. 01-06-2014



Valle Encantado. Salta. 30-11-1978



Valle Encantado. Salta. 30-11-1978



Jesús María. Córdoba. 16-09-2006. Libando



Jesús María. Córdoba. 01-06-2014

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

El macho por su larga cola. La hembra por el tamaño relativamente grande y la cola corta con las plumas externas blancas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Sappho sparganurus sapho (Lesson, 1829) hasta los 3000 m de altura en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Córdoba, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis y Neuquén. Ocasionalmente en Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Se encuentra en la ladera este de los Andes de Bolivia y Argentina hasta los 3.000 metros de altura. Además en Sierras Centrales de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Sappho sparganurus sapho (Lesson, 1829)

Buenos Aires
Citas: Barrios et al. (1992); Pereyra (1937a, 1938b)

Catamarca
Citas: Alabarce et al. (1990); Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009); White (1882)

Observaciones: De la Peña (Agua de las Palomas, dpto. Andalgalá, 11-03-1981)


Córdoba
Citas: Castellanos (1932); De la Peña (2013c); Deluis y Hammerschmidt (1953); Heredia (2006); Miatello et al. (1993, 1999); Montaldo (1995); Nores et al. (1983); Nores (1996); Ordano (1996); Partridge (1953c); Salvador y Salvador (1988, 2012); Sferco y Nores (2003); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (La Falda, dpto. Punilla, 19-01-2000; Jesús María, dpto. Colón, 13-10-2006)

Jujuy
Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Contino (1975); Fiora (1933); Malizia et al. (2005); Montaldo (2014); Moschione y Segovia (2005); Salvador (1988); Salvador y Bodrati (2013a)

Observaciones: De la Peña (Humahuaca, dpto. Humahuaca, 23-02-1979)

La Pampa
Citas: Willianson (1971)



La Rioja
Citas: Fracchia y Aranda-Rickert (2015); Giacomelli (1907, 1923); Hayward (1967); Koslowsky (1895b);Pereyra (1923a); Salvador (1988); Salvador y Di Giacomo (2014)

Mendoza
Citas: Calí et al. (2008); Contreras y Fernández (1980); Darrieu (2014); Gómez (2006); Hartert y Venturi (1909); Lucero (2013f); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (2005); Wetmore (1926b)

Observaciones: De la Peña (Villavicencio, dpto. Las Heras, 12-01-1982)

Neuquén
Citas: Del Valle et al. (1989); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Olrog (1979); Pereyra (1945, 1950); Veiga et al. (2005)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Coconier et al. (2007); De la Peña (2013c) ; Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b)

San Juan
Citas: Camperi y Darrieu (2004); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Gelain (2014a); Lucero (2009, 2013f, 2013i)

San Luis
Citas: Casares (1944b); Masramón (1983)

Observaciones: De la Peña (Merlo, dpto. Junín, 19-11-1997)

Santa Fe
Citas: Giai (1950); Giarduz (2008)

Santiago del Estero
Citas: Nores y Yzurieta (1981); Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (2000); Antelo y Brandán Fernández (2013); Antelo (1992, 1999); Antelo y Brandán (2000); Antelo et al. (2013); Brandán (2005); Brandán y Antelo (2000, 2009); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (1998, 2007a); Capllonch y Aráoz (2007); Capllonch et al. (2011b); Echevarría et al. (2008a); Gianini (2000); Handford (1983); Hartert y Venturi (1909); Lucero, M. M. (1983); Lucero et al. (2002); Juri y Chani (2005);Malizia et al. (1998); Navarro et al. (2007); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Aráoz (2014); Vides Almonacid (1991, 1993)

Observaciones: De la Peña (Horco Molle, dpto. Capital, 13-05-1987)

PICAFLOR PUNEÑO *Oreotrochilus estella* (d'Orbigny y Lafresnaye, 1838)

Otros nombres: Picaflor de vientre castaño. Picaflor serrano. Picaflor serrano grande. Picaflor serrano de vientre castaño. Picaflor serrano ventricanela.

DESCRIPCIÓN
Largo: 13-15 cm.
Peso: Salvador (1990a: N= 1 (H) 6,6 g;Schuchmann (1999): (M) 8,8 g, (H) 8 g
Coloración. Pico ligeramente curvado, negro. Patas negras. Iris pardo.
Macho. Dorso pardo verdoso. Garganta y cuello anterior verdes con borde inferior negro. Ventral blanca con línea rojiza en el pecho y abdomen.
Alas pardas. Plumas centrales de la cola verdes, externas blancas.
Hembra. Dorso pardo verdoso. Ventral grisácea. Garganta blanquecina con pequeñas manchitas verdes grisáceas. Alas pardas. Las plumas centrales de la cola son verdes, las siguientes con punta blanca y las más externas blancas.

HÁBITAT
Zonas arbustivas rocosas entre los 3200 y los 4000 m de altura. (Puna y prepuna).
En invierno a niveles más bajos.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Tucumán, Jujuy, Salta.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N									N	N



Colgante del techo de grutas. A baja altura.
Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita. Emplea en la construcción pelos, lanas, musgos y líquenes, liados con telas de arañas. Internamente plumas.

Salvador (1992). El Infiernillo, dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 3 nidos, todos adheridos al mismo techo metálico bajo un puente sobre un arroyo. El 23-12-1983, sin postura. El 22-06-1985, hembra con dos pichones momificados y un huevo. Nido elaborado con elementos vegetales algodonosos y la parte interior con plumas. Mide 13 cm de alto, 8 cm de diámetro externo, 4,5 cm de diámetro interno y 3,5 cm de profundidad. El tercer nido el 06-12-1987, tenía 2 pichones. La altura desde el suelo era de 5 m, 5,5 m y 4,5 m para cada nido.
Salvador y Salvador, en De la Peña (2010b). Aparzo, dpto. Humahuaca, Jujuy, 22-02-1995, nido con 2 pichones.
El nido se hallaba en una barranca de tierra sobre un arroyo, a 4 m de altura en un alero natural de 30 cm, a 17 cm del techo y adherido a raíces expuestas, semiesfera profunda elaborada en su totalidad con lana de oveja blanca y marrón, con un diámetro externo de 7 cm, diámetro interno 4,5 cm, altura 8 cm y 3 cm de profundidad.
De la Peña (2013c). Valle Encantado, dpto. Chicoana, Salta, 06-12-1977 y 30-11-1978 nidos sin postura, a 1,50 m del suelo, colgaban del techo de una gruta. Medidas: diámetro total, 7 a 9,5 cm, diámetro interno, 4 cm, profundidad, 3 cm, alto, 7 cm.

Huevos
Pone 2 huevos, blancos.

Medidas
Salvador (1992): 16,9 x 10,5

PICHONES
Descripción
Salvador y Salvador, en De la Peña (2010b).Nacen con los ojos cerrados, la piel en lo dorsal es color córneo oscuro con plumón acanelado, la piel en lo ventral es color carne naranja.

Más información:
Johnson (2012)




Valle Encantado. Salta. 30-11-1978

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Ventralmente blanco con una línea rojiza en el pecho y abdomen en el macho. La hembra es parda y grisácea con blanco en la cola.
Diferenciar a la hembra de la del Picaflor andino.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Oreotrochilus estella estella (d'Orbigny y Lafresnaye, 1838) entre los 3800 y los 4000 m de altura en Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca. En invierno baja hasta los 2000 metros.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Dos subespecies. Hasta los 5000 metros de altura en Ecuador, Perú, Bolivia, norte de Chile y noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Oreotrochilus estella estella (d'Orbigny y Lafresnaye, 1838)

Catamarca

Citas: Carma (2009); Nores (1995); Salvador (1990a)

Jujuy

Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Chebez et al. (1998); Salvador (2015)



La Rioja

Citas: Chebez (2005b)

Salta

Citas: De la Peña (2013c); Moschione et al. (2013); Nores (1995)

San Juan

Citas: Fava et al. (2012, 2012a); Gelain y Pereyra Lobos (2011b)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009);

Capllonch et al. (2011b); Handford (1983); Lucero (1983); Nores (1995); Salvador (1992)

PICAFLOR ANDINO *Oreotrochilus leucopleurus* (Gould, 1847)

Otros nombres: Picaflor de vientre azul negruzco. Picaflor de vientre fuliginoso. Picaflor serrano. Picaflor serrano chico. Picaflor serrano de vientre negruzco. Picaflor serrano ventinegro.

DESCRIPCIÓN
Largo: 13-15 cm.
Peso: Navas (1968): N= 2 (M) 6,8 y 7,3 g; N= 3 (H) X: 7,1 g (Rango: 6,9 a 7,2);Schuchmann (1999): (M) 7,9 g, (H) 8,4 g
Coloración. Pico ligeramente curvado, negro.
Macho. Dorso pardo. Garganta y cuello anterior verdes, bordeados hacia abajo por una línea negra. Pecho y abdomen blancos con una línea central negra.
Alas pardas verdosas. Plumas centrales de la cola pardas verdosas, laterales blancas.
Hembra. Ventral grisácea. Garganta blanca con puntos verdes. Cola verde con punta blanca en las plumas más externas.



COMPORTAMIENTO

Alimentación
González Gómez et al. (2004). Néctar de *Puya coerulea.*
Lucero (2009). Néctar de *Nicotiana glauca.*
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). Néctar de *Echinopsis atacamensis. Nicotiana glauca.*
Fracchia y Aranda-Rickert (2015). Néctar de *Ligaria cuneifolia*.

HÁBITAT
Zonas arbustivas áridas y rocosas entre los 1000 y los 4000 m de altura. (Puna y prepuna).
En invierno a niveles más bajos.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en San Juan, Río Negro.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N										

Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita. Emplea en la construcción musgos, fibras vegetales, líquenes, lanas, pelos y materiales vegetales suaves internamente.

Navas (1965c). Río Ñirihuau, dpto. Pilcaniyeu, Río Negro, nido adherido a una pared rocosa del cajón del río, en febrero de 1957.
Bodrati et al. (2003). Pampa de los Pozos, Parque Nacional El Leoncito, dpto. Calingasta, San Juan, 15-01-1999, se localizaron 5 nidos (2 activos y 3 inactivos). Los nidos estaban ubicados en lugares ocultos y protegidos, pegados a la irregular pared rocosa, a pocos centímetros del techo y en lugares con luz natural tenue. Estaban construidos con pelos de guanaco (*Lama guanicoe*), con pocas y finas fibras de gramíneas e inflorescencias de coirón. El interior tapizado con plumas. Los dos nidos activos tenían 2 huevos cada uno y



miden: uno 7,9 de alto, 4,2 cm de profundidad, 5,8 de diámetro externo y 4,8 cm en el interno, el otro 10,3 de alto, 3,6 cm de profundidad, 7,0 de diámetro externo y 3,78 cm en el interno.
Christie et al. (2004). Noroeste patagónico, nidifica en paredes rocosas.

Huevos
Pone 2 huevos. Blancos.

Medidas
Bodrati et al. (2003): 15 a 16 x 10 X= 15,5 x 10 (N= 4)

Más información:
Bodrati et al. (2003)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pico curvo. Ventral blanca con una mancha oscura en el pecho y abdomen en el macho.
La hembra se parece a la hembra del Picaflor puneño pero difieren en el color de la cola.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Oreotrochilus leucopleurus (Gould, 1847) entre los 1000 y los 4000 metros de altura, desde Jujuy y Salta hasta Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Presenta un área de distribución que se extiende desde el sur de Bolivia al sur de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca
Citas: Carma (2009); Nores (1995); White (1882)

Chubut
Citas: Calvelo et al. (2006); Kovacs et al. (2005); Navas (1965c, 1968)

Jujuy
Citas: Budin (1931); Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998)

La Rioja
Citas: Dabbene (1910); Fracchia y Aranda-Rickert (2015); Giacomelli (1923); Koslowsky (1895b); Nores (1995)

Mendoza
Citas: Darrieu (2014); Gómez (2006); Gosse (1899); Hellmayr (1932); Navas (1965c.); Olivera et al. (2009); Oates y Reid (1903);Reed (1916); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (2005); Wetmore (1926b); Wolffhuegel (1929)

Neuquén
Citas: Babarskas et al. (1996); Calvelo et al. (2006);Casares (1938); Contreras (1977b); Christie et al. (1988); Funes en Fiori y Zalba (1999); Gorgoglione (1997); Matarasso (2007); Navas (1965c, 1978); Olrog (1963, 1979); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Camperi (1998); Chehebar y Ramilo (1992); Christie et al. (2004); Gelain (2001, 2010); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Grigera y Rubulis (1985); Hecker y Vidoz (1998); Kovacs et al. (2005); Navas (1965c, 1968); Paz Barreto (1997b)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013); Nores (1995)

San Juan
Citas: Bodrati et al. (2003); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2009, 2013i); Moschione y Banchs (1992); Navas (1968, 1995); Olrog (1962,1963)

Santa Cruz
Citas: Chebez et al. (1988); Di Giacomo et al. (2005); Imberti (2005e); Mazar Barnett (2001); Navas (1965c); Serret y Jonson (1986.)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Navarro (2009); Capllonch et al. (2011b); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Navas (1965c); Nores (1995); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Aráoz (2014)

PICAFLOR ANDINO CASTAÑO *Oreotrochilus adela* (d'Orbigny y Lafresnaye, 1838)



DESCRIPCIÓN
Largo: 11-13 cm.
Peso: Schuchmann (1999): (M) 7,45 g, (H) 8,3 g
Coloración. Pico ligeramente curvado, negro.
Macho. Dorso pardo grisáceo, bronceado. Garganta y lados del cuello verdes brillantes. Ventral castaña con negro en la parte central (pecho y abdomen). Cola azul oscura con rojizo en las plumas externas.
Hembra. Garganta blanca con puntos grises. Pecho y abdomen rojizos. Cola con punta blanca.

HÁBITAT
Zonas semiáridas o temporalmente húmedas, entre los 2600 y los 4000 m de altura.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Jujuy.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N	N	

Tacita de fibras vegetales, lanas, forrado externamente con líquenes y musgos.

Areta et al. (2006). Yavi, dpto.Yavi, Jujuy, 08-10-2003, nido en construcción a unos 5,5 m del suelo, en una concavidad de la pared. Estaba apoyado sobre una plataforma de piedra. Forrado externamente por líquenes y musgos, de aproximadamente 7 cm de alto y 5 cm de diámetro. El 17-11-2033, se localizó otro nido a 4,50 m del suelo en la pared de una concavidad en el techo de una cueva amplia. El nido con forma de taza alargada, estaba adherido a una estructura de fibras vegetales, la que a su vez se fijaba a la pared rocosa vertical, sin estar apoyada encima de las rocas. Los materiales parecían ser principalmente lana de

oveja y fibras vegetales. Medía unos 13-15 cm de alto y 8-10 cm de ancho, contando la estructura sobre la que aseguraba el nido.



IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Ventral castaña con negro en el pecho y abdomen.
Hembra con pecho y abdomen rojizos.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Oreotrochilus adela (d'Orbigny y Lafresnaye, 1838) en Jujuy.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Especie de los altos Andes llegando hasta los 4.000 metros en el sur de Bolivia y noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Jujuy
Citas: Alvarez y Blendinger (1995); Areta et al. (2006); Burgos et al. (2009); Mazar Barnett et al. (1998a); Wayar y Segura (2014)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

PICAFLOR DE FRENTE AZUL *Eriocnemis glaucopoides* (d'Orbigny y Lafresnaye, 1838)

Otros nombres: Picaflor de cabeza violácea. Picaflor de frente violácea. Picaflor frente azul.

DESCRIPCIÓN
Largo: 9-11 cm.
Peso: Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 (H) 4,5 g, N= 1 (?) 4,0 g
Coloración. Pico negro, recto.
Macho. Verde. Frente y anterior de la corona, vientre y subcaudales azules. Muslos blancos. Alas pardas. Cola furcada, negro azulada.
Hembra. Se parece al macho, pero tiene solamente azul en las subcaudales. Ventral acanelada.

HÁBITAT
Matorrales, orillas de selvas, yungas.



NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.
Más información:
Schuchmann (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho con azul en la cabeza y en el vientre. Ambos sexos con la cola azulada y blanco en los muslos.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Eriocnemis glaucopoides (d'Orbigny y Lafresnaye, 1838) entre los 1000 y los 2700 metros de altura en Jujuy, Salta y Tucumán.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Cordillera de los Andes en el sur de Bolivia y noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca
Citas: Moschione (2005p)

Jujuy
Citas: Blendinger (1998); Burgos et al. (2009) Camperi et al. (2012); Chebez et al. (1998); Moschione y Segovia (2005)

La Rioja
Citas: Bodrati y Ferrari (2014)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013); Salvador y Di Giacomo (2014)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Blendinger (1998);Brandán y Navarro (2009); Capllonch (1998); Capllonch et al. (2011b); Esteban (1953); Handford (1983); Lucero (1983); Navarro et al. (2007); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Aráoz (2014); Vides Almonacid (1993)

PICAFLOR GIGANTE *Patagonas gigas* (Vieillot, 1824)

Otros nombres: Colibrí gigante. Colibrí gigante andino. Colibrí grande. Pingara. Quenti. Tuminico grande. Tumínico grande.

DESCRIPCIÓN
Largo: 21-22 cm.
Peso: Contreras (1978): N= 1 (M) 24 g; N= 1 (H) 21,5 g;Schuchmann (1999): (M) 18,5 g, (H) 20,2 g
Coloración. Pico recto, negro.
Dorso pardo verdoso. La rabadilla es blanquecina. Ventral ocrácea rojiza. Subcaudales blancas.
Alas pardas. Cola parda verdosa.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
González Gómez et al. (2004). Néctar de *Puya berteroniana, Puya coerulea.*
Schlumpberger y Badano (2005). Néctar de *Echinopsis atacamensis.*
Speziale y Lambertucci (2009). Néctarde *Kniphofia uvaria.*
Lucero (2009). Néctar de *Nicotiana glauca.*
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). Néctar de *Echinopsis atacamensis, Nicotiana glauca.*

HÁBITAT
Zonas arbustivas áridas, preferentemente con cactáceas, entre los 1000 y los 4000 m de altura. (Puna y prepuna).

NIDIFICACIÓN



Se localizaron nidos en Jujuy, Mendoza.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
X	X									X	X

Asentado en tirante de construcción. A baja altura .
Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita. Emplea en la construcción pelos, lanas, materiales vegetales suaves, liados con telas de arañas. Externamente líquenes.

Puca (*in litt*.). Cerro El Huancar, dpto. Cochinoca, Jujuy, 8-12-2015, nido construido con lana de oveja y pelos de llama.Tenía un pichón.
Reed (1919). Villavicencio, dpto. Las Heras, Mendoza, 25-11-1918, nido en un arbusto espinoso, a 2 m del suelo. Construido con pelos y lanas y algunas pajitas. Mide 10 cm de diámetro y 6 cm de alto. La parte interna 4 cm de diámetro y 1,5 cm de profundidad. Contenía 2 huevos.
Spegazzini (1920). Cerro Jiménez, Mendoza, en enero de 1896 y en Potrerillos, dpto. Luján de Cuyo, Mendoza, en 1909. El nido tiene forma cónica, construido con materiales herbáceos entretejidos con cerdas de caballos al exterior y rellena la cavidad con vilano. Nidos con un huevo.
Contreras (1978a). Rio Gualcamayo, Mendoza, nido abandonado, en febrero, en un Sauce.
De la Peña (2013c). Azul Pampa, dpto. Humahuaca, Jujuy, 08-02-2001, nido en un tirante en una construcción, a 2,50 m del suelo, 2 pichones. Medidas: diámetro total: 9 cm, diámetro interno: 4 cm, profundidad: 2 cm, alto: 2 cm.
Salvador (2015). Purmamarca, dpto. Tumbaya, Jujuy, 24-02-2007, nido en un Cardón (*Echinopsis atacamensis*) a 2,80 m del suelo, con un pichón.

Huevos
Pone 2 huevos. Blancos.

Medidas
Reed (1919): 20 x 16

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Tamaño grande. Pardo con rojizo en la zona ventral y rabadilla blanquecina.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Patagonas gigas peruviana Boucard, 1893 entre los 2000 y los 4000 m de altura en Jujuy, Salta, Tucumán y norte de Catamarca. *Patagonas gigas gigas* (Vieillot, 1824) entre los 1000 y los 3000 m de altura, desde el suroeste de Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut.
Observado además en el este de Buenos Aires y en Sierras de Córdoba.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. En la cordillera de los Andes en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y ***o*** Argentina entre los 1.000 y 4.000 metros de altura.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS



Patagonas gigas peruviana Boucard, 1893

Jujuy
Citas: Budin (1931); De la Peña (2013c); Hartert y Venturi (1909); Salvador (2015)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

Observaciones: De la Peña (Cuesta del Obispo, dpto. Chicoana, 06-12-1977)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Capllonch (2007a); Lucero (1983)

Patagonas gigas gigas (Vieillot, 1824)

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Cabré et al. (2008); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1986, 1994); Mouchard (1987); Narosky y Di Giacomo (1993); Pugnali y Chamorro (2008); Spegazzini (1920)

Catamarca
Citas: Carma (2009); Hartert y Venturi (1909); Nores (1995); White (1882)



Foto: Teófilo M. Puca. Cerro El Huancar. Jujuy.

Chubut
Citas: Kovacs et al. (2005)

Córdoba
Citas: Giraudo et al. (2013a); von Wehrden (2008)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Giacomelli (1907, 1923); Koslowsky (1895b); Nores (1995); Zotta (1937a)

Mendoza
Citas: Calí et al. (2008); Contreras (1978a); Olivera et al. (2009); Reed (1916, 1919); Roig (1965); Spegazzini (1920, 1929)

Neuquén
Citas: Babarskas et al. (1996); Gorgoglione (2005); Matarasso (2007); Pereyra (1945); Veiga et al. (2005)

Río Negro
Citas: Christie et al. (2004); Fierro en Gelain et al. (2003); Gelain (2001); Gelain y Tolosa (2011); Speziale y Lambertucci (2009)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013); Nores (1995)

San Juan
Citas: Camperi y Darrieu (2004); Contreras (1978a); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Gelain (2014a); Lucero (2009, 2013i)

Tucumán
Citas: Brandán y Navarro (2009); Capllonch et al. (2011b); Lucero (1983); Nores (1995)

PICAFLOR PICUDO *Heliomaster longirostris* (Audebert & Vieillot, 1801)

Otro nombre: Picaflor estrella.
DESCRIPCIÓN
Largo: 12 cm.
Peso: Schuchmann (1999): (M) 7,1 g, (H) 6,5 g
Coloración. Pico largo, ligeramente curvado, negro.
Macho. Corona azul verdosa. Mancha blanca detrás de los ojos. Línea blanca en las mejillas. Barbilla negra. Garganta roja violácea brillante. Dorso bronceado. Ventral grisácea bronceada. Subcaudales con puntos blancos.
Alas pardas. Cola con las plumas centrales verdes azuladas, las externas con puntas blancas.
Hembra. Semejante al macho pero con la corona verde y con las plumas de la garganta orilladas de blanco.

HÁBITAT
Matorrales, montes, orillas de bosques y de selvas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.
Más información:
Schuchmann (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pico largo. Punto blanco detrás de los ojos y línea de igual color por debajo de los mismos. Garganta roja, corona azul en el macho. En la hembra corona verde y garganta oscura.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Heliomaster longirostris longirostris (Audebert & Vieillot, 1801) en Chaco, Formosa y Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Amplio rango de distribución en Centro América y Sud América desde Méjico a Brasil. Comprende: Méjico, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, ocasional en Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Heliomaster longirostris longirostris (Audebert & Vieillot, 1801)

Chaco
Citas: Bishels y Moschione (2005); Moschione y Bishels (2004)

Formosa
Citas: Contreras et al. (2014)

Misiones
Citas: Chebez et al. (2004)

Salta
Citas: Moschione et al. (2013)

Aclaración sobre la cita de esta especie en Santa Fe.
En noviembre de 1976 se halló nidificando en Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe un picaflor cuya hembra tenía una visible mancha oscura en la garganta. En esa oportunidad fue consultado el Dr. Ch. Olrog, quien lo toma, al parecer como *Heliomaster squamosus* (Olrog, 1979).
Con posterioridad la foto fue enviada a un Museo de Estados Unidos y se lo identifica como *Heliomaster longirostris.*
Luego de este nido se localizaron dos más con hembras con una mancha en la garganta. En este caso fue consultado el Dr. Karl Schuchmann, (de Alemania) el que determina que algunas hembras muy adultas de *Heliomaster furcifer* tienen una mancha en la garganta. Por este motivo se descarta la presencia de la especie en la provincia de Santa Fe.

PICAFLOR DE GARGANTA ESCAMADA *Heliomaster squamosus* (Temminck, 1823)

DESCRIPCIÓN
Largo: 10-12 cm.
Peso: Schuchmann (1999): (M) 5 g, (H) 6,5 g
Coloración. Pico largo, ligeramente curvado, negro.
Macho. Corona azul-verdosa brillante. Dorso verde bronceado oscuro. Garganta rojiza purpúrea brillante. Ventral verde. Línea blanca en el centro del pecho y vientre.
Alas pardas. Cola verde, furcada.
En el período de reposo sexual la garganta es moteada de violáceo oscuro.
Hembra. Punto blanco detrás de los ojos. Garganta blanquecina, con escamado pardo. Dorso verde bronceado. Ventral gris pálida. Flancos verdosos. Cola verde con banda subterminal negra-azulada y ápices blancos. Puntos blancos a los lados del cuerpo.



HÁBITAT
Sabanas, matorrales, selvas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Schuchmann (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pico largo. El macho tiene la garganta rojiza y línea ventral blanca. Cola larga, furcada. La hembra es ventralmente gris con punto blanco detrás de los ojos. Garganta escamada.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Heliomaster squamosus (Temminck, 1823) en Misiones y Formosa.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Área reducida en el sureste de Brasil y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS
Formosa
Citas: Contreras et al. (2014)

Misiones
Citas: Castillo y Chebez (2009)

PICAFLOR DE BARBIJO *Heliomaster furcifer* (Shaw, 1812)

Otros nombres: Dominico. Mainumbí-yetapá. Picaflor azul. Picaflor azul garganta roja. Picaflor azulado. Picaflor barbijo granate. Picaflor banco debaxo. Picaflor cola de tixera. Picaflor de barba colorada. Picaflor de garganta colorada. Picaflor de garganta rojiza.

DESCRIPCIÓN
Largo: 12,5-13 cm.
Peso: Fiora (1933): N= 1 X= 5,5 g; Di Giacomo (2005h): N= 1 (M) 6,0 g, N= 2 (H) X= 6,1 g (Rango 5,8 a 6,4 g; Salvador (2014a): N= 2 (M) 5,4 y 5,9 g; N= 2 (H) 5,1 y 5,8 g; Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 (H) 5,5 g
Coloración. Pico largo, ligeramente curvado, negro.
Macho. Corona verde brillante. Dorso verde bronceado. Garganta rojiza violeta brillante. Plumas alargadas a los costados del cuello azules metálicas. Ventral azul violáceo.
Alas pardas. Cola verde azulada, furcada.
Hembra. Punto blanco detrás de los ojos. Cabeza pardusca. Dorso verde bronceado. Ventral gris pálida. Cola negruzca y verde, más corta que la del macho.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Pereyra (1923b). Agua azucarada.
De la Peña (2010d). Néctar de *Canna indica, Ipomoea carnea, Ipomoea indica,Lycium cestroides, Nicotiana glauca, Pithecoctenium cynanchoides.* Arañas. Mosquitos.

De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). Néctar *Tecoma capensis.*
Fracchia y Aranda-Rickert (2015). Néctar de *Ligaria cuneifolia*.

Voces
Straneck (*in litt*.). En vuelo emite un agudo y claro Tsíi...tsíi...tsíi...
HÁBITAT
Sabanas, matorrales, montes, parques, jardines.
NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Salta, Tucumán, Formosa, Corrientes, Córdoba, Santa Fe.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N



Asentado en ramas de árboles. A mediana y baja Altura y altos.
Expuesto. Elaborado. Tacita de fibras vegetales suaves, lana, barba de viejo.
Liados con tela de arañas. Recubierto externamente con líquenes.

Girard (Instituto Miguel Lillo). Atahona, dpto. Simoca, Tucumán, 18 -10-1929, nido con 2 huevos.
Wilson (in liit.). a S. Salvador, Mercedes, Corrientes, 12 oct. 1972, nido en algarrobo a 2 m de altura, con 2 huevos.
Nores e Yzurieta (*in litt*.), a S. Salvador, Cerro Colorado, dpto. Sobremonte, Córdoba, hallaron 2 nidos, uno con 2 huevos y otro con 2 pichones, el 29-10-1974.
Salvador, Narosky y Fraga (*in litt*.). Icho Cruz, dpto. Punilla, Córdoba, 01-12-1983, nido en un arbusto a 4 m de altura, con 2 huevos.
Wilson (1977). Mercedes, dpto. Mercedes, Corrientes, nidifica en Eucaliptos.
Contino (1980). Nidifica en el mes de diciembre en dpto. Rivadavia, Salta.
Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, anida entre setiembre y noviembre. Se localizaron 10 nidos, entre los 4,5 y 10 m del suelo.
De la Peña (2013c). Entre 10-10-1975 y 13-12-2012, se localizaron 37 nidos, 4 en Morteros, dpto. San Justo, Córdoba y el resto en la provincia de Santa Fe. Medidas: diámetro total, de 4,5 a 5 cm, diámetro interno, de 3,5 a 4 cm, profundidad, de 1,5 a 2 cm, alto, de 3 a 3,5 cm. Altura desde el suelo: nido más bajo a 1,80 m, nido más alto a 8,00 m.

Huevos
Pone 2 huevos. Elípticos. Blancos.

Medidas
Salvador, Narosky y Fraga (*in litt*.): 14,4 a 15,0 x 9,4 a 9,5 X= 14,7 x 9,4 (N= 2)
Hartert y Venturi (1909): 14 a 14,5 x 8,5 a 9,5
Di Giacomo (2005h): 14,4 a 14,6 x 9,2 a 9,3 X= 14,5 x 9,2 (N= 2)
De la Peña (2013c): 14,5 a 15,5 x 9 a 9,4 X= 14,8 x 9,2 (N= 4)

Pesos
Salvador, Narosky y Fraga (*in litt*.): X= 0,7 (N= 2)
Di Giacomo (2005h): X= 0,5 (N= 2)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,037 a 0,047 X= 0,042 (N= 2)

PICHONES

Descripción

De la Peña (2013c). Nacen con los ojos cerrados. Piel oscura. Plumón gris. Dos líneas en dorsal.
5 días. Ojos semiabiertos (por momentos). Dos líneas, en dorsal de plumón. Activo.
7 días. Ojos cerrados. Pico pardo oscuro. Comisura amarillenta. Cavidad bucal, lengua y paladar, amarillentos. Plumón gris. Flancos blanquecinos.
10 días. Plumas blanquecinas en los lados del cuerpo.
13 días. Plumas ventralmente. Dorsalmente pardo oscuras con punta ocrácea.
15 días. Plumas tornasoladas. Blanquecinas en la garganta. Láminas oscuras. Cañones alares claros.
18 días. Ventralmente blanquecino. Dorsalmente verdoso con la punta de las plumas ocráceas. Jaspeado.
Desde los 8 días se le notan dos abultamientos a los lados del cuello, que los inflan.

MEDIDAS Y PESOS

Días de vida	Medidas									
	Pico	Tarso	Tibia	Plumas primarias		Plumas secundarias		Cola		Peso
				Vaina o cañón	Lámina	Vaina o cañón	Lámina	Total	Lámina	
1	0,2	0,4	0,7							1,0-1,1
2	0,3	0,5	0,8							1,1-1,3
3	0,3	0,5	0,8							1,3-1,5
4	0,4	0,5	0,8							1,6-1,8
5	0,4	0,5	0,8							1,9-2,2
6	0,5	0,5	0,9							2,3-2,6
7	0,5	0,5	1,0							2,7-3,3
8	0,6	0,5	1,1							3,4-3,6
9	0,6	0,5	1,1							3,7
10	0,6	0,5	1,1	0,1		0,1				3,8
11	0,9	0,5	1,1	0,2						3,8
12	1,2	0,6	1,2	0,3						3,8
13	1,2	0,6	1,2	0,4						4,1-4,3
14	1,2	0,6	1,2	0,5						4,5-5,0
15	1,2	0,6	1,2	0,6	0,3	0,5	0,2	0,2		5,8-5,9
16	1,2	0,6	1,2	0,6	0,3	0,6	0,2	0,3		5,9
17	1,2	0,6	1,2	0,7	0,4	0,7	0,2	0,4		5,9
18	1,2	0,6	1,2	0,7	0,4	0,8	0,2	0,4		5,9
19	1,2	0,6	1,2	0,8	0,4	0,8	0,2	0,5	0,1	5,9

Observaciones

La hembra construye el nido. Busca telas y trocitos de corteza de chañar, desde 3 m. hasta 30 m. Aletea sobre los troncos y arranca los líquenes. Internamente puede colocar Barba de viejo (*Clematis* sp.). Moldea el nido con el cuerpo.
En el nido localizado el 15-10-98 en Esperanza, a los 11 días de volar los pichones, fue utilizado nuevamente, posiblemente por la misma hembra, criando dos pichones.
No es común la observación de los machos, pero están en las proximidades de los nidos.
Se levanta del nido y corre a todas las aves que pasan cerca. Corrió a un Benteveo hasta 30 m., también a otras aves.
Deja el nido durante mucho tiempo, cuando tiene pichones, pero anda en las proximidades.

Se observó a un macho comiendo arañitas y una hembra comía las arañitas de la tela que rodeaba un nido de *Camptostoma obsoletum.*
Dos días después de dejar el nido, la madre los sigue alimentando y durante varios días permanecen juntos.
Puede ocupar el mismo nido, durante la misma temporada o al año siguiente si está en condiciones.
Las hembras viejas tienen una mancha oscura en la garganta.

Generalidades
De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido, 10-17 días. Pone los huevos en días alternos. Período de incubación, 17 días. Permanencia de los pichones en el nido, 26-27 días

Más información:
De la Peña (2013c)

Otros
Bodrati en Salvador y Bodrati (2013a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*


Esperanza. Santa Fe. 03-11-2005. 17 días


Esperanza. Santa Fe. 07-11-05. 21 días


Esperanza. Santa Fe. 21-10-2005. 3 días


Esperanza. Santa Fe. 06-10-2008. Macho



Esperanza. Santa Fe. 07-10-2005



Esperanza. Santa Fe. 07-10-2005



Elisa. Santa Fe. 30-11-2010



Esperanza. Santa Fe. 25-10-2005. Hembra



Esperanza. Santa Fe. 10-11-2005. 24 días



Esperanza. Santa Fe. 07-10-2005

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Pico largo. Macho, ventralmente azul con plumas alargadas de igual color en el cuello. Cola larga, furcada. La hembra es ventralmente gris con punto blanco debajo de los ojos.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Heliomaster furcifer (Shaw, 1812) desde el norte del país hasta Córdoba, San Luis y Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Su área de distribución se encuentra en el centro sur de Sud América, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati (2001); Bodrati et al. (2006b); Dabbene (1918b); Darrieu y Camperi (2001a); Hartert y Venturi (1909); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Mérida y Bodtati (2006); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008)

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009); White (1882)

Observaciones: De la Peña (Bañado de Ovanta, dpto. Santa Rosa, 11-03-1981)

Chaco
Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004); Salvador y Bodrati (2013a)

Córdoba
Citas: Castellanos (1932); De la Peña (2005); Heredia (2006); Miatello et al. (1993, 1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Salvador (1983a); Sferco y Nores (2003); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Jesús María, dpto. Colón, 03-02-2006)

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Chatellenaz et al. (2010); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b); Wilson (1977)

Observaciones: De la Peña (Empedrado, pdo. Empedrado, 23-11-1993)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Baliño y Biole (1984); Beltzer et al. (2006); De la Peña (2012b); Hartert y Venturi (1909); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Zapata (1975, 1977)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998);Fiora (1933); Malizia et al. (2005); Moschione y Segovia (2005)

La Rioja
Citas: Bodrati y Ferrari (2014); Fracchia y Aranda-Rickert (2015); Giacomelli (1905, 1923); Lucero (2013d)

Misiones
Citas: Chebez (1996a); Heinonen y Chebez (1989); Holmberg (1887); Krauczuk (2005)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

San Juan
Citas: Lucero (2012h)

San Luis
Citas: Di Giacomo et al. (2001)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2001d, 2011f, 2013c); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Rodríguez Graves et al. (2009)

Santiago del Estero
Citas: López de Casenave et al. (1998); Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Antelo et al. (2013); Brandán (2005); Brandán y Navarro (2009); Echevarría (2001); Echevarría et al. (1998); Capllonch (1998); Gianini (2000); Brandán (2005); Echevarría (2001); Echevarría et al.(1998); Echevarría y Chani (1999, 2000, 2006); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Navarro et al. (2007); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Ruiz (2011); Ortiz y Aráoz (2014); Presti y Echevarría (2009); Vides Almonacid (1993)

PICAFLOR ENANO *Microstilbon burmeisteri* (P. L. Sclater, 1887)

Otros nombres: Colibrí de Burmeister. Coqueta serrana.

DESCRIPCIÓN
Largo: 7-9 cm.
Peso: Salvador (1988): N= 1 (H) 2,5 g
Coloración. Pico recto, negro.
Macho. Dorso verde oscuro brillante. Garganta con plumas alargadas rojizas violetas brillante. Ventral gris con puntos verdes a los lados del pecho y de los flancos. Subcaudales y muslos blanquecinos.
Alas pardas. Cola larga, furcada, con las plumas centrales verdes y las laterales pardas.
Hembra. Dorso verde. Mancha clara a los lados del lomo. Ventral canela clara. Mancha blanca detrás de los ojos. Ceja ocrácea.
Alas pardas. Cola corta canela clara con una banda subterminal negra.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
De la Peña (2010d). Néctar de *Eucaliptus* sp.

HÁBITAT
Bosques, yungas, alisales, entre los 1000 y los 3000 m de altura.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Catamarca.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
											N



Asentado en ramas de plantas. A mediana Altura y altos.
Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita. Emplea en la construcción materiales vegetales suaves, liados con telas de arañas. Externamente líquenes.

De la Peña (2013c). Cuesta del Clavillo, dpto. Andalgalá, Catamarca, 15-12-1999, se localizó un nido en un árbol, a 6 m del suelo con 2 huevos. Medidas: diámetro total, 4,5 cm, diámetro interno, 2,3 cm, profundidad, 1,5 cm, alto, 3,5 cm.

Huevos
Pone 2 huevos. Elípticos. Blancos.

Medidas
De la Peña (2013c): 10 x 7,4 X= 2 (N= 2)





Cuesta del Clavillo. Catamarca. 15-12-1999

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Pequeño tamaño. Pico corto. Macho con rojizo en la garganta y en la cola. La hembra canela en la parte ventral y en la cola. Mancha clara a los lados del lomo.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA

Microstilbon burmeisteri (P. L. Sclater, 1887) entre los 1000 y los 3000 m de altura en Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca. Observado además en Córdoba.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Su área de distribución abarca desde el sur Bolivia y noroeste deArgentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Catamarca

Citas: Alabarce et al. (1990); Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009); De la Peña (2001a, 2013c); Nores e Yzurieta (1982a); Nores et al. (2000)

Córdoba

Citas: Spinuzza (2009b)

Jujuy

Citas: Burgos et al. (2009); Camperi et al. (2012); Chebez et al. (1998); Moschione y Segovia (2005); Salvador (1988); Straneck (1990f)

Salta

Citas: Babarskas et al. (1995); Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b)

San Juan

Citas: Lucero e Izasa (2015)

Tucumán

Citas: Antelo y Brandán Fernández (2013); Brandán y Antelo (2009); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (1998, 2007a); Capllonch y Aráoz (2007); Hartert y Venturi (1909); Lucero (1983); Navarro et al. (2007); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Aráoz (2014); Vides Almonacid (1991, 1993)

Observaciones: De la Peña (Horco Molle, dpto. Capital, 13-05-1987)

PICAFLOR AMATISTA *Calliphlox amethystina* (Boddaert, 1783)

Otros nombres: Colibrí amatista. Mainumbí michi eté.

DESCRIPCIÓN

Largo: 6-7 cm.

Peso: Belton (1984): N= 1 (H) 2,0 g; Willis y Oniki (2002): N= 6 (?) de 2,3 a 2,8 g.

Coloración.

Pico largo, ligeramente curvado, negro.

Macho. Dorso verde bronceado brillante. Mancha blanca detrás de los ojos. Garganta y lados del cuello rojos violáceos. Pecho blanco. Resto de la zona ventral gris verdoso.

Alas pardas. Cola escalonada, furcada. Plumas centrales verdes, el resto morado.

Hembra. Dorso verde bronceado. Línea alargada detrás de los ojos.
Garganta ocrácea con puntos verdes. Banda blanquecina en el pecho. Resto de la parte ventral canela.
Cola corta, rectangular, con las plumas centrales verdes, las externas negras con punta canela.



HÁBITAT
Matorrales, sabanas y selvas.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.

Más información:
Schuchmann (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho con la cola muy ahorquillada. Garganta roja violácea y banda blanca en el pecho. Hembra con cola cuadrada, garganta con puntos y línea posocular blanca.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Calliphlox amethystina (Boddaert, 1783) en Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Se distribuye alrededor de Amazonia desde el norte de Sud América hasta Argentina.
Comprende: Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Misiones
Citas: Bertoni (1913); Bodrati et al. (2008b, 2010b); Castillo et al. (2012); Chebez (1996a); Mogensen (1930); Navas y Bó (1993); Partridge (1954)

PICAFLOR COMÚN *Chlorostilbon lucidus* (Shaw, 1812)

Otros nombres: Colibrí. Colibrí verde. Mainumbí. Manimbé. Picaflor. Picaflor verde. Picaflor verde común. Pinda. Quenti. Rondín. Tente en el aire. Tuminejo. Tumiñico.

DESCRIPCIÓN
Largo: 9,5-10,5 cm. (macho); 7,5-8,5 cm. (hembra).
Peso: Contreras (1979f): N= 2 (M) 3,8 y 3,7 g; Salvador (1988): N= 1 (H) 3,0 g; Salvador (2014a): N= 5 (M) X= 3,5 g (Rango 3,2 a 3,7); N= 4 (H) X= 3,4 g (Rango 3,3 a 3,5); Salvador y Di Giacomo (2014): N= 2 (H) 3,3 y 3,5 g
Coloración. Pico recto, rojo con punta negra.
Macho. Verde. Garganta y cuello anterior azules verdosos brillantes. Frente verde dorada. Vientre blanquecino. Mancha blanca detrás de los ojos (a veces ausente).
Alas pardas. Cola azulada.
Hembra. Verde. Ventral gris clara. Mancha blanca detrás de los ojos. Cola azulada con las plumas más externas con punta blanca.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Castellanos (1920a). Hormigas.
Zotta (1934). Arácnidos. Coleópteros. Dípteros (Foridae). (Platypezidae). Hemípteros, Himenópteros.
Olrog (1956). Arácnidos.
Williamson (1975). Insectos (Cochinilla, Pulgones).
Klimaitis (1993). Insectos.
Isacch (2002). Néctarde *Phormiun tenax.*
Zelaya et al. (2008).Savia.
Núñez Montellano et al. (2009c).Savia.
Montaldo y Haene (2009). Néctarde *Salvia guaranitica.*
De la Peña en De la Peña y Salvador (2010). Néctar de *Agapanto praecox, Citrus limon*, *Hibiscus rosa-sinensis, Hoya carnosa, Hypoestes sanguinolenta, Ipomoea cairica, Ipomoea rubriflora, Jazminium sambac, Lycianthes rantonnei, Nicotiana glauca, Plumbago auriculata, Punica granatum.*
De la Peña (2010d). Néctar de *Abutilon grandiflorum, Ceiba insignis, Cestrum parqui, Bidens laevi, Erytrina crista-galli, Funastrum clausum, Ipomoea alba, Leonurus sibiricus, Lycium cestroides, Mandevilla laxa, Phoradendron liga, Pithecoctenium cynanchoides, Tecoma capensis, Tecoma stans, Thalia geniculata.* Agua azucarada
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). Arácnidos (arañas). Homoptera (Aphidae). Hymenoptera (formicidae).
Fracchia y Aranda-Rickert (2015). **Vegetales:** Néctar de *Ligaria cuneifolia*.

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto es un agudo Trrtlítrrtlítrrtlí repetido esporádicamente.

HÁBITAT
Vegetación arbustiva en praderas, sabanas, montes, áreas rurales. También en parques y jardines en zonas urbanas.
NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Tucumán, San Juan, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, San Luis, Córdoba, Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
N	N	N							N	N	N



Colgante o asentado en alambres, hierros, cables o hilos pendientes de techos. En ramas de plantas, tallos de enredaderas, yuyos o raíces, en barrancas, plantas en planteras. A mediana y baja altura.
Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita. Emplea en la construcción pelos, cerdas, lanas, materiales vegetales suaves, liados con telas de arañas. Externamente trocitos de hojas o de cortezas de árboles, musgos.

De la Peña (inéd.). Esperanza, dpto. Las Colonias, Santa Fe, 20-11-2015, nido en una ramita de una planta en una galeria de una casa urbana, 2 pichones.
Salvador y Salvador (en prep.). Dpto. San Martín, Córdoba, 47 nidos, posturas entre octubre y marzo, construidos en árboles, arbustos, enredaderas y construcciones humanas, entre 0,9 y 3,2 m (X= 1,8). Ponen 2 huevos, en un solo caso 3.

Salvador (inéd.). Capilla del Monte, dpto. Punilla, Córdoba, 06-02-1982, un nido en una enredadera a 1,2 m de altura, con 2 huevos incubados: 12,8 x 8,8 y 12,7 x 8,2 mm. Sachayoj, dpto. Alberdi, Santiago del Estero, 05-12-1997, un nido adherido a un alambre en un galpón, a 3,2 m de altura, con 3 huevos.
Grant (1911). Ajó, Partido de la Costa, Buenos Aires, nidos con huevos en noviembre y en enero.
Smyth (1928). Santa Elena, dpto. La Paz, Entre Ríos, 15-11-1921, huevos.
Pereyra (1923b). San Isidro, pdo. San isidro, Buenos Aires, varios nidos.
Pereyra (1933b). San Isidro, pdo. San Isidro, Buenos Aires, 22-12-1932, nido con 2 huevos.
Pereyra, C. B. de. (1935). Zelaya, pdo. de Pilar, Buenos Aires, noniembre, nido co 2 pichones.
Pereyra (1938b). Zona ribereña del noreste de Buenos Aires, nidifica desde noviembre.
Masramón (1962). San Luis, nido con 2 pichones.
Fraga (1984a). Estancia La Candelaria, pdo. Lobos, Buenos Aires, entre 1973 y 1976 se localizaron 4 nidos bajo aleros o techos de edificios abandonados, adheridos a alambres colgantes y 2 a tallos de Hiedra (*Hedera helix*) en una glorieta. Los nidos contenían 2 huevos o 2 pichones. Un nido tenía 3 huevos, puestos al parecer por 2 hembras.
Klimaitis y Moschione (1987). Nidifica en el interior umbrío e selvas y saucedales.
Contreras (1987). Reserva Ecológica del Riachuelo, dpto. Capital, Corrientes, se localizaron 3 nidos, de agosto a octubre de 1987.
Alabarce y Antelo (1998). San Felipe, dpto. Lules, Tucumán, nidifica en noviembre.
Babarskas et al. (2003). Otamendi, pdo. Campana, Buenos Aires, 12 nidos activos entre octubre y diciembre.
Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, anida entre agosto y diciembre. Se localizaron 35 nidos.
Gelain (2011). Rivadavia, dpto. Rivadavia, San Juan, 01-11-2009, nido con 2 huevos.
De la Peña (2013c). Se localizaron 109 nidos, uno en Las Cuevas, dpto. Diamante, Entre Ríos, 21-11-1993, nido en construcción en la raíz de una barranca, Morteros, dpto. San Justo, Córdoba, 6 nidos: dos el 04-10-1989, tres el 02-11-1990 y uno el 07-11-1990. El resto en la provincia de Santa Fe, principalmente en Esperanza.
Medidas: diámetro total, de 3 a 4,5 cm, diámetro interno, de 2 a 3,5 cm, profundidad, de 1,5 a 3 cm y alto, de 3 a 9 cm.
Gelain (2014d). Villa del Salvador, dpto. Angaco, San Juan. Nido en Mora el 18-01-2014, con 2 huevos.
Gelain (2014e). Villa del Salvador, dpto. Angaco, San Juan. Nido en Mora el 01-01-2013.
Segura et al. (2014a). Tucumán, Colección de huevos “Pablo Girard”, 3 nidos con 2 huevos cada uno.
Segura et al (2014b). Gral. Lavalle, Buenos Aires, Colección de huevos “Ronald Runnacles”, 3 nidos.

Huevos
Pone 2 huevos. Elípticos. Blancos.

Medidas
Salvador y Salvador (en prep.): 11,9 a 13,4 x 8,0 a 8,8 X= 12,88 x 8,42 (N= 28)
Smyth (1928): 12,5 a 13 x 7,5 a 8
Pereyra (1938): 13 x 9
Alabarce y Antelo (1998): 12,5 x 7.9
Di Giacomo (2005h): 11,3 a 13,1 x 7,9 a 8,4 X= 12,2 x 8,9 (N= 16)
De la Peña (2013c): 11,4 a 13,4 x 7 a 8,5 X= 12,4 x 8,1 (N= 8)

Pesos
Salvador y Salvador (en prep.): 0,42 a 0,51 gr X= 0,46 (N= 6)
Di Giacomo (2005h): 0,3 a 0,4 X= 0,3 (N= 16)
De la Peña (2013c): 0,20 X= 0,20 (N= 1)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,018 a 0,027 X= 0,022 (N= 7)

PICHONES

Descripción

Fraga (1984a). Los pichones nacen con los ojos cerrados. Piel de color rosáceo y una línea dorsal de color ocre-rojizo. Pico amarillento. Al 6º día comienzan a abrir los ojos. Son visibles dos líneas de canutos. Hacia el día 12 se ven las puntas de las plumas, que tienen un color pardo rojizo. Hacia el día 16-17 están bien emplumados, con una coloración similar al de las hembras.

De la Peña (2013c). Nacen con los ojos cerrados. Piel rosada. Pico amarillento. Plumón ocráceo rojizo.

6 días. Abre los ojos. Aparecen las vainas de las plumas dorsales.

9 días. Interior de la cavidad bucal rojizo. Paladar naranja. Plumitas en el dorso.

11 días. Se notan las vainas de las secundarias, en la cabeza y dorsalmente. Plumas color canela.

15 días. Emplumado.

MEDIDAS

Días de vida	Medidas				
	Pico	Plumas primarias		Plumas secundarias	Cola
		Vaina o cañón	Lámina	Vaina o cañón	Total
9	0,5	0,3			
11	0,5	0,7			
13	0,8	0,9	0,4	0,7	0,4
15	0,9	0,9	0,6		0,5

Pesos

Fraga (1984a): X= al nacer 0,3; 1 día, 0,45; 4 días, 0,85; 6 días, 1,8; 10 días, 3,25; 13 días, 3,95 (N= 2)

Observaciones

De la Peña (2013c). La hembra construye. Repara nidos viejos y los utiliza en la misma temporada. Pueden realizar tres posturas en una temporada.

Se localizaron hasta 4 nidos superpuestos.

Los nidos en general son colgantes, a veces asentados.

Los pichones elevan la cola y defecan fuera del nido y a los 15 días de edad se paran en el borde del nido.

Ubicación		
Número de nidos	Elemento sostén	
9	Ficus	En jardín. Dos nidos en galería
6	Santa Rita	En jardín
4	Alambre colgante	En techo de galpón o garaje
4	Hiedra	En jardín. Tres nidos en galería
4	Mandarino	En jardín
3	Cable de la luz	En galería o en galpón
1	Arbusto	En jardín
1	Bignonia rosada	En galería
1	Botón azul	En jardín
1	Cascada	En galería
1	Fresno	En jardín
1	Jazmín del cielo	En jardín
1	Limpiatubo	En jardín
1	Mora	En jardín
1	Naranjo	En jardín
1	Paja de techar	En techo de un “quincho”
1	Planta en maceta	En galería

1	Porta maceta	En galería
1	Tumbergia azul	En jardín
1	Vid	En jardín

Generalidades

Fraga (1984a). El período de incubación es de 15 días. Los pichones permanecen en el nido entre 21 y 23 días.

Di Giacomo (2005h). La postura ocurre en días alternos. El período de incubación es de 15 días. Los pichones permanecen en el nido de 20 a 22 días.

De la Peña (2013c). Demora en la construcción del nido, 9-13 días. Pone los huevos en días alternos. Período de incubación, 15-16 días. Permanencia de los pichones en el nido, 21-23 días

Desde fines de octubre de 2008 a fines de enero de 2009 se realizó un relevamiento de los nidos del Picaflor común, para determinar la cantidad de parejas que estaban nidificando en la ciudad de Esperanza (Santa Fe). Se detectaron 44 nidos con huevos o con pichones.

Más información:
De la Peña (2013c)

Otros

Bodrati en Salvador y Bodrati (2013a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*



Esperanza. Santa Fe. 05-11-2008



Esperanza. Santa Fe. 14-03-2008



.Esperanza. Santa Fe. 17-11-2008



Esperanza. Santa Fe. 18-12-2008. Ubicación nido



Espernza. Santa Fe.17-10-2008



Espernza. Santa Fe. 17-10-2008



Esperanza. Santa Fe. 16-12-2008



Espernza. Santa Fe. 11-01-2008



Esperanza. Santa Fe. 03-01-2009



Esperanza. Santa Fe. 08-06-2006



Esperanza. Santa Fe. 10-10-2015



Esperanza. Santa Fe. 20-11-2015

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Verde con garganta azul en el macho y gris en la hembra. Cola azul.
Diferenciar a la hembra de la del Picaflor corona violácea y de la del Picaflor copetón.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Chlorostilbon lucidus lucidus (Shaw, 1812) en el norte del país al oeste de los ríos Paraguay y Paraná hasta Mendoza y La Pampa, y *Chlorostilbon lucidus berlepschi*Pinto, 1938 en Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cuatro subespecies. Extensa área de distribución que abarca: centro de Bolivia, este y centro de Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Chlorostilbon lucidus lucidus (Shaw, 1812)

Catamarca
Citas: Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009); White (1882)

Observaciones: De la Peña (San Fernando del Valle de Catamarca, dpto. Capital,11-03-1981)

Chaco
Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (2004); Salvador y Bodrati (2013a)



Córdoba
Citas: Brandolín et al. (2007; Castellanos (1932); Dardanelli et al. (2006); De la Peña (2013c); Haro y Gutierrez (1992); Heredia (2006); Miatello et al. (1999); Nores et al. (1983); Nores (1996); Partridge (1953c); Salvador (1983a); Sferco y Nores (2003); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Villa GeneraL Belgrano, dpto. Calamuchita, 25-11-1990)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c);Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995); Wetmore (1926b)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009) Camperi et al. (2012); Chebez et al. (1998); Malizia et al. (2005); Miranda et al. (2010)

La Pampa
Citas: Acevedo y Bruno (2007); Darrieu et al. (2011b); De la Peña y Tittarelli (2011); Maceda et al. (2001); Maceda y Kin (2001); Siegenthaler (2004); Tejerina et al. (2006); Williamson (1975)

La Rioja
Citas: Camperi et al. (2008); Fracchia y Aranda-Rickert (2015); Giacomelli (1923); Hayward (1967); Koslowsky (1895b); Salvador (1988)

Mendoza
Citas: Contreras (1979g); Contreras y Fernández (1980); Darrieu (2014); Gómez (2006); Lucero (2013f); Reed (1916); Roig (1965); Sanzín (1918); Sosa (2005)

Misiones
Citas: Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Militello y Chebez (2009)

Rio Negro
Citas: Llanos et al. (2011)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Camperi (1988, 1990); Capurro y Bucher (1988); Coconier et al. (2007); Echevarría et al. (2014); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b)
Observaciones: De la Peña (Cafayate, 07-02-1977)

San Juan
Citas: Acosta y Murúa (2001); Camperi y Darrieu (2004); Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Gelain (2011a, 2012a, 2014e); Lucero (2013f, 2013i); Ortiz y Murúa (1994)

San Luis
Citas: Casares (1944b); Masramón (1983); Nellar Romanella (1993); Partridge (1953c.)

Observaciones: De la Peña (Merlo, dpto. Junín, 19-11-1997)

Santa Fe
Citas: Bollero y Ramírez (2012); De la Peña (2002h, 2011f, 2013c); Fandiño y Pautasso (2011); Fandiño et al. (2015b); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d); Pautasso (2002b); Quiroga y Hadad (2004); Rodríguez Graves et al. (2009); Rossetti y Giraudo (2003); Wilson (1926)

Santiago del Estero
Citas: Codesido y Bilenca (2000); López de Casenave et al. (1998); Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996, 1998); Antelo (1992, 1992); Antelo y Brandán (2006, 2013); Antelo et al. (2013); Brandán (2005); Brandán y Navarro (2009); Capllonch (1998, 2007a); Capllonch y Aráoz (2007); Chani

et al. (2000); Echevarría y Chani (2006); Echevarría et al. (1998, 2008a, 2011b); Echevarría y Chani (1999, 2000, 2006); Echevarría y Chani(1999); Handford (1983); Hartert y Venturi (1909); Juri (2007);Lucero (1983); Lucero et al. (2002, 2005); Malizia et al. (1998); Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Aráoz (2014); Presti y Echevarría (2009); Vides Almonacid (1991, 1993)

Chlorostilbon lucidus berlepschi Pinto, 1938

Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Dabbene (1918b); Daguerre (1922); Darrieu y Camperi (2001a); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Grant (1911); Hartert y Venturi (1909); Isacch et al. (2006); Klimaitis (1975b, 1993); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Leveau y Leveau (2004, 2005); Lucero et al. (2011); Marelli (1933); Mérida y Bodtati (2006); Morici (2012b); Montaldo y Claver (1986); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pereyra, C. B. de. (1935); Pugnali y Chamorro (2008); Soave et al. (1999)

Obse**rvaciones: De la Peña (Claromecó, 07-02-1976)**

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz (2004); Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Baliño y Biole (1984); Beltzer (1981c); Beltzer et al. (2006); Camperi (1992a); Canavelli et al. (2004); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi (2002); Muzzachiodi et al. (2003); Navas (1982); Peltzer (1998); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Zapata (1975, 1977)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b, 2012b); Camperi y Darrieu 2000 (2001b); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014)

PICAFLOR COPETÓN *Stephanoxis loddigesii* (Gould, 1831)

Otros nombres: Mainumbí-apirati. Picaflor de copete.

DESCRIPCIÓN
Largo: 8,5-9 cm.
Peso: Schuchmann (1999): (M) 3-4 g, (H) 2,2 g
Coloración. Pico recto, negro.
Macho. Frente y corona azules violetas con larga cresta puntiaguda negra. Punto blanco detrás de los ojos. Dorso verde brillante. Región subocular, lados del cuello y del pecho, flancos y abdomen grises. Centro del cuello y del pecho negro azulado.
Alas pardas violáceas. Plumas centrales de la cola verdes brillantes, el resto con la base verde, distalmente oscuro y con punta blanca.
Hembra. Dorso y plumas centrales de la cola verdes brillantes. Las plumas externas de la cola casi todas negras con la punta blanca. Ventral gris blanquecina. Mancha blanca detrás de los ojos. Carece de copete.

HÁBITAT
Orillas de selvas, capueras, selvas.

NIDIFICACIÓN



Se carece de datos.
Más información:
Schuchmann (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Copete y pecho, negros azulados en el macho. Hembra verde con la parte ventral blanquecina. Plumas externas de la cola con banda oscura y punta blanca en el macho.
La hembra se parece a la hembra del Picaflor corona violácea y a la hembra del Picaflor común, pero es más clara, más blanquecina.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Stephanoxis loddigesii (Gould, 1831) en Misiones y Corrientes.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Rango de distribución limitado al este de Paraguay, sur de Brazil y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS
Corrientes
Citas: Darrieu y Martínez (1984)

Misiones
Citas: Bertoni (1901); Bodrati et al. (2010b, 2012b); Chebez (1996a); Dabbene (1919a); Giai (1950); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2009); Martínez Gamba (2014); Ménégaux (1918); Navas y Bó (1993); Pereyra (1950a)

PICAFLOR TESORO *Eupetomena macroura* (J. F. Gmelin, 1788)

Otros nombres: Colibrí golondrina. Picaflor tijereta.

DESCRIPCIÓN
Largo: 15-17 cm.
Peso: Willis y Oniki (2002): N= 27 (?) de 7,0 a 11 g
Coloración. Pico ligeramente curvado, negro.
Macho. Pardo azulado. Cabeza, garganta y pecho violetas o azules violetas. El resto, verde azulado o verde bronceado.
Hembra. Similar al macho, pero con la cabeza y el pecho azulados pálidos.



HÁBITAT
Sabanas, arboledas, parques, plantaciones, orillas de selvas.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Schuchmann (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

Cola larga.Verde azulado, cabeza, garganta y pecho, violetas. Hembra más pálida.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Eupetomena macroura macroura (J. F. Gmelin, 1788) en Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cinsco subespecies. Desde Guayanas, Brasil, sur de Perú, Bolivia, Paraguay y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Eupetomena macroura macroura (J. F. Gmelin, 1788)

Misiones
Citas: Castillo et al. (2009); Chebez et al. (2006); Martínez Gamba (2014); Povedano en Saibene et al. (1996)

PICAFLOR ZAFIRO *Thalurania furcata* (J. F. Gmelin, 1788)

Otros nombres: Mainumbí. Picaflor de garganta verde. Picaflor de vientre azulado. Picaflor de vientre azul negruzco.

DESCRIPCIÓN
Largo: Macho: 9,5-11 cm, Hembra : 8-9 cm.
Peso: Schuchmann (1999): (M) 4,8 g, (H) 4,2 g
Coloración. Pico recto, negro.
Macho. Verde. Hombros, pecho inferior y vientre violetas. Garganta y pecho superior color verde esmeralda brillante. Subcaudales blancas.
Alas pardas azuladas. Cola negro azulada, ahorquillada.
Hembra. Dorsal verde. Azulada en la rabadilla. Ventral gris. Subcaudales blancas.
Alas pardas. Cola con las plumas centrales verdes, externas verdes en la base, azuladas hacia el extremo y punta grisácea.

HÁBITAT
Matorrales húmedos en orillas de selvas, parques, plantaciones y selvas.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.



Más información:
Schuchmann (1999). Oniki y Willis (1983c)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho con garganta verde y vientre violeta. Cola ahorquillada. La hembra es gris en la parte ventral y verde en la dorsal. Diferenciarla de la hembra del Picaflor corona violácea.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Thalurania furcata baeri Hellmayr, 1907 en Formosa, Tucumán, Jujuy y Salta y *Thalurania furcata eriphile* (Lesson, 1832) en Misiones y Corrientes.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Tresce subespecies. Extensa área de distribución desde el norte de Sud América hasta Argentina. Comprende: Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Thalurania furcata baeri Hellmayr, 1907

Formosa
Citas: Contreras (1987c);Contreras et al. (2014)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009)

Salta
Citas: Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

Tucumán
Citas: Lucero (1983); Olrog (1953); Ortiz y Aráoz (2015)

Thalurania furcata eriphile (Lesson, 1832)

Corrientes
Citas: Contreras y Contreras (1990); Contreras et al. (1990b) (*)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2012b); Chebez (1994, 1996a, 2009); Krauczuk (2008-2009); Martínez Gamba (2014); Saibene et al. (1996); Savigny (2010)

Observaciones: De la Peña (Puerto Rico, dpto. Libertador General San Martín, 10-02-1973)

PICAFLOR DE CORONA VIOLÁCEA *Thalurania glaucopis* (J. F. Gmelin, 1788)

Otros nombres : Mainumbí. Picaflor corona violácea. Picaflor de corona azul. Picaflor verde de frente azul.
DESCRIPCIÓN
Largo: 8-11 cm.
Peso: Schuchmann (1999): (M) 5 g, (H) 4 g
Coloración. Pico recto, negruzco.
Macho. Verde. Frente y corona azules violetas. Vientre blanquecino.
Alas pardas azuladas. Cola azulada, furcada.
Hembra. Dorsal verde dorada con las plumas orilladas de oscuro (“escamado”).
Ventral gris.
Alas iguales a las del macho. Cola con las plumas centrales verdes, las laterales verdes en la base, luego azules y con punta blanca.

HÁBITAT
Orillas de selvas, selvas, capueras, parques y jardines en áreas suburbanas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Misiones.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									N		

Colgante en ramas de plantas. Altos.
Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita. Emplea en la construcción materiales vegetales suaves liados con telas de arañas. Externamente líquenes.



De la Peña (2013c). Puerto Iguazú, dpto. Iguazú, Misiones, 12-10-1981, nido en la rama de árbol, a 4 m de altura. Contenía un huevo y un pichón. Medidas: diámetro total, 3 cm, diámetro interno, 2 cm, profundidad, 1,5 cm y alto, 3 cm.

Huevos
Pone 2 huevos. Elípticos. Blancos.

Medida
De la Peña (2013c): 12,2 x 7,8 (N= 1)

Peso
De la Peña (2013c): cáscara 0,020 (N= 1)



IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
El macho, es violeta en la frente y en la corona. Cola furcada, azulada. En la hembra hay contraste entre el gris ventral y el verde dorsal, se parece a la hembra del Picaflor zafiro pero tiene la cola más furcada.
De las hembras del Picaflor común y del Picaflor copetón se diferencia por ser más oscura.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Thalurania glaucopis (J. F. Gmelin, 1788) en Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Se encuentra en sureste de Brasil, este de Paraguay y noreste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Misiones
Citas: Bertoni (1913); Bodrati et al. (2010b); Castelino (1986); Chebez (1996a); De la Peña (1984d); Militello y Chebez (2009); Martínez Gamba (2014); Navas y Bó (1993); Straneck (1990h)

Observaciones: De la Peña (Cataratas del Iguazú, dpto. Iguazú, 21-09-1993)



Puerto Iguazú. Misiones. 12-10-1981

PICAFLOR SOMBRÍO *Aphantochroa cirrochloris* (Vieillot, 1818)

DESCRIPCIÓN
Largo: 11-12 cm.
Peso: Schuchmann (1999): 9 g
Coloración.
Pardo oscuro. Cabeza y parte dorsal verdosas. Cola gris con la parte terminal negruzca.

HÁBITAT
Selvas, plantaciones.

NIDIFICACIÓN

Se carece de datos.
Más información:
Schuchmann (1999)



IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Coloración general parda.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Aphantochroa cirrochloris (Vieillot, 1818) en Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Área reducida del este de Brasil y noeeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Misiones
Citas: Chebez et al. (2004)

PICAFLOR VIENTRE PUNTEADO *Taphrospilus hypostictus* (Gould, 1862)

DESCRIPCIÓN
Largo: 10,5-11,4 cm
Peso: Schuchmann (1999): (M) 6,7 g, (H) 7,2 g
Coloración. Verde bronceado.Punto blanco postocular. Ventral blanco punteado de verde, ecepto el centro de vientre.
Cola azul verdosa. Punta gris.

HÁBITAT
Selvas, matorrales, quebradas, orillas de selvas.

NIDIFICACIÓN
Se carede de datos.

Más información:
Schuchmann (1999)



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Taphrospilus hypostictus (Gould, 1862) en Salta.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Por el este de los Andes, Ecuador, este de Perú, este de Bolivia, soroeste de Brasil y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Salta
Citas : Moschione et al. (2013)

PICAFLOR DE GARGANTA BLANCA *Leucochloris albicollis* (Vieillot, 1818)

Otro nombre: Picaflor garganta blanca.
DESCRIPCIÓN
Largo: 10-11,5 cm.
Peso: Salvador y Di Giacomo (2014): N= 1 (?) 6,1 g; Willis y Oniki (2002): N= 6 (?) de 5,6 a 6,0 g.
Coloración. Pico recto, parte superior negruzca, inferior roja, punta oscura.
Cabeza y parte dorsal verdes. Mentón verde con las plumas orilladas de blanco. Garganta, vientre y subcaudales blancos. Pecho verde brillante.
Alas pardas verdosas. Cola azul con ancha punta blanca.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
Isacch (2002). Néctar *Phormium tenax.*
Montaldo y Haene (2009). Néctar *Salvia guaranitica.*
Salvador y Salvador en De la Peña y Salvador (2010). Néctar *Lantana camara.*

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto es un agudo Tsintsintsintsint repetido esporádicamente.

HÁBITAT
Matorrales, bosques, arboledas, orillas de selvas, capueras, plantaciones, parques, jardines.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Buenos Aires.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		N									

Tacita. Emplea en la construcción fibras vegetales liadas con telas de arañas y tapizado externamente con líquenes.



Núñez Chas (1992). Mar del Plata, pdo. General Pueyrredón, Buenos Aires, 21-03-1991, nido en una rama de un nogal (*Juglans nigra*). Forma cónica invertida: 3,9 cm de diámetro, 1,6 cm de profundidad, 4-6 cm de altura. Construido con musgos, fibras vegetales, telas de arañas, frutos de compuestas y tapizado externamente con líquenes. Contenía 2 pichones bien desarrollados.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Garganta, anterior del cuello y vientre blancos. Ancha franja verde en el pecho.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Leucochloris albicollis (Vieillot, 1818) en Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, este de Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y Buenos Aires.Observado en Bariloche (Río Negro)

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Su área de distribución comprende este de Bolivia, este de Paraguay, centro y sur de Brasil, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS



Buenos Aires
Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Carrizo et al. (2001); Darrieu y Camperi (2001a); De Lucca (1990a); Delhey (1992); Doiny Cabré (2006); Doiny Cabré y Lejarraga (2007); Fiameni (1994); Leveau y Leveau (2004, 2005, 2011b); Lucero et al. (2011); Mérida y Bodtati (2006); Morici (2012b); Montaldo (1984); Narosky (1983); Narosky y Di Giacomo (1993); Núñez Chas (1992); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1965); Pugnali y Chamorro (2008); Roda y Danti (2015); Soave et al. (1999)

Chaco
Citas: Bodrati (2005); Contreras et al. (1990b)

Córdoba
Citas: Montaldo (1995b); Zarco y Villafañe (2010)

Corrientes
Citas: Chatellenaz et al. (2010); Contreras (1981b)

Entre Ríos
Citas: Canavelli et al. (2004); Marateo et al. (2009); Raffo et al. (2008)

Formosa
Citas: Gorleri et al. (2011)

La Pampa
Citas: Chebez et al. (1998); De la Peña y Tittarelli (2011)

Misiones
Citas: Bodrati y Areta (2010); Bodrati et al. (2010b, 2012b); Camperi y Darrieu 2000 (2001b); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Hartert y Venturi (1909); Militello y Chebez (2009); Straneck (1990h)

Neuquén
Citas: Matarasso (2007); Veiga y Dupuy (2009)

Río Negro
Citas: Fierro en Christie et al. (2004); Gelain (2001); Gelain et al. (2003); Gelain y Tolosa (2011); Llanos et al. (2011)

Santa Fe
Citas: Giarduz (2008); Manassero et al. (2006)

Santiago del Estero
Citas: Salvador y Di Giacomo (2014)

Observaciones: Salvador y Salvador (Sachayoj, 05-12-87)

PICAFLOR BLANCO *Amazilia chionogaster* (Tschudi, 1845)

Otros nombres: Picaflor de pecho blanco. Quenti.

DESCRIPCIÓN
Largo: 9-12 cm.
Peso: Fiora (1933): N= 7 X= 3,8 g (Rango 3,2 a 4,5); Salvador (1988): N= 2 (M) 5,0 y 6,5 g; N= 1 (H) 4,6 g; Salvador y Di Giacomo (2014): N= 5 X 5,3 (Rango 4,9 a 5,8)
Coloración. Pico recto, parte superior negruzca, inferior rojiza, punta oscura.
Dorsal verde dorada. Ventral blanca con puntos verdes en la garganta y en la parte anterior del cuello.
Alas pardas. Cola verde bronceada con punta blanca.

COMPORTAMIENTO

Alimentación
De la Peña (2010) Néctar *Eucaliptus* sp.
Montaldo (2014). Néctar de Azafrán *Cnicothamnus lorentzii*
Fracchia y Aranda-Rickert (2015). Néctar de *Ligaria cuneifolia*.

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto es un agudo y cristalino Tsing...tsig...tsing.. repetido insistentemente.

HÁBITAT
Matorrales, bosques, yungas, plantaciones, jardines, áreas con cactáceas y arbustivas xerófilas.

NIDIFICACIÓN

Se localizaron nidos en Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	N						N				N



Asentado en ramas de plantas. A mediana y baja altura.
Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita. Emplea en la construcción materiales vegetales suaves, liados con telas de arañas. Externamente líquenes.

Hartert y Venturi (1909). Tucumán, nido de líquenes. Mide 5 cm. de diámetro y 3,5 cm de profundidad.
Salvador (1992). Chuquis, dpto. Castro Barros, La Rioja, el 09-02-1990, se localizó un nido en una quebrada húmeda y arbolada, en un molle de beber (*Lithraea ternifolia*) a 4,5 m del suelo. El nido es una semiesfera profunda, recubierta de líquenes. En la parte interna elementos algodonosos y unas pocas plumas. Diámetro externo de 4,8 cm, interno de 3,2 cm, altura 5 cm y 2,8 cm de profundidad. Contenía 2 pichones emplumados.
Di Giacomo y López Lanús (2000). Mesada de las Colmenas, Parque Nacional Calilegua, dpto. Ledesma, Jujuy, 12-08-1991, un nido fue observado.
De la Peña (2013c). Cuesta del Clavillo, dpto. Andalgalá, Catamarca, 18-12-1999, nido en un arbusto a 2,50 m del suelo, un huevo y un pichón. Medidas: diámetro total, 5 cm, diámetro interno, 3 cm, profundidad, 2,5 cm y alto, 4 cm.

Huevos
Pone 2 huevos. Elípticos. De color blanco.

Medida
De la Peña (2013c): 13 x 8,5 (N= 1)



IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Parte dorsal verde. Ventral blanca.
Se parece al Picaflor esmeralda pero éste tiene más marcados la garganta y el pecho.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Amazilia chionogaster hypoleucus (Gould, 1846) en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Dos subespecies. Se encuentra en Perú, Bolivia y noroeste de Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Amazilia chionogaster hypoleucus (Gould, 1846)

Catamarca
Citas: Alabarce et al. (1990); Camperi y Darrieu 2000 (2001a); Carma (2009); De la Peña (2001a, 2013c); Salvín (1982); White (1882)

Formosa
Citas: Esteban (1953)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998); Di Giacomo y López Lanús (2000); Fiora (1933); Malizia et al. (2005); Montaldo (2014); Moschione y Segovia (2005) ; Salvador (1988)

La Rioja
Citas: Fracchia y Aranda-Rickert (2015); Giacomelli (1923); Hayward (1967); Koslowsky (1895b);Salvador (1992)

Salta
Citas: Babarskas et al. (1995); Camperi (1990); Coconier et al. (2007); Malizia et al. (2005); Moschione et al. (2013); Rodríguez (2012b); Salvador y Di Giacomo (2014); Straneck (1990f); Zimmer (1950)

Santiago del Estero
Citas: Nores et al. (1991); Nores y Cerana (1990); Nores y Yzurieta (1981)

Tucumán
Citas: Alabarce y Antelo (1996); Antelo (1992, 1999); Antelo y Brandán Fernández (2013); Antelo y Brandán (2000, 2006); Antelo et al. (2013); Brandán y Antelo (2009); Brandán et al. (2006); Brandán y Navarro (2009);Capllonch (1998, 2007a); Capllonch y Aráoz (2007); Chani et al. (2000); Echevarría et al. (2008a, 2011b);Fanjul (2010); Gianini (2000); Handford (1983); Hartert y Venturi (1909); Juri (2007); Lucero (1983); Lucero et al. (2002, 2005); Malizia et al. (1998); Navarro et al. (2007);Ortiz et al. (2011b); Ortiz y Aráoz (2014);Presti y Echevarría (2009); Vides Almonacid (1991, 1993); Zimmer (1950)

Observaciones: De la Peña (Horco Molle, dpto. Capital, 13-05-1987)

PICAFLOR ESMERALDA *Amazilia versicolor* (Vieillot, 1818)

Otros nombres: Picaflor mainumbí. Picaflor pequeño verde.

DESCRIPCIÓN
Largo: 8-10 cm.
Peso: Schuchmann (1999): (M) 4 g, (H) 3,5 g; Willis y Oniki (2002): N= 4 (?) de 3,5 a 4,9 g
Coloración. Pico recto, parte superior negruzca, inferior rojiza, punta oscura.
Frente y corona pardas grisáceas. Dorsal verde. Ventral verde dorada. Vientre inferior y subcaudales grises. Alas parduscas. Cola verde olivácea con banda subterminal oscura y punta más clara.
La hembra tiene blanco en la garganta y en la parte anterior del cuello.

HÁBITAT
Capueras, orillas y claros de selvas, selvas en galería, parques, jardines.

NIDIFICACIÓN
Se localizaron nidos en Misiones.

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	N										

Semiesfera, asentada en ramas. Emplea en la construcción musgos, hojitas, fibras vegetales liadas con telas de arañas.



Militello y Castillo (2005). Parque Nacional Iguazú, dpto. Iguazú, Misiones, 02-02-2002, nido con 2 pichones. Estaba en una rama de un Marmelero (*Ruprechtia laxiflora*) a 6 m del suelo. Tiene forma de semiesfera asentada en la rama, de 4,4 cm de ancho por 2,9 cm de alto. Construido con musgos, telas de arañas y hojitas secas. Internamente fibras vegetales finas.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Verde. Superior de la cabeza parda y el vientre gris.
Diferenciarlo del Picaflor blanco.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Amazilia versicolor kubtchehi (Ruschi, 1959) en Misiones y Corrientes.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cinco subespecies. En ambientes abiertos en Colombia, Venezuela, Guayanas, Brasil, Bolivia, este de Paraguay y Argentina



CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Amazilia versicolor kubtcheki (Ruschi, 1959)

Corrientes
Citas: Darrieu y Camperi (1993); López-Lanús et al. (2013b)

Misiones
Citas: Bertoni (1906); Bodrati et al. (2010b, 2012b); Chebez (1996a); Dabbene (1919a); Militello y Castillo (2005); Militello y Chebez (2009); Navas y Bó (1993)

PICAFLOR DE VIENTRE BLANCO *Amazilia brevirostris* (Lesson, 1829)

DESCRIPCIÓN
Largo: 8,5-9 cm.
Peso: Schuchmann (1999): (M) 4,6 g, (H) 4,4 g
Coloración. Pico, maxila negra, mandíbula rosada oscura.
Corona, dorsal, cobertoras alares, lados del cuello y del pecho, y flancos verdes bronceados. Alas pardas purpúreas, cola parda bronceada con dos plumas centrales verdes bronceadas. Centro de la garganta y abdomen blancos, subcaudales pardas bronceadas pálidas bordeadas de blanco grisáceo.



HÁBITAT
Bordes de selvas, plantaciones, jardines.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Schuchmann (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Similar a *Amazilia versicolor* pero sin pecas verdes en garganta y pecho.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Amazilia brevirostris (Lesson, 1829) en Misiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Especie de la costa de Venezuela, Guayanas y norte de Brasil. Observado en Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Misiones
Citas: Chebez et al. (2009)

PICAFLOR DE PECHO AZUL *Amazilia lactea* (Lesson, 1832)

DESCRIPCIÓN
Largo: 9-10 cm.
Coloración. Pico, maxilar negro, mandíbula rosada o córnea.
Parte dorsales verdes con reflejos bronceados. Garganta y pecho azules violetas. Centro del vientre y subcaudales blancos.
Plumas centrales de la cola verdes. Externas azules. Ventralmente es azul oscura.

HÁBITAT
Bordes de selvas, matorrales, parques, jardines.



NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Schuchmann (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Garganta y pecho azules violetas. Centro del vientre y subcaudales blancos.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Amazilia lactea lactea (Lesson, 1832)enMisiones.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Tres subespecies. Areas aisladas en Venezuela, Perú, Bolivia, sur de Brasil y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Amazilia lactea lactea (Lesson, 1832)

Misiones
Citas: Chebez et al. (2004); Güller y Oste (2011); Güller y Rodríguez Elías (2013); Militello y Chebez (2009)

PICAFLOR DE COLA CASTAÑA *Hylocharis sapphirina* (J. F. Gmelin, 1788)

Otros nombres: Picaflor azul de garganta roja (al macho). Picaflor cola castaña. Picaflor de barba castaña. Picaflor de cabeza azul. Picaflor de pecho azul.


DESCRIPCIÓN
Largo: 8,5-9,5 cm.
Peso: Schuchmann (1999): (M) 4,1-4,5 g, (H) 3,9-4,3 g
Coloración. Pico recto, rojo con punta negra.
Macho. Parte dorsal, inferior del pecho y abdomen verdes brillantes. Barbillas y garganta castañas.
Parte anterior del cuello y superior del pecho violetas. Vientre blanco. Subcaudales castañas.
Alas pardas. Plumas centrales de la cola verdes bronceadas purpúreas, las externas castañas orilladas de negro.
Hembra. Dorso verde bronceado. Garganta y subcaudales rojizas. Ventral blanquecino grisáceo, con puntas verdes azuladas en la parte anterior del cuello y superior del pecho.
Cola como la del macho, pero con las plumas externas con puntas blanquecinas.

HÁBITAT
Vegetación arbustiva en sabanas, orillas de selvas, bosques, capueras, plantaciones de café.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Schuchmann (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho con el pecho violeta y la garganta rojiza. Hembra con rojizo en la garganta y puntos azules en el pecho. Ambos con la cola bronceada y castaña. Diferenciar a la hembra de la del Picaflor lazulita.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Hylocharis sapphirina (J. F. Gmelin, 1788) en Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y noreste de Santa Fe.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Monotípica. Amplia área de distribución como poblaciones separadas en el norte de Sudamérica: Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador Perú y norte de Brasil (Amazonia). Otra población se encuentra en Bolivia, este de Brasil, este de Paraguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Chaco
Citas: Contreras et al. (1990b); Chatellenaz (2005a); Olrog (1979)

Corrientes
Citas: Chatellenaz et al. (2010); Chebez (2009); Contreras (1981b); López-Lanús et al. (2013b)

Entre Ríos
Citas: Beltzer et al. (2006)

Formosa
Citas: Contreras (1987c);Contreras et al. (2014); López Lanús (1997); Ramírez-Llorens et al. (2003)

Misiones
Citas: Chebez (1996a); Saibene et al. (1996)

Santa Fe
Citas: Manassero et al. (2004); Manassero y Luna (2009a)

PICAFLOR LAZULITA *Hylocharis cyanus* (Vieillot, 1818)

Otros nombres: Picaflor azul de garganta blanca (a la hembra). Picaflor de cabeza azul.

DESCRIPCIÓN
Largo: 8-9 cm.
Peso: Schuchmann (1999): 3,5 g
Coloración. Pico recto, rojo con punta oscura.
Macho. Verde. Cabeza, garganta y cuello azules violetas. Pequeño punto blanco en el mentón.
Alas pardas verdosas. Subcaudales y cola negras azuladas.
Hembra. Dorsal verde. Ventral gris blanquecina con puntos verdosos en la garganta y en el pecho.
Subcaudales grises con puntos negros.
Cola negra azulada con las puntas de las plumas externas grises.

HÁBITAT
Vegetación arbustiva en bosques y selvas, orillas de selvas, selvas en galería, plantaciones, capueras.

NIDIFICACIÓN
Se carece de datos.

Más información:
Schuchmann (1999)

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Macho con la cabeza, el pecho y la cola azules. La hembra se parece a la del Picaflor cola castaña, pero tiene castaño en la garganta, subcaudales y cola. También a la hembra del Picaflor de antifaz pero tienen diferente color en la cola.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Hylocharis cyanus griseiventris Grantsau, 1988 en el sureste de Buenos Aires y Salta.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Cinci subespecies. Amplia área de distribución que comprende: Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Argentina.



CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Hylocharis cyanus griseiventris Grantsau, 1988

Buenos Aires
Citas: Dabbene (1926a); Fiameni (1994)

Salta
Citas: Cuñado et al. (2012); Moschione et al. (2013)

PICAFLOR BRONCEADO *Hylocharis chrysura* (Shaw, 1812)

Otros nombres: Colibrí bronceado. Picaflor dorado.

DESCRIPCIÓN
Largo: 8-10 cm.
Peso: Contreras (1979f): N= 2 (M) 4,0 y 4,2 g; N= 1 (H) 5,0 g; Camperi (1992a): N= 1 (H) 4,3 g; Di Giacomo (2005h): N= 2 X= 3,6 g; Salvador y Di Giacomo (2014): N= 3 X= 4,1 g (Rango 3,6 a 4,5)
Coloración. Pico rojo con punta negra.
Verde dorado. Rojizo pálido en la rabadilla.
Alas pardas. Cola verde bronceada en ambos sexos.

COMPORTAMIENTO


Alimentación
Olrog (1956). Insectos.
Lucero (2009). Néctarde *Nicotina glauca.*
Montaldo y Haene (2009). Néctar de *Salvia guaranitica.*
De la Peña (2010d). Néctar de *Tecoma capensis.*
Salvador en De la Peña y Salvador (2010). Néctar de *Pyracantha coccinea.*
Montaldo (2014). Néctar de Azafrán *Cnicothamnus lorentzii*
Fracchia y Aranda-Rickert (2015). Néctar de *Ligaria cuneifolia*.

Voces
Straneck (*in litt*.). El canto es un agudo Tsiirrrtsiirrrtsiirrr repetido a intérvalos.

HÁBITAT
Sabanas, matorrales, selva en galería, bosques, selvas, jardines, parques, plantaciones.

NIDIFICACIÓN

MESES DE NIDIFICACIÓN											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
								N	N	N	N



Se localizaron nidos en Formosa, Santiago del Estero, Santa Fe, Buenos Aires. Asentado en ramas de plantas, tallos de enredaderas. A baja altura. Expuesto. Elaborado. Tiene forma de tacita. Emplea en la construcción materiales vegetales suaves, fibras algodonosas del fruto del Palo borracho, liados con telas de arañas. Externamente líquenes.

Pereyra (1933b). San Isidro, pdo. San Isidro, Buenos Aires, 22-12-1932, nido con 2 huevos.
Klimaitis y Moschione (1987). Anida en sectores de vegetación densa y sombría de la selva.
Di Giacomo (2005h). Estancia El Bagual, dpto. Laishi, Formosa, anida entre setiembre y noviembre. Se localizaron 4 nidos.
Salvador y Salvador, en De la Peña (2010b). Bañados de Figueroa, dpto. Figueroa, Santiago del Estero, 2 nidos: 21-10-82,nido con 2 huevos, se hallaba en un área de bosques próximo a un bañado, a 4 m de altura en un *Geoffroea decorticans,* apoyado en una rama horizontal de 2 cm de espesor,elaborado con ootecas de arañas y barba de viejo, exteriormente revestido con líquenes e interiormente forrado en su totalidad de barba de viejo, con un diámetro externo de 4 cm, diámetro interno 2,5 cm, altura 3 cm y 1,5 cm de profundidad. El mismo día otro nido, con 2 huevos se hallaba a 50 m del anterior, a 3,5 m de altura en un *Geoffroea decorticans,* colgando en el extremo de una rama, de construcción y medidas similares al anterior.
Godoy et al. (2012). Avellaneda, pdo. Avellaneda y Quilmes, pdo. Quilmes, Buenos Aires, nido con un pichón en un Ligustro (*Ligustrum lucidum*).
De la Peña (2013c). Cayastá, dpto. Garay, Santa Fe, 2 nidos, el 20-11-1978, 3n un Ombú, a 2,50 m del suelo con 2 huevos y el 31-10-1981, en una enredadera a 2 m. con un huevo. Medidas: diámetro total, de 3 a 4 cm, diámetro interno, de 2 a 3 cm, profundidad, de 1,5 a 2 cm y alto, de 3 a 94 cm.

Huevo
Pone 2 huevos. Elípticos. Blancos.

Medidas
Hartert y Venturi (1909): 13 a 14 X 8,5 a 9
Di Giacomo (2005h): 12,9 a 13,6 x 8,1 a 9,1 X= 13,2 x 8,6 (N= 4)
Salvador y Salvador, en De la Peña (2010b): 12,5 a 12,7 x 8,1 a 8,4 X= 12,6 x 8,2 (N= 4)
De la Peña (2013c): 13,4 a 14,4 x 8,8 a 9,3 X=13,6 x 9 (N= 3)

Pesos
Di Giacomo (2005h): X= 0,4 (N= 4)
De la Peña (2013c): 0,557 X= 0,557 (N= 1)
De la Peña (2013c): cáscaras 0,029 a 0,032 X= 0,030 (N= 3)


Otros
Bodrati en Salvador y Bodrati (2013a). Víctima del parasitismo de moscas del género *Philornis.*

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO
Verde bronceado uniforme con las alas pardas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ARGENTINA
Hylocharis chrysura (Shaw, 1812) desde el norte del país hasta San Juan, Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe y Buenos Aires.




Cayastá. Santa Fe. 20-10-1978



Elisa. Santa Fe. 30-11-2010


SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN

Monotípica. Su área de distribución se extiende por Bolivia, Paraguay, suroeste de Brasil, Uruguay y Argentina.

CITAS Y OBSERVACIONES EN LAS PROVINCIAS

Buenos Aires

Citas: Babarskas et al. (2003); Bodrati et al. (2006b); Dabbene (1918b); Darrieu y Camperi (2001a); Fiameni (1991, 1994); Grant (1911); Hartert y Venturi (1909); Isacch et al. (2006); Klimaitis y Moschione (1986, 1987); Lucero et al. (2011); Mérida y Bodtati (2006); Morici (2012b); Montaldo (1984, 2014); Montaldo y Claver (1986); Narosky y Di Giacomo (1993); Pagano et al. (2012); Pagano y Mérida (2009); Pereyra (1923b, 1938b); Pugnali y Chamorro (2008); Roda y Danti (2015); Soave et al. (1999)



Chaco
Citas: Bodrati y Pietrek (2000); Chatellenaz (2005a); Contreras et al. (1990b); Moschione y Bishels (20044); Salvador y Bodrati (2013a)

Córdoba
Citas: Nores (1996); Nores e Yzurieta (1995); Yzurieta (1995)

Observaciones: De la Peña (Ascochinga, 13-03-2003)

Corrientes
Citas: Azpiroz et al. (2013); Capllonch et al. (2005a); Chatellenaz (2004); Contreras (1981b); Fraga (2001b); Giraudo et al. (2006); López-Lanús et al. (2013b)

Observaciones: De la Peña (Loreto, dpto. San Miguel, 17-09-1979)

Entre Ríos
Citas: Baliño (1984); Baliño y Biole (1984); Beltzer et al. (2006); Camperi (1992a); De la Peña (2012b); Mancini (2011); Marateo et al. (2009); Muzzachiodi et al. (2003); Raffo et al. (2008); Serié y Smyth (1923); Straneck (1990c); Zapata (1975, 1977)

Formosa
Citas: Chebez et al. (1998); Contreras (1987c);Contreras et al. (2014); Di Giacomo (2005h); Laubmann (1930); López Lanús (1997); Narosky y Lozzia (1988); Pujalte et al. (1995); Wetmore (1926b)

Jujuy
Citas: Burgos et al. (2009); Chebez et al. (1998)

La Rioja
Citas: Fracchia y Aranda-Rickert (2015)

Misiones
Citas: Bodrati et al. (2010b); Capmourteres et al. (2015); Chebez (1996a); Giraudo et al. (1993); Krauczuk (2005, 2009); Martínez Gamba (2014); Militello y Chebez (2009); Navas y Bó (1993)

Observaciones: De la Peña (Cataratas del Iguazú, 12-10-1982)

Salta
Citas: Coconier et al. (2007); Moschione et al. (2013)

Observaciones: De la Peña (La Viña, dpto. La Viña, 08-12-1977)

San Juan
Citas: Gelain y Pereyra Lobos (2011b); Lucero (2009); Lucero (2013i)

Santa Fe
Citas: De la Peña (2011f, 2013c); Giai (1950); López-Lanús et al. (2013a, 2013d);Pautasso (2002b); Rossetti y Giraudo (2003)

Santiago del Estero

Citas: Nores et al. (1991)

Tucumán
Citas:Antelo y Brandán Fernández (2013); Antelo et al. (2013); Brandán et al. (2006); Brandán y Navarro (2009); Lucero (1983); Navarro et al. (2007); Ortiz y Aráoz (2014)

BIBLIOGRAFÍA

Abadie, E. 1991. Notas sobre aves de Jujuy. Nuestras Aves 24: 23.

Abadie, E. I. 1993. Aves nuevas o poco comunes de Entre Ríos. Nuestras Aves 29: 31.

Abril, M., A. Delgado, G. Escudero y G. Murga. 1998. *Athene cunicularia* (Strigidae): dieta en un ambiente periurbano patagónico. X. RAO: 1.

Acerbo, P. E. 2000. Aves del río Neuquén. Autoridad interjurisdiccional de Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro. 180 p.

Acevedo, D. y F. Bruno. 2007. Lista de Aves del Parque Don Tomás. Santa Rosa, La Pampa. Editorial L y M. Gral. Acha. La Pampa.

Acosta, J. C. y F. Murúa. 2001. Inventario de la avifauna del Parque Natural Ischigualasto, San Juan, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie Nº 3: 1-4.

Agnolín, F. L., N. R. Chimento, C. Frank y R. F. Lucero. 2009. Nuevos registros de aves argentinas. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 34: 1-4.

Alabarce, E. A. 1987a. Aportes al conocimiento de la dieta en caprimúlgidos. Resúmenes VI RAO: 16. Horco Molle, Tucumán.

Alabarce, E. A. y C. M. Antelo. 1996. Organización temporal de una taxocenosis de aves en un ambiente secundario, en la provincia de Tucumán. Acta Zool. Lilloana 43: 411-425.

Alabarce, E. A. y C. M. Antelo. 1998. Comentarios sobre una ornitocenosis nidificante en la provincia de Tucumán. Acta Zool. Lilloana 44: 223-229.

Alabarce, E. A. y C. M. Antelo. 2000. Estudio preliminar sobre la avifauna residente en primavera en un sector del Bosque Chaqueño (Tucumán, Argentina). Acta Zool. Lilloana 45 (2): 181-188.

Alabarce, E. A. y M. M. Lucero. 1977. Observaciones sobre el paso de migraciones en el alto Pilcomayo. Hornero 11: 410-412.

Alabarce, E. A., C. Laredo, R. Vides y M. Lucero. 1990. Análisis de la estructura de una comunidad de aves en la localidad de Las Juntas, provincia de Catamarca. Estudio preliminar. Acta Zool. Lilloana, 39: 45-52.

Albrieu, C., S. Imberti y S. Ferrari. 2004. Las aves de la Patagonia Sur. El estuario de Río Gallegos y zonas aledañas. Ed. U.N. de la Patagonia Austral. Río Gallegos. 204 pp.

Alexander, W. B. 1921. Especies de tubinares observadas durante el viaje de Buenos Aires a Río de Janeiro y de Río de Janeiro a Capetown (del 4 de mayo al 3 de junio), a bordo del vapor "Kanagawa maru". El Hornero 2: 224.

Almirón, D., C. Schmidtuz, D. Caiafa y N. Oste. 2012. Primera documentación del nido de la Paloma montera castaña (*Geotrygon montana*) en Argentina. Nuestras Aves 57: 9-11.

Alvarez, M. E. y P. G. Blendinger. 1995. Primer registro de distribución del Picaflor andino castaño *Oreotrochilus adela* para Argentina. Hornero 14: 75.

Amela García, M. T., P. Courtalón y A. Krojethovich. 1990. Análisis de los hábitos alimentarios de *Tyto alba tuidara* (Strigiformes, Tytonidae) de Castelar, provincia de Buenos Aires. 1. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 18: 20-24.

Andrade, A., D. E. Udrizar Sauthier y U. F. J. Pardiñas.2004. Vertebrados depredados por la Lechucita vizcachera (*Athene cunicularia*) en la meseta de Somuncurá (Río Negro, Argentina) Hornero 19: 91-93.

Anónimo. 1933. Huevos de aves de Tierra del Fuego. Hornero 5: 228-230.

Antelo, C. M. 1992. Cambios de la avifauna en diferentes etapas sucesionales en un sector de la Sierra de San Javier, Tucumán, Argentina. Seminario de grado. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto M. Lillo. Universidad Nacional de Tucumán, 65 pp.

Antelo, C. M. 1999. Análisis del impacto de las plantaciones de *Pinus elliotti* sobre la avifauna de Yungas (Tucumán-Argentina). Tesis de Maestría U. N. C., Centro de Zoología Aplicada.

Antelo, C. M. y Z. J. Brandán Fernández. 2013. Las aves no Passeriformes de Tucumán, Argentina. Miscelanea 132. Fundación Miguel Lillo, Argentina.

Antelo, C. M. y Z. J. Brandán. 2006. Presencia estacional de la avifauna de las Yungas en un ambiente urbanizado del departamento Yerba Buena (Tucumán, Argentina). Acta Zool. Lilloana 50 (1-2): 61-70

Antelo, C. M. y Z. J. Brandán.2000. Presencia de migrantes altitudinales en tres localidades del pedemonte de la Sierra de San Javier (Tucumán-Argentina). Acta Zool. Lilloana 45 (2): 241-246.

Antelo, C. M., N. L. Marigliano, Z. J. Brandán y C. I. Navarro. 2013. Avifauna asociada a sectores de bosques ribereños con modificaciones antropogénicas (Tucumán, Argentina): II.

Ensambles presentes en estación seca y su relación con elementos estructurales del hábitat. Acta Zoológica Lilloana. 57 (1): 42-56.
Antelo, C. M., Z. J. Brandán, C. I. Navarro y N. L. Marigliano. 2006. Avifauna de un sector de bosque en Las Tipas (Tucumán-Argentina). Acta Zoológica Lilloana. 50 (1): 41-46.
Antoniazzi, L. R., D. E. Manzoli, D. Rohrmann, M. J. Saravia, L. Silvestre y P. M. Beldomenico. 2011. Climate variablility effects the impact of parasitic flies on Argentinean forest birds. Journal of Zoology.283: 126-134.
Aramburú R. 1983. Lista preliminar de la avifauna de la Laguna Llancanello. Informe inédito, 12 pp.
Aramburú, R., A. Formoso, A. M. Arambarri y D. Montalti. 2007. Morfología, peso corporal y dieta invernal de la Agachona chica *Thinocorus rumicivorus* en la provincia de Buenos Aires. Hornero 22: 39-42.
Aravena, R. O.1927. Notas sobre la alimentación de las aves. Hornero 4: 38-49.
Aravena, R. O.1928. Notas sobre la alimentación de las aves. Hornero 4: 153-166.
Arechabala, J. M. y R. Novatti. 1983. Estudio sobre la influenza en aves antárticas. Hornero Nº Extraordinario: 274-281.
Areta, J. I. y D. Monteleone. 2011. The voices of the High-Andean *Metriopelia* Ground-Doves. Ornitología neotropical, 22: 219-227
Areta, J. I., A. Bodrati y K. Cockle. 2009. Specializotion on *Guadua* Bamboo seeds by three birds species in the Atlantic Forest of Argentina. Biotropica 41: 66-73.
Areta, J. I., A. Bodrati y P. Grilli.2004. Primeros registros del picaflor vientre negro (*Anthracothorax nigricollis*) en la provincia de Entre Ríos, Argentina. Nuestras Aves 48: 20-21.
Areta, J. I., S. Vila Moret, J. Mazar Barnett y H. Casañas. 2006. Primer registro de nidificación del Picaflor andino castaño (*Oreotrochilus adela*) en la Argentina. Nuestras Aves 51: 21-23.
Argerich, E. 2012. Falaropo pico grueso (*Phalaropo fulicarius*) en lago Nonthue, Neuquén, Argentina. Ecoregistros 2, artículo Nº 1: 1-7.
Argerich, E. C. 2010. Primer registro de Anó grande (*Crotophaga major*) en el Parque Natural Municipal Ribera Norte, San Isidro, provincial de Buenos Aires, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. 47: 1-3.
Argerich, E., L. Mannarino y J. La Grotteria. 2011. Registros actuales de Playero ala blanca (*Tringa semipalmata*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Ecoregistros 1, artículo Nº 18: 1-8.
Arizmendi, M.C., C. Rodríguez-Flores, C. Soberanes-González, and Thomas S. Schulenberg. 2010. Stygian Owl (*Asio stygius*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=214936
Arizmendi, M.C., C. Rodríguez-Flores, C. Soberanes-González, Hope Batcheller, and Thomas S. Schulenberg. 2012. Short-tailed Nighthawk (*Lurocalis semitorquatus*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=215896
Azategui, A. 1975. Datos sobre aves de Santa Isabel (Córdoba). Hornero 11: 321.
Azpiroz, A., M. Mattalia, B. López-Lanús y L. L. Sosa. 2013. Caracterización ornitológia y productiva del campo "Gral Ávalos" Monte Caseros, Corrientes, informe técnico de Aves Argentinas/AOP: diciembre 2010. En pp. 351-373: G. D. Marino, F. Miñarro, M. E. Zaccagnini y B. López-Lanús (eds.). Pastizales y sabanas del cono sur de Sudamérica: iniciativas para su conservación en la Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación, Monografía de Aves Argentinas Nº 9. Aves Argentinas/AOP, Fundación Vida Silvestre Argentina e Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Buenos Aires, Argentina.
Babarskas, M. y P. Flombaum.1998. Nuevos registros de aves para la provincia de Chubut, Argentina. Nuestras Aves 38: 13-14.
Babarskas, M., E. Haene y J. Pereira.2003. Aves de la Reserva Natural Otamendi. En Haene, E. y J. Pereira (Eds.). Fauna de Otamendi. Inventario de los animales vertebrados de la Reserva Natural Otamendi, Campana, Buenos Aires, Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación. Monografía de aves argentinas 3: 47-113. Aves Argentinas/AOP. Buenos Aires.
Babarskas, M., J. O. Veiga y F. C. Filiberto.1995. Inventario de Aves del Parque Nacional El Rey, Salta, Argentina. Monografía Especial L. O. L. A. Nº 6, 44 Págs. Buenos Aires.

Babarskas, M., J. Veiga y F. Filiberto.1996. Nuevos registros de aves para la provincia de Neuquén. Nuestras Aves 34: 44-46. Buenos Aires.

Bachmann y C. A. Darrieu. 2010. Biología reproductive del Ostrero pardo (*Haematopus palliatus*) en el sudeste de la provincial de Buenos Aires, Argentina. Hornero 25 (2): 75-84.

Bachmann, S. y J. P. Isacch.1999. Ostrero austral (*Haematopus leucopodus*) en Mar de Cobo, provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 40: 15.

Bachmann, S. y M. M. Martínez. 1999. Feeding tactics of the American Oystercatcher (*Haematopus palliatus*) on Mar Chiquita coastal lagoon, Argentina. Ornitología Neotropical 10: 81-84.

Bachmann, S. y M. M. Martínez.1998. Biología reproductiva del Ostrero pardo, *Haematopus palliatus*, en las costas del SE de la provincia de Bs. As. (Pdo. de Mar Chiquita). Resúmenes X RAO: 2. Mar del Plata.

Baer, B. A. 1904. Note sur une collection d´oiseaux du Tucumán (République Argentine). Ornis 12: 209-234.

Bagnarol, M., A. Beltzer, M. Quiroga, M. de la Paz Ducommun y A. Ronchi Virgolini. 2010. Feeding biology of Pectoral Sandpiper (*Calidris melanotos*) (Birds: Scolopacidae) in the floodplain of the Parana River, Argentina. Natura Neotropicalis 41: 5-17.

Baker, S. C. y C. Barbraud. 2001. Foods of the South Polar Skua *Catharacta maccormicki* at Ardery Island, Windmill Islands, Antarctica. Polar Biology 24: 59-61.

Bala, L. O., F. Menchi y M. de los A. Hernández.1998a. Distribución espacial de presas *Calidris canutus rufa* en una barra del intermareal: una forma para interpretar el comportamiento de forrageo del ave. Resúmenes X RAO: 5. Mar del Plata.

Bala, L. O., Hernández, M. de los A. y Baarck, M.C.1998b. Análisis de la dieta de *Limosa haemastica* en Punta Loyola, Santa Cruz. Res. X RAO: 3-4. Mar del Plata.

Bala, L.O., Hernández, M. de los A. y D´Amico, V. L. 2001. Shorebidrs present on Fracasso Beach (San José Gulf, Península Valdés, Argentina): report of the 1999 migrating season. Wader Study Group Bulletin 94: 27-30.

Baldo, J. L. y M. Ordano.1993. Nuevos registros de aves para Sierra Grande, departamentos San Alberto, Santa María y Punilla, provincia de Córdoba, República Argentina. Nótulas Faunísticas 48: 1-5.

Baldo, J. L., M. Ordano, Y. Arzamendia y A. R. Giraudo.1995. Nuevos registros de aves para las provincias de Santa Fe y Corrientes, República Argentina. Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral 26: 55-59.

Baliño, J. J. y F. J. Biole.1984. La avifauna de nuestros Parques Nacionales. Nuestras Aves 5: 28-30.

Baliño. J. 1984. Aves del Parque Nacional El Palmar, lista sistemática y otras contribuciones a su conocimiento. Rev. Mus. Arg. Cs. Nat. Zool. 13: 499-511.

Baliño. J. 1984. Aves del Parque Nacional El Palmar, lista sistemática y otras contribuciones a su conocimiento. Rev. Mus. Arg. Cs. Nat. Zool. 13: 499-511.

Baptista, L. F., P. W. Trail y H. M. Horblit. 1997. Family Columbidae (Pigeons and Doves). Pp. 60-243 en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 4. Sandgrouse to Cuckoos. Lynx Edicions, Barcelona.

Barbetti, R., A. Ronchetti y J. C. Chebez. 1985. Refugio Educativo de la Ribera Norte, Pdo. de San Isidro, Provincia de Buenos Aires. Informe Inédito. Fundación Vida Silvestre Argentina. Buenos Aires.

Barrionuevo, C., D. Ortiz y M. Castillo. 2009a. Presencia y distribución de algunas aves de ambientes acuáticos de la provincia de Catamarca, Argentina. Xolmis 4: 27-33.

Barrionuevo, C., D. Ortiz y P. Capllonch. 2008. Nuevas localidades de la Lechucita canela (*Aegolius harrisii dabbenei*) (Strigidae) para la Argentina. Nuestras Aves 53: 45-47.

Barros, R. 1930. Sobre algunas aves de la Alta Cordillera de Mendoza. Rev. Chil. de Hist. Nat. 34: 312-320.

Barrows, W. 1884a. Birds of the lower Uruguay. Bull. Nuttall Orn. Club, 8, Auk 1 (2): 109-113.

Barrows, W. 1884b. Birds of the lower Uruguay. Bull. Nuttall Orn. Club, 8, Auk 1 (3): 270-278.

Barrows, W. 1884c. Birds of the lower Uruguay. Bull. Nuttall Orn. Club, 8, Auk 1 (4): 313-319.

Barrows, W. 1884d. Birds of the lower Uruguay. Bull. Nuttall Orn. Club, 8, Auk 1 (1): 20-30.

Beaudoin, F. and V. Ojeda. 2011. Nesting of Rufous-legged Owls in Evergreen *Nothofagu*s Forests. Journal of Raptor Research, 45: 272-274.

Belcher, C. F.1936.Nota sobre la Agachona, *Thinocorus rumicivorus*. Hornero 6: 313-314.

Bellocq, M. I. 1987a. Estudio estacional de la dieta de *Athene cunicularia* en agroecosistemas. Pp. 13 *in* Decimotercera Reunión Argentina de ecología (Bahía Blanca, Argentina).

Bellocq, M. I. 1987b. Roedores predados por *Tyto alba* en ecosistemas agrarios. Pp. 28 *in* Terceras Jornadas Argentinas de mastozoología (Vaquerías, Valle Hermoso, Argentina).

Bellocq, M. I. 1987c. Selección de hábitat de caza y depredación diferencial de *Athene cunicularia* sobre roedores en ecosistemas agrarios. Revista Chilena de Historia Natural 60: 81-86.

Bellocq, M. I. 1988. Dieta de *Athene cunicularia* (Aves, Strigidae) y sus variaciones estacionales en ecosistemas agrarios de la pampa argentina. Physis Secc. C. Cont. Org. Terr. 46 (140): 17-22. Buenos Aires.

Bellocq, M. I. 1990. Composición y variación temporal de la dieta de *Tyta alba* en ecosistemas agrarios pampeanos, Argentina. Vida Silv. Neotrop. 2: 32-35.

Bellocq, M. I. 1997a. Diet of the *Tyto alba* (Strigiformes) in Argentina: Synthesis and implications. Pp. 13 *in* Decimoctava Reunión Argentina de ecología (Buenos Aires, Argentina).

Bellocq, M. I. 1998. Prey Selection by Breeding and Nonbreeding Barn Owl in Argentina. The Auk 115: 224-229. PDF

Bellocq, M. I. 2000.A review of the trophic ecology of the Barn Owl in Argentina. J. Raptor Res. 34: 108-119. PDF

Bellocq, M. I. y F. O. Kravetz. 1983. Algunos rasgos de la predación de *Athene cunicularia* sobre roedores en agroecosistemas pampeanos argentinos. 1 Sympo. Ornit. Neotrop. Perú. Pp. 55-60.

Bellocq, M. I. y F. O. Kravetz. 1990. Efecto de la depredación de *Athene cunicularia* (Aves, Strigidae) en la regulación poblacional de roedores. Pp. 168 *in* Reunión conjunta Sociedad Argentina para el Estudio de los mamíferos-American Society of Mammalogists (Buenos Aires, Argentina). Resumen.

Bellocq, M. I. y F. O. Kravetz. 1994. Feeding strategy and predation of the Barn owl (*Tyto alba*) and the Burrowing owl (*Speotito cunicularia*) on rodent especies, sex, and size, in agrosystems of central Argentina. Ecología Austral 4: 29-34.

Bellocq, M. I. y F. O. Kravetz.1993. Productividad de la lechuza de campanario (*Tyto alba*) en nidos artificiales en agrosistemas pampeanos. Hornero 13: 277-312.

Bellocq, M. I.1993. Reproducción, crecimiento y mortalidad de la Lechucita vizcachera (*Speotyto cunicularia*) en agrosistemas pampeanos. Hornero 13: 272-276.

Bellocq, M. I.1997b. Ecology of the Burrowing Owl, in agrosystems of central Argentina. J. Raptor Res. 9: 52-57.

Beltzer, A. H. 1984c. Alimentación de *Phaetusa simplex* (Gmelin, 1789) (Aves, Sternidae) en el valle aluvial del río Paraná medio, Argentina. Iheringia, Sér.Zool. Porto Alegre 64: 47-52.

Beltzer, A. H. 1986b.Ecologie alimentaire de *Tringa flavipes* (Gmelin, 1789) (Oiseaux:Scolopacidae) dans la lacune del Cristál (Santa Fe, Argentine). Bol. Zool. Univ. S. Paulo 10: 87-94.

Beltzer, A. H. 1986d.Nota sobre la alimentación de *Charadrius collaris* "Chorlito de collar" (Aves: Charadriidae) en la laguna del Cristal (Santa Fe, Argentina). Bol. Asoc. Cienc. Nat. Litoral 6: 5-9.

Beltzer, A. H. 1988a.Alimentación de *Calidris fuscicollis* Vieillot, 1819 (Aves, Scolopacidae) en la laguna Del Cristál, Cuenca del Saladillo, Santa Fe, Argentina. Iheringia, Sér. Misc. (02): 53-62. Porto Alegre.

Beltzer, A. H. 1991a. Aspects of the foraging ecology of the Waders *Tringa flavipes, Calidris fuscicollis* and *Charadrius collaris* (Aves: Scolopacidae; Charadriidae) in del Cristal Pond (Santa Fe, Argentine). Studies on Neotropical Fauna end Environmente 26: 65-73.

Beltzer, A. H. 1995.Biología alimentaria del Pirincho común *Guira guira* (Aves: Cuculidae) en el Valle Aluvial del río Paraná Medio, Argentina. Rev. Ecol. Latinoamericana (Venezuela) 2: 13-18.

Beltzer, A. H. y G. Paporello de Amsler. 1984. Food and feeding habits of the Wattled *Jacana jacana* (Charadriformes: Jacanidae) in Middle Parana River floodplain. Studies on Neotropical fauna and environment, 19: 195-200.

Beltzer, A. H. y M. Quiroga. 2008. Alimentación del cuclillo canela (*Coccyzus melacoryphus*) en la isla Carabajal, Santa Fe, Argentina. Natura Neotropicalis 39: 7-17.

Beltzer, A. H. y R. C. Lajmanovich. 1991. Aportes al conocimiento de la alimentación de algunos chorlos(Aves: Charadriidae y Scolopacidae) en el Paraná medio, Argentina. Resúmenes IV Jor. Cienc. Nat. del Litoral: 12. Santa Fe.

Beltzer, A. H. y R. C.Lajmanovich. 1990. Aportes al conocimiento de la alimentación de algunos chorlos (Aves: Charadriidae y Scolopacidae) en el

Paraná medio, Argentina. Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral 21: 175-182.
Beltzer, A. H., M. A. Quiroga y A. L. Bortoluzzi. 2003-2004. Variación estacional de la comunidad de aves en un ambiente lenítico del valle de inundación del río Paraná. Natura Neotropicalis 34 y 35: 33-37.
Beltzer, A. H., M. A. Quiroga, C. F. Reales y V. G. Alessio. 2009. Espectro trófico, ritmo circadiano de actividad alimentaria y uso del hábitat del Pirincho negro *Crotophaga ani* (Aves: Cuculidae) en el valle de inundación del Río Paraná Medio, Argentina. Revista FABICIB. Vol. 13: 157-165.
Beltzer, A. H., P. A. Collins y M. A. Quiroga. 2006. Atlas ornitogeográfico de la provincia de Entre Ríos. Serie Climax Nº 13.Ceride-Conicet. Santa Fe.
Beltzer, A. H., Salusso, M. L. Ríos de y Bucher, E. H. 1988. Alimentación del Ñacundá (*Podager nacunda*) en Paraná (Entre Ríos). Hornero 13: 47-52.
Beltzer, A. H., Tomatis, M. F. y F. Díaz. 2001. Nota sobre la dieta del Gavilán Planeador *Circus buffoni* (Aves. Accipitridae) en el valle de inundación del río Paraná, Argentina. Rev. FABICIB 5: 159-161.
Beltzer, A. H.1981c. Lista preliminar de las aves del departamento La Paz (Entre Ríos, Argentina). I. No Passeriformes. Historia Natural 2: 53-56.
Beltzer, A. H.1986c. Estudio preliminar de la avifauna de la Laguna del Cristal (Cuenca del río Saladillo, Santa Fe, Argentina). Historia Natural 8: 65-74.
Bennett, A. G. 1920. Breves notas sobre las aves antárticas. El Hornero 2: 25-34.
Bergkamp, P. Y. 1995a. Concentrations of Manx Shearwater off San Antonio, Río Negro, Argentina. Seabird 17: 74.
Bernasconi, F. 2014. Primer registro documentado de Ermitaño canela (*Phaethornis pretrei*) en la provincia de Corrientes. Nuestras Aves 59: 11.
Berón, M. P., M. Favero y T. A. Luppi.2005. Selectividad de presa y eficiencia de alimentación en Gaviotas de olrog (*Larus atlanticus*) alimentándose en la laguna costera Mar Chiquita. XI RAO: 65. Buenos Aires.
Berón, M. P.2003. Dieta de juveniles de Gaviota cangrejera (*Larus atlanticus*) en estuarios de la provincia de Buenos Aires. Hornero 18: 113-117.
Bertelli, S., M. Morfulis, R. Aragón, L. R. Malizia y T. Lomáscolo. 1997. Segunda cita de *Colibri thalassinus* para Argentina. Hornero 14: 269.
Bertellotti, M. y P. Yorio. 1998. Aprovechamiento de descartes pesqueros por la Gaviota cocinera: diferencias en estrategias y éxito de forrageo según la clase de edad. X RAO: 7. Mar del Plata.
Bertellotti, M., A. Carribero y P. Yorio. 1995. Aves marinas y costeras coloniales de la Península Valdés: revisión histórica y estado actual de sus poblaciones. Informes Técnicos del Plan de Manejo de la Zona Costera Patagónica. Fundación Patagonia Natural (Puerto Madryn) Nº 1: 1-21.
Bertellotti, M., G. Pagnoni y P. Yorio. 1998a. Selección de presas por la Gaviota cocinera en función de la disponibilidad de alimento en intermareales arenosos de Península Valdés. Resúmenes X RAO: 6. Mar del Plata.
Bertellotti, M., G. Pagnoni y P. Yorio.2003. Comportamiento de alimentación de la Gaviota cocinera (*L. dominicanus*) durante la temporada no reproductiva en playas arenosas de P. Valdés, Argentina. Hornero 18 (1): 37-42.
Bertellotti, M., P. Yorio, G. Blanco, y M. Giaccardi. 2001. Use of tips by nesting Kelp gulls at a growing colony in Patagonia. Journal of Field Ornithology 72: 338-348.
Bertonatti, C. C. y P. E. Sutton. 1986. Notas sobre dos especies de la avifauna del partido de Mar Chiquita (Provincia de Buenos Aires). Nuestras Aves 10: 12-13.
Bertonatti, C. y S. Heinonen Fortabat.1988. Dos especies nuevas para la provincia del Chaco, República Argentina. Nótulas Faunísticas 14: 1-3.
Bertoni, A. de W.1913. Contribución para un catálogo de aves argentinas. An. Soc. Cient. Arg. 75: 64-102.
Bertoni, A. de W.1939. Revista Sociedad Científica. Paraguay, 4: 1-59.
Bettinelli, M. D. y J. C. Chebez.1986. Notas sobre aves de la meseta de Somuncurá, Río Negro, Argentina. Hornero 12: 230-234.
Bianchini, M. 2014a. Aportes tróficos para la avifauna Argentina. Biológica. N° 17: 65-68.
Bianchini, M. y C. Arenas. 2013b. Nuevos registros de aves accidentales y aportes a la distribución geográfica de algunas especies de aves para la Argentina. Parte I: No passeriformes. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 128: 1-11.
Bianchini, M. y C. Arenas. 2014a. Primer registro documentado del Playerito blanco (Calidris alba) para la provincia del Neuquén, Patagonia, Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie). 145 1-4.
Bianchini, M. y C. Arenas. 2014b. Registros documentados de aves con picos deformados en Argentina. Nuestras Aves 59: 12-13.

Biancucci, L.1995. Una nueva especie para la avifauna cordobesa y nuevas localidades para otras seis. Hornero 14: 76.

Blanco, D., H. Rodriguez Goñi y G. Pugnali.1992. La importancia de Punta Rasa, Buenos Aires, en la migración del Chorlo rojizo (*Calidris canutus*). Hornero 13: 203-206.

Blanco, G., P. Yorio y M. Bertellotti. 1998. Depredación diferencial y éxito de eclosión en el Gaviotín sudamericano: el valor adaptativo del color del huevo. X RAO: 9-10. Mar del Plata.

Blendinger, P. 1986. Nido de Gallito de agua. Nuestras aves 9: 13.

Blendinger, P. G. 2005. Abundance and Diversity of small-bird assemblages in the Monte desert, Argentina. J. Arid Environm. 61: 567-687.

Blendinger, P. G. y M. E. Alvarez. 2002. Ensamble de aves de los bañados de Carilauquen (Laguna Llancanello, Mendoza, Argentina) consideraciones para su conservación. Hornero 17: 71-83.

Blendinger, P. G. y R. A. Ojeda. 2001. Seed supply as a limiting factor for granivorous bird assemblages in the Monte Desert, Argentina. Austral Ecology, 26 : 413-422.

Blendinger, P. G., P. Capllonch y M. E. Alvarez.2004. Abundance and distribution of raptors in the Sierra de San Javier Biological Park, Northwestern Argentina. Ornit. Neotropical 15: 501-512.

Blendinger, P. G.1998. Registro de aves poco frecuentes en la Argentina y sector antártico argentino. Nuestras Aves 38: 5-8.

Blendinger, P., E. De Lucca y M. Saggese. 1987. Nidificación otoño-invernal del Lechuzón orejudo. Nuestras Aves 12: 19.

Bó, M. S. 1999. Dieta del halcón plomizo (*Falco femoralis*) en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Ornitología Neotropical 10: 95-99.

Bó, M. S., Cicchino, S. M. y M. M. Martínez. 1996. Diet of Long-winged Harrier (*Circus buffoni*) in Southeastern Buenos Aires Province, Argentina. J. Raptor Res. 39: 237-239.

Bó, M. S., S. M. Cicchino y M. Martinez. 2000c. Diet of breeding Cinereus Harrier (*Circus cinereus*) in southeastern Buenos Aires Province, Argentina. J. Raptor Res. 34 (3): 237-241.

Bó, N. A. 1958. Nota sobre una colección de aves del este de Chubut. Rev. Mus. La Plata. Zool. VII: 35-50.

Bó, N. A. 1961. La presencia en la Argentina de la Paloma de ojos desnudos *Gymnopelia ceciliae gymnops* (Chubb). Neotrópica 7: 80.

Bó, N. A., C. A. Darrieu y A. R. Camperi. 1995. Fauna de agua dulce de la República Argentina. Charadriiformes: Laridae y Rynchopidae. Vol. 43 (4C): 1-47. PROFADU (CONICET).

Bó, N. A.1965b. Notas preliminares sobre la avifauna del nordeste de San Luis.Hornero 10: 251-268.

Bodrati, A. 2004b. El Curiango (*Nyctidromus albicollis*). Presencia, fenología y nidificación en la provincia del Chaco, Argentina. Nuestras Aves 47: 34-36.

Bodrati, A. 2004d.Nuevos aportes a la distribución del Lechuzón negruzco (*Asio stygius*) en el noreste argentino. Nuestras Aves 47: 26-28.

Bodrati, A. 2005c. Nuevos aportes a la distribución de algunas especies de aves argentinas. Nuestras Aves 50: 30-33.

Bodrati, A. 2005d. Barra Concepción. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 310-311. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.

Bodrati, A. 2006b. El árbol frutal de la selva misionera, Yabotikaba. Naturaleza y Conservación. 18: 10-15.

Bodrati, A. y A. Pietrek. 2000. Relevamiento de los recursos biológicos del Parque Provincial “Pampa del Indio” (Departamento Libertador Gral. San Martín, Chaco). AOP. Inf. Inéd. Buenos Aires.

Bodrati, A. y C. Ferrari. 2014. Notas sobre 36 especies de aves nuevas o poco conocidas para la provincia de La Rioja, Argentina. Nuestras Aves 59: 30-42.

Bodrati, A. y E. Haene. 2008. Planta que atraen aves. Chal-chal o koku. Aves argentinas revista de Naturaleza y conservación. Nº 18: 16-17.

Bodrati, A. y J. Baigorria. 2013. El Atajacaminos ocelado (*Nyctphrynus ocellatus*) en Argentina: distribución, abundancia y reproducción. Nuestras Aves 58: 75-84.

Bodrati, A. y J. I. Areta. 2010. Dos nuevos dormilones para la avifauna Argentina (*Chordeiles acutipennis* y *Caprimulgus maculicaudus*) y comentarios sobre hábitat, comportamiento y geonemia en Paraguay. Hornero 25 (2): 67-73.

Bodrati, A. y J. Klavins. 2014. Presencia y estacionalidad del Picaflor de antifaz (*Polytmus guainumbi*) en Misiones, Argentina. Nuestras Aves 59: 43-45.

Bodrati, A. y J. Klavins.2004a. El Añapero castaño (*Lurocalis semitorquatus*) en el Chaco de Paraguay y la Argentrina. Nuestras Aves 47: 24-25.
Bodrati, A. y J. Klavins.2004b. La Palomita azulada (*Claravis pretiosa*) en el Chaco de Paraguay y la Argentrina. Nuestras Aves 47: 17-19.
Bodrati, A. y K. Cockle. 2006a. Habitat, distribución and conservation of Atlantic Forest birds in Argentina: notes on nine rare or threatenes species. Ornitología Neotropical 17: 243-258.
Bodrati, A. y K. Cockle. 2006b. New records of rare and threatened birds from the revista ornit Forest of Misiones, Argentina. Cotinga 26: 20-24.
Bodrati, A. y K. Cockle. 2008. La Torcaza Alas Blancas (*Zenaida meloda*): Una nueva especie para la avifauna argentina. Hornero 23: 35-36.
Bodrati, A. y K. Cockle. 2012. El Atajacaminos coludo *Macropsalis forcipata* en Argentina : ¿una especie amenazada o en expansión ?. Cotinga 34: OL 46-54.
Bodrati, A. y K. Cockle. 2013. Distribution, nesting and vocalizations of the Black-banded Owl (*Ciccaba huhula albomarginata*) in Argentina. Ornitología Neotropical, 24: 169-182.
Bodrati, A. y S. A. Salvador. 2013a. Aportes al conocimiento de aspectos reproductivos de la Paloma montera castaña (*Geotrygon montana*) en Argentina. Nuestras Aves 58: 72-75.
Bodrati, A. y S. A. Salvador. 2013b. Nidificación de la Yerutí colorada (*Leptotila rufaxilla reichenbachii*) en Misiones, Argentina. Nuestras Aves 58: 85-86.
Bodrati, A. y S. A. Salvador. 2015a. Termitas (Isoptera, Blattodea, Insecta) en la dieta de las aves argentinas. Historia Natural. Tercera Serie Volumen 5 (1): 77-89.
Bodrati, A. y S. Salvador. 2015b. Curutié blanco (*Cranioleuca pyrrhophia*), Pijuí corona rojiza (*Synallaxis ruficapilla*) y Picochato grande (*Tolmomyias sulphurescens*): Hospedadores de cría del Crespín (*Tapera naevia*). Nuestras Aves 60: 15-18.
Bodrati, A., C. Maders, K. Cockle, G. Pugnali y G. Di Santo. 2008b. El Picaflor amatista (*Calliphlox amethystine*) en la Argentina. Nuestras Aves 53:39-41.
Bodrati, A., E. Mérida y L. Montenegro.2003. Nidificación del Picaflor andino común (*Oreotrochilus leucopleurus*) en el parque nacional El Leoncito, provincia de San Juan, Argentina. Nuestras Aves 45: 26-28.
Bodrati, A., E. Mérida, G. Bodrati y E. Sierra. 2006b. Avifauna del talar de Vuelta de Obligado y de sus ambientes contigüos. San Pedro, Provincia de Buenos Aires, Argentina. En : Mérida, E. y J. Athor (Editores). Talares bonaerenses y su conservación. Fundación de Historia Natural "Félix de Azara". Buenos Aires.
Bodrati, A., G. Bodrati y C. A. Ferrari.1997a. Presencia del Atí (*Phaetusa simplex*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 37: 6-7.
Bodrati, A., G. Bodrati y H. Fernández.2001b. Notas sobre la avifauna del norte de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 41: 17-21.
Bodrati, A., G. Bodrati, C. Ferrari, E. Mérida y E. Haene. 1997b. Notas sobre la avifauna de Baradero, provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 37: 2-4.
Bodrati, A., J. I. Areta y E. White. 2012b. La avifauna de la Posada y Reserva Puerto Bemberg, Misiones, Argentina. Nuestras Aves 57: 63-80.
Bodrati, A., J. I. Areta, P. Cowper Coles, N. C. Mayer y Z. M. Machado. 2012c. La Suinda kaaguí (*Asio virgata*) habita la región chaqueña. Nuestras Aves 57: 29-31.
Bodrati, A., K. Cockle, J. M. Segovia, I. Roesler, J. I. Areta y E. Jordán. 2010b. La avifauna del Parque Provincial Cruce Caballero, Provincia de Misiones, Argentina. Cotinga 32: 41-64.
Bodrati, A., K. Cockle, J. M. Segovia, J. I. Areta y E. Mérida. 2010a. La Paloma trocal (*Patagioenas speciosa*) en Argentina. Nuestras Aves 55: 9-11.
Bodrati, A., P. Cowper Coles y N. Meyer. 2006a. Nuevo registro documentado del Lechuzón negruzco (*Asio stygius*) en la provincia del Chaco, Argentina. Nuestras Aves 51: 31-32.
Bodrati, A.2001. Notas sobre aves infrecuentes o poco conocidas para la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 41: 13-17.
Boletta, P. E., R. Vides-Almonacid, R. E. Figueroa y M. T. Fernández. 1995. Cambios fenológicos de la selva basal de Yungas en Sierra de San Javier (Tucumán-Argentina) y su elación con la organización estacional de las comunidades de aves. En: A. D. Brown y H. R. Grau (eds). Investigación, conservación y desarrollo en selvas subtropicales de montaña. L.I.E.Y. pp. 103-114.
Bollero, V. y R. Ramírez. 2012. Relevamiento de la avifauna de Laguna El Hinojo, Venado Tuerto, Santa Fe, Argentina. Período 2009/2011. Biológica 15: 119-126.
Bonkewitzz , A. N. 1990. Fauna de vertebrados de la laguna Guatraché. Universidad Nacional del Sur. Dpto. de Biología. Bahía Blanca, 103 pp.

Boswall, J. 1973. Supplementary notes on the birds of Point Tombo, Argentina. Bull. B.O.C: 93: 33-36.
Boswall, J. y Prytherch, R. 1972. Some notes on the birds of Point Tombo, Argentina. Bull. Brit. Orn. Club 92: 118-129.
Bradley, C. L, P. S. Humphrey y M. C. Thompsom. 1985. Notes on coastal birds of Puerto Melo, Chubut, Argentina. Bull. Brit. Orn. C. 105: 17-21.
Brandán, Z. J. 2005. Avifauna de un sector del Bosque de transición Tucumano, en diferentes condiciones de uso. Acta Zoológica Lilloana, 49 (1-2): 3-8.
Brandán, Z. J. y C. I. Navarro. 2009. Lista actualizada de las aves de la provincia de Tucumán. Fundación Lillo. Tucumán.
Brandán, Z. J. y C. M. Antelo. 2000. Comparación de la avifauna invernal en tres localidades del Bosque de transición (Tucumán-Argentina). Acta Zoológica Lilloana, 45 (2): 257-262.
Brandán, Z. J., N. L. Marigliano, C. I. Navarro y C. M. Antelo. 2006. Estructura y composición específica de la comunidad de aves de un área suburbana de la provincia de Tucumán, Argentina. Acta Zoológica Lilloana, 50 (1-2): 47-53.
Brandán, Z. y C. Antelo. 2009. Composición y variaciones estacionales de la avifauna de un ambiente antropizados (San Pablo, Tucumán, Argentina). Acta Zoológica Lilloana, 53 (1-2): 98-103.
Brandolín, P., R. Martori y M. Ávalos. 2007. Variaciones temporales de los ensambles de aves de la reserva natural de fauna Laguna La Felipa (Córdoba, Argentina). Hornero 22: 1-8.
Brayton, A. F. y Scheider, D. C. 2000. Shorebird abundance and invertebrate density during the boreal winter and spring at Península Valdés, Argentina. Waterbirds 23: 277-282.
Brocca, J. L. 1997. Informe Reserva Natural Otamendi. Informe inédito, 49 páginas.
Brodkorb, P. 1928. Geografhic variation in *Thinocorus orbignyanus* Geoffroy and Lesson- Auk 45 (4): 499-500.
Brodkorb, P. 1934. Geografhic variation in *Belonopterus chilensis* (Molina). Occasional Papers of the Museum of Zoology University Michigan 293: 1-13.
Brown, R. G. B., Cooke, F., Kinnear, P. K. y E. L. Mills. 1975. Summer seabird distributions in Drake Passage, the Chilean fjords and off southern South America. Ibis 117: 339-356
Bruce, M. D. 1999. Family Tytonidae (Barn-Owls). Pp. 34-75, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 5. Barn-Owls to Hummingbird. Lynx Edicions, Barcelona.
Bruno, F. 2009. Nuevos registros de gaviotines (Familia Sternidae) en la provincia de La Pampa. Argentina. Xolmis 4: 7-8
Bruno, F. y M. Erro. 2010. Nuevas observaciones de aves poco comunes en la provincia de La Pampa, Argentina, incluyendo al casi amenazado Tachurí canela (*Polystictus pectoralis*). Biológica Nº 12: 75-77
Bruno, F. y Morici, A. 2009. Torcacita Colorada (*Columbina talpacoti*) en las Provincias de La Pampa y Buenos Aires". Xolmis Nº 4: 17-18.
Bruno, F., D. Acevedo, J. L. Maceda y M. I. Mero. 2007. Reserva Natural Municipal Chadilauquen. Aves. Municipalidad de Embajador Martini. La Pampa.
Bucher, E. H. 1970. Consideraciones ecológicas sobre la paloma *Zenaida auriculata* como plaga en Córdoba. Ministerio de Economía y Hacienda. Dirección Provincial de Asuntos Agrarios. Serie Ciencia y Técnica Nº 1: 1-11.
Bucher, E. H. e I. E. Di Tada. 1975. Determinación de la edad en pichones de la paloma Torcaza (*Zenaida auriculata chrysauchenia*). Physis. Sec. C. 34: 83-89.
Bucher, E. H. y A. Orueta. 1977. Ecología de la reproducción de la Paloma *Zenaida auriculata* . Ecosur 4: 157-185.
Bucher, E. H. y G. Herrera. 1981. Comunidades de aves acuáticas de la laguna Mar Chiquita (Córdoba, Argentina). Ecosur, 8 (15): 91-120.
Bucher, E. H. y M. Nores. 1973. Alimentación de pichones de la Paloma *Zenaida auriculata* Hornero 11: 209-216.
Bucher, E. H. y M. Nores. 1976. Ecología de la alimentación de la Paloma *Zenaida auriculata* Physis 35: 17-32.
Bucher, E. H., M. T. Ferrero de Roque y A. Orueta. 1977. Caracterización de los estadios de incubación en huevos de la paloma Torcaza (*Zenaida auriculata*) Physis 36: 163-168.
Budin, E. 1931. Lista y notas sobre aves del N.O. Argentino (Prov. de Jujuy) Hornero 4: 401-411.
Burger, A. E. 1981. Food and foraging behaviour of Lesser Sheathbills at Marion Island. Ardea 69: 1676-180.
Burger, A. E. 1996. Family Chionidae (Sheathbills), Pp. 546-555, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J.

eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 3. Hoatzin to Auks. Lynx Edicions, Barcelona.
Burger, J. y M. Gochfeld.1996. Family Laridae (Gulls). Pp.572-623, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 3. Hoatzin to Auks. Lynx Edicions, Barcelona.
Burger, J. y M. Howe. 1975. Notes on winter feeding behavior and molt in Wilson´s Phalaropes. The Auk 92: 442-451.
Burgos, F. G., J. L. Baldo y F. M. Cornell. 2009. Lista de las aves de la Provincia de Jujuy, Argentina. Secretaría de Turismo y Cultura de Jujuy. S. S. de Jujuy.
Burmeister, H. 1861. Reise durch die La Plata-Staaten, mit besonderer Riicksicht aufdie physische. Beschaffenheit und der Culturzustand der Argentinischen Republik. Ausgefuht in den Jehren 1857, 1858, 1859, und 1860. H. W. Schmid, Halle, Vol. 1, 503 pp. Vol. 2, 538 pp.
Burmeister, H. 1890. Expedición a Patagonia. Anales del Museo Nacional de Buenos Aires. 3: 253-321.
Cabezas, R. 1988. Fauna silvestre jujeña. Diagnóstico, densidad poblacional y distribución geográfica. Dirección de Bosques, Caza y Pesca. Secretaría de Asuntos Agrarios. Gobierno de la provincia de Jujuy.
Cabré, C. D., R. Lejarraga y N. L. Gutierrez. 2008. Registros de picaflor gigante (*Patagonas gigas*) en Villa Ventana, provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 53: 21.
Calí, R., D. Unterkofler, F. Martínez y J. Raggio. 2008. Aves silvestres de Mendoza. YPF. Buenos Aires.
Callicó Fortunato, R., D. De Tomaso y P. Teta. 2008. Dieta de *Athene cunicularia* en el centro sur de la provincia de La Pampa, Argentina. Libro de Resúmenes. XII RAO: 73.
Calvelo, S., A. Trejo y V. Ojeda. 2006. Botanical composition and structure of hummingbird nest in different habitats from northwestern Patagonia (Argentina). Jour. of Natural History 40 (9-10): 589-603.
Camperi, A. R. 1992c. Estudio sobre aves colectadas en el extremo sudeste de la provincia de Buenos Aires. Neotrópica 38: 127-140.
Camperi, A. R. 1998. Avifauna Andinopatagónica, lista comentada de especies. Physis Sec. C. 56 (130-131): 33-46.
Camperi, A. R. y C. A. Darrieu. 2001a. Nuevos registros para aves de la Argentina. Neotrópica, 47: 107-108.
Camperi, A. R. y C. A. Darrieu. 2004. Avifauna de la provincia de San Juan, lista comentada de especies. Rev. Mus. Arg. Cs. Nat. (n.s.) 6 (1): 147-164. Buenos Aires.
Camperi, A. R. y C. A. Darrieu. 2005. Aves del Alto Valle del Río Negro, Argentina. Rev. Mus. Arg. Cs. Nat. (n.s.) 7 (1): 51-56. Buenos Aires.
Camperi, A. R. y C. A. Darrieu.2000 (2001b). Estudio de una colección de aves del sur de la provincia de Misiones. Physis Sec. C. 58 (134-135): 79-83.
Camperi, A. R. y C. A. Darrieu.2000. (2001a). Avifauna de Catamarca: Lista comentada de especies (No-passeriformes) Physis Sec. C. 58 (134-135): 67-78.
Camperi, A. R., C. A. Darrieu y M. Juárez. 2008. Avifauna de la provincia de La Rioja (Argentina): lista comentada de especies. Acta Zoológica Lilloana 52 (1-2): 76-97.
Camperi, A. R., C. A. Darrieu, P. G. Grilli y F. Burgos. 2012. Avifauna de la provincia de Jujuy, Argentina: lista de especies (no Passeriformes). Acta Zoológica Lilloana 56 (1-2): 82-140.
Camperi, A. R.1990. Notas sobre una colección de aves del río Santa María, Salta, Argentina. Hornero 13: 147-151.
Canavelli, S., M. E. Zaccagnini, J. Torresín, N. Calamari, M. de la Paz Duccomun y P. Capponch. 2004. Monitoreo extensivo de aves en el centro-sur de Entre Ríos. Insugeo, Miscelánea 12: 349-362.
Canepuccia, A. D, Martinez, M. M. y A. I. Vassallo. 2007. Selection of waterbirds by Geoffroy's cat: Effects of prey abundance, size, and distance. Mammals Biol. 72: 163-173.
Canevari, M., P. Canevari, G. R. Carrizo, G. Harris, J. Rodríguez Mata y R. J. Straneck.1991b. Nueva guía de las aves argentinas. Tomos I y II. Fundación Acindar.
Canevari, P. 1979. Aves del lago Pellegrini. Resúmenes 1º Encuentro Iberoamericano de Ornitología y mundial de Ecología y Comportamiento de las Aves: 36. Buenos Aires.
Canevari, P., D. E. Blanco, E. Bucher, G. Castro e I. Davidson. 1998. Los humedales de Argentina. Clasificación, situación actual, conservación y legislación. Wetlands International, Nº 46, 202 pp.
Cano, P. D., C. Saibene, M. L. Chatellenaz, H. A. Ball y A. Vallejos. 2010. Adiciones a la avifauna del Parque Nacional Mburucuyá, Corrientes, Argentina. FACENA 26: 43-52.
Capllonch, P. 1998. La avifauna de los bosques de Transición del Noroeste Argentino. Tesis doctoral,

Facultad de Ciencias Naturales e Instituto M. Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, 157 pp.
Capllonch, P. 2011. Ruta del Batitú (*Bartramia longicauda*) a través de la provincia de Tucumán, Argentina. Nuestras Aves 56: 19-20.
Capllonch, P. y O. Quiroga. 2013. Comentarios sobre la biología del Tero serrano (*Vanellus resplendens*) en el noroeste de la Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 121: 1-5.
Capllonch, P. y R. Aráoz.2007. Aves de los Jardines de Yerba Buena. Tucumán.
Capllonch, P., C. A. Alderete, R. Aráoz, E. Barboza, J. C. Mamaní, D. Ortiz, W. E. Pérez Bogado, O. B. Quiroga y K. Soria. 2015. Observaciones y capturas de aves poco conocidas en el norte de Argentina. Nuestras Aves 60:76-82.
Capllonch, P., D. Ortiz y I. Ferro. 2011b. Notas sobre la avifauna de las Cumbres Calchaquíes, Tucumán, Argentina. Acta Zoológica Lilloana 55 (1): 50-63.
Capllonch, P., Lobo, R., Ortiz, D. y R. Ovejero. 2005a. La avifauna de la selva de galería en el noreste de Corrientes, Argentina: Biodiversidad, patrones distribución y migración. Insugeo, Miscelánea, 14: 483-498.
Capllonch, P.2007a. Aves de Tafí del Valle. Tucumán. Argentina.
Capmourteres, V., V. Bauni, J. M. Meluso, S. Bogan y M. Homberg. 2015. Aves de la Reserva Natural Campo San Juan, Misiones: descripción e implicancias para su conservación. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 171: 1-14.
Capurro, H. A. y E. H. Bucher. 1982. Poblaciones de aves granívoras y disponibilidad de semillas en el bosque chaqueño de Chamical. Ecosur, 9: 117-131.
Capurro, H. A. y E. H. Bucher. 1986. Variación estacional en la comunidad de aves del bosqu echaqueño de Chamical. Physis, Secc. C, 44: 1-6.
Capurro, H. A. y E. H. Bucher.1988. Lista comentada de las aves del bosque chaqueño de Joaquín V. González, Salta, Argentina. Hornero 13: 39-46.
Carma, M. I. 2009. Relevamiento de aves de la provincia de Catamarca. Consejo Federal de Inversiones.
Carman, R. L. 1971a. En torno de la paloma picazuro y su postura. Hornero 11: 126-127.
Carman, R. L. 1975. Apuntes sobre la distribución de la Picazuro en la provincia de Buenos Aires. Hornero 11: 305-306.
Carman, R. L. 1979. Fase juvenil overa en *Zenaida auriculata.* Hornero 12: 39-40.
Carman, R. L. 1987c. Sobre alimentación de aves. Nuestras Aves 12: 9.
Carman, R. L.1980. *Piaya cayana* en Buenos Aires. Hornero 12: 54.
Carrera, J., F. J. Fernández, F. P. Kacoliris, L. Pagano y I. Berkunsky. 2008. Field notes on the breeding biology and diet of Ferruginous Pygmy-Owl (*Glaucidium brasilianum*) in the dry of Argentina. Ornit. Neotrp. 19: 315-319.
Carrete, M. y K. Delhey. 1997. La Gaviota de Olrog. Entre canales y cangrejos. Nuetras aves 37: 11-12.
Carrete, M., J. K. V. Delhey y M. M. Martínez. 1996a. Ecología alimentaria de *Larus atlanticus* en la ría de Bahía Blanca (Pcia. Bs.As.). Resultados preliminares. IX RAO: 11. Buenos Aires.
Carrillo, S. M. 2015. Primer registro de Gaviota garuma (*Leucophaeus modestus*) en territorio continental argentino. Revista Nº 5. Artículo Nº 5: 10-11.
Carrizo, M. A., P. A. Seewald y F. Rodrigo Tizón. 2001. Notas sobre la avifauna del partido de Saavedra, provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 42: 31.
Casares, J. 1939. Notas sobre la distribución del Gaviotón de cola blanca y negra (*Larus belcheri* Vigors). Hoenro 7: 286-287.
Casares, J.1938. Guía del Parque Nacional Nahuel Huapi (Aves de Nahuel Huapi). Dirección de Parques Nacionales.
Casares, J.1944b. Aves de Estanzuela. San Luis. Hornero 8: 379-463.
Casas, A. E. y M. R. de la Peña.1987. Algunos datos sobre la situación actual de la Paloma araucana (*Columba araucana*) (Lesson) en la Argentina. Nótulas Faunísticas 8: 1-2.
Casas, A. E.1988. El Chorlo dorado *Pluvialis dominica* en Bariloche, Pcia. Río Negro. Garganchillo 6: 5-6.
Casas, A. E.1992a. La avifauna de las lagunas Cari Laufquén Chica y Cari Laufquén Grande, departamento 25 de Mayo, Río Negro. Hornero 13: 248-252.
Casas, A. y M. Gelain.1986. Presencia del Chorlo nadador de pico fino en Ñirihuau, departamento Pilcaniyeu, provincia de Río Negro. Nuestras Aves 11: 6-7.
Casaux, R., Baroni, A., Ramón, A., Favero, M. y P. Silva. 2008. Aspects of the foraging behaviour of the Antarctic Tern *Sterna vittata gaini* at Harmony Point, South Shetland Islands. Polar Biology 31: 327-331.

Castelino, M. A. 1986. Asociación del Picaflor corona azul con el bananero. Nuestras aves 11: 5-6.
Castelino, M. A. y P. A. Moreyra.1989. Sobre el Picaflor Ermitaño canela, *Phaetornis pretrei* (Lesson & Delattre, 1839) en la provincia de Misiones, Argentina (Aves, Trochilidae). Nótulas Faunísticas 16: 1-2.
Castellanos, A. 1931. Aves del valle de los Reartes (Córdoba). Hornero 4: 361-391.
Castellanos, A.1920a. El alimento de algunos Picaflores. Hornero 2: 60-61.
Castellanos, A.1927. Notas sobre algunas aves antárticas. Hornero 4: 82-83.
Castellanos, A.1932. Aves del valle de los Reartes (Córdoba). Hornero 5: 1-40.
Castellanos, A.1935. Observaciones de algunas aves de Tierra del Fuego e isla de los Estados. Hornero 6: 22-37.
Castillo, L. y J. C. Chebez. 2009. Presencia del picaflor garganta escamada (*Heliomaster squamosus*) (Temminck, 1823) en la Argentina. Nótulas faunísticas. Segunda Serie. Nº 40: 1-8.
Castillo, L., M. Moschen y J. C. Lowen. 2009. Nuevos registros del picaflor tijereta (*Eupetomena macroura*) en la ciudad de Puerto Iguzú, Misiones, Argentina. Nuestras Aves 54: 68-69.
Castillo, L., R. Güller y J. O. Veiga. 2012. Nuevo registro del Picaflor amatista (*Calliphlox amethystina*) para el norte de la provincial de Misiones, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 88: 1-4.
Castro, D. del C. y A. C. Cicchino. 1992. Algunas especies de Menoponidae (Insecta: Phthiraptera; Amblycera) parásitas de aves en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral, 23: 59-69.
Catry, P., Lecop, M. y I. J. Strange. 2008. Population growth and density, diet and breeding success of Striated Caracaras *Phalcoboenus australis* on New Island, Falkland Islands. Polar Biology 31: 1167-1174.
Cavalli, M., A. V. Baladrón, J. P. Isacch, G. Martínez y M. S. Bó. 2013. Prey selection and food habits of breeding Burrowing Owls (*Athene cunicularia*) in natural and modified hábitats of Argentine pampas. Emu. 114: 184-188.
Cavicchia, M. y G. V. García. 2012. Riqueza y composición de especies de aves rapaces (Falconiformes y Strigiformes) de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Hornero 27: 159-166.
Cawkell, E. M. y J. E. Hamilton. 1961. The birds of Falkland Island. Ibis 103 a: 1-27.
Caziani, S. 1987. Lista de aves. Reserva Forestal de Copo, Santiago del Estero. Inf. Inéd.
Caziani, S. M. y E. J. Derlindati. 2000. Abundance and habitat of high Andes flamingos in northwestern Argentina. Waterbirds (S.P. 1): 121-123.
Caziani, S. M., E. J. Derlindati., A. Talamo, G. Nicolossi, A. L. Sureda y C. Trucco. 2001. Waterbird richness in altiplano lakes of northwestern Argentina. Waterbirds 24: 103-117.
Chani, J. M., A. L. Echevarría, M. D. Juri, I. R. Lobo, E. Martín, J. Torres Dowdall y E. Tribulo.2000. Importancia de los parches verdes en urbanizaciones. XVII Jornadas Científicas de la Asociación de Biología de Tucumán.
Chantler, P. 1999. Family Apodidae (Swifts). Pp. 388-457, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 5. Barn-Owls to Hummingbird. Lynx Edicions, Barcelona.
Chatellenaz, M. L. 2004. La avifauna del bosque de Quebracho colorado y Urunday del noroeste de Corrientes, Argentina. Facena, 20: 3-12.
Chatellenaz, M. L. 2005a. Aves del Valle del Río Paraná en la Provincia del Chaco, Argentina : riqueza, historia natural y conservación. Insugeo, Miscelánea 14: 527-550.
Chatellenaz, M. L. 2005b. Estancia San Juan Poriahú. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 151. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Chatellenaz, M. L. 2007. Fauna vinculada a la vegetación reófila del Parque Provincial Moconá (Misiones, Argentina) Facena 23: 41-54.
Chatellenaz, M. L., P. D. Cano, C. Saibene y H. A. Ball. 2010. Inventario de las aves del Parque Nacional Mburucuyá (Provincia de Corrientes, Argentina). Acta Zool. Lilloana 54: 139-150.
Chebez, J. C. 1992a. Notas sobre algunas aves poco conocidas o amenazadas de Misiones (Argentina) Aprona, 21: 12-30.
Chebez, J. C. 2005b. Guía de las reservas naturales de la Argentina. Noroeste. Ed. Albatros. Buenos Aires.
Chebez, J. C. 2009. Otros que se van. 1ª Ed. Albatros. Buenos Aires.
Chebez, J. C. y A. Bosso. 1992. Un curioso comportamiento alimentario del Caburé grande (*Glaucidium nanum*). Nuestras aves 26: 26-27.

Chebez, J. C. y C. Bertonatti. 1994. La avifauna de la isla de los Estados, islas de año Nuevo y mar circundante. (Tierra del Fuego, Argentina). Monografía 1. L.O. L.A. Págs. 57.

Chebez, J. C. y D. Gómez.1988. Notas zoogeográficas sobre las aves de Tierra del Fuego. Hornero 13: 75-78.

Chebez, J. C. y L. H. Rolón. 1989. Parque Provincial Urugua-í. Edit. Montoya. 64 pp. Posadas.

Chebez, J. C., N. R. Rey, M. Babarskas y A. G. Di Giacomo.1998. Las aves de los Parques Nacionales de la Argentina. Monografía Especial L. O. L. A. Nº 12, 126 págs. Bs.As.

Chebez, J. C., R. Castillo y R. M. Güller.2004. Notas sobre picaflores del noreste argentino. Hornero 19 (1): 1-5.

Chebez, J. C., R. Castillo, R. Guller y L. Castillo. 2008c. "Sobre la situación taxonómica de *Amazilia brevirostris* (Lesson 1829) y su presencia en la Argentina". Rev. Las Ciencias 1 (1): 67-81, Univ. Maimónides-FHN "Félix de Azara" Bs. As.

Chebez, J. C., S. Heinonen Fortabat, J. Veiga, M. Babarskas y F. Filiberto.1993. Novedades ornitogeográficas argentinas. IV. Nótulas Faunísticas 38: 1-11.

Chebez, J. C., S. Heinonen y A. Bosso.1988b. Nidificación del Atajacaminos oscuro (*Caprimulgus sericocaudatus*) en Misiones, Argentina. Hornero 13: 90-91.

Chebez, J. C.1992e. Acerca de la presencia de algunas aves misioneras. Hornero 13: 257-258.

Chebez, J. C.1994. Los que se van. Ed Albatros. Buenos Aires. Págs. 604.

Chebez, J. C.1996a. Fauna misionera, catálogo sistemático y zoogeográfico de los vertebrados de la provincia de Misiones (Argentina). Monografía Nº 5. Págs. 320. L. O. L. A. Bs.Aires.

Chehebar, C. y E. J. Ramilo y S. A. Mazzuchelli. 1992. Parque Nacional Laguna Blanca. Plan General de Manejo. Documento preliminar para discusión. Delegación técnica regional. Informe inédito. Administración Parques Nacionales.

Chehebar, C. y E. J. Ramilo. 1989. Fauna del Parque Nacional Nahuel Huapi. Gral. Roca. Río Negro.

Chehebar, C. y E. J. Ramilo. 1992. Fauna del Parque Nacional Nahuel Huapi. Administración de Parques Nacionales y Asociación Amigos del Museo de la Patagonia "Francisco Pascasio Moreno", San Carlos de Bariloche, 38 pp.

Chiale, M. C. y L. Pagano. 2014. A case of parcial leucism in the American Barn Owl (Tyto furcata) (Temminck, 1827), from Buenos Aires province, Argentina. Revista Brasileira de Ornitologia, 22 (3): 307-310.

Chiale, M. C., L. G. Pagano e I. Roesler. 2015. Nuevas localidades para la Parina grande (*Phoenicoparrus andinus.* Nuestras Aves 60: 46-47.

Chiurla, E. H.1996. Nuevos registros del Chorlito ceniciento (*Pluvianellus socialis*) en la provincia de Buenos Aires. Nuestras Aves 35: 35-36.

Christie, M. I., E. J. Ramilo y M. D. Bettinelli. 2004. Aves del noroeste patagónico. Atlas y guía. L. O. L. A. pp. 328.

Christie, M. I., E. J. Ramilo, M. D. Bettinelli. 1988. Las aves de los Parques Nacionales Norpatagónicos y zonas aledañas. Administración de Parques Nacionales.

Chubb, C. 1918b. New subespecies of *Attagis* Bulletin of the British Ornithologists´Club, 38: 40-41.

Cintra, R., M. A. S. Alves e R. B. Cavalcanti. 1990. Dieta de rolinha *Columbina talpacoti* (Aves, Columbidae) no Brasil Central-conparaçao entre sexos e idedas. Rev. Brasil Biol. 50 (2): 469-473.

Cirignoli, S., D. H. Podestá y U. F. J. Pardiñas.2001. Diet of the Short-eared Owl in Northwestern Argentina. J. Raptor Res. 35 (1): 68-69.

Clark, R. R.1984. Notas sobre aves de Península Mitre, Isla Grande de Tierra del Fuego, Argentina. Hornero 12: 212-218.

Clark, R. R.1986. Aves de Tierra del Fuego y Cabo de Hornos. Guía de campo. L.O. L.A. Bs. As.

Cleere, N. 1999. Family Caprimulgidae (Nightjars). Pp. 302-386, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 5. Barn-Owls to Hummingbird. Lynx Edicions, Barcelona.

Cobos, V., R. Miatello y J. Baldo.1999. Algunas especies de aves nuevas y otras con pocos registros para la provincia de Córdoba, Argentina. II. Nuestras Aves 39: 7-11.

Cocimano, M. C., J. M. Chani, A. L. Echevarría y C. F. Marano. 2005b. La comunidad de aves del río Los Sosa, Tucumán, Argentina. XI RAO: 81. Buenos Aires.

Cockle, K., K. Martin and K. Wiebe. 2011. Selection of Nest Trees by Cavity-nesting Birds in the Neotropical Atlantic Forest. Biotrópica 43: 228-236.

Coconier, E. 2005b. Aves Acuáticas en la Argentina. Reporte Final. Aves Argentinas-Wetland Intertional, 137 pp. www.avesargentinas.org.ar.

Coconier, E. G., López Lanús, B., Roesler, I., Moschione, F., Pearman, M., Blendinger, P., Bodrati, A., Monteleone, D., Casañas, H., Pugnali, G. y M. E. Alvarez. 2007. Lista comentada de las aves silvestres de la unidad de gestión Acambuco. Pp: 32-103. En Coconier, E. G. (Ed.). Las aves silvestres de Acambuco, Provincia de Salta, Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación 6: 1-127. Nuestras Aves. A.O.P.

Codesido, F. Miñarro y P. Preliasco. 2013. Inventario focal de las aves de las estancias La Gloria y El Raigón: sitio piloto Samborombón, Provincia de Buenos Aires, Argentina. En pp. 253-268/540-546: G. D. Marino, F. Miñarro, M. E. Zaccagnini y B. López-Lanús (eds.). Pastizales y sabanas del cono sur de Sudamérica: iniciativas para su conservación en la Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación, Monografía de Aves Argentinas Nº 9. Aves Argentinas/AOP, Fundación Vida Silvestre Argentina e Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Buenos Aires, Argentina.

Codesido, M. y D. N. Bilenca. 2000. Comparación de los métodos de transectas de faja y de conteo de puntos de radio fijo en una comunidad de aves del bosque semiárido santiagueño. Hornero 15: 85-91.

Codesido, M., C. González-Fischer y D. Bilenca. 2011. Distributional changes of landbird species in agroecosystems of central Argentina. The Condor 113: 266-273.

Cohn-Haft, M. 1999. Family Nyctibiidae (Potoos). Pp. 288-301 en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 5. Barn-Owls to Hummingbird. Lynx Edicions, Barcelona.

Colina, U, M. Chávez, J. M. Tanco y S. A. Navajas Cantaluppi. 2015. Descripción de la etología general y reproductiva del Atajacaminos lira (*Uropsalis lyra argentina*) en el noroeste argentino. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 174: 1-9.

Colina, U. 2011. Primer registro de nidificación del chorlo cabezón (*Oreopholus ruficollis*) en el noroeste argentino. Nótulas Faunísticas (segunda serie) 70: 1-5.

Colina, U. 2015. Registro de Atajacaminos ñañarca (*Systellura longirostris bifasciatus*) en la provincia de Jujuy, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 172: 1-3.

Collar, N. J., L. P.Gonzaga, N. Krabbe, A. Madroño Nieto, L.G. Navarro, T.A. Parker y D.C. Wege. 1992. Threatened birds of the Americas. The ICBP/IUCN Red Data Book. Smithsonian Institution Press. Washintong y London. Pp. 1150.

Comisso, E. 2012. Caso de Leucismo en Caburé grande (*Glaucidium nana*). Ecoregistros Revista Nº 2. Artículo Nº 8: 1-3.

Contino, F. 1975. Observaciones sobre la conducta de *Sappho sparganura* en el cerro de Santa Bárbara, Jujuy, Argentina. Hornero 11: 265-270.

Contino, F. N.1980. Aves del noroeste argentino. Univ. Nac. Salta. Págs. 136.

Contreras, J. R. 1975. Características ponderales de las aves del Parque Nacional Nahuel Huapi y regiones adyacentes. Physis. Sec. C. 34 (88): 97-107.

Contreras, J. R. 1978a. Biota centro-andina. VII. Comentarios acerca de las razas del Picaflor gigante *Patagonas gigas*, en las provincias de Mendoza y San Juan (Aves: Trochilidae). Neotrópica, 24 (71): 47-49.

Contreras, J. R. 1979f. Bird weights from northeastern Argentina. Bull. B.O.C. 99: 21-24.

Contreras, J. R. 1979g. Lista faunística preliminar de los vertebrados de la Reserva Ecológica de Ñacuñan, Cuaderno Técnico del IADIZA 5: 39-47.

Contreras, J. R. 1981b. Lista preliminar de la avifauna correntina. I. No Passeriformes. Historia Natural 2: 21-28.

Contreras, J. R. 1983a. Notas sobre el peso de las aves argentinas. I. Historia Natural 3 (1): 16.

Contreras, J. R. 1983c. Notas sobre el peso de aves argentinas. III. Historia Natural 3 (8): 95-96.

Contreras, J. R. 1986a. Notas sobre el peso de las aves argentinas. V. Historia Natural 6 (11): 100.

Contreras, J. R. 1987a. Algunas localidades interesantes para aves correntinas. Nótulas Faunísticas 6: 1-2. Corrientes.

Contreras, J. R. 1993b. Acerca de algunas especies de aves del extremo sudeste de la provincia de Formosa, República Argentina. Nótulas Faunísticas 47: 1-8.

Contreras, J. R. y A. Fernández. 1980. Ecología de la avifauna de la laguna del Viborón, departamento Maipú, provincia de Mendoza. Rev. Mus. Hist. Nat. de San Rafael (Mendoza) VIII (1): 3-14.

Contreras, J. R. y A. O. Contreras.1984. Addenda a la lista de aves no Passeriformes de la provincia de Corrientes, Argentina. Historia Natural 3 (28): 248.

Contreras, J. R., E. R. Krauzuck, A. R. Giraudo, A. E. Johnson, A. A. Garello y Y. E. Davies.1994b. Notas sobre aves de la provincia de Misiones, República Argentina. I. Nótulas Faunísticas 53:1-13.

Contreras, J. R., F. Agnolin, Y. E. Davies, I. Godoy, A. Giacchino y E. Ríos. 2014. Atlas ornitogeográfico de

la provincia de Formosa, República Argentina. 1º Ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fundación de Historia Natural Félix de Azara. 450 p.
Contreras, J. R., L. M. Berry, A. O. Contreras, C. C. Bertonatti y E. E. Utges.1990b. Atlas ornitogeográfico de la provincia del Chaco. República Argentina. I. No passeriformes. Cuad. Téc. Félix de Azara Nº 1. 164 pág. Corrientes.
Contreras, J. R., V. G. Roig y A. G. Giai. 1980b. La avifauna de la cuenca del río Manso superior y la orilla sur del Lago Mascardi, Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. Historia Natural 1: 41-48.
Contreras, J. R.1977b. La avifauna del Valle del río Collón Cura, provincia del Neuquén. Idia. Suplemento 34: 250-270.
Contreras, J. R.1979c. Sobre un ave nueva para la provincia de Mendoza y otra poco conocida. Historia Natural 1 (5): 26-28.
Contreras, J. R.1980c. Avifauna mendocina. IV. *Gallinago paraguaiae magellanica* (King) (Aves: Scolopacidae). Historia Natural 1 (13): 91-92.
Contreras, J. R.1980o. New data on Shiny cowbird parasitism (*Molothrus bonariensis bonariensis*: Aves, Icteridae). Historia Natural 1: 151-152.
Contreras, J. R.1987b. Lista preliminar de la avifauna de la provincia de Corrientes, República Argentina. Historia Natural VII (6): 61-70.
Contreras, J. R.1987c. Lista preliminar de la avifauna de la provincia de Formosa, República Argentina. Historia Natural VII (4): 33-52.
Copello, S. y M. Favero. 2001. Foraging ecology of Olrog´s Gull *Larus atlanticus* in Mar Chiquita Lagoon (Buenos Aires, Argentina): are there age-related differences ? . Bird Conservation International 11: 175-188.
Coria, N. R. y D. Montalti. 1993b. Flyng birds at Esperanza Bay, Antarctica. Polish Polar Research 14: 433-439.
Coria, N. R., D. Montalti, E. F. Rombola, M. M. Santos, M. I. García Betoño y M. A. Juares. 2011. Birs at Laurie Island, South Orkney Islands, Antarctica: Breedng species and their distribution. Marine Ornithology 39: 207-213.
Couve, E. y C. Vidal. 2003. Aves de Patagonia, Tierra del Fuego y Península Antártica. Islas Malvinas y Georgia del Sur. Ed. Fantástico Sur Birding Ltda. Pta. Arenas, Chile. 656 p.
Cowper Coles, P., N. C. Meyer y Z. M. Machado. 2012b. Primer registro de la Lechuza estriada (*Strix virgata*) para la provincial del Chaco, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 90: 1-3.
Crawshay, R. 1907. The birds of Tierra del Fuego. Bernard Quaritch, London.
Cueto, V. R. y J. López de Casenave. 2000a. Bird assemblages of protected and exploited coastal woodlands in east-central Argentina. Wilson Bull. 112 (3): 395-402.
Cueto, V. R. y J. López de Casenave. 2000b. Seasonal changes in bird assemblages of coastal woodlands in east-central Argentina. Stud Neotrop Fauna & Environm 35: 173-177.
Cunningham, R. O.1871. Notes on the natural history of the Straits of Magellan and West coast of Patagonia, made during the Voyage of H. M. S. « Nassau », 1866-1869. Edmonston and Douglas, Edinburgh.
Cuñado, C., S. Strelkov, R. Güller y J. O. Veiga. 2012. Redescubrimiento del Picaflor lazulita (*Hylocharis cyanus*) en la Argentina. Nótulas Faunísticas 95: 1-5.
Curtis, W. F. 1994. Further South Atlantic records, December 1991 to May 1992. Sea Swallow 43: 19-38.
D´Amico, V. L. 2011. Conteos leucocitarios en el Playero rojizo (*Calidris canutus rufa*) en Patagonia, Argentina. Hornero 26: 73–77.
D´Amico, V. L., Felino, W. R. (Jr), A. J. Baker. P. González y M. Bertellotti. 2005. Ectoparásitos en *Calidris canutus rufa* en dos sitios de invernada de América del Sur. XI RAO: 85. Buenos Aires.
D´Amico, V. L., M. de los A. Hernández y L. O. Bala. 2004. Selección de presas en relación con las estrategias de forrajeo de aves migratorias en Península Valdés, Argentina. Ornit. Neotropical 15 (3): 357-364.
Dabbene, R. 1918b.Notas sobre una colección de aves de la Isla Martín García.Hornero 1: 160-168.
Dabbene, R. 1918g. Nidos y huevos de Vencejos. Hornero 1: 193.
Dabbene, R. 1920d. Miscelánea ornitológica. Sobre la distribución geográfica de algunas aves. Hornero 2: 133-136.
Dabbene, R. 1923f. Miscelanea ornitológicas. Hornero 2: 225-227.
Dabbene, R. 1926d. Sobre la distribución de la Lechuza *Strix rufipes*. Hornero 3: 405-407.
Dabbene, R. 1926g. Semialbinismo en el Chorlo cabezón. Hornero 3: 420.
Dabbene, R. 1926g. Semialbinismo en el Chorlo cabezón. Hornero 3: 420.

Dabbene, R. 1929a. Algunas especies de aves pocas veces señaladas en la Argentina.Hornero 4: 312-313.
Dabbene, R. 1972. Aves de caza. Ed. Albatros. Buenos Aires. Págs. 237.
Dabbene, R.1910a. Ornitologia Argentina, Anal. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. As. T. XVIII.: 1-513.
Dabbene, R.1913. Distribution des oiseaux en Argentina d´aprés l´ouvrage de Lord Brabourne et Chubb The Birds of South Amerida. Physis 1: 241-261
Dabbene, R.1917c. Notas sobre una colección de aves de la Isla Martín García. Hornero 1: 29-34.
Dabbene, R.1918a. Notas sobre una colección de aves de la Isla Martín García. Hornero 1: 89-97.
Dabbene, R.1919a. Especies de aves poco comunes o nuevas para la República Argentina. Hornero 1: 259-266.
Dabbene, R.1923a.Captura de un Batitú (*Bartramia longicauda*) en las islas Shetland del Sud. Hornero 3: 197.
Dabbene, R.1926a. Aves nuevas y otras poco comunes para la Argentina. Hornero 3: 390-396.
Daciuk, J. 1968. La Fauna del Parque Nacional Laguna Blanca. Anales de Parques Nacionales. XI. 2º Entrega: 225-304.
Daciuk, J. 1973b. Notas faunísticas y bioecológicas de Península Valdés y Patagonia. XI. Etología y desarrollo de los pichones de Cuaco o Garza Bruja (*Nycticorax nycticorax obscurus*), de una colonia estudiada en la Isla de los Pájaros (Golfo San José, prov. de Chubut, Rep. Argentina). Physis 32: 107-121.
Daciuk, J. 1977b. Notas faunísticas y bioecológicas de Península Valdés y Patagonia. V. Anillado de aves en el litoral marítimo patagónico para estudios del comportamiento migratorio (Provincias de Chubut y Santa Cruz, Rep. Argentina). Hornero 11: 349-360.
Daciuk, J. 1977c. Notas faunísticas y bioecológicas de Península Valdéz y Patagonia XXI. Lista sistemática y comentarios de una colección ornitológica surcordillerana (Subregión Araucana, Prov. de Río Negro y Chubut, Argentina) Physis, Sec. C, 36 (92): 201-213, Buenos Aires.
Daciuk, J. 1978a. Aclimatación de aves y mamíferos en el Parque Nacional Nahuel Huapi (provincias de Neuquén y Río Negro, Argentina) con especial referencia de los Fasiánidos. Anales de Parques Nacionales, 14: 96-104.
Daciuk, J. 1978b. Evaluación preliminar de la fauna de vertebrados de la isla Victoria (Parque Nacional Nahuel Huapi, provincias de Neuquén y Río Negro, Argentina). Anales de Parques Nacionales, 14: 87-95.
Daciuk, J. 1983a. Contribuciones sobre protección, conservación, investigación y manejo de la vida silvestre y áreas naturales. VII Ensayo de cuantificación de la ornitocenosis y colonias de aves (Laguna Blanca, Neuquén; Península de Valdés-Bahía Janssen-Bahía Bustamante, Chubut; Puerto Argentino-Puerto San Carlos, Islas Malvinas). Hornero Nº Extraordinario: 282-294.
Daciuk, J.1972a. Notas faunísticas y bioecológicas de Península Valdés y Patagonia. XIV. Pequeña colonia de nidificación del Gaviotín Brasilero en “Isla de los Pájaros” (Golfo San José, Chubut, Rep. Argentina). Neotrópica 18: 103-106.
Daciuk, J.1973a. Notas faunísticas y bioecológicas de Península Valdés y patagonia. IX. Colonia de nidificación del Gaviotín brasileño en caleta Valdés (Chubut) y sugerencias para la protección. Physis, 32 (84): 71-82.
Daciuk, J.1976b. Notas faunísticas y bioecológicas de península Valdés y patagonia. XVII. Colonias de nidificación de *Egretta alba* (Gmelin) y *Sterna eurygnatha* Saunders recientemente encontradas en las costas de Chubut (Rep. Argentina). Physis, 25 (91): 341-347.
Daciuk, J.1977a. Notas faunísticas y bioecológicas de Península Valdés y Patagonia. VI. Observaciones sobre áreas de nidificación de la avifauna del litoral marítimo patagónico. (Provincias de Chubut y Santa Cruz, Rep. Argentina). Hornero 11: 361-376.
Daguerre, J. B.1922. Lista de aves coleccionadas y observadas en Rosas, F. C. S. Hornero 2: 259-271.
Daguerre, J. B.1924a. Apuntes sobre algunas aves de la provincia de Buenos Aires. Hornero 3: 248-252.
Daguerre, J. B.1924b. El Chorlo “Patas amarillas menor”, *Neoglottis flavipes* y la “Gallareta” *Fulica armillata* en las Malvinas. Hornero 3: 283.
Daguerre, J. B.1924c. Captura de un ejemplar de *Mesoscolopax boreales* en Rosas, (Prov. de Buenos Aires) Hornero 3: 284.
Daher, R. y C. Spagarino. 2011. Reproducción de Urutaú común (*Nyctibius griseus*) en el Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa, Argentina. XIV RAO: 71.
Damon, Adam. 2012. Dark-billed Cuckoo (*Coccyzus melacoryphus*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of

Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=202136

Dardanelli, S. y M. Nores. 2001. Extinción y colonización de aves en fragmentos de bosque de la provincia de Córdoba, Argentina. Boletín de la Academia Nacional de Ciencias, Córdoba, Rep. Argentina.Tomo 66: 55-60.

Dardanelli, S., D. A. Serra y M. Nores. 2006a. Composición y abundancia de la avifauna de fragmentos de bosque de Córdoba, Argentina. Acta Zoológica Lilloana, 50 (12): 71-83.

Darrieu, C. A. 1994. Dos nuevos registros para la avifauna pampeana: *Tersina viridis viridis* (Emberizidae: Thraupinae) y *Columbina talpacoti talpacoti* (Columbidae). Neotrópica, 40: 56.

Darrieu, C. A. 2014. Avifauna de la provincia de Mendoza, Argentina: lista de especies (no Passeriformes). Acta zoológica lilloana 58 (1): 94-132.

Darrieu, C. A. y A. R. Camperi.2000 (2001). Aves observadas en el lago Colhué Huapi y sus alrededores, provincia del Chubut. Physis Secc. C, 58 (134-135): 23-25. Buenos Aires.

Darrieu, C. A. y A. R. Camperi.2001a. Nueva lista de las aves de la provincia de Buenos Aires. Cobiobo Nº 3-Probiota Nº 2. Sec. de Política Ambiental. UNLP. Buenos Aires.

Darrieu, C. A. y M. M. Martínez.1984. Estudios sobre la avifauna de Corrientes. I. Nuevos registros de aves (no Passeres). Rev. Mus. La Plata (n.s.) Tomo XIII. Zool. 145: 257-260.

Darrieu, C. A. y N. A. Bó. 1992. Nuevos aportes a la distribución de las razas de *Zenaida auriculata* en la República Argentina (Aves, Columbidae). Revista del Museo La Plata. Zoología, 14 (159): 137-145.

Darrieu, C. A., A. R. Camperi y D. Montalti. 2010. Fluctuación anual de la masa corporal, tamaño de gónadas y muda de *Guira guira* (Aves, Cuculiformes: Cuculidae), Acta Zoologica Lilloana. 54: 161-165.

Darrieu, C. A., A. R. Camperi y S. Imberti.2008. Addenda. Avifauna (Non Passeriformes) of Santa Cruz province, Patagonia (Argentina): annotated list of species. Rev. Mus. Argentino Cienc. Nat. ,n.s. 10 (1): 111-145.

Darrieu, C. A., A. R. Camperi, J. J. Maceda y F. Bruno. 2011b. Avifauna de la provincia de La Pampa, Argentina: lista de especies (no passeriformes) Acta Zoologica Lilloana. 55: 64 - 108.

Darrieu, C. A., G. E. Soave y A. R. Camperi.1999. Reserva provincial Laguna de Llancanelo: paraíso de las Aves Acuáticas. Rev. Museo Fund. Mus. La Plata. "F. P. Moreno" 13: 2-3, La Plata.

Darrieu, C. A., M. M. Martinez y G. E. Soave.1985. Estudio de la avifauna de la Reserva Provincias Llancanelo, Mendoza. II. Presencia de *Larus pipixcan, Larus serranus, Sterna trudeaui y Chlidonias niger surinamensis* (Aves: Laridae). Historia Natural, 5 (3): 25-28.

Darrieu, C. A., M. M. Martinez y G. E. Soave.1989. Estudio de la avifauna de la Reserva Provincias Llancanelo, Mendoza. III. Nuevos registros de nidificación de aves acuáticas (Podicipedidae, Threskiornithidae, Anatidae, Rallidae, Laridae). Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral 20: 81-90.

Davis, E. D.1940b. Social nesting habits of *Guira guira*. Auk, 57: 472-484.

de La Fuente, H. 2002. Reserva Laguna Brava, La Rioja, Argentina. En: M. Kufner y D. Tamburini (ades.). Los Humedales del Oeste Argentino. Centro de Ecología y Recursos Naturales Revovables "Dr. R. Luti". Universidad Nacional de Córdoba, 69-73.

De la Peña, M. R. 1979j. Nidos de aves de Santa Fe. Hornero 12: 72-74.

De la Peña, M. R. 1982b. Notas nidobiológicas sobre Vencejos (Aves, Apodidae). Historia Natural 2 (26): 239-240.

De la Peña, M. R. 1983a. Hábitos parasitarios de algunas especies de aves. Hornero extraordinario: 165-169.

De la Peña, M. R. 1984d. Descripción de nuevos nidos para la avifauna argentina. Historia Natural 4 (2): 19.

De la Peña, M. R. 1988a. Albinismo en aves de Santa Fe. Nuestras aves 16: 16.

De la Peña, M. R. 2001a. Nidificación de algunas especies de aves en el este de la provincia de Catamarca, Argentina. Hornero 16 (1): 17-21.

De la Peña, M. R. 2001d. Observaciones de campo en la alimentación de las aves. Rev. FAVE. Vol. 15 N° 1: 99-107.

De la Peña, M. R. 2010b. Nidos de aves Argentinas. UNL. (Digital)

De la Peña, M. R. 2010c. Los alimentos de las aves. UNL. (Digital)

De la Peña, M. R. 2011a. Observaciones de campo en la alimentación de las aves. Biológica. Naturaleza, Conservación & Sociedad. Edición Especial. Nº 13.

De la Peña, M. R. 2011b. Nidificación del Urutaú (*Nyctibius griseus*) (Aves: Nyctibiidae) en la

provincia de Santa Fe, Argentina. Nótulas Faunísticas 75: 1-7.
De la Peña, M. R. 2011c. Guía de aves de la provincia de Santa Fe. Santa Fe.
De la Peña, M. R. 2011e. Diccionario de nombres vulgares de las aves de Argentina. Ed. Biológica. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad. Nº 1. Santa Fe, Argentina, 100 pp.
De la Peña, M. R. 2011f. Atlas ornitogeográfico de la provincia de Santa Fe. Serie Naturaleza y Conservación Nº 4. Pág. 1-500.
De la Peña, M. R. 2012b. Distribución y citas de aves de Entre Ríos. Serie Naturaleza y Conservación Nº 6. Pág. 1-206.
De la Peña, M. R. 2013a. Citas, observaciones y distribución de aves argentinas. Edición ampliada. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad Nº 7. Ediciones Biológica. Santa Fe, 786 pp.
De la Peña, M. R. y F. Bruno. 2008. Albinismo en aves argentinas. ECO. Ciencia y Naturaleza. Nº 10: 34-38
De la Peña, M. R. y J. F. Pensiero.2003. Contribución de la flora en los hábitos alimentarios de las aves en un bosque del centro de la provincia de Santa Fe, Argentina. Ornit. Neot. 14 (4): 499-514.
De la Peña, M. R. y J. Pensiero. 2011. Catálogo de nombres comunes de la flora argentina. UNL. Pp.1-463.
De la Peña, M. R. y R. F. Tittarelli. 2011. Guía de aves de La Pampa. Santa Rosa. Gobierno de La Pampa.
De la Peña, M. R. y S. A. Salvador. 2010. Manual de la alimentación de las aves argentinas. UNL. (Digital)
De la Peña, M. R., M. Manassero, J. L. López y H. Luna.2003b. Nuevos registros de aves para las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, Argentina. Nuestras Aves 45: 32-35.
De la Peña, M. R.1988c. Nuevos registros o aves poco citadas para Santa Fe. Nuestras Aves 16: 17-18.
De la Peña, M. R.1996b. Nuevos registros o aves poco citadas para las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, Argentina. Hornero 14 (3): 87-89.
De la Peña, M. R.1996c. Ciclo reproductivo de las aves argentinas. Segunda Parte. LOLA.
De la Peña, M. R.2013c. Nidos y Reproducción de las aves argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad Nº 8. Ediciones Biológica. Santa Fe.
De Lucca, E. R. 2011b. Observaciones del Aguilucho común (*Buteo polyosoma*) en el centro y sur de la Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 77: 1-15.
De Lucca, E. R. y M. D. Saggese.1992. Aves del departamento Deseado, Santa Cruz. Hornero 13: 259-260.
De Lucca, E. R.1989d. Vencejo de collar en San Luis. Nuestras Aves 19: 9.
De Lucca, E. R.1990a. Picaflor garganta blanca en el SO de Buenos Aires. Nuestras Aves 22: 32.
De Santis, I. J. M., C. I. Montalvo y E. R. Justo. 1983. Mamíferos integrantes de la dieta de *Tyto alba* (Aves, Strigiformes, Tytonidae) en la provincia de La Pampa, Argentina. Historia Natural 3: 187-188.
De Santis, I. J. M., C. M. García Esponda y G. J. Moreira. 1996a. Vertebrados depredados por *Tyto alba* (Aves: Tytonidae) en el sudoeste de la provincia de Chubut (Argentina). Neotrópica 42: 123.
De Santis, I. J. M., E. R. Justo, C. I. Montalvo y M. Kin. 1988a. Mamíferos integrantes de la dieta de *Tyto alba tuidara* (Gray) en la provincia de La Pampa, Argentina. Actas de las Terceras Jornadas Pampeadas de Ciencias Naturales. Univ. Nacional La Pampa. Serie Supl. 4: 165-175.
De Santis, I. J. M., I. M. Peña Cozzarin y M. F. Grosman. 1993. Vertebrados depredados por *Tyto alba* (Aves: Tytonidae) en las proximidades del río Corintos (provincia del Chubut, Argentina). Neotrópica 39: 53-54.
De Santis, I. J. M., M. F. Tejedor y M. F. Grosman. 1991. Vertebrados contenidos en egagrópilas de *Tyto alba* (Aves: Tytonidae) para el área precordillerana del Chubut (República Argentina). Neotrópica (La Plata) 37: 24.
De Santis, I. J. M., N. Basso, I. Noriega y M. F. Grossman. 1994. Explotación del recurso trófico por la lechuza de los campanarios (*Tyto alba*) en el oeste de Chubut, Argentina. Stud. Neotrop. Fauna Envir. 29: 43-47.
De Santis, I. J. M., y. G. O. Pagnoni. 1989. Alimentación de *Tyto alba* (Aves: Tytonidae) en localidades costeras de la provincia del Chubut (República Argentina). Neotrópica (La Plata) 35: 43-49.
De Santis, I. J., E. R. Justo M., C. Montalvo y M. Kin.1988. Mamíferos integrantes de la dieta de *Tyto alba tuidara* (Gray) en la provincia de La Pampa, Argentina. Universidad Nacional de La Pampa. Serie Suplementos, 4: 165-175.
Dean, A.1971. El "Crespín" en la localidad de Moreno. Buenos Aires. Hornero 11: 130.

Del Valle, A. E. y M. C. Funes. 1994. Vertebrados de la provincia del Neuquén. Centro de Ecología Aplicada del Neuquén. Nº 5, Aves, 11-21.
Del Valle, A. E., R. Gader y M. C. Funes. 1989. Aves y mamíferos de la provincia del Neuquén. Dirección General de Bosques y Parques Provinciales. Dirección de Ecología. Informe Inédito.
Delany, S. N., D. V. Edwards y T. D. Williams. 1988. Brown-hooded Gull *Larus maculipennis*: first record for South Georgia, Bull. Brit. Antarct. Surv., 78: 53-54.
Delhey, K. J. V., P. F. Petracci y C. H. F. Pérez.2001c. Observaciones de Charadriiformes en el sur de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 42: 14-16.
Delhey, R.1992. Algunas aves nuevas o poco conocidas para la región de Bahía Blanca. Nuestras Aves 27: 31-32.
Delius, J. D. y F. Hammerschmidt. 1953. Interesante captura del Picaflor coludo. Hornero 10: 80.
Devillers, P. 1977. Observations at a breeding colony of *Larus* (*belcheri*) *atlanticus*. Le Gerfaut 67: 22-43.
Devillers, P. y J. A. Terschuren. 1978. Relationships between the blue-eyed shag of South America. Gerfaut 68: 53-68.
Devoto, M., N. H. Montaldo y D. Medan. 2006. Mixed hummingbird-long-proboscid-fly pollination in "ornithophilous" *Embothrium coccineum* (Proteaceae) along a rainfall gradient in Patagonia, Argentina. Austral Ecology 31: 512-519.
Di Giacomo, A. G. 2005h. Aves de la Reserva El Bagual. En Di Giacomo, A. G. y S. F. Krapovickas (Eds.). Historia natural y paisaje de la Reserva El Bagual, provincia de Formosa, Argentina. Inventario de la fauna de vertebrados y de la flora vascular de un área del Chaco Húmedo. Temas de Naturaleza y Conservación 4: 201-465. Aves Argentinas/AOP. Buenos Aires.
Di Giacomo, A. G. y B. López Lanús.1998. Aportes sobre la nidificación de veinte especies de aves del noroeste argentino. Hornero 15: 29-38.
Di Giacomo, A. G. y B. López Lanús.2000. Nuevos aportes al conocimiento de la nidificación de algunas aves del noroeste argentino. Hornero 15: 131-134.
Di Giacomo, A. G., A. S. Di Giacomo y C. A. Marchisio.2001. Nuevos registros de aves para el centro de la Argentina. Nuestras Aves 42: 18-20.
Di Giacomo, A. S., A. G. Di Giacomo y B. López Lanús.1998b. Relevamiento de la avifauna del Parque nacional Baritú: informe de avance. X RAO: 21.
Di Giacomo, A. S., V. De Francesco y E. G. Coconier. 2005c. Áreas importantes para la conservación de las aves en la Argentina. CD- Rom. Aves Argentinas /Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Di Giacomo, A. S., V. De Francesco y E. G. Coconier. 2007. Áreas importantes para la conservación de las aves en la Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas. Buenos Aires.
Díaz, I. 1999. Food habits of the Rufous-legged Owl (*Strix rufipes*) in the Mediterranean sclerophyllous forest of Central Chile. J. Raptor Res. 33: 260-264.
Diéguez, A. J. 1996a. Aves depredadas por *Asio flammeus suinda*-1- en Saladillo, provincia de Buenos Aires. Bol.Cianc. Asoc. Protec. Nat. 30: 25-26.
Diéguez, A. J. 1997b. Notable depredación de un ejemplar de *Sturnella loyca loyca* (Molina, 1782) por *Athene cunicularia partridgei* (Olrog, 1976) en el partido de Campana, Pcia. De Buenos Aires. Bol.Cient.Asoc. Protec. Nat. 33:20.
Diéguez, A. J. 1999. Dieta ornitófaga de *Tyto alba tuidara* (J.A. Gray, 1829) en el río seco "La Hedionda", Dpto San Rafael, Pcia. de Mendoza. Biol. Neotrop. Rev. Grupo Invest. Conserv. Biodiv. Argent. 2: 11-13.
Diéguez, A. J. y C. Corbella. 1997. Aves depredadas por *Tyto alba* en Reserva Natural La Felipa, Ucacha, Dto. Juárez Celman, Pcia. de Córdoba. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 31: 12-14.
Diéguez, A. J. y C. Reboledo. 1997. Sobre la presencia de *Streptoprocne zonaris zonaris* (Shaw, 1876) (Aves: Apodidae) en Río Seco, La Hedionda, dpto. San Rafael, provincia de Mendoza, Argentina. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 32: 18.
Diéguez, A. J. y M. Méndez. 1997. Análisis de importantes componentes ornitológicos obtenidos en regurgitados de *Tyto alba* en Reserva "El Destino", Pdo. de Madalena, provincia de Buenos Aires. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 32: 9-11.
Dinelli, L. M. 1941. Causas que merman las aves. Hornero 8: 60-62.
Dinelli, L.1929. Notas biológicas sobre aves del noroeste argentino. Hornero 4: 272-277.
Doiny Cabré, C. y R. Lejarraga. 2007. Aves de Sierra de la Ventana. Bahía Blanca.

Doiny Cabré, P. C. 2006.Aves nuevas o poco registradas para sierra de la Ventana, provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 52: 21-23.
Donázar, J. A., A. Travaini, O. Ceballos, M. Delibes y F. Hiraldo. 1997. Food habits of the Great Hoened Owl in northwestern Argentine Patagonia: the role of introduced lagomorphs. J. Raptor Res. 31: 364-369.
Drabble, L. E.1953. Notas sobre nidos observados en Entre Ríos. Hornero 10: 81.
Durnford, H. 1878b. Notes on the birds of the Province of Buenos Aires. Ibis 1878: 58-68.
Earnshaw, E. M.1973. Entre las aves de Tierra del Fuego. Hornero 11: 203-208.
Echevarría, A. L. 2001. Estudios ecológicos de las aves acuáticas del embalse El Cadillal, provincia de Tucumán, Tesis doctoral, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto M. Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, 206, pp.
Echevarría, A. L. 2014. Las aves acuáticas como indicadoras de problemas ambientales en el embalse La Angostura, Tucumán, Argentina). Acta Zoológica Lilloana 58 (1): 44-56.
Echevarría, A. L. y J. M. Chani. 1999. Lista de aves del embalse El Cadillal, provincia de Tucumán. Acta Zoológica Lilloana 45 (1): 141-145.
Echevarría, A. L. y J. M. Chani. 2000. Estructura de las comunidades de aves acuáticas del embalse El Cadillal, Tucumán, Argentina. Acta Zoológica Lilloana 45 (2): 219-232.
Echevarría, A. L. y J. M. Chani. 2006. Aves migratorias, la importancia del embalse El Cadillal, (Tucumán, Argentina) como sitio de tránsito e invernada. Acta Zoológica Lilloana 50 (1-2): 97-108.
Echevarría, A. L., C. F. Marano y E. Fanjul. 2008a. Comunidades de aves del embalse Escaba y sus alrededores, Tucumán. Resúmen de XII RAO: 166. San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina.
Echevarría, A. L., C. F. Marano, J. M. Chani y M. C. Cocimano. 2008c. Composición de la comunidad de aves del embalse La Angostura, Tafí del Valle, Tucumán. Acta Zoológica Lilloana 52 (1-2): 98-105.
Echevarría, A. L., C. F. Marano, M. C. Cocimano, M. E. Fanjul y M. A. Cormenzana. 2014. Composición y variación de la comunidad de aves del embalse El Tunal, Salta, Argentina. Acta Zoológica Lilloana 58 (1): 80-93.
Echevarría, A. L., J. M. Chani, R. Lobo Allende, M. D. Juri, J. Torres Dowsall, E. Martín y E. Tribulo. 2007. Aves del Jardín Botánico de la Fundación Miguel Lillo, Fundación Miguel Lillo, Tucumán, Argentina, 1º ed., 136 pp.
Echevarría, A. L., L. R. Lobo Allende, M. D. Juri, J. M. Chani, J. Torres Dowsall y E. Martín. 2011b. Composición, estructura y variación estacional de la comunidad de aves del Jardín Botánico de la Fundación Miguel Lillo, Tucumán, Argentina. Acta. Zool. Lilloana 55: 123-136.
Echevarría, A. L., N. L. Marigliano y J. M. Chani. 1998. Composición y variaciones anuales de la diversidad de aves de una localidad de Bosque chaqueño serrano (Ticucho, El Cadillal, Tucumán, Argentina). Acta Zoológica Lilloana 44 (1): 207-217.
Edelaar, P. y G. Escudero. 2006. Primer registro de la Torcacita colorada (*Columbina talpacoti*) en la patagonia continental argentina. Nuestras Aves 52: 29-30.
Edelaar, P., M. Abril y J. Torres Dowdall. 2005a. Primer registro para agachonas (Familia: Thinicoridae) bebiendo en estado silvestre. XI RAO. Resúmenes: 93.
Eguía, P. 2014. Primer registro de Avoceta andina (*Recurvirostra andina*) para la provincia de La Rioja, Argentina. Ecoregistros.com.ar, 4 (2): 4-5.
Elías, D. 2008. Nuevo registro del Pelícano pardo (*Pelecanus thagus*) en la Argentina. Nuestras Aves 53: 48.
Ellis, D. H. Sabo, B. A., Fackler, J. K. y B. A. Millsap. 2002. Prey of the Peregrine Falcon (*Falco peregrinus cassini*) in southern Argentina and Chile. J. Raptor Res. 36: 315-316.
Erize, F. 1983. Observaciones sobre el Macá Tobiano. Hornero Nº Extraordinario: 256-268.
Escalante, R.1970. Aves marinas del río de la Plata y aguas vecinas del océano Atlántico. Barreiro y Ramos SA. Montevideo. Págs. 199.
Escudero, G., D. Vaquero, H. Marraco y M. G. Murga. 2004. Nuevas observaciones de aves para Comodoro Rivadavia y alrededores, Chubut, Argentina. Nuestras Aves 48: 13-14.
Estades, C. F.2003. Sap feeding by the Green-Backed Firecrown (*Sephanoides sephanoides*). Ornitología Neotropical 14 (4): 531-534.
Esteban, J. G. 1953. Nuevas localidades para aves argentinas. Acta Zool. Lilloana, 13: 349-362.
Esteves López, L., R. Goes, S. Souza y R. de Melo Ferreira.2004. Observations on a nest of the Stygian Owl (*Asio stygius*) in the central Brazilian cerrado. Ornit. Neot. 15 (3): 423-428.
Fandiño, B. y A. A. Pautasso. 2011. Avifauna del AVP La Salamandra, pp.: 62-105. En : Pautasso, A. A.

2011. La fauna y su conservación en los Bajos Submeridionales. Ediciones Biológica. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad Nº 5. Santa Fe, Argentina, 278 pp.

Fandiño, B., A. J. Berduc y A. H. Beltzer. 2010. Ensamble de aves de bosques nativos y exóticos en la Estación reproductiva de un área protegida en el espinal de Entre Ríos, Argentina. Ornitología Neotropical 21: 1-16.

Fandiño, B., L. A. Leiva, A. A. Pautasso, H. Luna y M. Manassero. 2015b. Avifauna de las reservas natural manejada "El Fisco" y privada de uso múltiple "Isleta linda", Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves 60: 39-45.

Fanjul, M. E. 2010. El papel de las plantaciones de limones (*Citrus lemon*) para la avifauna en Tucumán, Argentina. Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Córdoba. Programa de Postgrado en Manejo de Visa Silvestre, Córdoba, Argentina.

Fariña, N., L. Cardinale y O. E. Villalba. 2014. Un caso de depredación sobre Atajacaminos ala negra (*Eleothreptus anomalus*) en Corrientes, Argentina. Nuestras Aves 59: 45-46.

Fava, G., J. C. Acosta y G. Blanco. 2013. Primeros registros documentados y aportes a la distribución geográfica de ocho especies de aves de San Juan, Argentina. Nuestras aves 58: 12-16.

Favero, M. 1996. Foraging ecology of Pale-faced Sheathbills in colonies of Southern Elephant Seal at King George Island, Antarctica. J. Field Ornithol. 67: 292-299.

Favero, M. 2001. Caractiríscas morfométricas y dimorfismo sexual en la Paloma Antártica (*Chionisalba*). Ornit. Neotr. 12: 173-179.

Favero, M. y M. P. Silva.1993. Kleptoparasitismo de *Chionis alba* sobre pingüinos del género *Pygoscelis* en islas Shetland del Sur, Antártida. VIII RAO: 16. Puerto Iguazú.

Favero, M. y M. P. Silva.1999. First record of the Least Seedsnipe *Thinocorus rumicivorus* in the Antarctic. Ornitología Neotropical 10: 107-109.

Favero, M., M. P. Silva y L. Mauco. 2000a.Diet of Royal (*Thalasseus maximus*) and Sandwich (*T. sandvicensis*) ters during the austral winter in the Buenos Aires province, Argentina. Ornitología Neotropical 11: 259-262.

Favero, M., M. S. Bó, M. P. Silva y C. García Mata. 1998a. Dieta invernal del Gaviotín sudamericano *Sterna hirundinacea* en la provincia de Buenos Aires. X RAO: 24. Mar del Plata.

Favero, M., M. S. Bó, P. Silva y C. García-Mata. 2000b. Food and feeding of South American Tern during the nonbreeding season. Waterbirds 23: 125-129.

Fernándes D'Olivera, G. y H. Rodríguez Moulin.1997. Hallazgo de un nido de Chorlito de vincha (*Phegornis mitchellii*) en Mendoza, Argentina. Hornero 14: 255-256.

Fernández Guaraz, J. L. 2013. Nuevo registro de Cuclillo pico amarillo (*Coccyzus americanus*) para la provincia de Entre Ríos, Argentina. Ecoregistros Revista, 3 (8): 33-35.

Fernández, F. J., G. Moreira, D. Ferraro y L. De Santis. 2009. Presas consumidas por la Lechuza de campanario (*Tyto alba*) en la localidad de Olavarría, Buenos Aires: un caso de elevada batracofagia. Nuestras aves 54: 20-21.

Ferrari, C. y C. Henschke.2002. Registros del Gaviotín negro (*Chlidonias niger*) en la Reserva Costanera Sur y en San Pedro, Buenos Aires. Nuestras Aves 44: 19-20.

Ferrari, C., R. Güller, P. Rodríguez Elías y S. Vitale.2004b. Notas sobre la avifauna en las provincias de Santiago del Estero y Catamarca, Argentina. Nuestras Aves 48: 14-16.

Ferrari, S. y C. Albrieu. 2005. Estrategias y acciones para la conservación de las aves playeras en el estuario del río Gallegos, Santa Cruz. XI RAO: 40.

Ferrari, S., C. Albrieu, S. Imberti y C. Lishman. 2008. Estado actual del conocimiento de un chorlo endémico de la Patagonia austral, el Chorlito Ceniciento (*Pluvianellus socialis*): reuniendo las piezas de un rompecabezas. Ornit. Neotrop. 19 (Suppl.): 433-443.

Ferrari, S., S. Imberti y C. Albrieu. 2003. Magellanic Plovers *Pluvianellus socialis* in southern Santa Cruz Province, Argentina. Waser Study Group Bulletin, 101/102.

Ferrari, S., Z. Lizarralde, C. Albrieu y S. Pittaluga. 2005a. El Playero rojizo (*Calidris canutus rufus*) en el sur de Santa Cruz: abundancia, patrón migratorio y alimentación. XI RAO: 96.

Ferrer, D. G., U. Lardelli, R. Olivera y D. Cucchiara. 2013a. Observaciones sobre la presencia y reproducción del Chorlito de vincha (*Phegornis mitchellii*) en el Parque Provincial Aconcagua, Mendoza, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 116: 1-12.

Ferrer, D., R. Escudero, A. Traslaviña y E. Navarro. 2013b. Nuevos registros de aves para el parque

provincial Aconcagua y zonas aledañas, Argentina. Nuestras aves 58: 24-26.
Ferrer, D., U. Lardelli y R. Olivera. 2011. Propuesta para declarar sitio AICA al Parque Provincial Aconcagua y al Monumento Natural Puente del Inca, Las Heras, Mendoza, Argentina. Biológica Nº 14: 71-75.
ffrench, R. 1973. A Guide to the Birds of Trinidad and Tobago. Oliver & Boyd, Edimburgo.
Fiameni, M. A.1991. Hallazgo de *Hylocharis chrysura* en Necochea, Buenos Aires. Nuestras Aves 25: 25.
Fiameni, M. A.1994. Aves del Partido de Necochea. La Plata. Bs. As. Pág. 1-39.
Filipello, A. M. y J. López de Casenave. 1993. Variación estacional de la comunidad de aves acuáticas de la Reserva Costanera Sur. Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. B. Rivadavia. Ecología, 4 (3): 1-15.
Fiora A. 1933. El peso de aves. Hornero 5: 174-188.
Fiora, A.1939. Distribución geográfica de las especies de aves capturadas en la provincia de Jujuy y zonas limítrofes. Physis 16: 272-289.
Fiori, S. M. y S. M. Zalba. 1999. Plan de Manejo de la Reserva Provincial Auca Mahuida, Neuquén. GEKKO-Grupo de estudios en Conservación y Manejo. Departamento de biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur-Bahía Blanca, 1-260 p.
Fitzgerald, Jenny, Thomas S. Schulenberg, and Glenn Seeholzer. 2011. Squirrel Cuckoo (*Piaya cayana*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=201816
Fjeldsa J. 1985. Origin, evolution, anda status of the avifauna of Andean wetland. Neotropical Ornithology, Ornithological Monographs Nº 36: 85-112.
Fjeldsa J. y N. Krabbe. 1990. Birds of the High Andes, Published by Zool. Mus. Univ. of Copenhagen and Apollo Books, Svendborg, Denmark. 876 pág.
Fjeldsa, J. 1996. Family Thinocoridae (Seedsnipes) en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 3. Hoatzin to Auks. Lynx Edicions, Barcelona.
Fontana, L. 1918. Lista de las aves de la Región Andina (Mendoza, San Juan La Rioja y Catamarca). Academia Nacional de Ciencias Exactas Físicas Naturales de Buenos Aires, 1-15.
Fontanarrosa, G., C. Barrionuevo, D. Ortiz y P. Capllonch. 2008. Sobre la distribución y alimentación de la Lechucita canela y el Alicucu yungueño en el norte argentino. XII RAO. San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia Argentina. : 65.
Fracassi, N., J. Pereira y P. Teta. 2004. Efecto de la sequía sobre el comportamiento dietario de *Tyto alba* en el Parque Nacional Lihué Calel, La Pampa, Argentina. Primer Simposio Argentino sobre investigación y Conservación de Repaces. SAICRI. Libro de actas, pag. 30.
Fracchia, G. y A. Aranda-Rickert. 2015. La Liga (*Ligaria cuneifolia*) como recurso alimenticio clave para aves del monte de la provincia de La Rioja. Nuestras Aves 60: 95-97.
Fraga, R. M. 2001b. The avifauna of Estancia San Juan Poriahú, Iberá marshes, Argentina : check-list and some netural history notes. Cotinga 16: 81-86.
Fraga, R. M., A. E. Ruffini y D. Grigera.1997. Interacciones entre el Picaflor rubí *Sephanoides sephanoides* y plantas del bosque subantártico en el Parque Nacional Nahuel Huapi, Argentina. Hornero 14: 224-234.
Fraga, R. M., S. Narosky y H. Rodriguez Moulin.1984. Hallazgo de un nido de *Phaetornis pretrei* Hornero 12: 189-192.
Fraga, R. M.1983a. Conducta vocal y reproductiva de la Yerutí común (*Leptotila verreauxi*) en Lobos, Buenos Aires, Argentina. Hornero 12: 89-95.
Fraga, R. M.1984c. Casos de nidificación otoño-invernal en algunas rapaces (*Tyto alba, Asio clamator, Elanus leucurus*) en Lobos, Buenos Aires. Hornero 12: 193-195.
Frere, E. y P. A. Gandini. 1998.Distribución reproductiva y abundancia de las aves marinas de Santa Cruz. Parte II : de Bahía Laura a Punta Dungennes. Pp. 153-177. En: P. Yorio, E. Frere, P. Gandini & G. Harris (eds.). Atlas de la distribución reproductiva de aves marinas en litoral patagónico argentino, Fundación Patagónica Natural y Wildlife Conservation Society, Buenos Aires.
Friedmann, H. 1927. Notes on some Argentina birds. Bull. Mus. Comp. Zool. 68: 139-236.
Frixione, M. G., Casaux, R., Villanueva, C. and Alarcón, P. A. E. (2012) A recently established Kelp Gull colony in a freshwater environment supported by an inland refuse dump in Patagonia. Emu 112: 174–178.
Furness, R. W. 1996. Family Stercorariidae (Skuas), Pp. 556-571, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 3. Hoatzin to Auks. Lynx Edicions, Barcelona.

Galende, G. y A. Trejo. 2003. Depredation de Águila mora (*Geranoaetus melanoleucus*) y el Búho (*Bubo magellanicus*) sobre el Chinchillón (*Lagidium viscacia*) en el noroeste de Patagonia, Argentinas. Mastozoología Neotropical 10 (1): 143-147.

Gallardo, L. A. y J. M. Gallardo. 1984. Observaciones realizadas sobre el comportamiento de *Otus choliba* (Vieillot) (Aves: Strigiformes) en libertad. Com. Mus. Arg. Cs. Nat. Zool. 4: 109-114.

Gallegos Luque, D.1984. Aspectos de la biología reproductiva del Tero común *Vanellus chilensis* (Gmelin). I. Comportamiento y territorialidad. Hornero 12: 150-155.

Galmes, M. A., C. Solaro, J. H. Sarasola, N. Davini y M. A. Santillán. 2008a. Programa de extensión y difusión de *Harpyhaliaetus coronatus* en la provincia de La Pampa. XII RAO: 188.

Galmes, M. A., M. A. Santillán, M. M. Reyes, J. H. Sarasola y M. Dolsan. 2008b. Presas del Halcón peregrino (*Falco peregrinus*) en un ambiente urbano del centro de Argentina. XII RAO: 174.

Gandini, P. A., Seco Pon, J. P. y E. Frere. 2008. Composición de la dieta de la Gaviota Austral (*Larus scoresbii*) en Patagonia, Argentina. Ornit. Neotr. 19: 109-116.

Gandini, P. y E. Frere. 1995b. Recomendaciones para el manejo de Punta Medanosa. Informe Nº 8. Pan de manejo Integrado de la Zona Costera Patagónica. Fundación Patagónica Natural (Puerto Madryn). Anexo 6. Pp. 45-55.

Gandini, P. y E. Frere. 1996. Plan para el uso turístico y recreativo de la Ría Deseado e isla Pingüino, Santa Cruz. Informes Técnicos del Pan de manejo Integrado de la Zona Costera Patagónica. Fundación Patagónica Natural (Puerto Madryn) Nº 18: 1-22.

Gandini, P. y E. Frere. 1998a. Distribución reproductiva y abundancia de las aves marinas de Santa Cruz. Parte I : de la Lobería a Islote del Cabo. En: P. Yorio, E. Frere, P. Gandini & G. Harris (eds.). Atlas de la distribución reproductiva de aves marinas en litoral patagónico argentino, pp. 119-151. Fundación Patagónica Natural y Wildlife Conservation Society, Buenos Aires.

Gandini, P. y E. Frere. 1998b. Seabird and shorebird diversity and associated conservation problems in Puerto Deseado, Patagonia, Argentina. Ornitología Neotropical 9: 13-22.

Gandoy, F. A., E. A. Depino, G. Mangini y F. B. Egli. 2014. Nuevo registro de la Becasina gris (*Limnodromus griseus*) para Argentina: identificación e historia de un género conflictivo. Nuestras Aves 59: 21-24.

Gandoy, F., F. B. Egli, F. C. Gorleri, L. Castillo y S. Zalazar. 2015. La Palomita escamada (*Columbina squammata*) ocupa pequeños claros de desmontes en el Chaco húmedo. Nuestras Aves 60: 84-87.

García Esponda, C. M., I. J. M. De Santis, J. I. Noriega, G. O. Pagnoni, G. J. Moreira y M. N. Bertellotti. 1998. The diet of *Tyto alba* (Strigiformes: Tytonidae) in the lower Chubut valley river (Argentina). Neotrópica (La Plata) 44: 57-63.

García Esponda, C. M., N. R. Coria y D. Montalti. 2000. Breeding birds at Halfmoon Island, South Shetland Islands, Antarctica, 1995/96. Marine Ornitthology 28: 59-62.

García Peña, G. E., M. A. Hernández y L. O. Bala. 2008. Ecología reproductiva del Chorlo doble collar (*Charadrius falklandicus*) en Península Valdés. Ornitología Neotropical (Suplemento) 19: 445-452.

García, G. O. y A. Gómez Laich. 2007. Abundancia y riqueza específica de un ensamble de aves marinas y costeras del sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Hornero 22 (1): 9-16.

García, G. O. y C. A. Paterlini. 2009. First record of Greater Yellowlegs *Tringa melanoleucua* feeding on grapsid crabs on an Argentinian estuary. Water Stud.Group Bull.116: 1.

García, G. O. y R. Mariano-Jelicich. 2005. Foraging behavior of the Snowy-crowned Tern (*Sterna trudeaui*) at Mar Chiquita, Buenos Aires Province, Argentina. Ornit. Neotr. 16: 563-566.

Gatto, A. J. y P. Yorio. 2009. Provisioning of mates and chicks by Cayenne and Royal Terns: resource partitioning in Northern Patagonia, Argentina. Emu 109: 49-55.

Gatto, A. y P. Yorio.2005. Variación en la dieta del Gaviotín sudamericano (*Sterna hirundinacea*) durante la temporada reproductiva en la Reserva provincial de Punta loma, Chubut, Argentina. XI RAO: 105. Buenos Aires.

Gatto, A., F. Quintana, P. Dorio y N. Lisnizer. 2005. Abundancia y diversidad de aves acuáticas en un humedal marino del golfo San Jorge, Argentina. Hornero 20 (2): 141-152.

Gavensky, M. 2013. Nuevos registros de aves para el conourbano bonaerense en la Reserva Municipal de Vicente López: Ave Fragata (*Fregata magnificens*), Chorlo ártico (*Pluvialis squatarola*) y Playero rojizo (*Calidris canutus*). Ecoregistros Revista, 3 (7): 29-32.

Gavio, H. S.1939. Excursión al Parque Provincial de Sierra de la Ventana. Hornero 7: 255-259.
Gazari, R. R.1967. Notas sobre algunas aves no señaladas o poco conocidas al sur del río Colorado. Hornero 10: 451-454.
Gelain, M. A. 1984a. La avifauna del Cerro Otto. Nuestras aves 3: 4-5.
Gelain, M. A. 2001. Lista sistemática de las aves del Municipio de San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina. Ed. Grupo Naturalista Sur Patagonia.
Gelaín, M. A. 2007b. Reserva Municipal Isla Huemul. Departamento Bariloche, Río Negro, Argentina. Relevamiento ornitológico. I. Xolmis Nº 2: 26-28.
Gelain, M. A. 2008a. Presencia de *Parabuteo unicinctus unicinctus* (Temminck, 1824) (Aves: Accipitridae) en la provincia de San Juan, Argentina. Xolmis Nº 3: 42-45.
Gelain, M. A. 2008b. Nuevos aportes a la avifauna sanjuanina. Xolmis Nº 3: 45-47.
Gelain, M. A. 2009a. Aporte al conocimiento de la biología reproductiva del Chimango *Milvago chimango* Vieillot, 1816 (Aves: Falconiformes). Xolmis 4: 13-16.. Xolmis Nº 3: 45-47.
Gelain, M. A. 2010. Aves de la patagonia argentina: atlas ornitológico de Río Negro. San Juan.
Gelain, M. A. 2011a. Registro de un nido de Picaflor común *Chlorostilbon aureoventris* en la provincia de San Juan, Argentina. Xolmis CRO 2: 1-3. Poner en nido
Gelain, M. A. 2012a. Segundo nido descripto para San Juan del Picaflor común *Chlorostilbon aureoventris* (d´Orbigny y Lafresnaye, 1838). Xolmis CRO 12: 1-2. Poner en nido
Gelain, M. A. 2012b. Aves: Provincia de Río Negro, Argentina. Aves de Carri-Laufquen y adyacencias. II. Lista comentada. Xolmis CRO 14: 1-35.
Gelain, M. A. 2012e. Observaciones urbanas. Utilización de árboles por aves en Villa del Salvador, San Juan. Xolmis 21: 1-4. Ver pone varios nidos
Gelain, M. A. 2013h. Nuevos registros de aves para el departamento Valle Fértil, provincia de San Juan, República Argentina. Xolmis 32: 1-3.
Gelain, M. A. 2013i. Registros de *Phalaropus lobatus* y *Phalaropus fulicarius* en el departamento Angaco, provincial de San Juan, República Argentina. Xolmis 24 : 1-3.
Gelain, M. A. 2014a. Lista preliminar de aves del departamento Angaco, provincia de San Juan, República Argentina. Xolmis 35: 1-27.
Gelain, M. A. 2014b. Las Palomas (Familia Columbidae) presentes en el departamento Angaco, San Juan, República Argentina. Xolmis CRO, 37: 1-8.
Gelain, M. A. 2014d. Las aves y la Mora Morus alba en zona urbanizada. Xolmis CRO, 40: 1-3.
Gelain, M. A. 2014e. Nuevos registros del Picaflor común *Chlorostilbon lucidus* (Shaw, 1812) en Angaco. Xolmis CRO, 39: 1-3.
Gelain, M. A. 2014i. Nuevos datos de nidificación de la Paloma de ala manchada *Patagioenas maculosa* Temminck, 1813 en Villa del Salvador, Angaco, Provincia de San Juan, República Argentina. (Aves: Familia Columbidae). Xolmis CRO, 44: 1-3.
Gelain, M. A. y A.Casas. 1986b. Nueva distribución para el Chorlito de collar. Nuestras Aves 11: 7-8.
Gelain, M. A. y J. Tolosa. 2011. Aves de la provincia de Río Negro. Lista sistemática. Xolmis CRO 6: 1-37.
Gelain, M. A. y M. Diez Peña. 2006. Nuevos datos de la distribución del Gaviotín lagunero (*Sterna trudeaui*) y del Zorzal chiguanco (*Turdus chiguanco*) en Chubut, Argentina. Nuestras Aves 52: 31.
Gelain, M. A. y R. Pereyra Lobos. 2011a. Datos generales de nidificación y distribución de *Parabuteo unicinctus* (Aves: Accipitridae) en San Juan, Argentina. Xolmis CRO 5: 1-8.
Gelain, M. A. y R. Pereyra Lobos. 2011b. Lista de aves de la provincia de San Juan, Argentina. Xolmis CRO 3: 1-12.
Gelain, M. A., L. Sympson y F. F. Vidoz.2003. Aves de Bariloche. Lista comentada de aves del departamento Bariloche, Provincia de Río Negro, Argentina. Libros del Mediodía. San Carlos de Bariloche.
Gelain, M. A.1984b. Aves de ribera del curso inferior y desembocadura del río Ñirihuau. Nuestras Aves 4: 26-27.
Ghys, M. I. y M. Favero.2004. Espectro trófico de la Gaviota capucho café (*Larus maculipennis*) en agroecosistema del sudeste de la provincia de buenos Aires, Argentina. Ornit. Neotropical 15: 493-500.
Giaccardi, M. y P. Yorio.2004. Temporal patterns of abundance and waste use by Kelp Gulls (*Larus dominicanus*) at an urban and fishery waste site in northern coastal patagonia, Argentina. Ornit. Neotropical 15 (1): 93-102.
Giaccardi, M., P. Yorio y M. E. Lizurume.1997. Patrones estacionales de abundancia de Gaviota cocinera (*Larus dominicanus*) en un basural patagónico y su relación con el manejo de residuos

urbanos y pesqueros. Ornitología Neotropical 8: 77-84.
Giacomelli, E. 1907. Catálogo sistemático de la avifauna riojana. Anales de la Sociedad Científica Argentina, 63: 66-84.
Giacomelli, E. 1923. Catálogo sistemático de las aves útiles y nocivas de la provincia de La Rioja. Hornero 3: 66-84.
Giai, A. G. 1942. Aves desde mi ventana. Hornero 8: 268-270.
Giai, A. G. 1952-1953. Diccionario ilustrado de las aves argentinas. Mundo agrario. Ed. Haynes S.A.
Giai, A. G.1950. Notas de viajes. Por el norte occidental de Santa Fe y por el norte de Misiones. Hornero 9: 121-164.
Gianini, N. P. 2000. La interacción de aves-murciélagos-plantas en el sistema de frugivoría y dispersión de semillas en San Javier, Tucumán, Argentina. Tesis doctoral, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto M. Lillo, Universidad. Nacional de Tucumán, Tucumán, Argentina.
Giarduz, C. A. 2008. Picaflor cometa (*Sapo sparganura*), Picaflor rubí (*Sephanoides sephanoides*) y Picaflor garganta blanca (*Leucochloris albicollis*) en Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves 53:31-33.
Gibson, E. 1880a. Ornithological notes from the neighbouhood of Cape San Antonio, province of Buenos Ayres. Ibis (4th ser.) 4: 1-38.
Gibson, E. 1880b. Ornithological notes from the neighburhood of Cape San Antonio, Province of Buenos Ayres. Ibis 1880: 153-169.
Gibson, E. 1920. Fur ther ornithological notes from the neighburhood of Cape San Antonio, Province of Buenos Ayres. Part III. Phoenicopteridae-Rheidae. Ibis Serie XI, Vol. II: 1-97.
Gil, G., E. Haene y J. C. Chebez. 1995. Notas sobre la avifauna de Sierra de las Quijadas. Nuestras Aves 31: 26-28.
Girard, P.1933. Notas sobre algunas aves de Tucumán. Hornero 5: 223-225.
Giraudo, A, R. S. A. Di Giacomo, M. A. Ordano, M. L. Chatellenaz y E. Krauczuk. 2003b. Aves amenazadas del Iberá: un refugio que se desvanece. Pp. 273-301. En B. B. Alvarez (ed.). Fauna del Iberá. EUDENE. Talleres Gráficos Volpe/Fox, Buenos Aires.
Giraudo, A. R. 1996. Adiciones a la avifauna de la provincia de Corrientes, Argentina y de zonas limítrofes del Paraguay. Facena 12: 49-53.
Giraudo, A. R., A. Bortoluzzi y V. Arzamendia. 2006. Vertebrados tetrápodos de la reserva y sitio ramsar "Esteros del Iberá" (Corrientes, Argentina): análisis de su composición y nuevos registros para especies amenazadas. Natura Neotropicalis, 37 (1-2): 1-20.
Giraudo, A. R., J. L. Baldo y R. R. Abramson.1993. Aves observadas en el sudeste, centro y este de Misiones (República Argentina), con la mención de especies nuevas o poco conocidas para la provincia. Nótulas Faunísticas 49: 1-13.
Giraudo, A., B. Fandiño, V. Arzamendia y G. Bellini. 2008. Aves nuevas o poco conocidas de Santa Fe (Argentina), incluyendo los sitios Ramsar Jaaukanigás y Melincué. Natura Neotropicalis 39: 89-99.
Giraudo, H., J. Klavins y G. Bruno. 2013a. Primer registro documentado de Picaflor gigante (*Patagona gigas*) en la provincia de Córdoba, Argentina. Nuestras aves 58: 28-29.
Girini, J. M., D. Montalti y A. Trejo. 2016. Nuevos registros de Lechuza bataraz austral Strix rufipes en ambientes no-boscosos del norte de la Patagonia andina. Cotinga 38: 55-57.
Gochfeld, M. y J. Burger. 1996. Family Sternidae (Terns). Pp. 624-667, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 3. Hoatzin to Auks. Lynx Edicions, Barcelona.
Godoy, I., F. Suazo Lara, E. Guerrero, P. Rivero, B. González, M. Alegre, A. Godoy, C. Kain, F. Sesto y N. R. Chimento. 2012. Relevamiento biótico de la costa rioplatense de los partidos de Quilmes y Avellaneda (Buenos Aires, Argentina). Parte II: Aves. Historia Natural. Tercera Serie. Volumen 2: 57-95.
Gollán, J. S. 1951. Un refugio de aves acuáticas. El Parque Nacional Laguna Blanca. Hornero 9: 280-287.
Gómez, M. D., G. Fontanarrosa, P. E. Ortiz y J. P. Jayat. 2012. Pequeños mamíferos predados por la Lechuza de campanario (*Tyto alba*) en la ecorregión del Chaco seco en el noroeste argentino. Hornero 27: 127-135.
Gómez, V. 2006. Aves del Parque General San Martín (Mendoza). Distribución y características. Multequina, 15 (2): 81-95, versión on line.
González Gómez, P. L., Valdivia, C. E., Romero, C. R. Y A. M. Humaña. 2004. *Puya berteroniana* y *Puya coerulea* como recurso alimenticio para aves en Chile central. Bol. Chil. Ornit. 10: 29-33.
González, P. 1990. Las aves costeras y su relación con el entorno. Contribución a la Carta ambiental de

San Antonio Oeste. Dirección de Planificación ambiental.
González, P. 1991. Partición del hábitat y patrón de distribución y abundancia temporal de chorlos y playeros migratorios (Charadriidae, Scolopacidae) en "Los Álamos". Provincia de Río Negro, Argentina.
González, P. 1992. Relevamiento faunístico preliminar del área El Salado-Punta Pozos. Informe interno Subdirección de Fauna. Provincia de Río Negro.
González, P. 1996. Hábitat pertitioning and the distribution and seasonal abundances of migratory plovers and sandpipers in Los Alamos, Río Negro, Argentina. In: Hicklin P., De., Shorebirds ecology and conservations in the Western Hemisphere, Int. Wader Studies 8: 93-102.
González, P. M. 2005. San Antonio Oeste. En A S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 341-343. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
González, P. M., C. Albrieu, L. O. Bala, L. G. Benegas, M. Carbajal, V. L. D´Amico, M. E. Echave, G. Escudero, S. Ferrari, M. A. Hernández y L. R. Musmeci. 2008. Integrando cuatro sitios de Patagonia para evaluar la migración al norte del Playero rojizo (*Calidris canutus rufa*) luego de la declinación poblacional de 2005. XII RAO: 36. San Martín de los Andes, Neuquén.
González, P. M., M. Carvajal, R. I. Guy Morrison y A. J. Baker. 2004. Tendencias poblacionales del Payero rojizo (*Calidris canutus rufa*) en el sur de Sudamérica. Ornitología Neotropical 15 (Supp.): 357-365.
González, P. M., Piersma, T. y Verkuil, Y. 1996. Food, feeding and refuelling of red knots during northward migration at San Antonio Oeste, Río Negro, Argentina. J. Field Ornith. 67: 575-591.
González, P., M. Bertellotti, M. Giaccardi, R. Lini, M. E. Lizurume y P. Yorio. 1998. Distribución reproductiva y abundancia de las aves marinas de Río Negro. Pp. 29-38. En: P. Yorio, E. Frere, P. Gandini y G. Harris (eds.). Atlas de la distribución reproductiva de aves marinas en litoral patagónico argentino, Fundación Patagónica Natural y Wildlife Conservation Society, Buenos Aires.
Goodall, J. F, A. W. Johnson y R. A. Philippi. 1964. 2º Suplemento de Las aves de Chile. Págs. 443-523.
Goodall, J. F, A. W. Johnson y R. A. Philippi.1946. Las aves de Chile. Tomo 1. Platt Est. Graf. SA.
Goodall, J. F, A. W. Johnson y R. A. Philippi.1951. Las aves de Chile. Tomo 2. Platt Est. Graf. SA. Págs. 445.
Goodall, J. M. 1923. Remarks on the eggs of some Argentine Cuckoos and Argentine and Canadian Cowbirds. Bulletion of the Bristish Ornithologist Club, 43: 63-68.
Goodall, R. N., A. C. M. Schiavini y M. Galussio. 1991. Summer evaluation of mammals and of the Southwestern South Atlantic coast, between Cabo Vírgenes and Cabo San Sebastián. Informe inédito. Total Austral S. A., 182 pp.
GORA. (Grupo de observadores ribereños de aves). 1991. Ñacurutú, Milano tijereta y Boyero negro en el partido de Berisso. Garganchillo 11: 13-15.
Gorgoglione, C. E. 2005. Guía de campo para la identificación de las aves del Neuquén. Edición del autor. 3º Edición. Junín de los Andes. 279 págs.
Gorleri, F. y A. G. Di Giacomo. 2002. Lista sistemática de las aves de la Biósfera Laguna Oca del Río Paraguay, Formosa. Informe, 14 pp.
Gorleri, F., M. C. Gorleri. y M. Murdoch. 2011. Aves de la Reserva de Biosfera Laguna Oca, Formosa, Argentina. Universidad Nacional de Formosa/SPU Programa de Voluntariado Universitario. Ideas Gráficas. Formosa.
Gorleri, F., M. C. Gorleri., M. Murdoch y U. Ornstein. 2011. Aves de la Reserva de Biosfera Laguna Oca, Formosa, Argentina. Universidad Nacional de Formosa/SPU Programa de Voluntariado Universitario. Ideas Gráficas. Formosa.
Gorordo, P., C. I. Montalvo y S. I. Tiranti.2005. Modificaciones sobre huesos de roedores producidas por la Lechuza de campanarios *Tyto alba* (Aves, Atrigiformes) en el norte de La Pampa, Argentina. XI RAO: 111. Buenos Aires.
Gosse, P. 1899. Birds of the Aconcagua Valley of Mendoza. En E. A. Fitz Gerald (ed.). The Highest Andes. Mehtuen & Co. London. Pp. 342-352.
Grant, C. H. B. 1911c. List of Birds collected in Argentina, Paraguay, Bolivia y Southern Brasil, with field notes. Ibis 1911: 80-137; 317-350; 459-478.
Graves, G. R. y R. L. Zusi. 1990. Avian body weights from the lower Rio Xingu, Brazil. Bull. B.O.C. 110: 20-25.
Greeny, H. F. y P. B. Wetherwax.2005. Brooding behaviour and nestling growth of the Lyre-tailed Nightjar *Uropsalis Lyra*. Cotinga 23: 44-47.

Gregory, P. 1994. Notes on new and scarce birds on the Falkland Islands 1988-1990. Bulletin of the British Ornithologists' Club 114:12–20.

Grigera, D. E. y S. Rubulis. 1985. Aves de la cuenca del río Manso superior. Cuadernos Univ. Universidad Nac. del Comahue Centro Regional Bariloche. 14: 1-18.

Grigera, D. y C. Pavic. 2007. Ensamble de aves en un sitio quemado y en un sitio no alterado en un área forestal del noroeste de la patagonia argentina. Hornero 22 (1): 29-37.

Grilli, P. G., F. M. Idoeta y M. L. Arellano. 2009. Reaparición del Pato Crespón *Sarkidiornis melanotos* en la Región Pampeada de Argentina. Cotinga 31: 155-156.

Güller, R. 2008.*Sporophila nigrorufa* (D´Orbigny y Lafresnaye, 1837) una nueva especie para la avifauna argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda serie. 20: 1-3.

Güller, R. y N. Oste. 2011. Nuevo registro del Picaflor pecho azul (*Amazilia lactea*) en Argentina. Nuestras Aves 56: 12-13.

Güller, R. y P. Rodríguez Elías. 2013. Expansión del Picaflor pecho azul (Amazilia lactea) en la provincia de Misiones, Argentina. Nótulas Faunísticas 130: 1-5.

Güller, R., R. Cali y F. Martínez. 2006. Falaropo pico grueso (*Phalaropus fulicarius*) y Guayata (*Chloephaga melanoptera*) en el Parque Provincial Aconcagua, Mendoza, Argentina. Nuestras Aves 52: 20.

Haene, E. H. y A. Montañez. 1996. Notas sobre aves de la reserva de la biósfera San Guillermo (Provincia de San Juan, República Argentina). Nuestras Aves 34: 47-48.

Haene, E. H.1987. Nuevos registros para la avifauna sanjuanina. Nuestras Aves 12: 18-19.

Haene, E., A. Montañez, A. Carrizo, G. Bodrati, J. Bono, G. Krauss, E. Mérida, C. Nardini, R. Rodríguez, J. Jones y A. Pérez. 2001. Primer inventario de los animales vertebrados del Parque Nacional San Guillermo (Provincia de San Juan, República Argentina) Bol. Soc. Biol. 72: 59-67. Concepción, Chile.

Handford, P. 1983. Breves notas sobre aves del valle de Tafí, provincia de Tucumán. Neotrópica 29 (81): 97-105.

Hardy, J. W. y R. Straneck. 1989. The Silky-Tailed Nightjar and other neotropical caprimulgids : unraveling some mysteries. The Condor 91: 193-197.

Haro, G. 2002. Aves albinas en la colección del Museo de Zoología de la Universidad Nacional de Córdoba. Natura Neotropicalis 33: 85-88.

Haro, J. G. 1998. Alimentación de aves insectívoras en un bosque de coníferas en río de los Sauces (Córdoba, Argentina) Natura Neotropicalis 29: 117-125.

Haro, J. G. y M. Gutierrez. 1992. La avifauna de una forestación de pinos en río de los Sauces, Córdoba. Hornero 13: 214-218.

Harper, E. C. 1923a. Albinismo en la Palomita *Zenaida auriculata* y en la Martineta *Rhynchotus rufescens*. Hornero 3: 97-98.

Harrington, B. A., de Tarso Zuquin Antas, P. y F. Silva. 1986. Northward Shoresbird migrationn on the Atlanticcoast of southern Brazil. Vida Silv. Neotr. 1: 45-54.

Harris, G. 2008. Guía de aves y mamíferos de la costa patagónica. El Ateneo. Buenos Aires.

Hart, Julie A., C. Soberanes-González, C. Rodríguez-Flores, and M. C. Arizmendi. 2011. Ruddy Ground-Dove (*Columbina talpacoti*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=174101

Hartert, E. y S. Venturi.1909. Notes sur les oiseaux de la République Argentine. Novit. Zool. 16: 159-267.

Haverschmidt, F. 1968. Birds of Surinam. Oliver & Boyd, Edinburgh.

Hayman, P., J. Marchant yT. Prater. 1986. Shorebirds. An identification guide to the waders of the world. Croom Helm Ltd. Londres. Pp. 412.

Hayward, K. J. 1967. Fauna del noreste argentino. 1. Las aves de Guayapa (La Rioja). Acta Zool. Lilloana XXII : 211-220.

Hecker, E. y F. Vidoz. 1998. Aves del Lago Escondido. Hidden Lake S.A. Págs. 95.

Heinonen Fortabat, S. y E. H. Haene. 1994. Primeros aportes al conocimiento de los micromamíferos del monumento natural de los Bosques Petrificados (Provincia de Santa Cruz, República Argentina), con algunos comentarios biogeográficos. Nótulas Faunísticas 58: 1-4.

Heinonen Fortabat, S., J. C. Chebez y G. Gil.1992. Novedades ornitogeográficas argentinas III. Nuestras Aves 26: 20-21.

Heinonen, S. y J. C. Chebez. 1989. Nuevas aves para Misiones. Nuestras Aves 18: 5-7.

Hellmayr, C. E. 1932. The birds of Chile. Field Museum of Natural History, Zoological Series, 19: 1-472.

Hellmayr, C. E. y B. Conover. 1942. Catalogue of birds of the Americas and the adjacent islands. Field Museum of Natural History. Vol. 13. Part 1 (1) (Rheidae to Columbidae): 1-636.

Hellmayr, C. E. y B. Conover. 1948b. Catalogue of birds of the Americas and the adjacent islands. Field Museum of Natural History. Vol. 13. Part 1 (3) (Jacanidae to Alcidae): 1-383.

Hemming, A. D. 1985. Sandpiper at Signy Island, South Orkney Islands, December 1981-January 1982. British Antarctic Survey Bulletin 69: 81-82.

Heredia, G. y M. Funes. 1987. Informe técnico sobre el Parque provincial Tromen-Los Barros y Reserva Provincial Lagunas de Epu Lauquen. Subsecretaría de la Producción y Recursos Naturales de la Provincia del Neuquén. Infome Inédito.

Heredia, J. 2006. Aves de las Sierras de Córdoba. Guía de campo. 50 p. La Falda. Córdoba.

Heredia, J. y C. de la Fourniere. 2008. Primer registro de Atajamaminos coludo (*Macropsalis forcipata*) para Corrientes, Argentina. Nuestras Aves 53:25-26.

Hernández, M. A. y L. O. Bala. 2007. Prey selection and foraging patterns of the White-rumped Sandpiper (*Calidris fuscicollis*) at Península Valdés, Patagonia, Argentina. Ornit. Neotr. 18: 37-46.

Hernández, M. A., Bala, L. O. y L. R. Musmeci. 2008. Dieta de tres especies de aves playeras migratorias en Península Valdés, Patagonia, Argentina. Ornit. Neotr. 19: 605-611.

Hernández, M. A., L. R. Musmeci y L.O. Bala. 2005c. Dieta diferencial del Playero blanco (*Calidris alba*) en función de la disponibilidad de alimento. XI Reunión argentina de ornitología. B. Aires.: 114.

Hernández, M. de los A., G. Escudero, L. Musmeci y L. Bala. 2005b. ¿Existen variaciones en la dieta del Plateyo Rojizo (*Calidris canutus rufa*) a lo largo de la costa patagónica ?. XI RAO: 113. Buenos Aires.

Hernández, M. de los A., L. R. Musmeci y L. O. Bala. 2005a. Dieta comparada del Playero de rabadilla blanca (*Calidris fuscicollis*) en dos sitios de Península Valdés, Chubut. XI RAO: 114. Buenos Aires.

Hernández, M. de los A., V. L. D´Amico y L. O. Bala.2004. Presas consumidas por el Playero rojizo (*Calidris canutus*) en Bahía San Julián, Argentina. Hornero 19 (1): 7-11.

Herrera, E. D., V. Cailly-Arnulphi, S. Leveque, A. Arias y D. Elizondo. 2013. Aves del departamento Valle Fértil, San Juan, Argentina. Libro de Resúmenes XV RAO: 68. Santa Rosa, La Pampa.

Herrera, G. A.1988. Primeros registros para la provincia del Chaco del Picaflor de vientre negro *Anthracothorax nigricollis* y de Corbatita colorada *Sporophila hypochroma*.Garganchillo 8: 7-9.

Herrera, G., G. Punta y P. Yorio. 2005. Diet specialization of Olrog´s Gull *Larus atlanticus* during the breeding season at Golfo San Jorge, Argentina. Bird Conservation International 15: 89-97.

Hiraldo, F. J., A. Donázar, O. Ceballos, A. Travaini, J. Bustamante y M. Funes. 1995. Breeding biology of a Grey Eagle-buzzards population in Patagonia. Wilson Bull. 107: 675-685.

Hockey, P. A. R. 1996. Family Haematopodidae (Oystercatchers). Pp. 308-325, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 3. Hoatzin to Auks. Lynx Edicions, Barcelona.

Höhn, E. O.1975. Notes on Black-Headed Ducs, Painted Snipe and Spotted Tinamous. The Auk 92: 566-575.

Holland, A. H. 1890. On some birds of the Argentine Republic. Wiht notes by P. L. Sclater. Ibis 1890: 424-428.

Holland, A. H. 1896. Field-Notes on the Birds of Estancia Sta. Elena, Argentine Republic. Part.III. Ibis : 315-318.

Holland, A. H. 1897. Field-Notes on the Birds of Estancia Sta. Elena, Argentine Republic. Part. IV. Ibis : 166-169.

Holmberg, E. L. 1898. Aves. En: Fauna Argentina (ed.). Segundo censo de la República Argentina (1895), 1: 494-574.

Holmberg, E. L.1939. Las aves argentinas. Hornero 7: 142- 233.

Housse, P.1945. Las aves de Chile. Ed. de la Universidad de Chile. Pag. 1-390.

Höy, G. 1967. The eggs and nesting of the Puna Plevor. The Auk, 84 (1): 130-131.

Höy, G. 1968c. Uber Brutbiologie und Eir einiger Vogel aus Nordwest-Argentinien. Jour. Für Ornit 109, Heft 4 : 425-433.

Höy, G. 1987a. *Hydropsalis climacocerca* (Chudy) (Caprimulgidae), nuevo para la Argentina. Historia Natural 7 (5): 60. Corrientes.

Höy, G.1969a. Addendas a la avifauna salteña. Hornero 11: 53-56.

Humphrey, P. S., D. Bridge, P. W. Reynolds y R. T. Peterson.1970. Birds of Isla Grande (Tierra del Fuego). Prelim. Smiths. Manual. University of Kansas. Mus. of Nat. Hist. Págs. 411.

Humphrey, P. y D. Bridge. 1970. Apuntes sobre distribución de aves en la Tierra del Fuego y la patagonia argentina. Rev. Mus. Arg. de Cs. Nat. Zool. 10: 251-265.

Idoeta, F. M. y I. Roesler. 2012. Presas consumidas por el Carancho (*Caracara plancus*) durante el período reproductivo, en el noreste de la provincia de Buenos Aires. Nuestras Aves 57: 79-82.

Iglesias, G. J. y A. A. Pérez 1998. Región 4: Patagonia. En P. Canevari, D. E. Blanco, E. H. Bucher, G. Castro & I. Davidson (eds.). 1998. Los humedales de la Argentina: clasificación. Situación actual, conservación y legislación. Wetlans Internacional Publ. 46, Buenos Aires, Argentina, 208 pp.

Ihering, H. von. 1924. Notas oológicas sobre los cucúlidos. Hornero 3: 244-246.

Imberti, S. 2001a. Primera observación del Ñacundá (*Podager nacunda*) en Santa Cruz, Argentina, la más austral para la especie. Nuestras Aves 41: 10.

Imberti, S. y C. Albrieu.2001. Lista de las aves de la laguna Nimez. Univ. Nac. de la Patagonia Austral, Rio Gallegos, Santa Cruz, Argentina. Pag. 1-8.

Imberti, S.2003. Notes on the distribution and natural history of some birds in Santa Cruz and Tierra del Fuego provinces, Patagonia, Argentina. Cotinga 19: 15-24.

Imberti, S.2005e. Aves de Los Glaciares. Inventario Ornitológico del Parque Nacional Los Glaciares, Santa Cruz, Patagonia, Argentina. Aves Argentinas y Administración de Parques Nacionales. 80 pp.

Iribarne, O. y M. M. Martínez. 1999. Predation onthe southwestern Atlantic fiddler crab (*Ucauruguayensis*) by migratory shorebirds (*Pluvialisdominica*, *P. squatarola, Arenaria interpres* and *Numenius phaeopus*). Estuaries 22: 47-54.

Isacch, J. P. y E. H. Chiurla.1997. Observaciones sobre aves pelágicas en el SE bonaerense, Argentina. Hornero 14 (4): 253-254.

Isacch, J. P. y M. M. Martínez. 1998. Dieta y relaciones con la disponibilidad de presas de chorlos migradores patagónicos durante el período no-reproductivo en pastizales del SE de la Prov. de Buenos Aires. Resúmenes X RAO: 31. Mar del Plata.

Isacch, J. P. y M. M. Martínez. 2001. Estacionalidad y relaciones con la estructura del hábitat de la comunidad de aves de pastizales de Paja colorada (*Paspalum quadrifarium*) manejados con fuego en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Ornitología Neotropical. 12: 345-354.

Isacch, J. P. y M. M. Martínez. 2003. Habitat use Nom-breeding Shorebirds in Flooding Pampas Grasslands of Argentina. Waterbirds 26 (2): 494-500.

Isacch, J. P., C. F. Pérez y O. O. Iribarne. 2006. Bird species composition and diversity at middle argentinean coast of la Plata River. Ornitología Neotropical 17: 419-432.

Isacch, J. P., M. S. Bó y M. M. Martínez. 2000. Food habits of Striped Owl (*Asio clamator*) in Buenos Aires province, Argentina. J. of Raptor Research 34: 235-237.

Jaramillo, A. P. 2000. Punta Rasa, South America´sfirst vagrant trap?. Cotinga 14: 33-38.

Jazdzewski, K. y A. Konopacka. 1999. Necrophagous lysianassoid Amphipoda in the dieto f Antarctic Tern at King George Island, Antarctica. Antactic Science 11: 316-321.

Jehl, J. R. 1978. A new hybrid Oystercatcher from South America, *Haematopus leucopodus* x *H. ater*. Condor 80: 344-346.

Jehl, J. R. Jr. 1975. *Pluvianellus socialis*: biology, ecology and relationships of an enigmatic Patagonian shorebirds. Transactions, San Diego Society of Natural History 18: 29-73.

Jehl, J. R. y M. Rumboll. 1976. Notes on the avifauna of isla Grande and Patagonia, Argentina. Trans. of the San Diego Soc. of Nat. Hist. 18: 145-154. San Diego.

Jehl, J. R., Jr. 1974. The distribution and ecology of marine birds over the continental shelf of Argentina in winter. Trans. San Diego Soc. Nat. Hist. 17: 217-234.

Jenni, D. A. 1996. Family Jacanidae (Jacanas). Pp. 276-291, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 3. Hoatzin to Auks. Lynx Edicions, Barcelona.

Jenny, J. 1997. Unusual breeding behaviour of the Guira Cuckoo *Guira guira*. Cotinga 7: 18.

Jensen, R. y J. I. Areta. 2007. El Chorlo de espolón (*Vanellus cayanus*) en Argentina. Hornero 22 (1): 55-57.

Johansen, H. 1966. Die Vögel Feuerlands (Tierra del Fuego). Videnskabelige Meddelelser Dansk Naturhistorisk Forening 129: 215-260.

Johnson, Andy. 2012. Andean Hillstar (*Oreotrochilus estella*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of

Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=263096
Juares, M. A., M. M. Santos, J. Negrete, M. Gray, M. Baviera, M. E. Moreira, A. Carlini y N. R. Coria. 2009. Primer registro de la Becasa de mar (*Limosa haemastica*) en las islas Shetland del Sur, antártica. XIII RAO: 122. Tafí del Valle, Tucumán.
Junge, G. C. A. y K. H. Voous. 1955. The distribution and the relationship of *Sterna eurygnatha* Saunders. Ardea 43: 226-247.
Juri, M. D. 2007. Estudios ecológicos de la comunidad de aves en un gradiente urbano. Tesis doctoral, Facultad Ciencias Naturales e Instituto M. Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, 276 pp.
Juri, M. D. y J. M. Chani. 2005. Variación en la composición de comunidades de aves a lo largo de un gradiente urbano (Tucumán, Argentina). Acta Zoológica Lilloana, 49 (1-2): 49-57.
Justo, E. R. y L. J. M. De Santis. 1982. Alimentación de *Tyto alba* (Strigiformes, Tytonidae) en la provincia de La Pampa. Neotrópica, 28 (79): 83-86.
Kala, Muhammad, C. Soberanes-González, C. Rodríguez-Flores, and M. C. Arizmendi. 2011. Blue Ground-Dove (*Claravis pretiosa*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=174901
Keith, A. R. 1970. Bird observations from Tierra del Fuego. Condor 72 (3): 361-363.
Kieser, J. A. 1982. Dunlin *Calidris alpina*: new to Argentina. American Birds 36: 1024- 1025.
Klimaitis, J. F. 1975c. Observaciones ornitológicas. Hornero 11: 325-327.
Klimaitis, J. F. 1993. Contenido estomacal de algunas aves. Publicación Nº 3. Municipalidad de Berisso.
Klimaitis, J. F. y F. Moschione.1984. Observaciones sobre nidificación asociada en *Charadrius collaris, Sterna superciliaris y Rynchops nigra* en el río Uruguay, Entre Ríos, Argentina. Hornero 12: 197-202.
Klimaitis, J. F. y F. N. Moschione.1986. Cartilla sistemática de las aves de la Reserva integral de selva subtropical marginal de Punta Lara y sus alrededores (Provincia de Buenos Aires).
Klimaitis, J. F. y F. N. Moschione.1987a. Aves de la Reserva integral de selva marginal de Punta Lara y sus alrededores. Minist. Eco. Prov. Bs. Aires.
Klimaitis, J. F. y F. N. Moschione.1987b. Cartilla Sistemática de las aves del partido de Berisso. Municipalidad de Berisso. Buenos Aires.
Klimaitis, J. F. y S. M. Borba. 2016. Nidificación del Chorlito de collar Charadrius collaris en Berisso, provincia de Buenos Aires. Publicación Nº 8. Garganchillo Nueva Serie. Museo Ornitológico Municipal de Berisso.
Klimaitis, J. F.1975b. Lista sistemática de aves del Partido de Berisso (Bs. As.) Parte I: No passeriformes. Hornero 11: 271-280.
Klimaitis, J. F.1977b. De mi libreta de apuntes. *Stercorarius skua* en la provincia de Entre Ríos. Hornero 11: 417.
König, C. y F. Weick. 2008. Owls of the world. 2 ed. Christopher Helm, London.
König, C. y R. Straneck. 1989. Eine neue Eule (Aves: Strigidae) aus Nordargentinien. Struttgarter Beitr. Naturk. 428: 1-20.
Korschenewski, P.1969b. Observaciones sobre aves del litoral patagónico. Hornero 11: 48-52.
Koslowsky, J. 1895b. Enumeración sistemática de las aves de Chilecito, La Rioja. Rev. Mus. La Plata 6: 277-287. La Plata.
Kovacs, C., O. Kovacs, Z. Kovacs y C. M. Kovacs. 2005. Manual ilustrado de las aves de la patagonia, Antártica Argentina e islas del Atlántico Sur. 368. Pp. El Bolsón.
Kratter, A. W., T. Scotts Sillett, R. Terry Chesse, J. P. O´ Neill, T. A. Parker y A. Castillo. 1993. Avifauna of a Chaco locality in Bolivia. Wilson Bull., 105 (l): 114-141
Krauczuk, E. R. 2000. Presencia de *Chordeiles pusillus* como nidificante en la provincia de Misiones, Argentina. Ornitología Neotropical 11: 85-86.
Krauczuk, E. R. 2005. Aves do Inta-Campo Anexo ao Zaiman, e do Campus da Universidade Nacional de Misiones, Posadas, Misiones, Argentina. Atualidades Ornitológicas Nº 126: 1-22.
Krauczuk, E. R. 2008-2009. Riqueza específica, abundancia y ambientes de las aves de Corpus Chriti, San Ignacio, Misiones, Argentina. Lundiana 9 (1): 21-31.
Krauczuk, E. R. 2013. Algunos aspectos de la biología de *Chordeiles pusillus* en Misiones, Argentina y apuntes sobre otros Caprimulgiformes. Atualidades Ornitológicas. On-Line 173: 58-68.
Krauczuk, E. R. y F. Castía.2009.Notes on geographic distribution of three birds species in Misiones province, Argentina. Actualidades Ornitológicas On-line Nº 151.

Krauczuk, E. R. y J. Baldo.2004. Contribuiçao para o conhecimento da avifauna de um fragmento de floresta com araucaria em Misiones, Argentina. Actualidades ornitológicas 119: 42 págs.

Kuecker, Zerick, C. Soberanes-González, C. Rodríguez-Flores, M.C. Arizmendi, and Tom Johnson. 2012. Ruddy Quail-Dove (*Geotrygon montana*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=180181

La Sala, L. F., A. Pérez, S. Martorelli y J. Smits. 2011. Breeding biology of Olrog´s Gull in Bahía Blanca Estuary, Argentina. The Wilson Journal of Ornithology 123: 243-250.

La Sala, L. F., P. F. Petracci, V. Randazzo y M. E. Fernández-Miyakawa. 2013. Enteric bacteria in Olrog´s gull (*Larus dominicanus*) from the Bahía Blanca estuary, Argentina. Hornero 2 (2): 59–64.

Lajmanovich, R. C. y Beltzer, A. H. 1995. Aspectos de la alimentación de la Becasina común *Gallinago gallinago* (Aves: Scolopacidae) en el valle aluvial del Paraná medio, Argentina. Studies on Neotropical Fauna and Environment 30 (2): 121-127.

Lancelotti, J. L., L. M. Pozzi, F. Marquez, P. Yorio y M. A. Pascual. 2009. Waterbird occurrence and abundance in the Strobel Plateau, Paragonia, Argentina. Hornero 24 (1): 13-20.

Lanctot, R. B., D. E. Blanco, M. Oesterheld, R. A. Balbueno, J. P. Guerschman y G. Piñeiro. 2004. Assessing habitat availability and use by buff-breasted Sandpipers (*Tryngites subruficollis*) wintering in Aouth America. Ornitología Neotropical 15 (Suppl.): 367-376.

Lange, C. 1981. Una temporada de observaciones sobre *Podiceps gallardoi* (Aves: Podicipediformes). Ecología y etología. Neotrópica 27 (77): 39-56.

Laredo, C. D. 1996. Observations on migratory and resident shorebirds in lakes in the highlands of north-western Argentina. Int. Wader Stud. 8: 103-111.

Laredo, C. y R. Vides-Almonacid. 1999. Importancia para la avifauna andina de los humedales de Cumbres Calchaquíes, Aconquija y Valles intermontanos. XIX Reunión Argentina de Ecología, Tucumán.

Larsen, Ray. 2012. Ferruginous Pygmy-Owl (*Glaucidium brasilianum*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=212056

Laterra, P.1977. Nidificación de *Asio flammeus* en zona ribereña de la Capital Federal. Hornero 11: 436.

Laubmann, A. 1930. Vögel en Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen Gran Chaco-Expedition. Verlag von Strecker und Schröder, Stuttgart.

Le Nevé, A. y M. Manzione. 2011. First record of the Lesser Sand Plover (*Charadrius mongolus*) in Argentina: a new species for the country and for South America. Hornero 26: 177-180.

Leveau, C. M. y L. M. Leveau. 2006. Ensamble de aves en calles arboladas de tres ciudades costeras del sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Hornero 21: 25-30.

Leveau, C. M. y L. M. Leveau.2001. Nuevos registros de aves para Benito Juárez, provincia de Buenos Aires (Argentina). Nuestras Aves 41: 30-31.

Leveau, L. M. y C. M. Leveau. 2004a. Comunidades de aves en un gradiente urbano de la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Hornero 19 (1): 13-21.

Leveau, L. M. y C. M. Leveau. 2004b. Riqueza y abundancia de aves en agroecosistemas pampeanos durante el período post-reproductivo. Ornit. Neotropical 15 (3): 371-380.

Leveau, L. M. y C. M. leveau. 2005. Avian community response to urbanization in the pampean region, Argentina. Ornitología Neotropical 16: 503-510.

Leveau, L. M. y C. M. Leveau. 2011b. Uso de bordes de cultivo por aves durante invierno y primavera en la pampa austral. Hornero 26: 149-157.

Leveau, L. M., C. M. Leveau y U. F. J. Pardiñas. 2004. Trophic relationshps between white-tailed Kites (*Elanus leucurus*) and Barn Owls (*Tyto alba*) in Southern Buenos Aires Province, Argentina. J. Raptor Res 38 (2): 178-181.

Leveau, L. M., P. Teta, R. Bogdaschewsky y U. F. J. Pardiñas.2006. Feeding habits of the Barn Owl (*Tyto alba*) along a longitudinal-latitudinal gradient in central Argentina. Ornitología Neotropical 17: 353-362.

Leybold, F. 1873a. Beschrebungen einiger thiere und Pflanzen aus den Anden Chile´s und der Argentinischen Provinzen. Leopoldina, 8: 52-56.

Liebermann, J. 1935. Aves acridiófagas en la República Argentina. Hornero 6: 82-90.

Lillo, M. 1902. Enumeración sistemática de las aves de la provincia de Tucumán. An. Mus. Nac. Buenos Aires. 8: 169-221.

Lillo, M. 1905. Fauna Tucumana. Aves. Rev. Letras y Cs. Soc. Tucumán. 41 pp.

Lishman, C. y E. Nol. 2012. Ecology and hábitat selection of the Magellanic Plover (*Pluvianellus socialis*): A Little-known patagonian shorbird. The Wilson Journal of Ornithology 124 (3): 487-496.

Lisnizer, N., Cotichelli, L., Yorio, P., Basso, N. y A. Gatto. 2014. Using Morphometry and Molecular Markers for Sexing South American, Cayenne and Royal Terns Breeding in Patagonia, Argentina. Waterbirds 37: 183-190.

Lizurume, M. E., P. Yorio y M. Giaccardi.1995. Biología reproductiva de la Gaviota capucho café *Larus maculipennis* en Trelew, Patagonia. Hornero 14: 27-32.

Llanos, F. A., M. Failla, G. J. García, P. M. Giovine, M. Carbajal, P. M. González, D. Paz Barreto, P. Quillfeldt and J. F. Masello. 2011. Birds from the andangered Monte, the Steppes and Coastal biomes of the province of Río Negro, northern Patagonia, Argentina. Check List. Vol. 7. www.checklist.org.br

Lobo Allende, I. R. y P. N. Bortnyk. 2013. Aporte al conocimieno de la avifauna de La Rioja. XV RAO. Santa Rosa, La Pampa. Libro de Resúmenes: 69.

Lobo Allende, I. R., I. Rebeca, P. Bortnyk y M. D. Juri. 2014. Aportes a la avifauna de la provincia de La Rioja, Argentina. Acta zoológica lilloana 58 (1): 161-164.

Lönnberg, E. 1903. On a collection of birds from northwestern Argentina and the Bolivian Chaco. Ibis 1903: 441-471.

López de Casenave, J. y L. Marone. 1996. Efectos de la riqueza y de la equiatividad sobre los valores de diversidad en comunidades de aves. Ecología, 10: 447-455.

López de Casenave, J., J. P. Pelotto, S. M. Caziani, M. Mermoz y J. Protomastro. 1998. Responses of avian assemblages to a natural edge in a Chaco semiarid forest in Argentina. The Auk 115 (2): 425-435.

López Lanús, B. y R. Moller Jensen. 2012. La Becasina gigante (*Gallinago undulata*) en Argentina. Honero 27: 189-193.

López Lanús, B.1997. Inventario de las aves del Parque Nacional "Río Pilcomayo" Formosa, Argentina. Monografía Especial L.O.L.A. Nº 4, 76 págs. Bs.As.

López-Lanús, B., A. Galimberti, C. Giarduz, H. Luna, M. Manassero, A. A. Pautasso, M. P. Ducommun, A. A. G. Saigo, P. Petracci, G. A. Marteleur y M. R. de la Peña. 2013a. Inventario focal de fauna de las estancias El Estero, La Norma, El Matrero y La Elena en el sitio piloto San Javier: Santa Fe, Argentina. En pp. 135-169/277-306/331-347/507,511-513: G. D. Marino, F. Miñarro, M. E. Zaccagnini y B. López-Lanús (eds.). Pastizales y sabanas del cono sur de Sudamérica: iniciativas para su conservación en la Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación, Monografía de Aves Argentinas Nº 9. Aves Argentinas/AOP, Fundación Vida Silvestre Argentina e Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Buenos Aires, Argentina.

López-Lanús, B., A. S. Di Giacomo, A. Azpiroz, P. Haynes, A. Galimberti, A. Keyel, A. Ocampo, R. Güller, R. Moller Jensen, M. Mattalia, H. Cardoso, C. Giarduz, G. Papini y A. G. Di Giacomo. 2013b. Inventario focal de fauna de las estancias La Higuera, María Concepción, La Serena y Virocay en el sitio piloto Aguapey: Corrientes, Argentina. En pp. 179-223/277-293/307-319/331-347/490,494-506: G. D. Marino, F. Miñarro, M. E. Zaccagnini y B. López-Lanús (eds.). Pastizales y sabanas del cono sur de Sudamérica: iniciativas para su conservación en la Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación, Monografía de Aves Argentinas Nº 9. Aves Argentinas/AOP, Fundación Vida Silvestre Argentina e Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Buenos Aires, Argentina.

López-Lanús, B., D. Unterkofler, U Ornstein, V.del Sastre, R. Moller Jensen y P. Herrara. 2013d. Diversidad y estado de conservación de las aves de los Bajos Submeridioles (AICA SF03): informe de Aves Argentinas/AOP para la Fundación Vida Silvestre Argentina; junio de 2009. En pp. 375-417: G. D. Marino, F. Miñarro, M. E. Zaccagnini y B. López-Lanús (eds.). Pastizales y sabanas del cono sur de Sudamérica: iniciativas para su conservación en la Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación, Monografía de Aves Argentinas Nº 9. Aves Argentinas/AOP, Fundación Vida Silvestre Argentina e Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Buenos Aires, Argentina.

López-Lanús, B., P. Grilli, E. Carini, M. Montero y J. Castillo. 2013c. Inventario focal de fauna de las estancias La Catalina, La Aurora del Palmar, La Filiferta y Campo Bajo en el sitio piloto Gualeguaychú: Entre Ríos, Argentina. En pp. 179-223/277-293/307-319/331-347/490,494-506: G. D.

Marino, F. Miñarro, M. E. Zaccagnini y B. López-Lanús (eds.). Pastizales y sabanas del cono sur de Sudamérica: iniciativas para su conservación en la Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación, Monografía de Aves Argentinas Nº 9. Aves Argentinas/AOP, Fundación Vida Silvestre Argentina e Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Buenos Aires, Argentina.

Lowen, J. C., J. Mazar Bernet y M. Pearman. 2009. Nueva información sobre la distribución del Chorlito ceniciento (*Pluvianellus socialis*) y del Doradito copetón (*Pseudocolopteryx sclateri*) en la provincia de Buenos Aires. Nuestras Aves 54: 69-71.

Lowther, Peter E. 2009. Pavonine Cuckoo (*Dromococcyx pavoninus*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=24350

Lowther, Peter E. 2010. Pheasant Cuckoo (*Dromococcyx phasianellus*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=24182

Lowther, Peter E. 2010. Striped Cuckoo (*Tapera naevia*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=24014

Lucero, F. 2009. Aves nuevas, raras o con pocos registros para las provincias de Mendoza y San Juan. Nuestras Aves 54: 57-62.

Lucero, F. 2012b. Pato cutirí (*Amazonetta brasiliensis*) y Torcacita colorada (*Columbina talpacoti*) dos nuevas aves para la provincia de Catamarca, confirmaciones fotográficas y nuevas localidades de otras especies para las provincias de San Juan y Mendoza. Ecoregistros Revista Nº 2. Artículo Nº 9: 1-14.

Lucero, F. 2012h. Nuevos registros y distribución de aves par alas provincias de San Juan, Mendoza y La Rioja. Parte II. Nótulas Faunísticas. Seguda Serie 97: 1-10.

Lucero, F. 2013b. Primera observación de Falaropo pico grueso (*Phalaropus fulicarius*) para la provincia de San Juan, Argentina. Ecoregistros 3 (2): 7-11.

Lucero, F. 2013f. Listado de las aves observadas en la Reserva Natural Municipal Articulada: Laguna Guanacache, Laguna del Toro y Bañados del Carau, provincia de San Juan y Laguna Seca y los Bañados del Tulumaya, provincia de Mendoza, Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 137: 1-16.

Lucero, F. 2013i. Aves de Sarmiento, provincia de San Juan. Edición del autor. 1ª Ed., Cienaguita, 334 págs.

Lucero, F. e Izasa, F. 2015. Primeros registros, nuevas localidades, observación de aves con documentación escasa y evidencias de nidificación para las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Tucumán, Argentina. EcoRegistros Revista, 5(8): 18-48.

Lucero, F. y J. C. Chebez. 2011. Nuevas citas y ampliación de la distribución de algunas aves en las provincias de San Juan, Mendoza y La Rioja. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. 71: 1-16.

Lucero, M. M. 1982. El anillado de aves en la República Argentina. Fundación Miguel Lillo. Miscelania 74: 1-35.

Lucero, M. M. 1983. Lista y distribución de aves y mamíferos de la provincia de Tucumán. Miscelánea Nº 75. Fund. M. Lillo. Tucumán. Págs. 61.

Lucero, M. M., J. M. Chani, Z. J. Brandán, A. L. Echevarría y M. D. Juri. 2002. Lista de aves de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena. Acta Zool. Lilloana 46 (1 y 2): 131-135.

Lucero, M. M., Z. J. Brandán y J. M. Chani. 2005. Composición y variación anual de la avifauna de los tres grandes parques urbanos de San Miguel de Tucumán (Tucumán, Argentina). Acta Zool. Lilloana 49 (1 y 2): 43-48.

Lucero, R. F., F. L. Agnolin, S. O. Lucero y M. C. Molina. 2011. Fauna de la Reserva Micológica "Dr. Carlos Spegazzini", Partido de Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina. Parte I : Mammalia-Aves. Tercera serie. 1: 65-94.

Luna, H. y M. Manassero. 2008a. Nuevos registros de aves para Santa Fe y Santiago del Estero, Argentina. Nuestras Aves 53:12-13.

Luna, H. y M. Manassero. 2008b. Nuevos registros de aves para Santa Fe, Argentina. Parte III. Nuestras Aves 53: 42-43.

Luna, H. y M. Manassero. 2010. Nuevos registros de aves para Santa Fe, Argentina. Parte V. Nuestras Aves 55: 30-33.

Luna, H. y M. Manassero. 2013. Registros documentados de aves en Santa Fe, Argentina. Nuestras aves 58: 63-68.

Luna, H., M. Manassero y P. Krug. 2011b. Santa Fe. Nuevos relevamientos de aves en San Javier. Aves Argentinas. Revista de Naturaleza y Conservación. Nº 30: 18-21.

Luna, N., M. Libua, M. O. Gallegos, M. Cueva y L. E. Rodríguez. 2008. Redescubrimiento del Ganso de monte *Neochen jubata* (Spix, 1825) para la avifauna argentina. Nótulas Faunísticas 24: 1-13.

Lynch Arribalzaga, E.1902. Apuntes ornitológicos. 1. Dos especies nuevas para la avifauna argentina. Anales del Museo Nacional de Buenos Aires, 8 (1): 151-157.

Lynch Arribalzaga, E.1920. Las aves del Chaco. Hornero 2: 85-89.

Maceda, J. J. y M. S. Kin.2001. Lista de las aves de la Facultad de Agronomía de Santa Rosa (La Pampa) y sus alrededores. Rev. Fac. Agr. UNL La Pampa. Vol. 12 Nº 1: 21-30.

Maceda, J. J., M. Mero, H. Riesco y M. Dolsan.2001. Lista de las aves de la reserva Parque Luro, La Pampa. Rev. Fac. Agr. UNL La Pampa. Vol. 12 Nº 2: 47-59.

Maceda, J. J., F. Schmitt, F. Bruno y D. Acevedo. 2008. Confirmación de la presencia del Playerito menor (*Calidris minutilla*) en Argentina y nuevos registros para Chile central. Hornero 23 (2): 95-98.

Maceda, J. J., M. Fernández y F. Tittarelli.1999. Nuevos registros de aves para la provincia de La Pampa. Nuestras Aves 40: 18-19.

Maclean, G. L. 1969b. A study of seedsnipe in southern South America. Living Birds 8: 33-80.

Magno, S. 1983. Palomas. Noticioso Orbea 165: 6-7.

Magno, S. 1984a. Palomas. Noticioso Orbea 168: 4-6.

Malacalza, V. E.1987. Aspectos de la biología reproductiva de la Gaviota cocinera *Larus dominicanus* Lichtenstein, en Punta León (Chubut, Argentina). Physis (Buenos Aires), Secc. C, 45 (108): 11-17.

Malizia, L. R., P. G. Blendinger, M. Eva Alvarez, L. O. Rivera, N. Politi y G. Nicolossi. 2005. Bird communities in Andean premontane forests of Northwestern Argentina. Ornitología Neotropical 16: 231-251.

Malzof, S. L. y R. D. Quintana. 2008. Diet of the south polar *Catharacta maccormicki* and the brown skua *C. antarctica lonnbergi* at Cierva Point, Antarctic Península. Polar Biol. 31: 827-835.

Manassero, M. y H. Luna. 2009a. Aves de la cuña boscosa. Estancia La Isabel y los bosques mixtos de Santa Fe (Aica SF 01). Biológica. 10: 28-32.

Manassero, M. y H. Luna. 2009b. Nuevos registros de aves para Santa Fe, Argentina. Parte IV. Nuestras Aves 54: 37-39.

Manassero, M., H. Luna y L. Acquaviva.2004. Nuevos registros de aves para Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves 47: 31-33.

Manassero, M., H. Luna y L. Acquaviva.2006. Nuevos registros de aves para Santa Fe, Argentina. Parte II. Nuestras Aves 51: 29-31.

Mancini, J. A. 2011. Inventario de las aves del Parque Escolar Rural Enrique Berduc. Entre Ríos.

Marateo, G., H. Povedano y J. Alonso. 2009. Inventario de las aves del Parque Nacional El Palmar, Argentina. Cotinga 31: 47-60.

Marelli, C. A. 1919.Sobre el contenido del estómago de algunas aves. Hornero 1: 221-228.

Marelli, C. A. 1924. Elenco sistemático de la fauna de la provincia de Buenos Aires (Precordados y Vertebrados). Mem. Min. Obras Públi. La Plata, 1922-1923: 536-682.

Marelli, C. A.1918.Aves de Curuzú Cuatiá. (Corrientes). Hornero 1: 74-80.

Marelli, C. A.1933. Aves observadas en el sur de la provincia de Buenos Aires. Hornero 5:193-199.

Mariano-Jelicich, R. y M. Favero. 2005. Evaluación de la dieta del Rayador sudamericano (*Rynchops niger intercedens*) mediante el uso de diferentes metodologías : ¿es confiable el análisis de egagrópilas? XI RAO: 124. Buenos Aires.

Mariano-Jelicich, R., G. O. García, A. Gómez-Laich y M. Favero.2005. Estrategia de alimentación del Rayador sudamericano (*Rynchops niger intercedens*): importancia de los ambientes marinos durante la temporada reproductiva. XI RAO: 125. Buenos Aires.

Mariano-Jelicich, R., M. Favero y M. P. Silva. 2003. Fish prey of the Black skimmer *Rynchops niger* at Mar Chiquita, Buenos Aires Province, Argentina. Marine Ornithology 31: 199-202.

Marigliano, N. L., C. I. Navarro y Z. J. Brandán. 2005b. Aves asociadas a los bordes de una parcela cultivada con Trigo (Burruyacú, Tucumán, Argentina) Acta Zool. Lilloana 54 (1-2): 121-128.

Marks, J. S., R. J. Canning y H. Mikkola. 1999. Family Strigidae (Typical Owls). Pp. 76-242, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 5. Barn-Owls to Hummingbird. Lynx Edicions, Barcelona.

Marone, L. 1992b. Seasonal and year-to-year fluctuations of birds populations and guilds in the Monte Desert, Argentina. J. Field. Ornithol. 63: 294-308.
Marone, L.1990. Modifications of local and regional bird diversity after a fire in the Monte Desert, Argentina. Revista Chilena de Historia Natural, 63: 187-195.
Marone, L.1991. Habitat features affecting birda spatial distribution in the Monte desert, Argentina. Ecología Austral, 1: 77-86.
Marone, L.1992a. Estatus de residencia y categorización trófica de las especies de aves en la Reserva de la Biosfera de Ñacuñan, Mendoza. El Hornero 13: 207-210.
Márquez, C. G.2001. Observaciones sobre un nido de Picaflor rubí (*Sephanoides galeritus*) en el parque Nacional Lanín, Neuquén, Argentina. Nuestras aves 41: 12-13.
Martella, M. B. y E. H. Bucher. 1984. Nesting of the Spot-winged Falconet in Monk Parakeet nest. Auk, 101: 614-615.
Martínez Gamba, R. 2014. Lista de aves del Parque Natural Municipal Monte Seguín, Provincia de Misiones, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. 163: 1-10.
Martínez, D. R. 1993. Food habits of the Rufous-legged Owl (*Strix rufipes*) in temperate rainforests of southern Chile. J. Raptor Res. 27: 214-216.
Martínez, F. y R. Calí. 2013. Primer registro para la avifauna mendocina del Gaviotín golondrina (*Sterna hirundo*) y revalorización de los últimos relictos del gran humedal de Huanacache. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 140: 1-5.
Martínez, F. y R. Pereyra Lobos. 2005. Observaciones novedosas para la provincia de Mendoza, Argentina. Nuestras Aves 49: 25-26.
Martínez, F., F. Lucero, R. Calí, D. Valdés, D. Ferrer y J. C. Chebez. 2009. Registros novedosos de aves para las provincias de Mendoza y San Juan. Nótulas Faunísticas. Segunda serie Nº 35: 1-9.
Martínez, H. S., Sorraco, M. T. y A. D. Bischff. 1975. Nota preliminar sobre alimentación de aves de la zona de Chasicó (partido de Villarino- provincia de Buenos Aires). Direc. Rec. Nat. Minis. Asun. Agrar. 1-12.
Martínez, M. M. y J. P. Isacch. 1995. *Larus atlanticus* especialista o generalista?. V Congreso de Ornit. Neotr., Paraguay.
Martínez, M. M. y S. Bachmann. 1997. Kleptoparasitism of the American Oystercatcher Haematopus palliatus by Gulls Larus spp. In Mar Chiquita Lagoon, Buenos Aires, Argentina. Marine Ornithology 25: 68-69.
Martinez, M. M., C. A. Darrieu y G. E. Soave. 1985. Estudio de la avifauna de la reserva provincial Llancanello. Mendoza. II. Presencia de *Larus pipixan, Larus serranus, Sterna trudeaui* y *Chlidonias niger surinamensis* (Aves: Laridae). Historia Natural 5 (3): 25-28.
Martínez, M. M., C. A. Darrieu y G. E. Soave.1997a. The avifauna of Laguna Llancanelo (Mendoza, Argentina), a South American Wetland of internacional importante. Freshwater Forum. Volumen 9: 35-45.
Martínez, M. M., J. P. Isaach y M. Rojas. 2000. Olrog´s Gull *Larus atlanticus*: especialista o generalista?.
Martínez, M. M., J. P. Isacch y F. Donatti.1996a. Aspectos de la distribución y biología reproductiva de *Asio clamator* en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Ornitología Neotropical 7: 157-161
Martínez, M. M., M. S. Bó y J. P. Isachh. 1998. Dieta del lechuzón orejudo *Asio clamator* en el extremo sur de su distribución, Mar Chiquita, Prov. de Buenos Aires. X RAO: 35.Mar del Plata.
Masello, J. F. y P. Quillfeldt. 2005b. Villa Marítima. El Cóndor. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad : 338-339. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Masramón, D. O. de. 1977. Contribución al estudio de las aves de San Luis. Hornero 11: 413-416.
Masramón, D. O. de. 1983. Lista de aves del nordeste de San Luis. Hornero extraordinario 77-87.
Masramón, D. O. de.1962. Nidificación de algunas aves de San Luis. Nuestras Aves Nº 1: 8-10.
Massoia, E. 1979. Descripción de un género y especie nuevos: *Bibimys torresi* (Mammalia Rodentia-Cricetidae-Sigmodontinae-Scapteromyini). Physis Secc. C. Cont. Org. Terr. 38: 1-7.
Massoia, E. 1983. La alimentación de algunas aves del orden strigiformes en la Argentina. Hornero Número extraordinario 125-148.
Massoia, E. 1987. Algunos mamíferos recolectados en Guampacha, Guasayán, Santiago del Estero. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 1: 1-12.
Massoia, E. 1988a. Restos de mamíferos depredados por *Bubo virginianus* y cazadores desconocidos en el Parque Nacional Lihuel Calel, Departamento

Liuel Calel, provincia de La Pampa. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 6: 4-9.
Massoia, E. 1988b.Presas de *Tyto alba* en Campo Ramón, Departamento Oberá, provincia de Misiones. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 7: 4-16
Massoia, E. 1988e.Presas de *Tyto alba* en Campo Ramón, Departamento Oberá, provincia de Misiones. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 7: 4-16.
Massoia, E. 1988f. Análisis de regurgitados de *Tyto alba* de Humaita, departamento Cerrillos, provincia de Salta. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 5: 6-11.
Massoia, E. 1988g. Presas de *Tyto alba* en Saladillo, partido de Saladillo, provincia de Buenos Aires. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 6: 10-14.
Massoia, E. 1988h. Análisis de regurgitados de *Rhinoptynx clamator* del partido de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 9: 4-9.
Massoia, E. 1988j.Algunos roedores depredados por *Bubo virginianus* en Estancia Chacayal, Departamento Huiliches, provincia de Neuquén. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 2: 4-7.
Massoia, E. 1988k. Análisis de regurgitados de *Tyto alba* de Ituzaingó, partido de Morón, provincia de Buenos Aires. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 2: 13-20.
Massoia, E. 1989. Animales depredados por *Tyto alba tuidara* en la ciudad de San Miguel, partido de General Sarmiento, provincia de Buenos Aires. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 15: 2-7.
Massoia, E. 1990b. Roedores depredados por *Tyto alba tuidara* en Mar de Tuyú, partido de General Lavalle, provincia de Buenos Aires. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 17: 17-20.
Massoia, E. 1994. Análisis de regurgitados de *Bubo virginianus* de laguna de Pozuelos, provincia de Jujuy. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 26: 13-16.
Massoia, E. y A. Fornés. 1966. Notas sobre el género *Scapteromys* (Rodentia-Cricetidae). V. Curiosos casos de anomalías dentarias en *S. tumidus aquaticus*. Neotrópica (La Plata) 12: 91-94.
Massoia, E. y A. S. Vetrano. 1988a. Análisis de regurgitados de *Tyto alba* de Villa Regina, General Roca, provincia de Río Negro. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 3: 10-20.
Massoia, E. y A. S. Vetrano. 1988b. Análisis de regurgitados de *Tyto alba* de Alta Italia, Departamento Realicó, provincia de La Pampa. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 3: 4-10.
Massoia, E. y H. Pastore. 1997b. Análisis de regurgitados de *Bubo virginianus magellanicus* (Lesson, 1828) del Parque Nacional Laguna Blanca, Departamento Zapala, provincia de Neuquén. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 33: 18-19.
Massoia, E. y U. E. J. Pardiñas. 1988a. Nota sobre la fauna de pequeños roedores de Valle Hermoso, Departamento Escalante, provincia de Chubut. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 11: 13-15.
Massoia, E. y U. E. J. Pardiñas. 1988b. Presas de *Bubo virginianus* en Cañadón Las Coloradas, Departamento Pilcaniyeu, provincia de Río Negro. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 4: 14-19.
Massoia, E. y U. E. J. Pardiñas. 1988c. Presas de *Bubo virginianus* en Cueva Epullán, Departamento Collón Curá, provincia de Neuquén. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 7: 17-27.
Massoia, E. y U. E. J. Pardiñas. 1988e. Pequeños mamíferos depredados por *Bubo virginianus* en Pampa de Nestares, Departamento Pilcaniyeu, provincia de Río Negro. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 3: 23-27.
Massoia, E. y U. F. J. Pardiñas. 1988d. Algunos datos sobre la dieta mastofaunística de *Tyto alba* en Salinas del Bebedero, Departamento La Capital, provincia de San Luis. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 2: 8-12.
Massoia, E. y U. F. J. Pardiñas. 1989. Análisis de regurgitados de *Tyto alba tuidara* de Camping Casa Amarilla, partido de Chascomún, provincia de Buenos Aires. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 13: 22-24.
Massoia, E. y U. F. J. Pardiñas. 1994. La depredación de mamíferos por *Bubo virginianus* y *Tyto alba* en Cerro Casa de piedra, lago Burmeister, Parque Nacional Perito Moreno, provincia de Santa Cruz. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 26: 6-12.
Massoia, E., A. Morici y B. Lartigau. 1994c. Análisis de regurgitados de *Tyto alba* de Villa La Ventana, partido de Torquinst, provincia de Buenos Aires. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 26: 22-36.
Massoia, E., C. Reboledo y A. J. Diéguez. 1997c. Análisis de Bolos de *Tyto alba* del Río Seco, La Hedionda, Dto. San Rafael, provincia de Mendoza. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 31: 2-7.
Massoia, E., H. Pastore y J. C. Chebez. 1999a. Mamíferos depredados por *Tyto alba* en los departamentos de Gral. Ocampo y Rosa río V. Peñalosa, provincia de La Rioja. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 37: 17-20.
Massoia, E., H. Pastore y S. Heinonen Fortabat. 1999b. Análisis de regurgitados de *Tyto alba* de Escuela Pcial. Nº 17 “J. Sabiaur”, Dto. Bermejo,

provincia de Chaco. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 36: 2-4.
Massoia, E., J .C. Chebez y S. Heinonen Fortabat. 1988c. Depredación de mamíferos por *Tyto alba tuidara* en Teyú-Cuaré, Departamento San Ignacio, provincia de Misiones. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 8: 7-13.
Massoia, E., J. C. Chebez y S. Heinonen Fortabat. 1988a. Presas de *Tyto alba tuidara* en Ensenadita, Departamento San Cosme, provincia de Corrientes. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 12: 8-14.
Massoia, E., J. C. Chebez y S. Heinonen Fortabat. 1989a. Mamíferos y aves depredados por *Tyto alba tuidara* en el arroyo Yabebyrí, Departamento Candelaria, provincia de Misiones. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 15: 8-13.
Massoia, E., J. C. Chebez y S. Heinonen Fortabat. 1989b. Mamíferos y aves depredados por *Tyto alba tuidara* en Bonpland, Departamento Candelaria, provincia de Misiones. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 15: 19-24.
Massoia, E., J. C. Chebez y S. Heinonen Fortabat. 1989e. Segundo análisis de egagrópilas de *Tyto alba tuidara* en el Departamento de Apóstoles, provincia de Misiones. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 13: 3-8.
Massoia, E., J. C. Chebez y S. Heinonen Fortabat. 1994a. Depredación de pequeños mamíferos por *Bubo virginianus* en el lago Cardiel, Departamento Lago Buenos Aires, provincia de Santa Cruz. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 26: 17-21
Massoia, E., J. C. Chebez y S. Heinonen Fortabat. 1994b. La depredación de algunos mamíferos por *Bubo virginianus* en el Departamento Malargüe, Mendoza. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 26: 2-5.
Massoia, E., J. C. Chebez y S. Heinonen Fortabat. 1989c. Análisis de regurgitados de *Tyto alba tuidara* en Los Helechos, Departamento Oberá, provincia de Misiones. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 14: 16-22.
Massoia, E., J. C. Chebez y S. Heinonen Fortabat. 1990. Mamíferos depredados por *Tyto alba tuidara* en Desaguadero, Departamento Capital, provincia de Corrientes. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 18: 14-17.
Massoia, E., J. J. Pereiro y C. Reboledo. 1991a. Análisis de regurgitados de *Bubo virginianus* en la La Lipela, Departamento Los Lagos, provincia de Neuquén. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 19: 53-57.
Massoia, E., S. I.Tiranti y M. P. Torres. 1989d. La depredación de pequeños mamíferos por *Tyto alba* en Canal 6, Delta bonaerense, partido de Campana, provincia de Buenos Aires. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 13: 14-19.
Mata, A. B. 1927. Notas sobre dos rapaces de la provincia de Buenos Aires. Hornero 4: 60-64.
Matarasso, H. F. 2007. Checklist. Aves del Neuquén.
Mauco, L. y M. Favero. 2004. Diet of the Common Tern (*Sterna hirundo*) during the nonbreeding season in Mar Chiquita Lagoon, Buenos Aires, Argentina. Ornit. Neotropical 15 (1): 121-132.
Mauco, L., C. Paterlini, D. I. Isaldo, S. A. Quintero Blanco y M. Navarro. 2007. Primer registro de reproducción de la Gaviota cocinera (*Larus dominicanus*) en la Bahía Samborombon, provincia de Buenos Aires, Argentina. Hornero 22 (1): 47-50.
Mauco, L., M. Favero y M. S. Bó. 2001. Food and feeding biology of the Common Tern (*Sterna hirundo*) during the nonbreeding season in Samborombon Bay, Buenos Aires, Argentina. Waterbirds 24: 89-96.
Maugeri, F. G. 2002a. Aves nuevas o poco conocidas para el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras aves 44: 16-19.
Maugeri, F. G. 2005. Primer registro de nidificación en ambiente fluvial del Gaviotín chico común (*Sterna superciliaris*) para la provincia de Buenos Aires y nueva evidencia de su nidificación asociada con el Chorlito de collar (*Charadrius collaris*). Ornitología Neotropical, 16: 117-121.
Maugeri, F. G. 2007. Usurpación de un nido de Chorlito doble collar (*Charadrius falklandicus*) por el Tero común (*Vanellus chilensis*). Ornitología Neotropical, 18: 121-125.
Maugeri, F. G., L. Rey y A. Raparo. 2009. Laguna La Picasa, Santa Fe como sitio de importancia para la nidificación de *Phoenicopterus chilensis.* Libro de Resúmenes. XIII RAO: 123. Tafí del Valle, Tucumán, Argentina.
Maugeri, F. G.2006a. Ampliación del rango de distribución y descripción de aspectos reproductivos de cuatro especies de aves en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Cotinga 25: 43-46.
Mazar Barnett, J. y M. Pearman.2001. Lista comentada de las aves argentinas. Lynx Edicions. Barcelona. Págs.163.
Mazar Barnett, J., G. D. Pugnali y M. Della Seta.1998a. Primer registro del Saí grande *Oreomanes fraseri* (Passeriformes: Coerebidae ? Thraupidae ?) en la Argentina. Hornero 15: 44-46.

Mazar Barnett, J., R. Clark, A. Bodrati, G. Bodrati, G. D. Pugnali and M. Della Seta.1998c. Natural history notes on some little-know birds in north-west Argentina. Cotinga 9: 64-75.

Ménégaux, A. 1925. Etude d´une collection d´oiseaux faite par M. E. Wagner dans le Chaco argentin. Rev. Franc. Ornith. 9: 221-238, 279-297, 322-329.

Mérida, E. y A. Bodrati. 2006. Consideraciones sobre la conservación de los talares de barrancas del nordeste de Buenos Aires y descripción de las características de un relicto en Baradero. En : Mérida, E. y J.Athor (Editores). Talares bonaerenses y su conservación. Fundación de Historia Natural "Félix de Azara". Buenos Aires.

Mero, M. I. y R. Serracín. 1998. Hábito alimenticio de la Lechucita vizcachera *Speotyto cunicularia* (Aves, Strigidae) en agroecosistemas de la provincia de La Pampa. X RAO: 36. Mar del Plata.

Mezquida, E. T. 2001b. La reproducción de algunas especies de Dendrocolaptidae y Furnariidae en el desierto del monte central, Argentina. Hornero 16 (1): 23-30.

Mezquida, E. T. y L. Marone.2001. Factors affecting nesting success of a bird assembly in the central Monte Desert, Argentina, J. Avian, Biol. 32: 287-296.

Miatello, R., C. Rosacher y V. Cobos.1993. Algunas especies de aves nuevas o con pocos registros para la provincia de Córdoba, República Argentina. Nótulas Faunísticas 50: 1-12.

Miatello, R., J. Baldo, L. Biancucci y V. Cobos.2003. Nuevos registros de aves poco citadas para Córdoba, Argentina. Nuestras Aves 45: 15-21.

Miatello, R., J. Baldo, M. Ordano, C. Rosacher y L. Biancucci.1999. Avifauna del Parque Nacional Quebrada del Condorito y Reserva Hídrica Provincial de Achala. Córdoba. Argentina. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables. Córdoba. Pp. 193.

Miatello, R., V. Cobos y C. Rosacher. (1991) 1994. Algunas especies de aves nuevas o poco conocidas para la provincia de Córdoba, República Argentina. Nótulas Faunísticas 69: 1-5.

Michelutti, P. L. 1991. ¿ *Numenius borealis* en Córdoba ? . Nuestras Aves 25: 25.

Michelutti, P. y R. Torres. 2006. Nuevos registros y comentarios sobre aves acuáticas escasas o fuera de su rango de distribución conocido en el centro de Argentina. Nuestras Aves 51: 32: 34.

Milat, J. A. 1987. Observaciones sobre el hábito alimentario de la Gaviota austral. Garganchillo 4: 9-10.

Milat, J., F. Moschione y J. Klimaitis. 1985. Azor variado, Tachurí coludo y Anó grande en Entre Ríos. Nuestras Aves 6: 6-7.

Milesi, F. A., L. Marone, J. López de Casenave y E. T. Mezquida. 2002. Gremios de manejo como indicadores de las condiciones del ambiente: un estudio de caso con aves y perturbaciones del hábitat en el Monte central, Argentina. Ecología Austral, 12: 149-161.

Militello, E. R. y R. Castillo. 2005. Nidificación del Picaflor Esmeralda (*Agyrtria versicolor*) en el Parque nacional Iguazú, Misiones, Argentina.Nuestras Aves 49: 30-31.

Militello, E. y J. C. Chebez. 2009. Notas sobre aves del Parque Nacional Iguazú y zona de influencia, Misiones, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda serie 32: 1-5.

Millar, E. H. y A. J. Baker. 1980. Displays of the Magellanic Oystercatcher (*Haematopus leucopodus*). Wilson Bulletin 92 (2): 149-168.

Miranda, M. V., N. Politi y L. O. Rivera. 2010. Cambios inesperados en el ensamble de aves en áreas bajo explotación forestal en la selva pedemontana del noroeste argentino. Ornitología Neotropical 21: 323-337.

Mogensen, J. 1930. Argentinas Dyr. Pag. 383. Graebes Bogtrykkeri. Copenhagen.

Montaldo, N. 2014. Azafrán. Aves Argentinas. Revista de Naturaleza y Conservación. Nº 41: 25.

Montaldo, N. H. 1993a. Dispersión por aves y éxito reproductivo de dos especies de *Lugustrum* (Oleaceae) de un relicto de selva subtropical en la Argentina. Rev. Chilena de Hist. Nat. 66: 75-85.

Montaldo, N. H. 1995b. El Picaflor garganta blanca (*Leucochloris albicollis*) en Córdoba. Nuestras Aves 31: 21.

Montaldo, N. H. 2000. Éxito reproductivo de plantas ornitócoras en un relicto de selva subtropical en Argentina. Rev. Chilena de Hist. Nat. 73: 511-524.

Montaldo, N. H. y E. Haene. 2009. Salvia azul. Plantas que atraen aves. Aves Argentinas. Revista de Naturaleza y Conservación Nº 25: 11.

Montaldo, N. H. y J. A. Claver. 1986. Guía de las aves silvestres de las Facultades de Agronomía y de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Rev. Fac. Agr. 7 (2-3): 191-216.

Montaldo, N. H.1995a. Ecología alimentaria del Picaflor cometa *Sappho sparganura* en la provincia de Córdoba, Argentina. Hornero 14: 15-20.
Montaldo, N. H.2005. Aves frugívoras de un relicto de selva subtropical ribereña en Argentina: manipulación de frutos y destino de las semillas. Hornero 20 (2):163-172.
Montalti, D. y G. E. Soave.2002. The birds of Seymour Island, Antartida. Ornit. Neotropical 13 (3): 267-272.
Montalti, D. y J. L. Orgeira. 2001. Avifauna de la isla Decepción, Islas Shetland del Sur. Boll. Mus. Reg. Sci. Nat. Torino, 18(2): 513-519.
Montalti, D. y J. L. Orgeira.1998. Distribución de aves marinas en la costa patagónica argentina. Ornitología Neotropical 9: 193-199.
Montalti, D. y N. Coria. 1993. Distribución y abundancia de *Catharacta lonnbergi* y *Catharacta maccormicki* en tres sitios diferentes de la región antártica. Libro de resúmenes. Primera reunión de ornitología de la cuenca del Plata: 29.
Montalti, D., Arambarri, A. M., Soave, G. E., Darrieu, C. A. y A. R. Camperi. 2003. Seeds in the diet of the White-rumped Sandpiper in Argentina. Waterbirds 26: 166-168.
Montalti, D., Casaux, R., Coria, N., Soave, G. y M. Graña Grilli. 2009. The importante of fish in the dieto f the South Polar Skua (*Stercorarius maccormicki*) at the South Shetland Islands, Antarctica. Emu 109: 305-309.
Montalti. D., Peter H. U. y K. Reinhardt. 1994. Ecología y taxonomía de Skúas en la zona de hibridización. Contribución N°443. Inst. Antártico Argentino. Buenos Aires.
Montalvo, C. I., E. R. Justo y L. J. M. De Santis. 1985. Alimentación de *Tyto alba* (Strigiformes, Tytonidae) en la provincia de La Pampa. II. Neotrópica (La Plata) 30: 250-252.
Moraes, V.S. e R. Krul. 1995. Ocorrência e nidificaçao de *Macropsalis creagra* na ilha do Mel, Paraná, Brasil (Caprimulgidae, Caprimulgidae). Ararajuba 3: 79-80.
Morici, A. 1990a. Aves depredadas por *Tyto alba tuidara* –1- en San Miguel, Partido de General Sarmiento, Prov. de Buenos Aires. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 17: 5-8.
Morici, A. 1990b. Aves depredadas por *Tyto alba tuidara* –2- en Desaguadero, departamento Capital, Provincia de Corrientes. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 18: 18-19.
Morici, A. 2009e. Las aves en la dieta de *Tyto alba tuidara* (J. E. Gray, 1829) (Aves: Tytonidae) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Primeros datos. Xolmis 4: 19-24.
Morici, A. 2012b. Las aves del área Natural Protegida "Dique Roggero" (Buenos Aires, Argentina). Biológica 15 ; 24-36.
Morici, A. 2013. Primer registro de Anó chico (*Crotophaga ani*) para el sudoeste de la provincial de Buenos Aires, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie, 127: 1-2.
Morici, A. 2014. Composición de las bandadas invernales mixtas en un sector del sudeste bonaerense. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie, 142: 1-7.
Morici, A. y E. Massoia. 1998. Análisis de regurgitados de *Otus choliba choliba* (Vieillot, 1817), de la Granja "17 de abril". Pdo. de Gral Rodríguez, Buenos Aires. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 34: 11-13.
Morrison, R. I. G. y R. K. Ross. 1989. Atlas of Neartic shorbirds on the coast of South America, Canadian. Wildlife Servic Special Publication, Vol. 1 y 2.
Moschione, F. 2005p. Cuesta de las Higuerillas. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 76-77. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Moschione, F. 2005pp. Sierra de Ambato. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 78-79. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Moschione, F. N. 2010b. Informe Nº 60/10. Ministerio de Turismo. Administración de Parques Nacionales.
Moschione, F. N. 2012. Informe Nº 3/12. Ministerio de Turismo. Administración de Parques Nacionales.
Moschione, F. N. y J. Segovia. 2005. Listado de las aves de la Reserva Natural Las Lancitas, Santa Bárbara, Jujuy. (Informe Téc.) Proy. Elé/DFS.
Moschione, F. N., A. L. Sureda, L. Lizarraga y M. A. González. 2008a. Las aves de las áreas protegidas del Noroeste argentino: su representación por unidad, provincia y ecoregión. Comunicación Poster. XII. RAO: 147. San Martín de los Andes, Neuquén.

Moschione, F. N.1987. Datos curiosos en la alimentación del Cuclillo común *Coccyzus melacoryphus.* Garganchillo 2: 5-6.
Moschione, F. N.1989b. Nuevas aves para la reserva de Punta Lara. Garganchillo 10: 7-11.
Moschione, F. y L. Bishels. 2004. Listado de las aves del Parque Provincial Loro Hablador, provincia del Chaco. Informe Técnico. Proyecto Elé/DFS. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Moschione, F. y R. Banchs. 1992. Informe de factibilidad para la creación de un refugio de vida silvestre en el campo "Los Morillos" de Ansilia S.A. Informe inédito. Fundación Vida Silvestre Argentina. Buenos Aires.
Moschione, F., O. Spitznagel y M. González. 2013. Lista de aves de Salta. Gobierno de la Provincia de Salta.
Motta Junior, J. C. 2006. Relacoes tróficas entre cinco Strigiformes simpátricas na regiao central do Estado de Sao Paulo, Brasil. Rev. Bras. Ornit. 14: 359-377.
Motta Junior, J. C. y J. A. Lombardi. 1990. Aves como agentes dispersores de copaiba (*Copaifera* l*angsdorfii,* Caesalpiniaceae) em Sao Carlos, estado de Sao Paulo. Ararajuba 1: 105-106.
Motti, F. 1941. Nido con pichones de *Asio flammeus*. Hornero 8: 125.
Mouchard, A.1987. En la costanera sur. Nuestras Aves 12: 13.
Murphy, R. C.1925. Notes on certain species and races of oystercatchers. American Museum Novitates 194: 5-15.
Murphy, R. C.1936. Oceanic birds of South America. Vol. 1 y 2. American Museum of Natural History 44: 495-554.
Musmeci, L., L. O. Bala y Maria de los Ángeles Hernández. 2013. Dieta del Chorlito doble collar (*Charadrius falklandicus*) en Península Valdés, Patagonia, Argentina. Hornero 28 (1): 15–21.
Muzzachiodi, N. 2001a. Avifauna de la reserva natural de fauna y flora "Parque Muttio", Paraná, E. Ríos. Natura Neotropicalis 32 (1): 59-64.
Muzzachiodi, N. 2001b. Nuevos registros de aves para el área natural protegida "Islote Municipal", Paraná, Provincia de Entre Ríos, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 2: 1-2.
Muzzachiodi, N. 2002. Avifauna registrada en la reserva natural "Juan Bautista Alberdi", Oro Verde, departamento Paraná, Provincia de Entre Ríos, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 11: 1-3.
Muzzachiodi, N., M. G. Wilson y R. A. Sabattini. 2003. Avifauna registrada en un ciclo anual en el Parque Escolar Rural "Enrique Berduc", La Picada, Paraná, Provincia de Entre Ríos, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 16: 1-3.
Myers, J. P. y L. P. Myers. 1979. Shorebirds of Coastal Buenos Aires Province, Argentina. Ibis 121: 186-200.
Nabte, M. J., S. L. Saba y U. F. J. Pardiñas. 2006. Dieta del Búho magallánico (*Bubo magellanicus*) en el desierto del monte y la patagonia argentina. Ornitología Neotropical 17: 27-38.
Nanni, A. S., P. E. Ortiz, J. P. Jayat y E. Martín. 2012. Variación estacional de la dieta de la Lechuza de campanario (*Tyto alba*) en un ambiente perturbado del Chaco seco argentino. Hornero 27: 149-157.
Narosky, S. 1980. Un nuevo picaflor para la Argentina. Hornero 12: 53.
Narosky, S. 1988. Hallazgo de aves poco comunes en el norte argentino. Hornero 13: 91-93.
Narosky, S. y D. Yzurieta. 1973b. Nidificación de la Gaviota de cabeza gris (*Larus cirrocephalus*). Hornero 11: 217-219.
Narosky, S. y M. A. Fiameni.1986. Aves pelágicas en Costa Bonita, Buenos Aires, Argentina. Hornero 12: 281-285.
Narosky, S., A. G. Di Giacomo y B. López Lanús.1990. Notas sobre aves del sur de Buenos Aires. Hornero 13: 173-178.
Narosky, S., D. Yzurieta y M. Nores.1977. Presencia del Chorlito enano, *Calidris pusilla* en la Argentina. Hornero 11: 433-434.
Narosky, S.1969a. Nidificación de algunas aves en la región central de la Pcia. de Buenos Aires. Hornero 11: 27-32.
Narosky, S.1983b. Registros nuevos o infrecuentes de aves argentinas. Hornero 12: 122-126.
Narosky, T. y A. G. Di Giacomo.1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires, distribución y estatus. Asoc. Orn. del Plata. Vazquez Mazzini Editores, L.O.L.A., Buenos Aires.
Narosky, T. y A. Martelli. 1995. Una nueva visita al este de Formosa. Nuestras Aves 31: 28-29.
Narosky, T. y L. M. Lozzia. 1988. Aves de la Reserva El Bagual. Nuestras Aves 15: 7-9.
Narosky, T. y P. Sutton.1991. Sobre la presencia del Gaviotín *Sterna albifrons* en Buenos Aires. Nuestras Aves 25: 28-29.

Nasca, P. B., P. A. Gandini y E. Frere.2004. Caracterización de las asociaciones de alimentación multiespecíficas de aves marinas en la ría Deseado, Santa Cruz, Argentina. Hornero 19 (1): 29-36.

Naumburg, E. M. B. 1933. A study of *Zenaida auriculata*. American Museum Novitates, 648: 1-15.

Navarro, C. I., Z. J. Brandán y N. L. Marigliano. 2007. Lista comentada de las aves de un fragmento de la Reserva Provincial La Florida, Tucumán, Argentina. Acta Zool. Lilloana 51: 142-150.

Navarro, C. I., Z. J. Brandán, C. M. Antelo y N. L. Marigliano. 2000. Avifauna invernal en una localidad del Bosque Chaqueño Serrano (Las Tipas, Tucumán, Argentina). Acta Zool. Lilloana 45 (2): 233-240.

Navas, J. R. 1968. Nuevos datos sobre la distribución de dos Trochillidae en la Argentina (Aves, Trochillidae), Neotrópica, 14 (43): 38-40.

Navas, J. R. 1970b. Nuevos registros de aves para la patagonia. Neotrópica 16: 11-16

Navas, J. R. 1982. Introducción a la avifauna del Parque Nacional El Palmar. Anales P. Nac. XV: 35-64.

Navas, J. R. 1987a. Los vertebrados exóticos introducidos en la Argentina. Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. B. Rivadavia, e Inst. Nac. Inv.Cienc. Nat., Ser. Zool.T XIV (2): 7-38.

Navas, J. R. 1994. Aves nuevas o poco comunes de la Patagonia, Neotrópica 40 (103-104): 93-94.

Navas, J. R. y A. R. Camperi. 2005. Novedades y comentarios sobre la distribución de algunas especies de aves del noroeste de la Argentina. Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat.,n. s. 7: 77-82.

Navas, J. R. y A. R. Camperi. 2006. Novedades y comentarios sobre la distribución de algunas especies de aves del noroeste de la Argentina II. Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat., n. s. 8: 105-109.

Navas, J. R. y N. A. Bó. 1986c. Aves nuevas o poco conocidas de Misiones, Argentina. I. Neotrópica 87: 43-44.

Navas, J. R. y N. A. Bó. 1988a. Aves nuevas o poco conocidas de Misiones, Argentina. II. Comunicaciones Zoológias del Mus. de hist. Nat. de Montevideo. Nº 166 (XII): 1-9.

Navas, J. R. y N. A. Bó. 1990. Apuntes sobre aves de la meseta de Somuncurá, provincia de Río Negro. Neotropica 36: 45-53.

Navas, J. R. y N. A. Bó. 1991a. Aves nuevas o poco conocidas de Misiones, Argentina. IV. Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Tomo 15 (8): 95-105.

Navas, J. R. y N. A. Bó. 1993. Aves nuevas o poco conocidas de Misiones, Argentina. V. (addenda) Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Zool. 16 (4): 37-50.

Navas, J. R. y N. A. Bó. 2001. Aportes al conocimiento de la distribución, la cría y el peso de aves de las provincias de Mendoza y San Juan, República Argentina. Segunda parte.(Aves: Falconidae, Scolopacidae, Thinocoridae, Columbidae, Psittacidae, Strigidae, Caprimulgidae, Apodidae, Furnariidae, Rhinocryptidae y Tyrannidae). Hornero 16 (1): 31-37.

Navas, J. R. y N. A. Bó.1986a. Revisión de las subespecies argentinas de *Vanellus chilensis* (Aves, Charadriidae). Neotrópica 32: 157-165.

Navas, J. R. y N. A. Bó.1986b. Notas sobre una colección de aves del Parque Nacional Lihué Calel, La Pampa, Argentina. Hornero 12: 250-261.

Navas, J. R. y N. A. Bó.1996c. Notas breves sobre las especies del género *Attagis* en la Argentina (Aves: Thinocoridae). Neotrópica 42: 76.

Navas, J. R. y N. A. Bó.1997b. Sobre la distribución geográfica de las razas de *Thinocorus rumicivorus* y *T.orbignyanus* en las provincias de San Juan y Mendoza, República Argentina. Hornero, 14 (4): 277-279.

Navas, J. R.1965c. Nuevos aportes para *Oreotrochilus leucopleurus*. Hornero 10: 283-285.

Naveen, R. 1989. First record of Long-tailed Jaeder for South Georgia. Amer. Birds 43: 17.

Nellar Ramonella, M. M. 1993. Aves de la provincia de San Luis. Lista y distribución. Ed. Mus. Priv. Cienc. Nat. e Inv. Ornit. "G. E. Hudson". San Luis. Págs. 98.

Neunteufel, A.1951. Observaciones sobre el *Dromococcyx pavoninus* Pelzeln y el parasitismo de los cucúlidos. Hornero 9: 288-290.

NORAMBUENA, H. 2013. AUSTRAL PYGMY-OWL (*GLAUCIDIUM NANUM*), NEOTROPICAL BIRDS ONLINE (T. S. SCHULENBERG, EDITOR). ITHACA: CORNELL LAB OF ORNITHOLOGY; RETRIEVED FROM NEOTROPICAL BIRDS ONLINE: HTTP://NEOTROPICAL.BIRDS.CORNELL.EDU/PORTAL/SPECIES/OVERVIEW?P_P_SPP=212216

Nores, A. I. y M. Gutiérrez.1986. Nidificación de *Tyto alba* en Córdoba, Argentina. Hornero 13: 242-249.

Nores, A. I. y M. Gutiérrez.1990. Dieta de la Lechuza de campanario (*Tyto alba*) en Córdoba, Argentina. Hornero 13: 129-132.

Nores, A. I. y M. Nores.1994. Nets building and nesting behavior of the Brown Cacholote. Wilson Bull. 106 (1): 106-120.

Nores, M. 1986b. Nuevos registros para aves de Argentina. Hornero 12: 304-307.
Nores, M. 1989. Patrones de Distribución y Causas de Especiación en Aves Argentinas. Tesis Doctoral. Univ. Nac. de Córdoba, Córdoba, pp. 1-178.
Nores, M. 1992. Bird speciation in subtropical South America in relation to forest expansion and retraction. The Auk 109 (2): 346-357.
Nores, M. y D. Yzurieta. 1982a. Nuevas localidades para aves Argentinas. Parte II. Historia Natural 2: 101-104.
Nores, M. y D. Yzurieta. 1982b. Nuevas localidades para aves Argentinas. Parte III. Historia Natural 2: 151-152.
Nores, M. y D. Yzurieta.1979b. Una nueva especie y dos nuevas subespecies de aves (Passeriformes). Nidificación del Gaviotín pico grueso (*Gelochelidon nilotica grönvoldi* Mathews) en Córdoba, Argentina. Academia Nac. de Cienc. (Córdoba, Argentina) Miscelánea Nº 61:1-11.
Nores, M. y D. Yzurieta.1980b. Aves de ambientes acuáticos de Córdoba y centro de Argentina. Sec. de Estado de Agricultura y Ganadería. Acad. Nac. Cienc. de Córdoba. Págs. 235.
Nores, M. y D. Yzurieta.1981. Nuevas localidades para aves Argentinas. Historia Natural 2 (5): 33-42.
Nores, M. y D. Yzurieta.1995. Nuevas localidades para aves argentinas. Parte VIII. Hornero 14 (1-2): 72-73.
Nores, M. y M. M. Cerana. 1990. Biogeography of forest relics in the mountains of northwestern Argentina. Revista Chilena de Historia Natural 63: 37-48.
Nores, M. y M. M. Cerana. 2010. Contemporary colonisation by waterbirds of a small sam lake in central Argentina. Avian Biology Research, 3 (1): 31-34
Nores, M. y S. A. Salvador. 1996. Nuevos registros de aves para San Juan. Nuestras Aves 34: 43-44.
Nores, M. y S. A. Salvador.1985. Nuevos registros de aves para La Rioja, Argentina. Historia Natural 5 (24): 207-208.
Nores, M., D. Yzurieta y R. Miatello. 1983. Lista y distribución de las aves de Córdoba, Argentina. Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba. 56: 1-114.
Nores, M., D. Yzurieta y S. A. Salvador.1991. Lista y distribución de las aves de Santiago del Estero, Argentina. Bol. Acad. Nac. Cs.Córdoba, 59: 157-196.
Nores, M., S. A. Salvador y D. Yzurieta.2000. Registros de aves de selva en Catamarca, Argentina. Hornero 15: 111-115.
Nores, M.1996. Avifauna de la provincia de Córdoba. Fauna 1: 255-337.
Noriega, J. I., L. J. M. De Santis y G. O. Pagnoni. 1990. Passeriformes presentes en egagrópilas de *Tyto alba* (Aves: Tytonidae) para la localidad de Laguna Blanca (Provincia de Chubut-Argentina). Neotrópica 36 (95): 33-34.
Noriega, J. I., R. Aramburú, E.R. Justo y L. J. M. De Santis. 1993. Birds present in pellets of *Tyto alba* (Strigiformes, Tytonidae) from Casa de Piedra, Argentina. J. Raptor Res. 27: 37-38.
Notarnicola, J. y S. H. Seipke. 2004. Presas de Halcones pergrinos *Falco peregrinus* en la ciudad de La Plata, Argentina. I Simposio Argentino sobre Investigación y Conservación de rapaces. Museo de La Plata, La Plata: 17-18. Buenos Aires.
Novatti, R. 1978. Notas ecológicas y ecológicas sobre las aves de Cabo Primavera (Costa Danco-Península Antártica). Ed. Dirección Nacional del Antártico, Contr. Nº 27: 26-108
Núñez Chas, J. M.1992. Hallazgo de un nido de *Leucochloris albicollis* en Mar del Plata. Nuestras aves 27: 32.
Núñez Montellano, M. G., P. G. Blendinger, M. A. Vattuone, E. Barboza, G. Terán, J. Martiarena, G.Salas y D. Gómez. 2009c. Consumo de savia por aves del Chaco semiárido. XIII RAO: 80. Tafí del Valle, Tucumán.
Oates, E. W. 1901. Catalogue of the collection of birds eggs in the British Museum. Vol. 1.Taylor & Francis, London.
Oates, E. W. y S. G. Reid. 1903. Catalogue of the collection of birds eggs in the British Museum. London.
Ojeda, V., L. Chazarreta y A. Trejo. 2013. Presencia y nidificación del Lechuzón de campo (*Asio flammeus*) en el bosque andino-patagónico: muchas lauchas por aquí, mucha ceniza por allá. Nuestras aves 58: 37-40.
Olguín, P. F., A. H. Beltzer y M. Campana. 2013b. Dieta del Gaviotín chico (*Sterna superciliaris*) (Aves: *Sternidae*) en el valle de inundación del río Paraná Medio. Revista FABICIB. Vol. 17: 113-120.
Olivera, D. S. 2011. Gaviotas cangrejeras en Buenos Aires. Los que se van. ONL: 1-2.
Olivera, D. S. 2009. Laguna de los Pozuelos. Naturaleza y Conservación. 26: 12-13.

Olivera, R. A., U. Lardelli y F. Bruno. 2009. Aves del Parque Provincial Aconcagua y Monumento Natural Puente del Inca. Mendoza, Argentina. Lista comentada. Publicaciones El Arunco Nº 2. Ed. de la Travesía. La Pampa, Argentina.

Olivera, R., D. Ferrer, F. Bruno, M. Cataldo y O. D. Navas. 2010. Gaviota chica (*Larus pipixcan*) en el Parque Provincial Aconcagua, provincia de Mendoza, Argentina. Biológica Nº 12: 69-70.

Olrog, C. C. 1948. Observaciones sobre la avifauna de Tierra del Fuego y Chile. Acta Zool. Lilloana 5: 437-531. Tucumán.

Olrog, C. C. 1950. Notas sobre mamíferos y aves del Archipiélago de Cabo de Hornos. Acta Zool. Lilloana 9: 505-532.

Olrog, C. C. 1953. Sobre aves del noroeste argentino. Hornero 10: 84-85.

Olrog, C. C. 1958a. Observaciones sobre la avifauna antártica y de alta mar desde el río de la Plata hasta los 60º de latitud sur. Acta Zool. Lilloana 15: 19-33.

Olrog, C. C. 1959c. Notas ornitológicas sobre la colección del Instituto Miguel Lillo (Tucumán). V. Acta Zool. Lilloana, 17: 421-428.

Olrog, C. C. 1963a. *Colibri thalassinus*, nuevo picaflor para la fauna Argentina. Neotrópica 9: 94.

Olrog, C. C. 1965b. Diferencias en el ciclo sexual de algunas aves. Hornero 10: 269-272.

Olrog, C. C. 1967a. Breeding of the Band-Tailed Gull (*Larus belcheri*) on the Atlantic coast of Argentina. Condor 69: 42-48.

Olrog, C. C. 1972a.Notas ornitológicas, VIII, sobre la colección del Instituto Miguel Lillo. Tucumán. Acta Zool. Lill., 26 (18): 267-274. Tucumán.

Olrog, C. C. 1973a. Dos adiciones a la avifauna argentina. Neotrópica 19: 145-146.

Olrog, C. C. 1974. Notas ornitológicas, X. Sobre la colección del Instituto Miguel Lillo. Tucumán. Acta Zool. Lill., 31: 69-75. Tucumán.

Olrog, C. C. 1975a. *Uropsalis lyra* nueva para la fauna argentina (Aves, Caprimulgidae). Neotrópica 21: 147-148.

Olrog, C. C. 1979a. Alarmante escasez de rapaces en el sur argentino. Honero 12 (1): 82-84.

Olrog, C. C. 1979b. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana (XXVII): 324 pp.Tucumán.

Olrog, C. C. 1979c. Notas ornitológicas XI. Sobre la colección del Instituto Miguel Lillo. Acta Zool. Lilloana., 33: 5-7. Tucumán.

Olrog, C. C. 1985a. Status of wet forest raptors in northern Argentina. ICBP. Tecnical Publication Nº 5: 191-197.

Olrog, C. C. y E. A. Pescetti. 1991. Las aves del Gran Cuyo: Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja. Guía de campo. CRICYT. Mendoza, 160 páginas.

Olrog, C. C.1949a. Breves notas sobre la avifauna de Aconquija. Acta Zool. Lilloana 7: 139-159.

Olrog, C. C.1956a. Contenidos estomacales de aves del noroeste argentino. Hornero 10: 158-163.

Olrog, C. C.1963b. Lista y distribución de las aves argentinas. Fundación M. Lillo.UNT. Págs. 377.

Olrog, C. C.1969. *Chlidonias niger* y *Sterna albifrons*, dos láridos nuevos para Argentina. Neotrópica 15: 7-8.

Olrog, C. C.1972b. Adiciones a la avifauna argentina. (1º suplemento de lista y distribución de las aves argentinas). Acta Zoológica Lilloana, 26: 255-266.

Olson, S. L. y H. M. F. Alvarenga. 2006. An extraordinary feeding assemblage of birds at a termite swarm in the Serra da Mantiqueira, Sao Paulo, Brazil. Rev. Bras. Ornit. 14: 297-299.

Oniki, Y. y E. O. Willis. 1999. Body mass, cloacal temperatura, morphometrics, breeding and mot of birds of the Serra das Araras region, Mato Grasso, Brazil. Ararajuba 7: 17-21.

Oniki, Y. y E. O.Willis. 1983c. A study of breeding birds of the Belém area, Brazil: II. Psittacidae to Trochilidae. Ciencia e Cultura, 35: 958.

Ordano, M. y A. Bosisio. 1997. Historial records of threatened and near threatened argentinian birds from Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino of Santa Fe, Argentina. Bull. Br. Ornithol., Club 117: 77-79.

Ordano, M. y A. Bosisio. 2001. Catálogo de aves del Museo Provincial de Ciéncias Naturales “Florentino Ameghino”, Santa Fe, Argentina. Serie Catálogos, 7: 1-85.

Ordano, M. y R. Miatello.2001. *Nyctibius griseus* (Aves: *Nyctibiidae*). Nueva especie para la avifauna de Córdoba, Argentina. Natura Neotropicalis 32 (1): 71-72.

Ordano, M., A. Bortoluzzi, M. Chatellenaz y L. Biancucci. 2008. Respuesta a corto plazo de las aves a la quema y al pastoreo en pastizales del Parque Nacional Mburucuyá, Argentina. INSUGEO, Miscelánea, 17 (2): 425-446.

Ordano, M., A. Bosisio, B. Boscarol, A. Beltzer y G. P. de Amsler. 1999. Stomach contents of thirty six bird species from northern Argentina. Revista Ceres, 46 (267): 555-563.

Ordano, M.1996. Estudio de una comunidad de aves altoserrana (Córdoba, Argentina) durante un ciclo anual. Rev. Asc. Cienc. Nat. Litoral 27 (2): 83-94.
Orgeira, J. L. 1995b. Seabird observations of the Argentina Atlantic shore between Tierra del Fuego and Buenos Aires. Bolletino del Museo Regionale di Scienze Naturale di Torino 13: 105-115.
Orgeira, J. L. 1997a. Programa de censos en el mar de aves antárticas y subantárticas: Resultados del periodo 1987-1995. Hornero 14 (4): 184-192. Aves Argentinas / AOP., Buenos Aires Argentina.
Orgeira, J. L. 1997c. Nidificación y hábitat del petrel de Wilson (*Oceanites oceanicus*) en Punta Cierva, costa de Danco, Península Antártica. Ornitología Neotropical 8: 49-56.
Orgeira, J. L. 2001a. Distribución espacial de densidades de aves marinas en la plataforma continental argentina y océano atlántico sur. Ornitología Neotropical 12: 45-55.
Orgeira, J. L. 2004. Asociaciones entre aves marinas y cetáceos en el océano atlàntico sur y antártida. Ornit. Neotropical 15 (2): 163-172
Orrego Aravena, R. 1970. Vertebrados de La Pampa. Biblioteca Pampeana. Serie Folletos, 13: 1-31.
Ortiz, D. y C. Ruiz. 2011. Migración y estacionalidad de aves en el arroyo Mista, Tucumán, Argentina. Nuestras Aves 56: 16-18.
Ortiz, D. y R. Aráoz. 2014. Aves de la Sierra de San Javier. Universidad Nacional de Tucumán.
Ortiz, D. y R. Aráoz. 2015. El Picaflor zafiro (*Thalurania furcata*) y el Colibrí mediano (*Colibrí serrirostris*) en la provincia de Tucumán, Argentina. EcoRegistros Revista, 5(7): 15-17.
Ortiz, D., A. Novillo, I. Ferro, R. Ovejero y P. Capllonch. 2005. Contribución al conocimiento de la avifauna de las cumbres calchaquíes (Tucumán, Argentina). XI RAO: 136. Buenos Aires.
Ortiz, D., C. Barrionuevo, P. Capllonch, L. Julio y R. Aráoz. 2009. Acerca de la distribución e historia natural del Alilicucu yungueño (*Megascops hoyi*) en el noroeste argentino. Nuestras Aves 54: 11-14.
Ortiz, D., R. Aráoz y C. Aldetere. 2011b. Lista sistemática de las aves de la reserva experimental Horco molle, provincia de Tucumán, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 62: 1-5.
Ortiz, G. y F. Murúa. 1994. Aves de ambientes acuáticos de la provincia de San Juan (Argentina). I. Multiquina, 3: 125-131.
Osinaga Acosta, O., J. R. Torrres Dowdll, E. Martín y E. Lascano. 2006. Aves playeras. En: Bañados del río Dulce y Laguna Mar Chiquita (Córdoba), Argentina) (Ed. Bucher, E. H. pp. 263-275. Academia Nacional de Ciencias, Córdoba, Argentina)
Oustalet, E. 1891. Oiseaux. Mission Scientifique du Cap Horn, 1882-1883. Zoologie 6 (B): 1-341. París.
Pagano, L. G. y E. Mérida. 2009. Aves del Parque Costero del Sur. Pp. 200–244, en: Athor J. (ed) Parque Costero del Sur. Naturaleza, conservación y patrimonio cultural. Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Buenos Aires, Argentina.
Pagano, L. G., E. A. Jordán, J. I. Areta, R.F. Jensen e I. Roesler. 2012. Aves de la Reserva Natural Punta Lara. En 97-143: Roesler, I. y M.G. Agostini (eds). Inventario de los Vertebrados de la Reserva Natural Punta Lara, provincia de Buenos Aires, Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación, Monografía de Aves Argentinas No 8. Buenos Aires, Argentina.
Pagano, L. G., E. A. Jordán, J. I. Areta, R.F. Jensen e I. Roesler. 2012. Aves de la Reserva Natural Punta Lara. En 97-143: Roesler, I. y M.G. Agostini (eds). Inventario de los Vertebrados de la Reserva Natural Punta Lara, provincia de Buenos Aires, Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación, Monografía de Aves Argentinas Nº 8. Buenos Aires, Argentina.
Pagnoni, G. O. 2015. El Picaflor Rubí (*Sephanoides sephanoides*) como residente otoñal en la ciudad de Puerto Madryn, Chubut, Argentina. Historia Natural. Tercera Serie Volumen 5 (1): 91-98.
Pagnoni, G. O. 1995. Censos de chorlor y playeros en Bahía Nueva (Puerto Madryn, Chubut). Hornero 14: 60-63.
Pagnoni, G. O. 2002. Poblamiento de la infauna en la zona intermareal del Golfo San José (Provincia del Chubut) y su importancia en la alimentación de aves migradoras. Naturalia Patagónica 1: 111-114.
Pardiñas, U. F. J. y C. A. Galliari. 1998. La distribución del ratón topo *Notiomys edwardsii* (Mammalia: Muridae). Neotrópica 44: 123-124.
Pardiñas, U. F. J., P. Teta y S. Heinonen Fortabat. 2005a. Vertebrate prey othe Barn Owl (*Tyto alba*) in subtropical Wetlands of Northeastern Argentina and Eastern Paraguay. J. Raltor Res. 39 (1) 65-69.
Pardiñas, U. J., P. Teta y S. H. Fortabat.2005b. Dieta de la Lechuza de campanario (*Tyto alba*) en los humedales subtropicales del Chaco oriental y en el complejo de esteros Ibará-Ñeembucú (Argentina-Paraguay) XI RAO: 137. Buenos Aires.
Parera, A.1992. Aves costeras de Comodoro Rivadavia. Nuestras Aves 26: 21-23.

Partridge, W. H. 1956a. Un nuevo dormilón para la fauna de Argentina y Paraguay. Hornero 10: 169-170.

Partridge, W. H.1953c. Observaciones sobre aves de las provincias de Córdoba y San Luis. Hornero 10: 23-73.

Partridge, W. H.1954. Estudio preliminar sobre una colección de aves de Misiones. Rev. Mus. Arg. Cs. Nat. Zool. 3: 85-153.

Partridge, W. H.1961b. Aves de Misiones nuevas para Argentina. Neotrópica 7 (22): 25-28.

Passeggi, J. M. 2011. First Description of the Breeding Chronology of the White-collared Swift (*Streptoprocne zonaris*) in Argentina. The Wilson Journall of Ornithology 123: 613-618.

Pautasso, A. A. 2002a. Nuevos registros para aves poco citadas en Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves 43: 19-21.

Pautasso, A. A. 2002b. Aves de la Reserva Urbana de la Ciudad Universitaria UNL "El Pozo", Santa Fe, Argentina. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino", 8: 1-12.

Pautasso, A. A. 2011. La fauna y su conservación en los Bajos Submeridionales. Ediciones Biológica. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad Nº 5. Santa Fe, Argentina, 278 pp.

Pautasso, A. A.2006a. Dieta del Lechuzón orejudo (*Asio clamator*) en el centro y este de la provincia de Santa Fe, Argentina. Ornitología Neotropical 17: 289-293.

Pautasso, A. y J. Cazenave.2002. Observaciones sobre la nidificación del Atajacaminos tijera *Hydropsalis torquata* en el este de la provincia de Santa Fe, Argentina. Hornero 17 (2): 99-104.

Payne, R. B. 1997. Family Cuculidae (Cuckoos). Pp. 508-607, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds.. Handbook of the Birds of the World. Vol. 4. Sandgrouse to Cuckoos. Lynx Edicions, Barcelona.

Paz Barreto, D. 1990c.Lista sistematica de aves observadas en la reservade fauna de punta Bermeja. Prov. de Rio Negro. Direccion de Planificacion Ambiental, Provincia de Rio Negro. Banco de datos AOP: PRION 218.

Paz Barreto, D. 1997b. Aves de la Provincia de Río Negro. II Localidades confirmadas. Consejo de Ecología y Medio Ambiente, Delegación Bariloche. Pp. 1-24.

Paz, D. 1990a. Aves de los hielos. Nuestras Aves 22: 4-6.

Paz, D. 1991b. Punta Bermeja: junto a los Lobos Marinos… y las aves. Nuestras Aves 24: 7.

Paz, D., J. F. Masello, P. Quillifeldt, M. Marchesan, M. L. Pagnossin, T. Sommer, A. Pagnossin y M. Failla. 2004. Las aves del Cóndor. Folleto Villa Marítima El Cóndor, Provincia de Río Negro, Argentina. Uñopatun.

Paz, D.1992b. Gaviotín sudamericano (*Sterna hirundinacea*) nidificando en Río Negro. Nuestras aves 26: 22-23.

Pearman, M. y E. Abadie. 1995a. Field identification, ecology and status of Sickle-winged Nigthjar *Eleothreptus anomalus*. Cotinga 3: 12-14.

Pearman, M., J. I. Areta, I. Roesler y A. Bodrati. 2010. Confirmation of the Sooty Swift (*Cypseloides fumigatus*) in Argentina with notes on the nest placement, seasonality and distribution. Ornitología Neotropical, 21: 351-359.

Pearman, M., M. Zambrano y A. Bodrati. 2011. Primeros registros y confirmación de la Paloma plomiza (*Patagioenas plumbea*) en la Argentina. Nuestras Aves 56: 7-9.

Pearson, O. P., N. Binsztein, L. Boiry, C. Busch, M. Di Pace, G. Gallopín, P. Penchaszadech & M. Piantanida. 1968. Estructura social, distribución especial y composición por edades de una población de Tuco-tucos (*Ctenomys talarum*). Invest. Zool. Chil. 13: 47-80.

Peltzer, P. M.1998. Inventario de flora y fauna del área natural protegida: islote municipal del valle aluvial del Paraná. Natura Neotropicalis 29: 74-78.

Peres, M. y C. Peres. 1985. Peregrine projetct, Argentina (activities 1982). Bull. WWGBP 2: 109-110.

Pereyra Lobos y F. Jara. 2013. Primer registro de nidificación de Lechuza bataraz chaqueña (*Strix chacoensis*) en la provincia de Mendoza, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 133: 1-6.

Pereyra Lobos, R. y A. Elías. 2011. Primer registro de Falaropo Pico grueso *Phalaropus fulicaria* (Aves, Charadriiformes, Scolopacidae) en laguna de Llancanello. Mendoza, Argentina. Xolmis CRO Nº 4: 1-2.

Pereyra Lobos, R. y F. Jara. 2012. Primer registro de *Strix chacoensis* (Aves : Strigiformes) para la reserva de la Biósfera Ñacunán, Provincia de Mendoza, Argentina. Xolmis 22: 1-4.

Pereyra Lobos, R. y F. Jara. 2013a. Primer registro documentado de la Lechuza bataraz chaqueña, *Strix chacoensis* para la Provincia de San Juan, República Argentina. Xolmis 23: 1-3.

Pereyra Lobos, R. y F. Martínez. 2011. Primer registro de Falaropo de Wilson *Phalaropus tricolor* (Aves: Scolopacidae) en el extremo norte de la provincia de Mendoza, Argentina. Xolmis 7: 1-4.

Pereyra Lobos, R., P. Ramirez, F. Santander, S. Mayorga, S. Alvarado Orellana y L. Muñoz. 2008b. Hábitos alimenticios de la Lechuza bataraz chaqueña (*Strix chacoensis*) en un ambiente de monte en la Reserva Natural bosques Telteca, Mendoza, Argenttina. XII RAO: 53. San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia Argentina.

Pereyra Lobos, R.2002. Observaciones sobre aves del Parque Provincial Aconcagua, provincia de Mendoza, Argentina. Nuestras Aves 43: 25.

Pereyra, C. B. de. 1927. Observaciones sobre algunas aves de Zelaya (Prov. de Buenos Aires). Hornero 4: 75-77.

Pereyra, C. B. de. 1928. Observaciones sobre algunas aves de Buenos Aires. Hornero 4: 204-206.

Pereyra, C. B. de. 1935. Sobre la nidificación de algunas aves. Hornero 6: 102-104.

Pereyra, J. A. 1923a. Lista de aves colectadas en otras regiones de la República Argentina. Hornero 3: 174.

Pereyra, J. A. 1923b. Las aves de la región ribereña de la provincia de Buenos Aires. Hornero 3: 159-174.

Pereyra, J. A. 1927d. Segunda lista de aves colectadas en la región ribereña de Buenos Aires. Hornero 4: 23-34.

Pereyra, J. A. 1927e. Lista de aves colectadas en otras regiones (continuación). Hornero 4: 28-34.

Pereyra, J. A. 1927f. Captura del Chorlito (*Tryngites subruficollis*) Hornero 4: 80.

Pereyra, J. A. 1931a. La familia de los Estrígidos. Hornero 4: 392-397.

Pereyra, J. A. 1932a. Los Caprimúlgidos. Hornero 5: 41-46.

Pereyra, J. A. 1937a. Aves nuevas para la provincia de Buenos Aires. Hornero 6: 438-439.

Pereyra, J. A. 1937b. Contribución al estudio y observaciones ornitológicas de la zona norte de la Gobernación de La Pampa. Mem. Jard. Zool. La Plata. Tomo 7: 197-326.

Pereyra, J. A. 1937c. Miscelánea ornitológica. Algunos casos interesantes de albinismo. Hornero 6: 437-449.

Pereyra, J. A. 1939. Miscelánea ornitológica. Hornero 7: 234-243.

Pereyra, J. A. 1942a. Avifauna argentina. Mem. del Jardín Zool. La Plata.Tomo 10: 171-274.

Pereyra, J. A. 1945. Las aves del territorio del Neuquén. An. Mus. de la Pat. Perito "Francisco P. Moreno", Adm. Prq. Nac., Argentina. T. I, pags. 61-99. Lam. I-VIII.

Pereyra, J. A. 1950a. Avifauna argentina. Hornero 9: 178-241.

Pereyra, J. A. 1950b. Las aves del territorio de Misiones. Anal. Mus. Nahuel Huapi Pto. F. P. Moreno. " : 1-40. Buenos Aires.

Pereyra, J. A. 1965. *Leucochloris albicollis* en la provincia de Buenos Aires. Hornero 10: 279.

Pereyra, J. A.1932c. Notas ornitológicas del mes de diciembre de 1931. Hornero 5: 65-69.

Pereyra, J. A.1935a. Miscelánea ornitológica. Hornero 6: 95-98.

Pereyra, J. A.1938a. Algunos nidos poco conocidos de nuestra avifauna. Hornero 7: 24-30.

Pereyra, J. A.1938b. Aves de la zona ribereña nordeste de la provincia de Buenos Aires. Memorias del Jardín Zoológico. La Plata. Tomo 9, parte 2: 1-304.

Pérez, C. H. F. y P. Petracci. 1998. Notas sobre la avifauna de la cuenca media y superior del Río Negro, Provincia de Río Negro, Argentina. X RAO: 38.

Pérez, C. H. F., K. Delhey y P. F. Petracci. 2006. Aves nuevas o poco frecuentes del norte de la patagonia argentina.Nuestras Aves 52: 25-28.

Pérez, F., P. Sutton y A. Vila. 1995. Aves y mamíferos marinos de Santa Cruz. Recopilación de los relevamientos realizados entre 1986-1994. Boletín Técnico 26, Fundación Vida Silvestre Argentina, Buenos Aires.

Pergolani de Costa, M. J. y A. R. P. Zapata. 1980. Relación entre la Torcaza Común, *Zenaida auriculata chrysauchenia* (Reichenbach), y las malezas (Aves, Columbidae). Neotrópica 26: 179-181.

Pergolani, M. J. I. 1944b. Nota sobre el inmaduro del Vencejo de collar blanco, *Streptoprocne zonaris zonaris* (Shaw). Hornero 8: 491-493.

Peri, P. L. 2013. Reserva Provincial Punta Gruesa. Una mirada al bosque nativo y los pastizales naturales. Río Gallegos. 67 Pp.

Pessino, M. E. M., S. I.Tiranti, H. Riesco, B. C. Molas y P. Tejerina.2005. Consumo de murciélagos por la Lechucita de las vizcacheras *Athene cunicularia* en un área protegida del caldenal pampeano. XI RAO: 140.

Peters, J. L. 1934. Check-List of Birds of the word, vol. 2, Harvard University Press. Cambridge.

Peters, J. L.1923b. Notes on some summer birds of northen Patagonia. Bull. Mus. Comp. Zool. Vol. 65: 277-337.

Petracci, P. F. 1998. Ecología trófica de *Calidris alba* en el sur de la provincia de Buenos Aires. X RAO: 39. Mar del Plata.

Petracci, P. F. y C. H. F. Pérez.1997. Primer registro de nidificación en ambiente fluvial (Río Negro, Argentina) del Gaviotín sudamericano *Sterna hirundinacea*. Hornero 14: 267-268.

Petracci, P. F. y D. Basanta. 2002. Efectos positivos de la nidificación del Macá común (*Rollandia rolland*) en una colonia de caracoleros (*Rostrhamus sociabilis*).Ornitología Neotropical 13:113-119.

Petracci, P. F., J. K. V. Delhey, y C. H. F. Pérez. 2001. Albinismo en carancho (*Caracara plancus*) y la gaviota cocinera (*Larus dominicanus*). Nuestras Aves 42: 28.

Petracci, P. F., K. J. V. Delhey, C. H. F. Pérez, D. Basanta, M. V. Massola, M. Zamorano y M. Fosatti. 2004a. Nuevos aportes al conocimiento de la distribución y anidación de algunas especies de aves en la Argentina. Nuestras Aves 48: 25-31.

Petracci, P. F., L. F. La Sala, G. Aguerre, C. H. Pérez, N. Acosta, M. Sotelo y C. Pamparana.2004b. Dieta de la Gaviota cocinera (*Larus dominicanus*) durante el período reproductivo en el estuario de Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. Hornero 19 (1): 23-28.

Petracci, P. F., L. F. La Sala, J. K. V. Delhey, C. H. F. Pérez, M. Sotelo, J. Cereghetti y G. Aguerre. 2005. Especialización trófica de la Gaviota cangrejera *Larus atlanticus* durante el período reproductivo en el estuario de Bahía Blanca, Argentina. XI Reunión argentina de ornitología. B. Aires.: 141.

Petracci, P. F., M. R. Sotelo y L. I. Díaz. 2008. Nuevo registro de nidificación de la Gaviota cangrejera (*Larus atlanticus*) en la Reserva Natural Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde, Buenos Aires, Argentina. Hornero 23 (1): 37-40.

Petracci, P., K. Delhey y M. Sotelo. 2007. Hábitos granívoros de la Gaviota cangrejera (*Larus atlanticus*): implicancias sobre su estatus de especialista. Hornero 22 (1): 51-54

Philippi, B., A. W. Johnson, J. D. Goodall y F. Behn. 1954. Notas sobre aves de Magallanes y Tierra del Fuego. Boletín del museo Nacional de Historia Natural de Chile. 26 (3): 1-65.

Piacentini, H. y P. Acerbo.1998. Presencia del Alilicucu común (*Otus choliba*) en la provincia de Río Negro, Argentina. Nuestras Aves 38: 12.

Piacentini, H., D. Paz Barreto, y A. Wucusich. 2003. Registro de Fauna zona de Reserva Cinco Chañares págs. 369-386, en Bajo del Gualicho, una planicie patagónica bajo el nivel del mar-Realidad y leyenda. Coord. R. F. Massera y J. C. Guarido. Secretaría de Estado de Acción Social de Río Negro 2003, págs. 1-416.

Pichorim, M.2002a. Biologia reprodutiva do bacurau-tesoura-gigante (*Macropsalis forcipata*, Caprimulgidae) no morro Anha. Ararajuba 10 (2): 149-165.

Pichorim, M.2002b. The breeding biology of the Biscutate Swift (*Streptoprocne biscutata*) in Southern Brazil. Ornitología Neotropical 13: 61-84.

Pierce, R. J. 1996. Family Recurvirostridae (Stilts and Avocets). Pp. 332-347, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 3. Hoatzin to Auks. Lynx Edicions, Barcelona.

Pierce, R.1990.Feeding observations on the Magellanic plover *Pluvianellus socialis* at Península Valdés, Chubut, Argentina. Hornero 13: 166-168.

Piersma, T. 1996a. Family Scolopacidae (Sandpipers, Snipes and Phalaropes), Pp. 444-533, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 3. Hoatzin to Auks. Lynx Edicions, Barcelona.

Piersma, T. 1996b. Family Charadriidae (Plovers). Pp. 384-442, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 3. Hoatzin to Auks. Lynx Edicions, Barcelona.

Pillado, M. S. y A. Trejo. 1998. Comparación entre las ditas de *Tyto alba* (lechuza de los campanarios) y *Bubo viginianus* (ñacurutú) en la Patagonia argentina. Pp. 128 *in* Cuarto Congreso Internacional de gestión en Recursos naturales (Termas de peyuhue, Chile). Resumen.

Pillado, M. S. y A. Trejo. 2000. Diet of the Barn Owl (*Tyto alba tuidara*) in Northwestern Argentine Patagonia. J. Raptor Res. 34 (4): 334-338.

Pineschi, R. B. 1990. Aves como dispersoras de sete espécies de *Rapanea* (Myrsinaceae) no maciço do Itatiaia, estados do Rio de Janeiro e minas Gerais. Ararajuba 1: 73-78.

Plotnick, R. 1956a. Original comportamiento de un Caburé. Hornero 10: 171-172.

Poretti, T. I.1993. Biología reproductiva del Gaviotín antártico en la isla 25 de Mayo, Shetland del Sur. Resúmenes VIII RAO: 37. Puerto Iguazú.

Povedano, H.1999. Nidificación del Gaviotín chico común (*Sterna superciliaris*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras aves 39: 11-12.
Pozzi, A. 1934. Nidos y pichones de Tero *Belonopterus chilensis*. Hornero 5: 404-407.
Presti, P. M. y A. L. Echevarría. 2009. El ensamble de aves en un relicto de selva pedemontana: Parque Percy Hill (Yerba Buena, Tucumán, Argentina). Acta Zoológica Lilloana, 53 (1-2): 64-76.
Prince, P. A. y J. P. Croxall. 1983. Birds of South Georgia new records and re-evaluations of status. Bull. Brit. Antarct. Surv.59: 15-27.
Prince, P. A. y J. P. Croxall. 1996. The birds of South Georgia. Bull. Brit. Orn. Club. 116 (2): 81-104.
Prince, P. A. y M. R. Payne. 1979. Current status of birds at South Georgia. Bull. Brit. Antarct. Surv.48: 103-118.
Pugnali, G. y P. Chamorro. 2008. Lista de aves de la Reserva Costanera Sur. Aves Argentinas. Buenos Aires.
Pugnali, G.2002a. Primera observación del Colibrí mediano (*Colibri serrirostris*) en la provincia de Misiones, Argentina. Nuestras Aves 43: 22-23.
Pujalte, J. C., A. R. Reca, A. Balabusic, P. Canevari, L. Cusato y V. P. Fleming. 1995. Unidades ecológicas del Parque Nacional Río Pilcomayo. Anales de Parques nacionales 16: 1-185.
Punta, G., G. Herrera y J. Saravia.1995. Aspectos de la biología reproductiva del Ostrero negro *Haematopus ater* en las islas Isabel, Bahía Bustamante, Chubut. Hornero 14: 42-43.
Quintana, C. A. 2015. Tafonomía de contenidos dispersos de egagrópilas de *Tyto alba* en un ambiente serrano. Historia Natural. Tercera Serie Volumen 5 (1): 29-47.
Quintana, F. y P. Yorio. 1997a. Breeding biology of Royal and Cayenne terns at a mixed-species colony in Patagonia. Wilson Bulletin 109: 650-662.
Quintana, F. y P. Yorio. 1998a. Competition for nest sites between Kelp Gulls (*Larus dominicanus*) and Terns (*Sterna maxima* and *S. eurygnatha*) in Patagonia. The Auk 115 (4): 1068-1071.
Quintana, F. y P. Yorio. 1998b. Kelp Gull *Larus dominicanus* predation on an Imperial Cormorant *Phalacrocorax atriceps* colony in patagonia. Marine Ornithology 26: 84-85.
Quintana, F. y P. Yorio. 1999. Kleptoparasitism by Kelp Gulls on Royal and Cayenne Terns at Punta León, Argentina. J. Field Ornithol. 70 (3): 337-342.
Quintana, F. y P. Yorio.1996a. Biología reproductiva de los Gaviotines reales y Pico amarillo en patagonia. IX RAO: 43. Buenos Aires.
Quiroga, M. A y H. R. Hadad. 2004. Diversidad de aves y macrófitas en diferentes comunidades vegetales de un humedal. Revista FABICIB (8): 435-57.
Quiroga, O. B., O. R. Coria, N. Gómez, G. Chimino, F. Jorge, L. M. Rojas, J. E. Llugdar y M. Alcalde. 2015. El Gaviotín negro (*Chlidonias niger*) y el Burrito común (*Laterallus melanophaius*) en Santiago del Estero, Argentina. Nuestras Aves 60: 59-60.
Rábano, D., F. Rabuffetti, P. Friedrich y P.Yorio.1996. Nuevos sitios de nidificación y estado poblacional de la Gaviota de Olrog *Larus atlanticus* en el sur de la provincia de Buenos Aires. Resúmenes IX RAO: 44. Buenos Aires.
Rábano, D., P. García Borboroglu y P. Yorio.2002. Nueva localidad de reproducción de la Gaviota de Olrog (*Larus atlanticus*) en la prov. de Buenos Aires, Argentina. Hornero 17 (2): 105-107.
Raffo, F. C., M. R. de la Peña, R. Laenen Silva, G. Capuccio y L. M. Bonin. 2008. Aves del Río Uruguay. CARU.
Ramilo, E. y H. Pastore. 2015. El Chorlo pampa (*Pluvialis dominica*) en el ecotono estepa-bosque patagónico del Parque Nacional Perito Moreno. Nuestras Aves 60: 69-70.
Ramírez Llorens, P. y M. I. Bellocq. 2007. New records clarify the southern distribution of the Spectacled Owl (*Pulsatrixperspicillata*). J. Raptor Res. 41: 268-276.
Ramírez-Llorens, P., E. E. White y M. Rotundo. 2003. Sobre algunas aves de la estancia Guaycolec, prov. de Formosa, Argentina. Nuestras Aves 46: 36-40.
Rau, J. R., M. C. Villagra, M. L. Mora, D. R. Martínez y M. S. Tillería. 1992. Food habits of the Short-Eared Owl. J. Raptor Res. 26 (1): 35-36.
Reed, C. S. 1914. Catálogo de las aves argentinas de la colección del Museo General Regional de Mendoza. Boletín de educación, Nº 35: 1-56.
Reed, C. S. 1916. Las aves de la provincia de Mendoza. Mus. Educ. Mendoza, 47 págs. Mendoza.
Reed, C. S. 1921. Las aves de caza en la provincia de Mendoza. Revista Chilena de Historia Natural, 25: 203-220.
Reggio, P. y C. de la Orden.1997. Presencia del Aguatero (*Nycticryphes semicollaris*) en la provincia de San Juan, Argentina. Nuestras Aves 36: 6.
Reid, K. 1998. Franklin´s Gull *Larus pipixcan* at South Georgia. Bull. Brit. Orn. Club 118: 55-56.

Renard, A.1920. Notas sobre aves de Cañuelas (Prov. de Buenos Aires). Hornero 2: 58-60.

Renard, A.1931. Algunas observaciones sobre aves durante un viaje a la ría de Deseado. Hornero 4: 412-414.

Repenning, M., Basso, H. C. P., Rossoni, J. R., Krügel, M. M. y C. S.Fontana. 2009. Análise comparativa da dieta de quatro espécies de Cucos (Aves: Cuculidae), no sul do Brasil. Zoologia 26: 443-453.

Restivo, C. y C. Rego. 2015. Registro de Picaflor negro (*Florisuga fusca*) en Baradero, provincia de Buenos Aires. Nuestras Aves 60: 64.

Reynolds, P. W.1934. Apuntes sobre aves de Tierra del Fuego. Hornero 5: 339-352.

Reynolds, R. T.1953. Sobre nidificación del Chorlo de Magallanes. Hornero 10: 90-91.

Riehl, C. 2010. Greater Ani (*Crotophaga major*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=205176

Ripley, S. D. 1950. A smoll collection of birds from Argentine. Tierra del Fuego. Postilla 3: 1-11.

Roda, M. A. y C. F. Danti. 2015. Nuevos registros de aves para Saladillo, provincia de Buenos Aires. Nuestras Aves 60:32-38.

Rodríguez Astorino, L. N., S. V. Rodríguez Astorino, T. N. Rodríguez Astorino y C. Rodríguez. 2013. Primer registro domumentado de Salteador grande (*Stercorarius pomarinus*) en Argentina continental. Nuestras aves 58: 48-51.

Rodríguez Goñi, H.1984. Presencia del Atajacaminos coludo en Buenos Aires. Nuestras Aves 4:8-9.

Rodríguez Graves, V., A. Pautasso, P. Preliasco, M. V. Del Sastre y F. Miñarro. 2009. Relevamiento ambiental de la Estancia Isleta Linda. Provincia de Santa Fe. Fundación Vida Silvestre Argentina.

Rodríguez Moulín, H.1984b. El Ostrero negro en Buenos Aires. Nuestras Aves 3: 7.

Rodríguez, C. A., F. N. Moschione, A. L. Sureda y A. J. Sandoval. 2010. Monitoreo mensual de tres especies de flamencos en el Monumento Nacional Laguna de los Pozuelos, Jujuy, Argentina. Flamingo. Bulletin of the Flamingo Speialist Group. Nº 18.

Rodríguez, E. D. 2012b. Aves del Cerro San Bernardo y de las Serranías del Este de la Ciudad de Salta. 1º ed. Salta: Fondo Editorial Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta.

Rodríguez, E. D. 2013. Registro de nidificación de la Lechucita canela (*Aegolius harrisi dabbenei*) en la provincia de Salta. Nuestras aves 58: 61-62.

Roesler, I. 2001a. Nuevas citas de aves para al partido de General Villegas, provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 41: 32-33.

Roesler, I., D. Punta Fernández y P. Hernández. 2013a. Gaviota cocinera (*Larus dominicanus*) atacando a un Pato maicero (*Anas spinicauda*). Nuestras aves 58: 36-37.

Roesler, I., G. D. Pugnali y M. della Seta.2004. Observación del playero ala blanca (*Catoptrophorus semipalmatus*) en Punta Rasa, partido de General Lavalle, Prov. de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 48: 24-25.

Roesler, I., S. Imberti, H. E. Casañas, P. M. Hernández, J. M. Klavins y L. G. Pagano. 2014. Noteworthy records and natural history comments on rare and threatened birds species from Santa Cruz province, Patagonia, Argentina. Revista Brasileira de Ornitologia, 22 (2): 189-200

Roesler, I.2001b. Tres especies poco comunes en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 42: 30.

Roig, V. G. 1965. Elenco sistemático de los mamíferos y aves de la provincia de Mendoza y notas sobre su distribución geográfica. Bol. de Estud. Geogr. 12 (49): 175-222.

Romano, M., F. Pagano, I. Barberis y J. Maidagan. 2005. Registros del gaviotín pico negro (*Sterna nilotica*) y Playerito unicolor (*Calidris bairdii*) en el sur de la provincia de Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves 49: 29.

Romano, M., R. Biasatti y L. De Santis. 2002. Dieta de *Tyto alba* en una localidad urbana y otra rural en la región pampeana argentina. Hornero 17: 25-29.

Ronchi Virgolini, A., L. J. Alonso y A. Manzano. 2008. Estado actual de la comunidad de aves del Parque Nacional Pre-Delta (Diamante-Entre Ríos). XII RAO: 97.

Roper, E. M. 2011. White-collared Swift (*Streptoprocne zonaris*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=225691

Rossetti, M. A. y A. R. Giraudo. 2003. Comunidades de aves de bosques fluviales habitados y no habitados por el hombre en el río Paraná Medio, Argentina. Hornero 18: 89-96.

Rougés, M. y J. G. Blake.2001. Tasas de captura y dietas de aves del sotobosque en el Parque biológico Sierra de San Javier, Tucumán. Hornero 16 (1): 7-15.

Rovira, P. y A. H. Beltzer. 1992. *Polytmus guainumbi* Picaflor de antifaz (Aves: Trochilidae), una nueva especie para la provincia de Entre Ríos, Argentina. Rev. Asoc. Cienc. Nat. Lit. 23 (1 y 2): 71-72.

Rubio, J. M. 2006. Falaropo pico grueso (*Phalaropus fulicarius*) para la provincia de Chubut. Nuestras Aves 52: 34-35.

Sahores, M. y A. Trejo. 2004. Diet shift of barn owls (*Tyto alba*) after natural fires in Patagonia, Argentina. Raptor Research 38 (2): 174-177.

Saibene, C. A. 1987. Observaciones sobre la conducta reproductiva del Urutaú y la Mosqueta amarilla en el Parque Nacional Iguazú. Nuestras aves 14: 16.

Saibene, C. A., M. A. Castelino, N. R. Rey, J. Herrera y J. Calo. 1996. Inventario de las aves del Parque Nacional "Iguazú", Misiones, Argentina. Monografía 9. L.O. L. A. Págs. 70.

Sainz-Trápaga, S. 2014. Aves del noreste de Chubut. Paragonia Argentina. Trelew. Pp.90.

Sainz-Trápaga, S. 2014a. Presencia de la Codorniz californiana (*Callipepla californica*) y la Paloma araucana (*Patagioenas araucana*) al este de la provincia de Chubut, Argentina. EcoRegistros Revista, 4 (10): 32-36.

Salvador, A. S. y M. R. de la Peña. 2014. Nidadas anormales de Tero común (*Vanellus chilensis*) en Argentina. Biológica 17: 60-61.

Salvador, S. A. 1981b. Desarrollo de una nidada comunal de Pirincho: *Guira guira* (Gmelin) (Aves: Cuculidae) Historia Natural 2 (4): 29-31.

Salvador, S. A. 1983a. La avifauna en Villa María y sus alrededores. Escuela Normal " Víctor Mercante" . Inst. Sec. "Bernardino Rivadavia". Villa María, Córdoba. Argentina.

Salvador, S. A. 1984b. Roedores en la dieta de algunas aves. Nuestras Aves 5: 7-9.

Salvador, S. A. 1988. Datos de peso de aves argentinas. Hornero 13: 78-83.

Salvador, S. A. 1990a. Datos de peso de aves argentinas. 2. Hornero 13: 169-171.

Salvador, S. A. 1992. Notas sobre nidificación de aves andinas en la Argentina. Parte II. Hornero 13: 242-244.

Salvador, S. A. 2011a. Biología reproductiva de la familia Cuculidae en el departamento Gral. San Martín, Córdoba, Argentina. Historia Natural. Tercera Serie. Vol. 1 (2): 101-112.

Salvador, S. A. 2012c. Reutilización de nidos por aves en el área central de Córdoba, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 91: 1-9.

Salvador, S. A. 2012h. Dieta y reproducción del Halcón aplomado (*Falco femoralis femoralis*) en Villa María, Córdoba, Argentina. Historia Natural. Tercera serie. Vol. 2 (2): 111-118.

Salvador, S. A. 2013d. El Espinero chico (*Phacellodomus sibilatrix*)un nuevo hospedante del Crespín (*Tapera naevia*). Nuestras aves 58: 58-59.

Salvador, S. A. 2013e. Hormigas Isaú (*Atta vollenweideri*)en la alimentación de algunas aves de Villa María, Córdoba, Argentina. Nuestras aves 58: 63-64.

Salvador, S. A. 2014a. Peso de las aves del Departamento General San Martín, Córdoba, Argentina.Biológica17: 48-57.

Salvador, S. A. 2015. Reproducción de aves andinas del noroeste argentino. Historia Natural. Tercera Serie Volumen 5 (1): 49-76.

Salvador, S. A. y A. Bodrati. 2011. Nuevas víctimas del Tordo renegrido (*Molothrus bonariensis),* hallados enArgentina. Nuestras aves 56: 38-39.

Salvador, S. A. y A. Bodrati. 2013a. Aves víctimas del parasitismo de moscas del género *Philornis* en Argentina. Nuestras aves 58: 16-21.

Salvador, S. A. y A. Bodrati. 2013b. Reproducción del Atajacaminos chico (*Setopagis parvulus*)en las provincias de Córdoba y Chaco, Argentina. Nuestras aves 58: 21-24.

Salvador, S. A. y A. G. Di Giacomo. 2014. Datos de pesos de aves argentinas. Parte 3. Historia Natural. Tercera serie. Vol. 4 (2): 63-88.

Salvador, S. A. y L. A. Salvador. 1990. Nuevos hallazgos en Argentina de *Anas discors, Lophornis chalybea* y *Tyrannus tyrannus*. Hornero 13: 178-179.

Salvador, S. A. y L. A. Salvador. 2012. Reproducción de aves en Pampa de Achala, Córdoba, Argentina. Historia Natural. Tercera serie. Vol. 2 (2): 119-145.

Salvador, S. A. y P. G. Erole. 1994. Notas sobre aves de Santiago del Estero. Nuestras aves 30: 24-25.

Salvador, S. A., A. Bodrati y L. A. Salvador. 2014. Aportes al conocimiento de la reproducción del Atajacaminos colorado (*Antrostomus rufus*) en Argentina. Nuestras Aves 59: 54-57.

Salvador, S. A.1981a. Datos de nidificación de *Asio flammeus suinda* (Vieillot): (Aves: Strigidae) Historia Natural 2 (7): 49-52.

Salvador, S. A.1982. Estudio de parasitismo del Crespín *Tapera naevia chochi* (Vieillot) (Aves: Cuculidae). Historia Natural 2: 65-70.

Salvador, S. y S. Narosky. 1984. Notas sobre nidificación de aves andinas en la Argentina. Hornero 12: 184-188.

Salvador, S. y T. Narosky .1987. Nuevos registros para aves argentinas. Nuestras Aves 13: 9-11.

Salvadori, T. 1897. Viaggio del Dott. Alfredo Borelli nel Chaco boliviano en ella Repubblica Argentina. VII. Uccelli. Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. Univ. Torino 12 (292): 1-36.

Salvadori, T. 1900. Contribuzione all´avifauna dell´Amedica Australe (Patagonia, Terra del Fuoco, Isola Degli Stati, Isole Falkland). Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova. Ser 2 (20): 609-634.

Santander, F., R.A. Figueroa, F. Martínez and S. Alvarado. 2013. Chaco Owl (*Strix chacoensis*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=214616

Santillán, M. A., Costán, A. S. y J. I. Zanón Martínez. 2014. Predation by Geoffroy's Cat on Furrugineus Pygmy-Owl in caldén semiari forest, Argentina. J. Raptor Res. 48: 192-193.

Santillán, M. A., J. de la Cruz Martínez, A. Travaini y P. A. Gandini. 2011. Presencia de la Lechuza de campanario (*Tyto alba*) en el océano atlántico sur. Hornero 26: 159-161.

Santillán, M. A., Travaini, A. y J. Fernández. 2010b. Dieta del Halcón Peregrino (*Falcoperegrinus*) en la Ría Deseado, Patagonia austral Argentina. *Bol. Chil. Ornit*. 16: 1-8.

Santillán, M. A., Travaini, A., Zapata, S. C., Rodríguez, A., Donázar, J. A., Procopio, D. E. y J. I. Zanón. 2009. Diet of the American Kestrel in Argentine Patagonia. J. Raptor Res. 43: 377-381.

Sanzín, R.1918. Lista de aves mendocinas. Hornero 1: 147-152.

Sarasola, J. H., M. A. Santillán y M. A. Galmes. 2003. Food habits and foraging ecology of American Kestrels in the semirid forests of central Argentina. J. Raptor Res. 37 (3): 236-243.

Savigny, C. 2002c. Observaciones sobre aves marinas en aguas argentinas, sudeste bonaerense y Patagonia. Cotinga 18: 81-84.

Savigny, C. y M. Favero. 2005. Playa Punta Mogotes y Puerto de Mar del Plata. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad : 50-51. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.

Savigny, C., F. Firstater y G. Caille. 2005b. Observaciones de aves marinas en la plataforma continental austral argentina: registros extralimitales y especies poco documentadas. XI RAO: 154.

Savigny, C.2001c. Segundo registro del Picaflor negro (*Melanotrochilus fuscus*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 41: 13.

Savigny, C.2002d. Registros de aves nuevas o poco comunes para el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 43: 24-25.

Schaaf, A. A., G. Peralta, A. Luczywo, A. Diaz y S. I. Peluc. 2015b. Aspectos reproductivos de siete especies de aves en el bosque chaqueño serrano, Córdoba, Argentina. Nuestras Aves 60: 18-27.

Schaaf, A. A., G. Peralta, A. Luczywo, A. Diaz y S. I. Peluc. 2015a. Biología reproductiva y comportamientos de cuidado parental de dos especies de Atajacaminos de Córdoba, Argentina. Ornitología Neotropical 26: 25-37.

Schalow, H. 1898. Die Vögel der Sammlung Plate. Zoologischen Jahrbuchen, Jena. Supplement 4: 641-748.

Schiavini, A. C. M., P. Yorio y E. Frere. 1998. Distribución reproductiva y abundancia de las aves marinas de la Isla Grande de Tierra del Fuego, Islas de los Estados e Islas de Año Nuevo (Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur). Pp. 179-221. En: P. Yorio, E. Frere, P. Gandini y G. Harris (eds.). Atlas de la distribución reproductiva de aves marinas en litoral patagónico argentino, Fundación Patagónica Natural y Wildlife Conservation Society, Buenos Aires.

Schlumpberger, B. O. y E. I. Badano. 2005. Diversity of floral visitors to *Echinopsis atacamensis* subsp. *pasacana* (Cactaceae). Haseltonia 11: 18-26.

Schuchmann, K. L. 1999. Family Trochilidae (Hummingbirds). Pp. 468-680, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 5. Barn-Owls to Hummingbird. Lynx Edicions, Barcelona.

Schulz Neto, A., Serrano, I. L. y M. A. Efe. 2008. Muda e parámetros biométricos de aves migratorias no norte do Brasil. Ornithologica 3: 21-33.

Schulz, M. y R. Gales. 2004. Winter dieto f the subantarctic Skua *Catharacta antarctica* at Macquarie island. Marine Ornith. 32: 179-181.
Sclater, P. L. & O. Salvín. 1871. A revised list of the Neotropical Laridae. Proceedings of the Zoological Society of London, 1871: 564-580.
Sclater, P. L., O. Salvín & A. Newton. 1870. Thid list of birds collected during the survey of the Straits of Magellan, by Dr. Cunningham. Ibis 1870: 499-504.
Scolaro, J. A., S. Laurenti and H. Gallelli. 1996a. The nesting and breeding biology of the South American Tern in Northern Patagonia. J. Field Ornithol. 67 (1): 17-24.
Scott, D. A. & M. Carbonell. 1986. Inventario de humedales de la Región Neotropical (compiladotes). IWRB Slimbridge UICN Cambridge.
Scott, W. E. D. & R. B. Sharpe. 1910. Reports of the Princenton University Expeditions to Patagonia, 1896-1899. Vol. II, Ornithology, Part. II, pp. 113-344.
Scott, W. E. D. & R. B. Sharpe. 1915. Reports of the Princenton University Expeditions to Patagonia, 1896-1899. Vol. II, Ornithology, Part. IV, pp. 505-718.
Scott, W. E. D. y R. B. Sharpe. 1904a. Reports of the Princenton University Expeditions to Patagonia, 1896-1899. Vol. II, Ornithology, Part. I, pp. 1-112.
Seco Pon, J. P. 2015. El Salteador grande (*Stercorarius pomarinus*) asociado a buques pesqueros en el mar argentino. Nuestras Aves 60: 56-58.
Seco Pon, J. P. y M. Favero. 2011. The Olrog´s Gull (*Larus atlanticus*) attending high-seas trawlers during the breeding season. Hornero 26: 105-109.
Seco Pon, J. P. y M. Favero. 2013. Registro de aves continentales a bordo de buques pesqueros en aguas argentinas. Nuestras aves 58: 41-43.
Seebohm, H. 1887. The Geographical Distribution of the Charadriidae, or the Plovers, Sanpipers, Snipes and their allies. London & Manchester, pp. 1-524.
Seewald, P. A. y C. H. F. Pérez. 2009. Aves nuevas o poco frecuentes del Alto Valle de Río Negro, Río Negro, Argentina. Nuestras Aves 54: 25-27.
Segura, L. N., N. Bogado, C. A. Darrieu y D. Montalti. 2014a. La colección de huevos “Pablo Girard” del Museo de La Plata. Probiotica. FCN y M, UNLP, La Plata, Argentina, Serie Técnica y Didáctica 27: 1-14.
Segura, L. N., N. Bogado, C. A. Darrieu y D. Montalti. 2014b. La colección de huevos “Ronald Runnacles” del Museo de La Plata: historia y material depositado. Probiotica. FCN y M, UNLP, La Plata, Argentina, Serie Técnica y Didáctica 27: 1-9.
Seipke, S. H. y G. S. Cabanne. 2008. Breeding of the Rufous-thighed Hawk (*Accipiter erythronemius*) in Argenrina y Brazil. Ornitología Neotropical 19: 15-29.
Serié, P. 1935. El Urutaú o Cacui en cautividad. Hornero 6: 70-73.
Serié, P. y C.H. Smyth.1923. Notas sobre aves de Santa Elena (E. Ríos). Hornero 3: 37-55.
Serié, P.1923d. Un huevo de pirincho *Guira guira* en un nido de *Phytotoma rutila*. Hornero 3: 100.
Serracín, A. R.1998. Presencia del Picaflor rubí *Sephanoides sephanoides,* provincia de La Pampa (Aves, Trochilidae). X RAO: 49. Mar del Plata.
Sérsic, A. N. y A. A. Cocucci. 1996. A remarkable case of ornithophily in *Caldeolaria*: food bodies as rewards for a non-nectarivorus bird. Bot. Acta 109: 172-176.
Sferco, G. D. y M. Nores. 2003. Lista comentada de las aves de la reserva natural Chancaní, Córdoba, Argentina. Hornero 18: 21-29.
Sharpe, R. B. 1896. Catalogue of the Limicolae in the Collection of the British Museum. Vol. 24. London.
Shogren, Elsie. 2011. Nacunda Nighthawk (*Podager nacunda*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=217336
Short, L. L. (Jr.).1971. Aves nuevas o poco comunes de Corrientes. Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Zool. IX (11): 283-309.
Short, L. L. 1975. A zoogeographic analysis of the south american Chaco avifauna. Bull. of the Am. Mus. of Nat. Hist. Vol. 154: art 3. New York. Págs. 255.
Shuford, W. D. y L. B. Spear. 1988. Surverys of breeding Penguins and other Seabird in the South Shetland Island, Antarctica. Janary-February 1987. NOAA. Tecnical Memorandum.
Sick, H. 1953. Zur Kenntnis der brasilianischen Lerchenkuckucke *Tapera* and *Dromococcyx*. Bonn. Zool. Beitr. 4: 305-326.
Siegenthaler, G. B. (Coord.) 2004. Relevamiento de los vertebrados de la provincia de La Pampa. Inventario integrado de los recursos naturales de la provincia de La Pampa. Clima, geomorfología, suelo, vegetación y fauna de vertebrados.

Reedición. INTA.UNLP. Gobierno de La Pampa, CD, multimedia.
Siegenthaler, G., E. Fiorucci, S. Tiranti, P. Borraz, M. Urioste y A. García. 1990. Informe de avance del plan de relevamiento de los vertebrados de la provicia de La Pampa. Agro Pampeanno. Ministerio de Asuntos Agrarios de La Pampa. 18: 38-49.
Siegentlhaler, G. 1984. La avifauna de la Laguna Don Tomás y espejos de agua contiguos. Santa Rosa, La Pampa. Resumen V reunión Argentina de ornitología. Buenos Aires.
Silva Rodríguez, M. P., M. Favero, M. P. Berón, R. Mariano-Jelicich y L. Mauco. 2005. Ecología y conservación de aves marinas que utilizan el litoral bonaerense como área de invernada. Hornero 20: 111-130.
Silva, M. P. y Favero, M. 1993. Comportamiento alimentario de *Larus dominicanus* en Península Potter, isla 25 de Mayo, Shetland del sur, Antártida. VIII RAO: 39. Puerto Iguazú.
Silva, M. P., Bastida, R. y Darrieu, C.A. 1998a. Ecología trófica de la gaviota cocinera *Larus dominicanus*: comparación entre áreas con diferente grado de impacto humano. Resúmenes X RAO: 47. Mar del Plata.
Silva, M. P., Bastida, R. y Darrieu, C.A. 2000. Dieta de la Gaviota cocinera (*Larus dominicanus*) en zonas costeras de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Ornitol. Neotrop. 11: 331-339.
Silva, M. P., Favero, M. y García Mata, C. 1998b. Monitoreo de la dieta de *Larus dominicanus* en distintas localidades del sector antártico occidental. X RAO: 47. Mar del Plata.
Silverio, M. J. y E. A. Fra. 2009. Comunidad de verano de las aves en el Dique Sumampa (Catamarca): su uso en el diagnostico del funcionamiento del Ecosistema. HuaylluBios, 3: 33-51. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de Catamarca.
Simonetti, P. y S. M. Fiori. 2009. Biología reproductiva del Ostrero pardo (*Haematopus palliatus*), en el estuario de Bahía Blanca. XIII RAO: 166. Tafí del Valle, Tucumán.
Simonetti, P., S. M. Fiori, S. E. Botté y J. E. Marcovecchio. 2013. Nidificación del Ostrero común (*Haematopus palliatus*) en el estuario de Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. Hornero 2 (2): 51–58.
Sitters, H. P., González, P. M., Piersma, T., Baker, A. J. y D. J. Price. 2001. Day and nigth feeding habitat of red knots in Patagonia : profitability versus safety ?. J. Field Ornith. 72: 86-95.
Sladen, W. J. L. 1954. Pomarine Skua in the Antarctic. Ibis 96: 315-316.
Smyth, C. H. 1927. Descripción de una colección de huevos de aves argentinas.Hornero 4: 1-16.
Smyth, C. H.1928. Descripción de una colección de huevos de aves argentinas.Hornero 4: 125-152.
Soave, G. E., Darrieu, C. A., Aribalzaga, M. E., Camperi, A. R., Mariano, L., Willians, J. Y M. Juarez. 2008. Dieta del Pirincho (*Guira guira*) en el nordeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina (Cuculiformes: Cuculidae). Rev. Biol. Trop. 56: 1883-1892.
Soave, G. E., G. Marateo, P. Rey, D. Glaz y C. A. Darrieu. 1999b. Evolución estacional de los ensambles de aves en un talar del nordeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. CIC. Informe Nº 55. Mist. de la Prod. y el empleo. Prov. de B. Aires.
Solaro, C., M. A. Santillán, A. S. Costán y M. M. Reyes. 2012. Ecología trófica de *Athene cunicularia* y *Tyto alb*a en el cerro Curru-Mahuida, ecotono monte-espinal, La Pampa, Argentina. Hornero 27: 177-182.
Soncini, R., H. Salas y L. Marcus. 1985. Alimentación de la Lechuza de los campanarios (*Tyto alba*) en San Miguel de Tucumán. Historia Natural 5 (7): 49-54.
Sosa, H. J. 1993a. Citas nuevas de chorlos para Mendoza. Bol. Inf. Grupo Argentino de Limícolas Nº 10, Buenos Aires.
Sosa, H. J. 1993b. Situación de la avifauna acuática de Laguna Blanca “Coihue-Co”, Malargüe, Mendoza. Multequina 2: 243-249.
Sosa, H. J. 1995b. Sobre un nuevo registro para la Argentina del Falaropo Pico Fino *Phalaropus lobatus* (Aves: Phalaropodidae). Bol. Nº 23: 6. Fundación Cullunche.
Sosa, H. J. 1995d. Actualización de la lista de avifauna de la Reserva Provincial Laguna Llancanello, Malargüe, Mendoza. Presencia estacional, referencias de hábitat y nidificación. Multequina 4: 65-75.
Sosa, H. J. 1999. Descripción del evento reproductivo del Flamenco austral (*Phoenicopterus chilensis*) en la laguna Llancanello, Malargüe, Mendoza. Multequina 8: 87-99.
Sosa, H. J. 2003. Nuevos registros de aves acuáticas para la provincia de Mendoza, Argentina. Nuestras Aves 45: 24-26.

Sosa, H. J. 2005. Aves no passeriformes de Llancanello y zonas de influencia. Ed. Aguirre. Mendoza. Pp. 141.

Sosa, H. J. 2009b. Inventario de aves de Mendoza. Informe inédito.

Sosa, H. J. 2010. Presencia del Chorlito ceniciento (*Pluvianellus socialis*) Gray, 1846 en las adyacencias de la reserva provincial Laguna Brava, La Rioja, Argentina. Nótulas Faunísticas 46: 1-4..

Sosa, H. J., M. R. de la Peña y M. Gelain. 2006. El Falaropò de pico fino *Phalaropo lobatus* (Linné, 1758) en Argentina (Aves: Scolopacidae). Xolmis 1: 7-8.

Sosa, R. A. y J. H. Sarasola. 1998. Programa de anillado de aves rapaces en la Reserva Parque Provincial Parque Luro, La Pampa. X RAO: 50.

Sosa, R., H. G. Matteazzi y F. N. Marcelino. 1993. Dieta de *Tyto alba tuidara* (Aves: Strigiformes) en el Parque Nacional Lihue Calel, La Pampa, Argentina. V Jornadas Pampeanas de Ciencias Naturales, Santa Rosa, Argentina. : 148-151.

Spegazzini, C. 1920. El gigante de los picaflores en La Plata. Hornero 2: 138.

Speziale, K. L. y S. A. Lambertucci. 2009. El Picaflor gigante (*Paragonas gigas*) en la provincia de Río Negro. Nuestras Aves 54: 39-40.

Spinuzza, J. M. 2009b. Primer registro del Picaflor enano (*Microstilbon burmeisteri*) en la provincia de Córdoba. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 28: 1-3.

Spinuzza, J. M. 2014. Primer registro de Torcacita colorada (*Columbina talpacoti*) para la provincia de La Rioja, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 155: 1-6.

Spivak, E. D. y N. Sanchez. 1992. Prey selection by *Larus belcheri atlanticus* in Mar Chiquita lagoon, Buenos Aires, Argentina : a possible explanation for its discontinuos distribution. Rev. Chilena de Hist. Natural 65: 209-220.

Steullet, A. B. y E. A. Deautier. 1935-1946. Catálogo sistemático de las aves de la República Argentina. 1: 1-1006. La Plata.

Steullet, A. B. y E. A. Deautier. 1939. Catálogo sistemático de las aves de la República Argentina. Obra del Centenario del Museo de La Plata. Unv. Nac. de La Plata. Tomo 1 (3º entrega): 493-732.

Stiles, E. W. 1979a. Censo de aves en el Canal de Beagle. El Hornero 12 (1): 79-81.

Stone, W. 1928. Reports of the Princeton University Expedition to Patagonia, 1896-1899. Vol. II, Ornithology, Part. V, pp. 719-857.

Stouffer, P. C. y R. O. Bierregaard. 1993. Spatial and temporal abundance patterns of Ruddy Quai-Dove (*Geotrygon montana*) near Manaus, Brazil. Condor 95: 896-903.

Straneck, R. 1990a. Canto de las aves patagónicas. Mar-Meseta-Bosques. L.O.L.A. Buenos Aires.

Straneck, R. 1990b. Canto de las aves pampeanas I. L.O.L.A. Buenos Aires.

Straneck, R. 1990c. Canto de las aves pampeanas II. L.O.L.A. Buenos Aires.

Straneck, R. 1990d. Canto de las aves de las serranías centrales. L.O.L.A. Buenos Aires.

Straneck, R. 1990e. Canto de las aves de los esteros y palmares. L.O. L.A. Buenos Aires.

Straneck, R. 1990f. Canto de las aves del noroeste, selva y puna. L. O. L.A. Buenos Aires.

Straneck, R. 1990g. Canto de las aves de Misiones I. L.O.L.A. Buenos Aires.

Straneck, R. 1990h. Canto de las aves de Misiones II. L.O.L.A. Buenos Aires.

Straneck, R. J. y A. Johnson. 1990. *Nyctibius aethereus* (Wied, 1820) nueva especie para la República Argentina (Aves, Nyctibiidae). Nótulas Faunísticas 23: 1-3.

Straneck, R. J. y F. Vidoz. 1995. Sobre el estado taxonómico de *Strix rufipes* (King) y de *Strix chacoensis* (Cheerie y Reichenberger) (Aves: Strigidae). Nótulas Faunísticas 74: 1-5.

Straneck, R. J. y M. J. Viñas. 1994. Comentarios sobre costumbres y manifestaciones acústicas del Atajacaminos de los pantanos, *Eleothreptus anomalus* (Gould, 1838) (Aves, Caprimulgidae). Nótulas Faunísticas 67: 1-4.

Straneck, R. J., R. Ridgely y J. Rodríguez Mata. 1987b. Dos nuevas lechuzas para la Argentina: Caburé andino *Glaucidium jardinii* y Lechucita vermiculada *Otus guatemalae* (Aves, strigidae). Comun. Mus. Arg.Cienc. Nat. Zool. 4: 137-139.

Straneck, R. J., R. Ridgely, M. Rumboll y J. Herrera. 1987a. El nido del Atajacaminos castaño *Lurocalis nattereri* (Temminck) (Aves, Caprimulgidae). Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. "B. Rivadavia". Zool. Tomo 4: 133-136.

Straneck, R. J.1999a. Nuevas localidades para Aves de la Argentina. Rev. Mus.Argentino Cienc. Nat, n.s. 1(2): 173-180.

Studer, A. y D. M. Teixeira.1994. Notes on the Buff-Fronted Owl *Aegolius harrisii* in Brazil. Bull. B.O.C. 114: 62-63.

Suárez, N. y P. Yorio. 2005. Foraging patterns of breeding Dolphin Gulls *Larus scoresbii* at Punta Tombo, Argentina. Ibis 147: 544-551.

Suárez, N., C. Marinao, T. Kasinsky y P. Yorio. 2014. Distribución reproductiva y abundancia de gaviotas y gaviotines en el área natural protegida Bahía San Blas, Buenos Aires. Hornero 29 (1): 29–36.

Suárez, N., L. Pozzi y P. Yorio. 2010. Nest site selecction of the Kelp gull (*Larus dominicanus*) in the Beagle Channel, Tierra del Fuego, Argentina. Polar Biol. 33: 215-221.

Suárez, N., M. V. Retama y P. Yorio. 2008. Patrones de alimentación de la Gaviota de Olrog (*Larus atlanticus*) durante la temporada reproductive en Bahía San Blas, Buenos Aires. XII RAO: 108. San Martín de los Andes, Neuquén.

Sutton, P., S. Heinonen Fortabat, G. Gil y J. C. Chebez. 1988. Relevamiento de las colonias de nididficación de aves marinas del litoral marítimo de Santa Cruz, Argentina. Fundación Vida Silvestre Argentina, Buenos Aiores.

Tallade, P. O., C. Verategua y G. N. Nungesser. 1998a. Alimentación de la Lechuza de campanario *Tyto alba* (Aves, Tytonidae) en la provincia de La Pampa. Resúmenes X RAO: 50. Mar del Plata.

Tallade, P., S. I. Tiranti, N. Gouts, M. E. Orroño, L. Rastelli, P. Tejerina y R. Serracín.1998b. Observaciones sobre la nidificación y almacenamiento de presas de la Lechuza de campanario *Tyto alba* (Aves, Tytonidae) en la Reserva "Parque Luro", provincia de La Pampa. X RAO: 51. Mar del Plata.

Tambussi, E. y F. Moschione. 1988. Presencia de la Paloma cenicienta *Columba maculosa* en el este de la provincia de Buenos Aires. Garganchillo 8: 10-11.

Tejerina, P., M. J. Turnes y S. L. Tiranti. 2006. Aves. En: Salomone, F. y N. Gouts. (eds.). Los vertebrados de las áreas protegidas de la provincia de La Pampa. Ed. Santa Rosa, La Pampa, Argentina.

Terán, E y F. Ortiz. 2005. Nuevo registro del Alilicucu yungueño (*Otus hoyi*) en la provincia de Tucumán, Argentina. Nuestras Aves 49: 26-27.

Teta, P. y A. Andrade. 2002. Micromamíferos depredados por *Tyto alba* (Aves: Tytonidae) en las sierras de Talagapa (Provincia del Chubut, Argentina). Neotrópica 48: 88-90.

Teta, P., C. Panti, A. Andrade y A, Perez. 2001. Amplitud y composición de la dieta de *Bubo virginianus* (Aves: Strigiformes: Strigidae) en la patagonia noroccidental Argentina. Bol. Soc. Biol. Concepción, Chile. Tomo 72: 131-138.

Teta, P., S. Malzof, R. Quintana y J. Pereira.2005. Presas de *Bubo virginianus* (Aves, Strigidae) en el delta del Paraná (Buenos Aires, Argentina). XI RAO: 166. Buenos Aires.

Teta, P., S. Malzof, R. Quintana y J. Pereira.2006. Presas del Ñacurutú (*Bubo virginianus*) en el bajo delta del río Paraná (Buenos Aires, Argentina). Ornitología Neotropical 17: 441-444.

Thurber, Walter A., Rebecca Lohnes, and Thomas S. Schulenberg. 2009. Striped Owl (*Pseudoscops clamator*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=36400

Tiranti, S. I. 1992. Barn Owl prey Southern La Pampa, Argentina. J. Raptor Res. 26 (2): 89-92.

Tiranti, S. I. 1994. Mammal prey of the Barn Owl (*Tyto alba*) in Parque Provincial Parque Luro Reserve, La Pampa, Argentina. Hystrix, Revista diTermología. Associazione Teriologia Italiana, 5: 47-52.

Tiranti, S.; Serracín, R.; Tejerina, P. y Rastelli, L. 1998. Alimentación de la Lechucita vizcachera *Speotyto cunicularia,* (Aves, Strigidae) en arbustales semiáridos de la provincia de La Pampa. X RAO: 48. Mar del Plata.

Tittarelli, F.2002. Aves de la ribera del río Colorado en La Pampa, una nueva cita para la provincia y dos especies poco comunes. Nuestras Aves 44: 9.

Tittarelli, R. F. y D. Villareal. 2009a. Registro de reproducción del Lechuzón orejudo (*Asio clamator*) en el bosque de caldén (*Prosopis caldenia*) de La Pampa, Argentina. Nuestras Aves 54: 32-33.

Tolosa y Gelain 2007. Aves del Río Negro Superior y Medio. Convenio AIC- Secretaríade Turismo de Río Negro. Pomona-Desembocadura.

Tolosa, J. y M. A. Gelain. 2012. Nuevos registros de dos especies de Gaviotines (Aves: Sternidae) para la provincial de Río Negro, Argentina. Xolmis 17: 1-4.

Torregiani, F., P. Teta, C. Massa y G. R. Cueto. 2015. Superposición entre el Lechuzón orejudo (*Pseudoscops clamator*) y la Lechuza de campanario (*Tyto alba*) en el partido de Tigre, provincia de Buenos Aires. Nuestras Aves 60: 101-103.

Torres, R. y P. Michelutti. 2001a. Las aves de ambientes acuáticos del sistema Laguna Mar Chiquita – Bañados del Río Dulce (provincias de

Córdoba y Santiago del Estero, Argentina. Bol. Acad. Nac. Cienc. Córdoba 66: 61-73.

Torres, R. y P. Michelutti. 2005. Bañados del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 134-137. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.

Torres, R., P. Michelutti, J. León, G. Bruno y W. Cejas. 2006. Nuevas citas y comentarios sobre rapaces en la región central de Argentina (Provincias de Catamarca, Córdoba y Santiago del Estero). Nuestras Aves 52: 13-15.

Travaini, A., J. A. Donázar, O. Ceballos, A. Rodríguez, F. Hiraldo y M. Delibes.1997. Food habits of Common Barn-Owls along an elevational gradient in Andean Argentine, Patagonia. J. Raptor Res. 31 (1): 59-64.

Travaini, A., J. Bustamante, J. J. Negro y R. D. Quintana. 2004. ¿Puntos fijos o recorridos lineales para el censo de aves en la estepa patagónica?. Ornitología Neotropical15: 513-525.

Travaini, A., Santillán, M. A. y S. C. Zapata. 2012. Diet of the Red-backed Hawnk (*Buteo polyosoma*) in two environmentally contrasting areas of Patagonia. Stud. Neotr. Fauna Env. 47: 25-32.

Trejo, A. y D. Grigera. 1998. Food habits of the Great Horned Owl (*Bubo virginianus*) in a Patagonian steppe in Argentina. J. Raptor Res. 32 (4): 306-311.

Trejo, A. y Lambertucci, S. 2007. Feeding habits of Barn Owls along a vegetative gradient in northern patagonia. J. Raptor Res. 41(4): 77–287.

Trejo, A. y S. Seijas. 2003. Una estimación de aves muertas en ruta en el Parque Nacional Nahuel Huapi, noroeste de la Patagonia, Argentina. Hornero 18: 97-101.

Trejo, A. y V. Ojeda.2004. Diet of Barn Owls (*Tyto alba*) in forested habitats of northwestern Argentine Patagonia. Ornitología Neotropical 15: 307-311.

Trejo, A., M. Kun y S. Seijas.2006a. Dieta del Águila Mora (*Geranoaetus melanoleucus*) en una transecta oeste-este en el ecotono norpatagónico. Hornero 21 (1): 31-36.

Trejo, A., M. Kun, M. Sahores y S. Seijas. 2005a. Diet overlap and prey size of two owls in the forest-steppe ecotone of southern Argentina. Ornitología Neotropical 16: 539-546.

Trejo, A., N. Guthmann y M. Lozada. 2005c. Seasonal selectivity of Magellanic horned owl (*Bubo magellanicus*) on rodents. Eur. J. Wildl Res. 51: 185-190.

Trejo, A., V. Ojeda, M. Kun and S. Seijas. 2006b. Prey of White-throated Hawks (*Buteo albigula*) in the southern temperate forest of Argentina. J. Field Ornithol. 77 (1): 13-17.

Udrizar Sauthier, D. E., Andrade, A. y U. f. J. Pardiñas. 2005. Predation of small mammals by Rufous-legged Owl, Barn Owl, and Magellanic Horned Owl in argentinean Patagonia forests. J. Raptor Res. 39: 163-166.

Urcola, M. R. 2011. Aberraciones cromáticas en aves de la colección ornitológica del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. Rev. Mus. Argentino Cienc. Nat., n. s. 13(2): 221-228.

Vandecaveye, A., F. Gorleri y M. C. Gorleri. 2015. La Lechuza bataraz chaqueña (*Strix chacoensis*) y su presencia en áreas pobladas del centro-oeste formoseño. XVI. Reunión Argentina de Ornitología: 161. La Plata. Buenos Aires.

Vargas, R. J., M. S. Bó y M. Favero. 2007. Diet of the Southern Caracara (*Caracara plancus*) in Mar Chiquita Reserve, Southern Argentina. Raptor Research Foundation, 41 (2): 113-121.

Vargas, R. J., M. S. Bó y M. Favero. 2007. Diet of the Southern Caracara (*Caracara plancus*) in Mar Chiquita Reserve, Southern Argentina. Raptor Research Foundation, 41 (2): 113-121.

Vasina, W. G. 1975. Algunas consideraciones sobre “*Falco peregrinus”* en nuestro país. Hornero 11: 281-284.

Veiga, J. O. y G. Dupuy. 2009. Nuevas especies y registros de aves para la provincia de Neuquén, Argentina. Nuestras Aves 54: 79-81.

Veiga, J.O., F. Filiberto, M. Babarskas y C. Savigny. 2005. Aves de la provincia de Neuquén. Patagonia Argentina. Lista comentada y distribución. 184 págs. Edit. R y C.

Veiga, J.O., U. Colina, R. Güller, C. Savigny y P. Rodríguez Elías. 2014. Actualizaciones sobre la presencia de algunas especies de aves no passeriformes en las provincias de Jujuy y Salta, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 150: 1-15.

Vides Alminacid, R. 1991. La alteración del boque de Yungas en Tucumán, Argentina y el uso de las aves como indicadores ecológicos para el diseño de zonas de amortiguamiento en áreas protegidas. Tesis Maestría Sc. Programa de Maestría de

Manejo de Vida Silvestre para Mesoamérica y el Caribe, Universidad de Costa Rica, 210 pp.
Vides Alminacid, R. 1993. Estudio comparativo de las taxocenosis de aves de los bosques montanos de Sierra de San Javier, Tucumán, Argentina. Bases para su manejo y conservación- Tesis doctoral, Facultad de Ca. Naturales, Universidad Nacional de Tucumánnn, Argentina, 347 pp.
Vides Almonacid, R. 1990. Observaciones sobre la utilización del hábitat y la diversidad de especies de aves en una laguna de la puna argentina. Hornero 13: 117-128.
Vidoz, F.1995. Lista de aves Parque Nacional Lago Puelo, Chubut, Argentina (Foll. del PN. Puelo)
Vilches, A. y G. Berasain. 1998. Nidificación de la Gaviota capucho café *Larus maculipennis* en la Laguna Lacombe, Buenos Aires. X RAO: 54. Mar del Plata.
Villabriga, M. L., L. O. Bala, M. de los A. Hernández, G. García Peña y S. Tomás. 2009. Características del hábitat de nidificación del Chorlo doble collar en playas cercanas a Puerto Madryn, Chubut, Argentina. Libro de Resúmenes. XIII RAO. Tafí del Valle, Tucumán, Argentina: 68.
Vitale, S., K. Cokle, A. Bodrati, C. Ferrari, I. Roesler, E. Jordán y D. Ramos. 2010. Nidificación y distribución de la Torcaza alas blancas (*Zenaida meloda*) en Argentina. Nuestras Aves 55: 6-8.
Volkmann, L y R. Cargnelutti. 2001. Nuevas localidades para aves de Córdoba, Argentina. Nuestras Aves 41: 23-26.
Vuilleumier, F.1993b. Field study of allopatry, sympatry, parapatry, and reproductive isolation in steppe birds of patagonia. Ornitología neotropical 4 (1): 1-41.
Wace, R. H. 1921. Lista de aves de las islas Falkland. Hornero 2: 194-204.
Wallace, P. 2010. Primer registro de nidificación de Lechuza bataraz austral (*Strix rufipes*) en Argentina. Nuestras Aves 55: 3.
Waller, T., Micucci, P. A. y E. Alvarenga. 2007. Conservation biology of the Yellow Anaconda (*Eunectes notaes*) in Northeasterm Argentina. Pp. 340-362 en Henderson, R. W. y R. Powell (eds) Biology of the Boas and Pythons. Eagle Montain Publishing, L. C. Utah.
Watson, G. E. 1975. Birds of the Antarctic and Sub-antarctic. American Geophysical Union, Washington, D. C. Pp. 1-350.
Wayar, C. y J. M. Segura. 2014. Nueva localidad para el Picaflor andino castaño (*Oreotrochilus adela*) en Argentina. Nuestras Aves 59: 28-29.
Weller, M. W. 1967a. Notes some marsh birds of Cape San Antonio, Argentina. Ibis 109: 391-411.
Wetmore, A. 1939. Recent observations on the Eskimo Curlew in Argentina. Auk 56: 475-476.
Wetmore, A.1926a. Report on a collection of birds made by J. R. Pemberton in Patagonia. University of California Publications in Zoology 24 (4): 395-474.
Wetmore, A.1926b. Observations on the birds of Argentina, Paraguay, Uruguay and Chile. United States Nat. Mus. Bull. 133: 1-448.
Wexman, Mary, Alvaro Jaramillo, and Thomas S. Schulenberg. 2013. Chilean Pigeon (*Patagioenas araucana*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=170901
White, E. 2001b. Guaycolec. Un refugio muy particular. Naturaleza y Conservación Nº 3: 28-31.
White, E. W. 1882. Notes on birds collected in the Argentine Republic. Proc. Zool. Soc. London, 591-629.
Willianson, J. 1975. Alimentación de algunas aves de La Pampa. El Hornero 11(4): 322-324.
Willianson, J.1971. Observaciones de aves poco comunes en La Pampa. Hornero 11: 124.
Willis, E. O. y Y. Oniki. 2002. Birds of Santa Teresa, Espírito Santa, Brazil: Do Humans add or substract species ?. Papeis Avulsos de Zoologia 42: 193-264.
Wilson, A. S. 1923a. Notas biológicas sobre algunas aves de Santa Fe. Hornero 3: 84-89.
Wilson, A. S.1926. Lista de aves del sur de Santa Fe. Hornero 3: 349-362.
Wilson, D. B. 1977. Comportamiento de algunas aves de Mercedes (Provincia de Corrientes) Hornero 11: 430-432.
Withington, F. 1888. On the Birds of Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentine, Ibis 1888: 461-473.
Wolffhügel, K. 1929. La exploración de la Alta Cordillera de Mendoza. Círculo Militar. Biblioteca del Oficial. Buenos Aires.
Woods, R. W. 1988. Guide to birds of the Falkland Island. Anthony Nelson, Oswestry, Inglaterra.
Woods, R. W. 2006. Checklist of Falkland Islands Birds.

Woods, R.W. y Woods, A. 1997. Atlas of Breeding Birds of the Falkland *Islands.* Anthony Nelson, Oswestry.

Yepes, J. 1939. Contribución al conocimiento de la Biocenosis del Oeste de la Gobernación del Neuquén. Revista del centro de estudios del doctorado en ciencias Naturales, 2 (5): 65-81.

Yorio, P. M. y G. Harris.1992. Actualización de la distribución reproductiva, estado poblacional y de conservación de la Gaviota de Olrog (*Larus atlanticus*). Hornero 13: 200-202.

Yorio, P. y M. Bertellotti.2002. Espectro trófico de la Gaviota cocinera (*L. dominicanus*) en tres áreas protegidas de Chubut, Argentina. Hornero 17: 91-95.

Yorio, P. y P. García Borboroglu. 2002. Breeding biology of Kelp Gulls (*Larus dominicanus*) at Golfo an Jorge, Patagonia, Argentina. Emu 102: 1-7.

Yorio, P., D. E. Rábano y P. Friedrich. 2001. Habitat and nest site characteristics of Olrog´s Gull *Larus atlanticus* breeding at Bahía San Blas, Argentina. Bird Consevation International 11: 25-32.

Yorio, P., D. Rábano, F. Rabuffetti, P. Friedrich y G. Harris. 1998c. Distribución reproductiva y abundancia de las aves marinas de la provincia de Buenos Aires: Bahía Blanca a Punta Redonda. Pp. 19-28. En: P. Yorio, E. Frere, P. Gandini y G. Harris (eds.). Atlas de la distribución reproductiva de aves marinas en litoral patagónico argentino, Fundación Patagónica Natural y Wildlife Conservation Society, Buenos Aires.

Yorio, P., E. Frere, P. Gandini y W. Conway. 1999. Status and conservation of seabirds breeding in Argentina. Bird Consevation International 9: 299-314.

Yorio, P., F. Quintana, C. Campagna y G. Harris. 1994b. Diversidad, abundancia y dinámica espacio-temporal de la colonia mixta de aves marinas en Punta León, patagonia. Ornitología Neotropical 5: 69-77.

Yorio, P., G. Punta, D. Rábano, F. Rabuffetti, G. Herrera, J. Saravia y P. Friedrich. 1997. Newly discovered breeding sites of Olrog´s Gull *Larus atlanticus* in Argentina. Bird Consercation International, 7: 161-165.

Yorio, P., M. Bertellotti y P. García Borboroglu. 2005a. Estado poblacional y de conservación de gaviotas que se reproducen en el litoral marítimo argentino. El Hornero. 20 (1): 53-74.

Yorio, P., M. Bertellotti, P. García Borboroglu, A. Carribero, M. Ciaccardi, M. E. Lizurume, D. Boersma y F. Quintana. 1998a.Distribución reproductiva y abundancia de las aves marinas de Chubut. Parte I: de Península Valdés a Islas Blancas. Pp. 39-73. En: P. Yorio, E. Frere, P. Gandini & G. Harris (eds.). Atlas de la distribución reproductiva de aves marinas en litoral patagónico argentino, Fundación Patagónica Natural y Wildlife Conservation Society, Buenos Aires.

Yorio, P., P. Dee Boersma y S. Swann. 1996. Breeding Biology of the Dolphin Gull at Punta Tombo, Argentina. Cordor 98: 208-215.

Yorio, P., P. García Borboroglu, M. Bertellotti, A. Carrilero, M. E. Lizurume, M. Giaccardi, G. Punta, J. Saravia, G. Herrera, S. Sollazzo y D. Boersma. 1998b. Distribución reproductiva y abundancia de las aves marinas de Chubut. Parte II: Norte del Golfo San Jorge, de Cabo Dos Bahías a Comodoro Rivadavia. Pp. 75-118. En: P. Yorio, E. Frere, P. Gandini y G. Harris (eds.). Atlas de la distribución reproductiva de aves marinas en litoral patagónico argentino, Fundación Patagónica Natural y Wildlife Conservation Society, Buenos Aires.

Yorio, P., P. Petracci and P. García Borboroglu. 2013. Current status of the threatened Olrog´s Gull Larus atlanticus: global population, breeding distribution and threats. Bird Conservation International: 1-10.

Yorio, P., P. Petracci, M. Magnanelli, M. Sotelo, N. Suárez, M. Carrizo, V. Delhey, R. Sarria, R. O. Amado, O. H. Jensen, M. L. Agüero, y P. García Borboroglu. 2012. Actualización del estado de la población reproductiva de la Gaviota de Olrog (*Larus atlanticus*). Informe Técnico inédito. 37 pp.

Yorio, P.2005. Estado poblacional y de conservación de Gaviotines y Escúas que se reproducen en el litoral marítimo argentino. Hornero 20: 75-93.

Yzurieta, D.1995. Manual de reconocimiento y evaluación ecológica de las aves de Córdoba. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables. Córdoba.

Zalba, S. M. y C. J. Belenguer.1996. Nidificación del Gaviotín sudamericano (*Sterna hirundinacea*) en Bahía San Blas, Buenos Aires. Nuestras aves 35: 33-34.

Zapata, A. R. P. 1969. Aves observadas en el Golfo San Jorge, Provincias de Chubut y Santa Cruz, Argentina. Zoología Platense, 1: 21-27.

Zapata, A. R. P. y A. M. A. de Cabrera. 1969. Sobre una colección de huevos de aves silvestres. Comunicaciones Vol. 1 Nº 5: 73-97. La Plata.

Zapata, A. R. P. y E. M. Zazarino de Bustingorry. 1990. Observaciones de campo sobre algunas aves

que nidifican en el partido 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires. Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral 21: 91-94.
Zapata, A. R. P.1967. Observaciones sobre aves de Puerto Deseado, Provincia de Santa Cruz. Hornero 10: 351-378.
Zapata, A. R. P.1975. Aves observadas en la proximidad de la confluencia de los ríos Uruguay y Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Hornero 11: 291-304.
Zapata, A. R. P.1977. Aves observadas en la proximidad de la confluencia de los ríos Uruguay y Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Hornero 11: 387-403.
Zapata, A. R. P.1998. Aves registradas en la región de la laguna Chasicó, sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Natura Neotropicalis 29 (2): 156-161.
Zarco, A. y N. A. Villafañe. 2010. Nuevo registro del Picaflor garganta blanca (*Leucochloris albicollis*) para la provincia de Córdoba, Argentina. Nuestras Aves 55: 4.
Zelaya, D., T. Narosky, S. Di Martino y P. Petracci. 1997. Albinismo en un ejemplar de Ostrero común (*Haematopus palliatus*). Nuestras aves 37: 1-2.
Zelaya, P. V., P. G. Blendinger, M. Gabriela Núñez Montellano y L. Macchi. 2008. Comportamientos de defensa y consumo del recurso savia por machos y hembras de *Melanerpes cactorum* durante la estación seca. Resúmenes. XII RAO: 121. San Martín de los Andes. Neuquén.
Zimmer, J. T. 1950. Studies of Peruvian birds. Nº 59. The genera *Polytmus, Leucippus* and *Amazilia*. American Museum Novitates.N º 1475: 1-27.
Zotta, A. R. 1932. Notas sobre el contenido estomacal de algunas aves. Hornero 5: 77-81.
Zotta, A. R. 1934. Sobre el contenido estomacal de algunas aves. Hornero 5: 376-383.
Zotta, A. R. 1936a. Notas ornitológicas. El *Thinocorus rumicivorus bolivianus* Lowe., en la Puna de Jujuy. Hornero 6: 290.
Zotta, A. R. 1936b. Notas ornitológicas. La becasina, *Capella paraguaiae andina* Tacz., nueva para la Argentina. Hornero 6: 289-290.
Zotta, A. R. 1936c. Notas ornitológicas. Un ostrero más para la fauna argentina. Hornero 6: 289.
Zotta, A. R. 1937a. Notas ornitológicas. Hornero 6: 477-483.
Zotta, A. R. 1937b. Notas ornitológicas. Un nuevo "Pirincho" para la fauna argentina. Hornero 6: 479-480.
Zotta, A. R. 1939a. Otras adiciones a la avifauna argentina. Hornero 7: 243-255.
Zotta, A. R. 1940c. Lista sobre el contenido estomacal de las aves argentinas. Hornero 7: 402-411.
Zotta, A. R. 1944a. Lista sistemática de las aves Argentinas. Mus. Argen. Cienc. Nat. Buenos Aires.
Zotta, A. R.1942c. Notas ornitológicas. Hornero 8: 171-178.
Zuberbhüler, E. A.1971.Observaciones sobre las aves de la provincia de Buenos Aires. Hornero 11: 98-112.
Zusi, R. L. 1996. Family Rynchopidae (Skimmers), Pp. 668-677, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 3. Hoatzin to Auks. Lynx Edicions, Barcelona.